Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1453/2004

(2004. gada 16. augusts)

par pastāvīgu atļauju izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 269, 17.8.2004., 3. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1399 (2015. gada 17. augusts)	L 217	1	18.8.2015.
►M2	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/447 (2017. gada 14. marts)	L 69	18	15.3.2017.

▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1453/2004

(2004. gada 16. augusts)

par pastāvīgu atļauju izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Preparātus, kas ir uzskaitīti I un II pielikumā grupā "Mikroorganismi" un "Fermenti", ir atļauts izmantot kā piedevas dzīvnieku uzturā bez termiņa, ievērojot minētajos pielikumos ietvertos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M2

▼B

II PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					Aktīvās vienības/kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1609	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4	Ar *Aspergillus niger* (CBS 600.94) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,4-beta-glikanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: ar pārklājumu: endo-1,4-beta-ksilanāze: 36 000 FXU ([1])/g endo-1,4-beta-glikanāze: 15 000 BGU ([2])/g šķidrā veidā: endo-1,4-beta-ksilanāze: 36 000 FXU/ml endo-1,4-beta-glikanāze: 15 000 BGU/ml cietā stāvoklī: endo-1,4-beta-ksilanāze: 36 000 FXU/g endo-1,4-beta-glikanāze: 15 000 BGU/g	Gaļas cāļi	—	4 860 FXU 2 025 BGU	— —	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos tiek norādīta glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 4 860–6 000 FXU 2 025–2 500 BGU. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav ciete (galvenokārt ar arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piem., maisījumā, kas satur vairāk nekā 35 % miežu un vairāk nekā 20 % kviešu.	Beztermiņa
			Gaļas tītari	—	6 000 FXU 2 500 BGU	— —	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos tiek norādīta glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas. 2. . Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 6 000 FXU 2 500 BGU. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav ciete (galvenokārt ar arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piem., maisījumā, kas satur vairāk nekā 40 % kviešu.	Beztermiņa

▼B

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					Aktīvās vienības/kg kompleksās barības			
			Sivēni (atšķirtie)	—	6 000 FXU	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos tiek norādīta glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 6 000 FXU 2 500 BGU. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav ciete (galvenokārt ar arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piem., maisījumā, kas satur vairāk nekā 30 % kviešu un vairāk nekā 30 % kviešu. 4. Izmantošanai atšķirtajiem sivēniem līdz aptuveni 35 kg.	Beztermiņa
					2 500 BGU	—		
E 1610	Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Aspergillus niger* (CBS 600.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: ar pārklājumu: endo-1,4-beta-glikanāze: 10 000 BGU ([3])/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 4 000 FXU ([4])/g šķidrā veidā: endo-1,4-beta-glikanāze: 20 000 BGU/ml endo-1,4-beta-ksilanāze: 8 000 FXU/ml cietā stāvoklī: endo-1,4-beta-glikanāze: 20 000 BGU/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 8 000 FXU/g	Gaļas cāļi	—	5 000 BGU	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos tiek norādīta glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 5 000–10 000 BGU 2 000–4 000 FXU. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav ciete (galvenokārt ar arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piem., maisījumā, kas satur vairāk nekā 60 % miežu.	Beztermiņa
					2 000 FXU	—		

▼B

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					Aktīvās vienības/kg kompleksās barības			
E 1611	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Poligalakturonāze EC 3.2.1.15	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūtas poligalakturonāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 400 U ([5])/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U ([6])/g poligalakturonāze: 50 U ([7])/g	Nobarojamās cūkas	—	endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 400 U	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos tiek norādīta glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 400 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U poligalakturonāze: 50 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav ciete (galvenokārt ar arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piem., maisījumā, kas satur vairāk nekā 40 % miežu.	Beztermiņa
					endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U	—		
					poli-galakturonāze: 50 U	—		
E 1612	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1	Ar *Aspergillus niger (phoenicis)* (NRRL 25541) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Aspergillus oryzae* (ATCC 66222) iegūtas alfa-amilāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 275 U ([8])/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U ([9])/g Alfa-amilāze: 3 100 U ([10])/g	Sivēni (atšķirtie)	—	endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 138 U	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos tiek norādīta glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 138 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 200 U alfa-amilāze: 1 550 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav ciete, piem., jauktā uzturā, kurā ietilpst mieži, kukurūza, kvieši. 4. Izmantošanai atšķirtajiem sivēniem līdz aptuveni 35 kg.	Beztermiņa
					endo-1,4-beta-ksilanāze: 200 U	—		
					alfa-amilāze: 1 550 U	—		

▼B

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					Aktīvās vienības/kg kompleksās barības			
E 1613	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6–10W) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: pulvera veidā: 70 000 IFP ([11])/g šķidrā veidā: 7 000 IFP/ml	Gaļas cāļi	—	1 050 IFP	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos tiek norādīta glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 400 IFP. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav ciete (galvenokārt ar arabinoksilāniem), piem., maisījumā, kas satur vairāk nekā 40 % kviešu.	Beztermiņa

([1]) 1 FXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 40 °C, no ksilāna, kurš piesaistīts azurīnam, atbrīvo 0,15 mikromolus ksilozes minūtē.
([2]) 1 BGU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 40 °C, no beta-glikāna, kurš piesaistīts azurīnam, atbrīvo 0,15 mikromolus ksilozes minūtē.
([3]) 1 BGU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 40 °C no beta-glikāna, kurš piesaistīts azurīnam, atbrīvo 0,15 mikromolus ksilozes minūtē.
([4]) 1 FXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 40 °C, minūtē no ksilāna, kurš piesaistīts azurīnam, atbrīvo 0,15 mikromolus ksilozes minūtē.
([5]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 30 °C, no miežu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošā cukura (glikozes ekvivalentus) minūtē.
([6]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,3 un temperatūra 50 °C, no auzu pelavu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošā cukura (ksilozes ekvivalentus) minūtē
([7]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 40 °C, no poli D-galakturonsubstrāta izdala 1 mikromolu reducējošu vielu (galakturonskābes ekvivalentus) minūtē.
([8]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 40 °C, no auzu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošā cukura (glikozes ekvivalentus) minūtē.
([9]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,0 un temperatūra 30 °C, no auzu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošā cukura (glikozes ekvivalentus) minūtē.
([10]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,0 un temperatūra 30 °C, no kviešu cietes atbrīvo 1 mikromolu reducējošā cukura (glikozes ekvivalentus) minūtē.
([11]) 1 IFP ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,8 un temperatūra 50 °C, no auzu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošā cukura (to mēra kā ksilozes ekvivalentu) minūtē.