Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1453/2004

2004 m. rugpjūčio 16 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti pašaruose tam tikrus priedus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 269, 2004 8 17, p. 3)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2015 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1399	L 217	1	2015 8 18
►M2	2017 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/447	L 69	18	2017 3 15

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1453/2004

2004 m. rugpjūčio 16 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti pašaruose tam tikrus priedus

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

I ir II prieduose nurodytus „Mikroorganizmų“ ir „Fermentų“ grupei priskiriamus preparatus leidžiama neribotą laiką naudoti kaip pašarų priedus laikantis minėtuose prieduose nustatytų reikalavimų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M2

▼B

II PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, apibūdinimas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimas galioja
					Aktyvumo vienetų/kg visaverčio pašaro			
Fermentai								
E 1609	Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4	Endo-1,4-beta-ksilanazės ir endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš *Aspergillus niger* (CBS 600.94), preparatas, kurio aktyvumas ne mažesnis kaip: Apvalkale: Endo-1,4-beta- ksilanazė: 36 000 FXU ([1])/g Endo-1,4-beta- gliukanazė:15 000 BGU ([2])/g Skysto pavidalo: Endo-1,4-beta- ksilanazė:36 000 FXU/ml Endo-1,4-beta- gliukanazė:15 000 BGU/ml Kieto pavidalo: Endo-1,4-beta-ksilanazė:36 000 FXU/g Endo-1,4-beta-gliukanazė:15 000 BGU/g	Viščiukai broileriai	—	4 860 FXU	—	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma kg visaverčio kombinuotojo pašaro: 4 860–6 000 FXU 2 025–2 500 BGU. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 35 % miežių ir 20 % kviečių.	Neribotą laiką
					2 025 BGU	—		
			Penimi kalakutai	—	6 000 FXU	—	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma kg visaverčio kombinuotojo pašaro: 6 000 FXU 2 500 BGU. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 40 % kviečių.	Neribotą laiką
					2 500 BGU	—		

▼B

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, apibūdinimas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimas galioja
					Aktyvumo vienetų/kg visaverčio pašaro			
			Paršeliai (nujunkyti)	—	6 000 FXU	—	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma kg visaverčio kombinuotojo pašaro: 6 000 FXU 2 500 BGU. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 30 % kviečių ir 30 % *kviečių*. 4. Nujunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg.	Neribotą laiką
					2 500 BGU	—		
E 1610	Endo-1,4-beta- gliukanazė EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beta- ksilanazė EC 3.2.1.8	Endo-1,4-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Aspergillus niger* (CBS 600.94), preparatas, kurio aktyvumas ne mažesnis kaip: Apvalkale: Endo-1,4-beta-gliukanazė:10 000 BGU/ ([3])g Endo-1,4-beta- ksilanazė: 4 000 FXU ([4])/g Skysto pavidalo: Endo-1,4-beta- gliukanazė:20 000 BGU/ml Endo-1,4-beta- ksilanazė:8 000 FXU/ml Kieto pavidalo: Endo-1,4-beta- gliukanazė:20 000 BGU/g Endo-1,4-beta- ksilanazė:8 000 FXU/g	Viščiukai broileriai	—	5 000 BGU	—	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma kg visaverčio kombinuotojo pašaro: 5 000– 10 000 BGU 2 000–4 000 FXU. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 60 % miežių.	Neribotą laiką
					2 000 FXU	—		

▼B

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, apibūdinimas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimas galioja
					Aktyvumo vienetų/kg visaverčio pašaro			
E 1611	Endo-1,3(4)-beta- gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta- ksilanazė EC 3.2.1.8 Poligalakturonazė EC 3.2.1.15	Endo-1,3(4)-beta- gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta- ksilanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), ir poligalakturonazės, gautos *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), preparatas, kurio aktyvumas ne mažesnis kaip: Endo-1,3(4)-beta- gliukanazė: 400 U ([5])/g Endo-1,4-beta- ksilanazė: 400 U ([6])/g Poligalakturonazė: 50 U ([7])/g	Penimos kiaulės	—	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 400 U	—	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma kg visaverčio kombinuotojo pašaro: endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 400 U endo-1,4- beta-ksilanazės: 400 U poligalakturonazės: 50 U. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 40 % miežių.	Neribotą laiką
					endo-1,4-beta-ksilanazė: 400 U	—		
					poligalakturonazė: 50 U	—		
E 1612	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8 Alfa-amilazė EC 3.2.1.1	Endo-1,3(4)-beta- gliukanazės ir endo-1,4-beta- ksilanazės, gautos iš *Aspergillus niger (phoenicis)* (NRRL 25541), ir alfa-amilazės, gautos iš *Aspergillus oryzae* (ATCC 66222), preparatas, kurio aktyvumas ne mažesnis kaip: Endo-1,4-beta- ksilanazė: 275 U ([8])/g Endo-1,4-beta- ksilanazė: 400 U ([9])/g Alfa-amilazė: 3 100 U ([10])/g	Paršeliai (nujunkyti)	—	endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 138 U	—	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma kg visaverčio kombinuotojo pašaro: endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 138 U endo-1,4-beta-ksilanazė: 200 U alfa-amilazės: 1 550 U 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų, pvz., miežių, kukurūzų, kviečių mišinio. 4. Nujunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg.	Neribotą laiką
					endo-1,4-beta-ksilanazė: 200 U	—		
					alfa-amilazės: 1 550 U	—		

▼B

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, apibūdinimas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimas galioja
					Aktyvumo vienetų/kg visaverčio pašaro			
E 1613	Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8	Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10W), preparatas, kurio aktyvumas ne mažesnis kaip: Miltelių pavidalo: 70 000 IFP ([11])/g Skysto pavidalo: 7 000 IFP/ml	Viščiukai broileriai	—	1 050 IFP	—	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma kg visaverčio kombinuotojo pašaro: 1 400 IFP. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., pašaruose, savo sudėtyje turinčiuose daugiau kaip 40 % kviečių.	Neribotą laiką

([1]) 1 FXU – fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,15 μmol ksilozės per minutę iš azurino ksilano, esant pH 5,0 ir 40 °C.
([2]) 1 BGU – fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,15 μmol gliukozės per minutę iš azurino betagliukano, esant pH 5,0 ir 40 °C.
([3]) 1 BGU – fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,15 μmol gliukozės per minutę iš azurino betagliukano, esant pH 5,0 ir 40 °C.
([4]) 1 FXU – fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,15 μmol ksilozės per minutę iš azurino ksilano, esant pH 5,0 ir 40 °C.
([5]) 1 U – fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 μmol redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių betagliukano, esant pH 5,0 ir 30 °C.
([6]) 1 U – fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 μmol redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš avižų ksilano, esant pH 5,3 ir 50 °C.
([7]) 1 U – fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 μmol redukuojančios medžiagos (galakturoninės rūgšties ekvivalentai) per minutę iš poli-D-galakturono substrato, esant pH 5,0 ir 40 °C.
([8]) 1 U – fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 μmol redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš avižų betagliukano, esant pH 5,0 ir 40 °C.
([9]) 1 U – fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 μmol redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš avižų ksilano, esant pH 4,0 ir 30 °C.
([10]) 1 U – fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 μmol redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš kviečių krakmolo, esant pH 4,0 ir 30 °C.
([11]) 1 IFP – fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 μmol redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš avižų ksilano, esant pH 4,8 ir 50 °C.