Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1453/2004 НА КОМИСИЯТА

от 16 август 2004 година

относно постоянното разрешение на определени добавки за влагане в храни за животни

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 269, 17.8.2004 г., стр. 3)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1399 на Комисията от 17 август 2015 година	L 217	1	18.8.2015 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/447 на Комисията от 14 март 2017 година	L 69	18	15.3.2017 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1453/2004 НА КОМИСИЯТА

от 16 август 2004 година

относно постоянното разрешение на определени добавки за влагане в храни за животни

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Препаратите, които принадлежат към групата на „Микроорганизмите“ и „Ензимите“, както е посочено в приложение I и приложение II, са разрешени за употреба като добавки за хранене на животните при условията, определени в същите тези приложения.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M2

—————

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЕО номер	Добавка	Химическа формула, описание	Биологичен вид или категория на животното	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					Активни единици на килограм готова храна за животни			
Ензими								
E 1609	Ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8. Ендо-1,4-бета-глюконаза EC 3.2.1.4.	Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,4-бета-глюконаза, произведен от *Aspergillu niger* (CBS 600.94), който е с минимална активност от: Ако е под формата на таблетки: Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 36 000 FXU ([1]) за грам Ендо-1,4-бета-глюконаза: 15 000 BGU ([2]) за грам В течно агрегатно състояние: Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 36 000 FXU за милилитър Ендо-1,4-бета-глюконаза: 15 000 BGU за милилитър В твърдо агрегатно състояние: Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 36 000 FXU за грам Ендо-1,4-бета-глюконаза: 15 000 BGU за грам	Пилета за угояване	—	4 860 FXU	—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочва температурата за съхранение, максималният период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна дозировка за килограм готова храна за животни: 4 860—6 000 FXU 2 025—2 500 BGU 3. За използване в смесени храни за животни, богати на полизахариди, различни от нишестето (основно arabinoxylans и бета-глюкани), като например такива, които съдържат повече от 35 % ечемик и 20 % пшеница.	Без ограничение във времето
					2 025 BGU	—		
			Пуйки за угояване	—	6 000 FXU	—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочва температурата за съхранение, максималният период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна дозировка за килограм готова храна за животни: 6 000 FXU 2 500 BGU. 3. За използване в смесени храни за животни, богати на полизахариди, различни от нишестето (основно arabinoxylans и бета-глюкани), като например такива, които съдържат повече от 40 % пшеница.	Без ограничение във времето
					2 500 BGU	—		

▼B

ЕО номер	Добавка	Химическа формула, описание	Биологичен вид или категория на животното	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					Активни единици на килограм готова храна за животни			
			Прасенца (отбити)	—	6 000 FXU	—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочва температурата за съхранение, максималният период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна дозировка за килограм готова храна за животни: 6 000 FXU 2 500 BGU. 3. За използване в смесени храни за животни, богати на полизахариди, различни от нишестето (основно arabinoxylans и бета-глюкани), като например такива, които съдържат повече от 30 % пшеница и 30 % ечемик. 4. За използване на при отбити прасенца докато достигнат приблизително 35 килограма.	Без ограничение във времето
					2 500 BGU	—		
E 1610	Ендо-1,4-бета-глюконаза ЕС 3.2.1.4 Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8	Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,4-бета-глюконаза, произведен от *Aspergillus niger* (CBS 600.94), и който е с минимална активност от: Под формата на таблетки: Ендо-1,4-бета-глюконаза: 10 000 BGU ([3]) на грам Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 4 000 FXU ([4]) на грам В течно агрегатно състояние: Ендо-1,4-бета-глюконаза: 20 000 BGU на милилитър Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 8 000 FXU на милилитър В твърдо агрегатно състояние: Ендо-1,4-бета-глюконаза: 20 000 BGU на грам Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 8 000 FXU на грам	Пилета за угояване	—	5 000 FXU	—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса, да се посочва температурата за съхранение, максималния период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна дозировка за килограм готова храна за животни: 5 000-10 000 FXU 2 000-4 000 BGU 3. За използване в смесени храни за животни, богати на полизахариди, различни от нишестето (основно arabinoxylans и бета-глюкани), като например такива, които съдържат повече от 60 % ечемик.	Без ограничение във времето
					2 000 BGU	—		

▼B

ЕО номер	Добавка	Химическа формула, описание	Биологичен вид или категория на животното	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					Активни единици на килограм готова храна за животни			
E 1611	Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза EC 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8 Полигалактороназа EC 3.2.1.15	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глюконаза, произведен от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) и от ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведен от *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) и от polygalacturonase, произведен от *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), и който е с минимална активност от: Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 400 U ([5])за грам Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U ([6])за грам Polygalacturonase: 50 U ([7])за грам	Прасета за угояване	—	Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 400 U	—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочва емпературата за съхранение, максималният период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна дозировка за килограм готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 400 U ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U полигалактороназа: 50 U 3. За използване в смесени храни за животни, богати на нишесте и полизахариди, различни от нишестето (основно arabino-xylans и бета-глюкани), като например такива, които съдържат повече от 40 % ечемик.	Без ограничение във времето
					Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U	—		
					Полигалактороназа: 50 U	—		
E 1612	Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза EC 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8 Алфа-амилаза EC 3.2.1.1	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глюконаза и от ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведен от *Aspergillus niger (phoenicis)* (NRRL 25541) и от алфа-амилаза, произведен от *Aspergillus oryzae* (ATCC 66222), и който е с минимална активност от: Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 275 U ([8])за грам Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U ([9])за грам Алфа-амилаза: 3 100 U ([10]) за грам	Прасенца (отбити)	—	Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 138 U	—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочва температурата за съхранение, максималният период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна дозировка за килограм готова храна за животни: Ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 138 U Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 200U Алфа-амилаза: 1 550 U 3. За използване в смесени храни за животни, богати на нишесте и полизахариди, различни от нишестето, като например за смесено хранене със съдържание на ечемик, царевица, пшеница. 4. За използване на при отбити прасенца докато достигнат приблизително 35 килограма.	Без ограничение във времето
					Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 200 U	—		
					Алфа-амилаза: 1 550 U	—		

▼B

ЕО номер	Добавка	Химическа формула, описание	Биологичен вид или категория на животното	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					Активни единици на килограм готова храна за животни			
E 1613	Ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8	Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведен от *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6 - 10W), и който е с минимална активност от: Под формата на прах: 70 000 IFP ([11]) за грам В течно агрегатно състояние: 7 000 IFP за милилитър	Пилета за угояване	—	1 050 IFP	—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочва температурата за съхранение, максималният период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна дозировка за килограм готова храна за животни: 1 400 IFP. 3. За използване в смесени храни за животни, богати на полизахариди, различни от нишестето (основно arabinoxylans и бета-глюкани), като например такива, които съдържат повече от 40 % пшеница.	Без ограничение във времето

([1]) 1 FXU е количеството ензим, което освобождава 0,15 микромола ксилоза от ксилан, кръстосано свързан с азурин, за една минута, при pH 5,0 и при температура 40° по Целзий.
([2]) 1 BGU е количеството ензим, което освобождава 0,15 микромола ксилоза от бета-глюкан, кръстосано свързан с азурин, за една минута, при pH 5,0 и при температура 40° по Целзий.
([3]) 1 BGU е количеството ензим, което освобождава 0,15 микромола ксилоза от бета-глюкан, кръстосано свързан с азурин, за една минута, при pH 5,0 и при температура 40° по Целзий.
([4]) 1 FXU е количеството ензим, което освобождава 0,15 микромола ксилоза от ксилан, кръстосано свързан с азурин за една минута, при pH 5,0 и при температура 40° по Целзий.
([5]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол от прости захари (еквиваленти на глюкозата) от бета-глюкан от ечемик за една минута, при pH 5,0 и при температура 30° по Целзий.
([6]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол от прости захари (еквиваленти на ксилозата) от ксилан от шпелта от овес за една минута, при pH 5,3 и при температура 50° по Целзий.
([7]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол от прост материал (еквиваленти на galacturonic acid) от poly D-galacturonic substrate за една минута, при pH 5,0 и при температура 40° по Целзий.
([8]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол от прости захари (еквиваленти на глюкозата) от бета-глюкан от овес за една минута, при pH 5,0 и при температура 40° по Целзий.
([9]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол от прости захари (еквиваленти на глюкозата) от ксилан от овес за една минута, при pH 4,0 и при температура 30° по Целзий
([10]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол от прости захари (еквиваленти на глюкозата) от нишесте от пшеница за една минута, при pH 4,0 и при температура 30° по Целзий.
([11]) 1 IFP е количеството ензим, което освобождава 1 микромол от прости захари (измерени като еквиваленти на ксилозата) от ксилан от овес за една минута, при pH 4,8 и при температура 50° по Целзий.