ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2112/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Δεκεμβρίου 2003

για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2003 για την τροποποίηση των όρων έγκρισης ορισμένων πρόσθετων υλών που ανήκουν στην ομάδα των ιχνοστοιχείων και οι οποίες χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1756/2002 [2], και ιδίως τα άρθρα 3, 9δ και 9ε,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2003 της Επιτροπής [3] περιλαμβάνει ένα λάθος εκ παραδρομής το οποίο πρέπει να διορθωθεί.

(2) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2003 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή
David BYRNE
Μέλος της Επιτροπής

---

[1] ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.
[2] ΕΕ L 265 της 3.10.2002, σ. 1.
[3] ΕΕ L 187 της 26.7.2003, σ. 11.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο κατάλογος των πρόσθετων υλών με την επικεφαλίδα «E1 Σίδηρος-Fe» αντικαθίσταται από τον εξής:

Αριθ. ΕΚ	Στοιχείο	Πρόσθετη ύλη	Χημικός τύπος και περιγραφή	Μέγιστη περιεκτικότητα του χημικού στοιχείου σε mg/kg της πλήρους ζωοτροφής ή σε mg/ημέρα	Λοιπές προϋποθέσεις	Διάρκεια έγκρισης
«Ιχνοστοιχεία						
E1	Σίδηρος-Fe	Ανθρακικός σίδηρος	$FeCO_3$	Πρόβατα: 500 (σύνολο) mg/kg πλήρους ζωοτροφής Ζώα συντροφιάς: 1 250 (σύνολο) mg/kg πλήρους ζωοτροφής Χοίροι: — χοιρίδια έως μια εβδομάδα πριν από τον απογαλακτισμό: 250 mg/ημέρα — λοιποί χοίροι: 750 (σύνολο) mg/kg πλήρους ζωοτροφής Άλλα είδη: 750 (σύνολο) mg/kg πλήρους ζωοτροφής		Απεριόριστη»
		Διχλωριούχος σίδηρος, τετραένυδρος	$FeCl_2 \cdot 4H_2O$			
		Τριχλωριούχος σίδηρος, εξαένυδρος	$FeCl_3 \cdot 6H_2O$			
		Κιτρικός σίδηρος-II, εξαένυδρος	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2 \cdot 6H_2O$			
		Φουμαρικός σίδηρος	$FeC_4H_2O_4$			
		Γαλακτικός σίδηρος-II, τριένυδρος	$Fe(C_3H_5O_3)_2 \cdot 3H_2O$			
		Τριοξείδιο του σιδήρου	Fe_2O_3			
		Θειικός σίδηρος-II, μονένυδρος	$FeSO_4H_2O$			
		Θειικός σίδηρος-II, επταένυδρος	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$			
		Ένυδρο χηλικό σύμπλοκο σιδήρου-II-αμινοξέων	$Fe(x)_{1-3} \cdot nH_2O$ (όπου το x είναι το ανιόν οποιουδήποτε αμινοξέος που παράγεται από υδρολυθείσα πρωτεΐνη σόγιας) Μοριακό βάρος έως 1 500			