VERORDENING (EG) Nr. 1636/1999 VAN DE COMMISSIE

van 26 juli 1999

tot verlening van een vergunning voor nieuwe toevoegingsmiddelen en nieuwe toepassingen van toevoegingsmiddelen voor de diervoeding

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding [1], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1411/1999 van de Commissie [2], en met name op de artikelen 9 J en 3,

(1) Overwegende dat in Richtlijn 70/524/EEG is bepaald dat, rekening houdend met de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis, nieuwe toevoegingsmiddelen of nieuwe toepassingen van toevoegingsmiddelen kunnen worden toegestaan;

(2) Overwegende dat de lidstaten bij Richtlijn 93/113/EG van de Raad van 14 december 1993 betreffende het gebruik en het in de handel brengen van voor de diervoeding bestemde enzymen, micro-organismen en hun preparaten [3], laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/40/EG [4], in afwijking van Richtlijn 70/524/EEG zijn gemachtigd om het gebruik en het in de handel brengen van enzymen, micro-organismen en preparaten daarvan voorlopig toe te staan;

(3) Overwegende dat een voorlopige vergunning voor nieuwe toevoegingsmiddelen of voor nieuwe toepassingen van toevoegingsmiddelen kan worden afgegeven als die middelen of die nieuwe toepassingen, bij het toegestane gehalte, niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mens of dier, of voor het milieu, en de verbruiker niet schaden door nadelige beïnvloeding van de kenmerken van de dierlijke producten, als de aanwezigheid van die middelen in diervoeders bepaalbaar is en als op grond van de beschikbare resultaten redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij bij gebruik in diervoeders een gunstige invloed uitoefenen op de eigenschappen daarvan of op de dierlijke productie;

(4) Overwegende dat Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk [5] en de in het kader daarvan vastgestelde bijzondere richtlijnen, met name Richtlijn 90/679/EEG van de Raad van 26 november 1990 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk [6], laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/65/EG [7], volledig van toepassing zijn op het gebruik en de hantering door werknemers van toevoegingsmiddelen voor de diervoeding;

(5) Overwegende dat na onderzoek van de dossiers, die de lidstaten overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 93/113/EG hebben ingediend, blijkt dat sommige preparaten die tot de groepen van de enzymen en de micro-organismen behoren, voorlopig kunnen worden toegestaan;

(6) Overwegende dat het Wetenschappelijk Comité voor de diervoeding een gunstig advies heeft gegeven betreffende de onschadelijkheid van deze preparaten;

(7) Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor veevoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De tot de groep „enzymen" behorende preparaten die in bijlage I bij deze verordening worden vermeld, kunnen overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG onder de voorwaarden van die bijlage als toevoegingsmiddel in de diervoeding worden toegestaan.

Artikel 2

Het tot de groep „micro-organismen" behorende preparaat dat in bijlage II bij deze verordening wordt vermeld, kan overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG onder de voorwaarden van die bijlage als toevoegingsmiddel in de diervoeding worden toegestaan.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 juli 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

[1] PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.
[2] PB L 164 van 30.6.1999, blz. 56.
[3] PB L 334 van 31.12.1993, blz. 17.
[4] PB L 180 van 9.7.1997, blz. 21.
[5] PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
[6] PB L 374 van 31.12.1990, blz. 1.
[7] PB L 335 van 6.12.1997, blz. 17.

BIJLAGE I

Nr.	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Duur van de vergunning
					Aantal activiteitseenheden per kg volledig diervoeder			
34	Endo-1,3 (4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6	Bereiding van endo-1,3 (4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Aspergillus niger (NRRL 25 541) en van	Biggen	4 maanden	Endo-1,3 (4)-bèta-glucanase: 165 U	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.	30.9.1999
	Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8	alfa-amylase geproduceerd door Aspergillus oryzae (ATCC 66 222), met een minimale activiteit van: endo-1,3 (4)-bèta-glucanase:			Endo 1,4-bèta-xylanase: 240 U	—	2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,3 (4)-bèta-glucanase: 165 U endo-1,4-bèta-xylanase: 240 U alfa-amylase: 1 860 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders waarin granen	
	Alfa-amylase EC 3.2.1.1	275 U/g (1) endo 1,4-bèta-xylanase: 400 U/g (2) alfa-amylase: 3 100 U/g (3)			Alfa-amylase: 1 860 U	—	aanwezig zijn die rijk zijn aan zetmeel en niet-zetmeelpolysachariden (vooral arabinoxylanen en bèta-glucanen), bijvoorbeeld voeders die meer dan 45 % gerst en 10 % tarwe of 10 % maïs bevatten.	
35	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6.	Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 106) en endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum	Legkippen	—	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 80 U	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 80 U	30.9.1999
	Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8.	(ATCC 2 105), met een minimale activiteit van: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 80 U/g (4) endo-1,4-bèta-xylanase: 180 U/g (5)			Endo-1,4-bèta-xylanase: 180 U	—	endo-1,4-bèta-xylanase: 180 U. 3. Voor gebruik in mengvoeder die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen), bijvoorbeeld voeders die meer dan 60 % gerst bevatten.	

Nr.	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Duur van de vergunning
					Aantal activiteitseenheden per kg volledig diervoeder			
36	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6. Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8.	Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 106) en endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), met een minimale activiteit van: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 300 U/g ([6]) endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U/g ([7])	Mestkippen	—	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 300 U Endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U	— —	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 300 U endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen), bijvoorbeeld voeders die meer dan 40 % gerst bevatten.	30.9.1999
			Legkippen	—	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 300 U Endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U	— —	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 300 U endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabino-xylanen), bijvoorbeeld voeders die meer dan 35 % gerst bevatten.	30.9.1999

Nr.	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Duur van de vergunning
					Aantal activiteitseenheden per kg volledig diervoeder			
37	Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8. Subtilisine EC 3.4.21.62	Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105) en subtilisine geproduceerd door Bacillus subtilis (ATCC 2 107), met een minimale activiteit van: endo 1,4-bèta-xylanase: 2 500 U/g ([8]) subtilisine: 800 U/g ([9])	Mestkippen	—	Endo-1,4-bèta-xylanase: 500 U Subtilisine: 160 U	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,4-bèta-xylanase: 500-2 500 U subtilisine: 160-800 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders, bijvoorbeeld voeders die meer dan 65 % tarwe bevatten.	30.9.1999
			Kalkoenen	—	Endo-1,4-bèta-xylanase: 825 U Subtilisine: 265 U	— —	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,4-bèta-xylanase: 825-2 500 U subtilisine: 265-800 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders, bijvoorbeeld voeders die meer dan 45 % tarwe bevatten.	30.9.1999

Nr.	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Duur van de vergunning
					Aantal activiteitseenheden per kg volledig diervoeder			
38	Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8. Subtilisine EC 3.4.21.62.	Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105) en subtilisine geproduceerd door Bacillus subtilis (ATCC 2 107), met een minimale activiteit van: endo 1,4-bèta-xylanase: 5 000 U/g ([10]) subtilisine: 500 U/g ([11])	Biggen	4 maanden	Endo-1,4-bèta-xylanase: 5 000 U Subtilisine: 500 U	— —	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,4-bèta-xylanase: 5 000 U subtilisine: 500 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders, bijvoorbeeld voeders die meer dan 40 % tarwe bevatten.	30.9.1999
39	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6. Endo-1,4-bèta-xylanase: EC 3.2.1.8.	Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 106) en endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105), met een minimale activiteit van: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 400 U/g ([12]) endo-1,4-bèta-xylanase: 400 U/g ([13])	Mestvarkens	—	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 400 U Endo-1,4-bèta-xylanase: 400 U	— —	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 400 U endo-1,4-bèta-xylanase: 400 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral bèta-glucanen en arabinoxylanen) bijvoorbeeld voeders die meer dan 65 % gerst bevatten.	30.9.1999

Nr.	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Duur van de vergunning
					Aantal activiteitseenheden per kg volledig diervoeder			
40	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6. Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8. Subtilisine EC 3.4.21.62.	Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 106), endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105) en subtilisine geproduceerd door Bacillus subtilis (ATCC 2 107), met een minimale activiteit van: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U/g [14] endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U/g [15] subtilisine: 800 U/g [16]	Mestkippen	—	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 30 U Endo-1,4-bèta-xylanase: 90 U Subtilisine: 240 U	— — —	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 30-100 U endo-1,4-bèta-xylanase: 90-300 U subtilisine: 240-800 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders, bijvoorbeeld voeders die meer dan 60 % gerst bevatten.	30.9.1999
41	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6. Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8. Subtilisine EC 3.4.21.62.	Bereiding van endo-1,3(4)-bèta-glucanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 106), endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105) en subtilisine geproduceerd door Bacillus subtilis (ATCC 2 107), met een minimale activiteit van: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U/g [17] endo-1,4-bèta-xylanase: 2 500 U/g [18] Subtilisine: 800 U/g [19]	Mestkippen	—	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 25 U Endo-1,4-bèta-xylanase: 625 U Subtilisine: 200 U	— — —	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 25-100 U endo-1,4-bèta-xylanase: 625-2 500 U subtilisine: 200-800 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders, bijvoorbeeld voeders die meer dan 30 % tarwe en 10 % gerst bevatten.	30.9.1999

Nr.	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Duur van de vergunning
					Aantal activiteitseenheden per kg volledig diervoeder			
			Legkippen	—	Endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U Endo 1,4-bèta-xylanase: 2 500 U Subtilisine: 800 U	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 100 U endo-1,4-bèta-xylanase: 2 500 U subtilisine: 800 U 3. Voor gebruik in mengvoeders, bijvoorbeeld voeders die meer dan 50 % tarwe en 25 % gerst bevatten.	30.9.1999
42	Endo-1,4-bètaxylanase EC 3.2.1.8	Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), met een minimale activiteit van: Vaste vorm: 4 000 U/g ([20]) Kenmerken van het toegestane preparaat: endo 1,4-bèta-xylanase: 1,99 % tarwe: 97,7 % calciumpropionaat: 0,3 % lecithine: 0,01 %	Biggen	4 maanden	4 000 U	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 4 000 U/kg. 3. Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan niet-zetmeelpolysachariden (vooral arabinoxylanen), bijvoorbeeld voeders die meer dan 60 % tarwe bevatten.	30.9.1999

(1) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van haver.
(2) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.
(3) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit tarwezetmeel.
(4) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(5) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.
(6) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(7) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.
(8) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.
(9) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 7,5 en een temperatuur van 40 °C 1 microgram fenolverbinding (tyrosine-equivalent) per minuut vrijmaakt uit caseïnesubstraat.
(10) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.
(11) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 7,5 en een temperatuur van 40 °C 1 micromol reducerende suikers (tyrosine-equivalent) per minuut vrijmaakt uit caseïnesubstraat.
(12) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(13) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.
(14) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(15) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.
(16) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 7,5 en een temperatuur van 40 °C 1 microgram fenolverbinding (tyrosine-equivalent) per minuut vrijmaakt uit caseïnesubstraat.
(17) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.
(18) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.
(19) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 7,5 en een temperatuur van 40 °C 1 microgram fenolverbinding (tyrosine-equivalent) per minuut vrijmaakt uit caseïnesubstraat.
(20) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit haverxylaan.

BIJLAGE II

Nr.	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of categorie	Maximumleeftijd	Minimum	Maximum	Andere bepalingen	Duur van de vergunning
					CFU/kg volledig diervoeder	CFU/kg volledig diervoeder		
13	Enteroccocus faecium DSM 10 663 NCIMB 10 415	Bereiding van Enteroccocus faecium met ten minste: Poeder en korrels: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g toevoegingsmiddel Gecoat: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g toevoegingsmiddel Vloeibaar: 1×10^{10} CFU/g toevoegingsmiddel	Kalveren	6 maanden	1×10^{9}	1×10^{10}	In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.	30.9.1999
			Mestkippen	—	1×10^{9}	1×10^{10}	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Mag worden gebruikt in mengvoeders die de volgende toegestane coccidiostatica bevatten: amprolium, amprolium-ethopabaat, arprinocide, decoquinato, diclazuril, dinitolmide, halofuginone, lasalocide-natrium, maduramicine-ammonium, meticlorpindol/methylbenzoquaat, monensin-natrium, narasin, nicarbazin, robenidine en salinomycine-natrium.	30.9.1999