# KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1636/1999

## af 26. juli 1999

## om godkendelse af nye tilsætningsstoffer og nye anvendelser af tilsætningsstoffer i foderstoffer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer ([1]), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1411/1999 ([2]), særlig artikel 3 og 9j, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge direktiv 70/524/EØF kan der på baggrund af den videnskabelige og tekniske udvikling godkendes nye tilsætningsstoffer og nye anvendelser af tilsætningsstoffer;

(2) ved Rådets direktiv 93/113/EF af 14. december 1993 om anvendelse og afsætning af enzymer, mikroorganismer og præparater heraf i foderstoffer ([3]), senest ændret ved direktiv 97/40/EF ([4]), blev medlemsstaterne som undtagelse fra direktiv 70/524/EØF bemyndiget til midlertidigt at tillade anvendelse og afsætning af enzymer, mikroorganismer og præparater heraf;

(3) nye tilsætningsstoffer og nye anvendelser af tilsætningsstoffer kan midlertidigt tillades, hvis det indhold, der tillades i foderstoffer, ikke frembyder nogen fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet og ikke har uheldige virkninger for forbrugeren som følge af ændringer af de animalske produkters karakteristika, hvis dets forekomst i foderstoffer kan kontrolleres, og hvis det på grundlag af de foreliggende resultater er rimeligt at antage, at deres tilsætning i foderstofferne har gunstige virkninger for de pågældende foderstoffers karakteristika eller for husdyrproduktionen;

(4) bestemmelserne i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet ([5]) og de relevante særdirektiver, særlig Rådets direktiv 90/679/EØF af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet ([6]), senest ændret ved direktiv 97/65/EF ([7]), finder fuld anvendelse for arbejdstagernes håndtering og anvendelsen af tilsætningsstoffer i foderstoffer;

(5) gennemgangen af de dossierer, som medlemsstaterne har indgivet efter artikel 3 i direktiv 93/113/EF, viser, at en række præparater, der tilhører grupperne af enzymer og mikroorganismer, midlertidigt kan godkendes;

(6) Den Videnskabelige Komité for Foder har afgivet positiv udtalelse om disse stoffers uskadelighed;

(7) de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Foderstofkomité —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

*Artikel 1*

De præparater, der tilhører gruppen »enzymer«, som er opregnet i bilag I til nærværende forordning, kan i henhold til direktiv 70/524/EØF tillades anvendt som tilsætningsstoffer i foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser.

*Artikel 2*

Det præparat, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, som er opregnet i bilag II til nærværende forordning, kan i henhold til direktiv 70/524/EØF tillades anvendt som tilsætningsstof i foderstoffer på de i nævnte bilag fastsatte betingelser.

*Artikel 3*

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 1999.

*På Kommissionens vegne*

Franz FISCHLER

*Medlem af Kommissionen*

([1]) EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.
([2]) EFT L 164 af 30.6.1999, s. 56.
([3]) EFT L 334 af 31.12.1993, s. 17.
([4]) EFT L 180 af 9.7.1997, s. 21.
([5]) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
([6]) EFT L 374 af 31.12.1990, s. 1.
([7]) EFT L 335 af 6.12.1997, s. 17.

*BILAG I*

| Nr. | Tilsætningsstof | Kemisk betegnelse, beskrivelse | Dyreart eller dyrekategori | Maksimumsalder | Minimumsindhold | Maksimumsindhold | Bestemmelser i øvrigt | Tilladelsens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder | | | |
| 34 | Endo-1,3 (4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6<br><br>Endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8<br><br>Alpha-amylase EC 3.2.1.1 | Præparat af endo-1,3 (4) - beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (NRRL 25 541) og af alpha-amylase produceret af Aspergillus oryzae (ATCC 66 222) med en aktivitet på mindst:<br>Endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 275 U/g [1]<br>Endo 1,4-beta-xylanase: 400 U/g [2]<br>Alpha-amylase: 3 100 U/g [3] | Smågrise | 4 måneder | Endo- 1,3 (4)- beta-glucanase: 165 U<br><br>Endo-1,4-beta-xylanase: 240 U<br><br>Alpha-amylase: 1 860 U | —<br><br>—<br><br>— | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosir pr. kg fuldfoder:<br>endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 165 U<br>endo- 1,4-beta-xylanase: 240 U<br>alpha-amylase: 1 860 U<br>3. Til brug i foderblandinger med korn med højt indhold af stivelse og andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), dvs. med indhold af mere end 45 % byg og 10 % hvede eller majs. | 30.9.1999 |
| 35 | Endo-1,3(4)- beta-glucanase EC 3.2.1.6.<br><br>Endo-1,4-beta-xylanase EC3.2.1.8 | Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 106) og endo-1,4-betaxylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105) med en aktivitet på mindst:<br>Endo- 1,3(4)-beta-glucanase: 80 U/g [4]<br>Endo- 1,4-beta-xylanase: 180 U/g [5] | Ægglæggende høner | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 80 U<br><br>Endo-1,4-beta-xylanase 180 U | —<br><br>— | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:<br>endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 80 U<br>endo- 1,4-beta-xylanase: 180 U.<br>3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), dvs. med indhold af mere end 60 % byg. | 30.9.1999 |

| Nr. | Tilsætningsstof | Kemisk betegnelse, beskrivelse | Dyreart eller dyrekategori | Maksimumsalder | Minimumsindhold | Maksimumsindhold | Bestemmelser i øvrigt | Tilladelsens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder | | | |
| 36 | Endo-1,3(4)-beta-glucanase<br>EC 3.2.1.6<br><br>Endo-1,4-betaxylanase<br>EC 3.2.1.8 | Præparat af endo- 1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 106) og endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) med en aktivitet på mindst:<br>endo-1,3(4)-beta- glucanase: 300 U/g (6)<br>endo-1,4-beta-xylanse: 300 U/g (7) | Slagtekyllinger | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 300 U<br><br>Endo-1,4-beta-xylanase: 300 U | —<br><br>— | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:<br>endo- 1,3 (4)-beta-glucanase: 300 U<br>endo- 1,4-beta-xylanase: 300 U.<br>3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner) dvs. med indhold af mere end 40 % byg. | 30.9.1999 |
| | | | Ægglæggende høner | | Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 300 U<br><br>Endo-1,4-beta-xylanase: 300 U | —<br><br>— | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:<br>endo-1,3 (4)-beta-glucanase: 300 U<br>endo-1,4-beta-xylanase: 300 U.<br>3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), dvs. med indhold af mere end 35 % byg. | 30.9.1999 |

| Nr. | Tilsætningsstof | Kemisk betegnelse, beskrivelse | Dyreart eller dyrekategori | Maksimumsalder | Minimumsindhold | Maksimumsindhold | Bestemmelser i øvrigt | Tilladelsens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder | | | |
| 37 | Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8<br><br>Subtilisin EC 3.4.21.62 | Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105) og subtilisin produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2 107) med en aktivitet på mindst:<br>Endo-1,4-beta-xylanase: 500 U/g ([8])<br>Subtilisina: 800 U/g ([9]) | Slagtekyllinger | — | Endo-1,4-beta-xylanase: 500 U<br><br>Subtilisin: 160 U | —<br><br>— | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:<br>endo-1,4-beta-xylanase: 500- 2 500 U.<br>3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af mere end 65 % hvede. | 30.9.1999 |
| | | | Kalkuner | — | Endo-1,4-beta-xylanase: 825 U<br><br>Subtilisin: 265 U | —<br><br>— | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:<br>endo-1,3 (4)-beta-xylanase: 825-2 500 U<br>subtilisin: 265-800 U.<br>3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af mere end 45 % hvede. | 30.9.1999 |

| Nr. | Tilsætningsstof | Kemisk betegnelse, beskrivelse | Dyreart eller dyrekategori | Maksimumsalder | Minimumsindhold | Maksimumsindhold | Bestemmelser i øvrigt | Tilladelsens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder | | | |
| 38 | Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8<br><br>Subtilisin EC 3.4.21.62. | Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105) og subtilisin produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2 107), med en aktivitet på mindst:<br>Endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U/g ([10])<br>Subtilisin: 500 U/g ([11]) | Smågrise | 4 måneder | Endo-1,4-beta- xylanase: 5 000 U<br><br>Subtilisin: 500 U | —<br><br>— | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:<br>endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U<br>subtilisin: 500 U.<br>3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af mere end 40 % hvede. | 30.9.1999 |
| 39 | Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6.<br><br>Endo-1,4-betaxylanase: EC 3.2.1.8. | Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 106) og endo-1,4-betaxylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105), med en aktivitet på mindst:<br>Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U/g ([12])<br>Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U/g ([13]) | Fedesvin | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U<br><br>Endo-1,4-betaxylanase: 400 U | —<br><br>— | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:<br>endo-1,3(4)-beta-glucanase:<br>endo- 1,4-beta-xylanase: 400 U.<br>3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), dvs. med indhold af mere end 65 % byg. | 30.9.1999 |

| Nr. | Tilsætningsstof | Kemisk betegnelse, beskrivelse | Dyreart eller dyrekategori | Maksimumsalder | Minimumsindhold | Maksimumsindhold | Bestemmelser i øvrigt | Tilladelsens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder | | | |
| 40 | Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6<br><br>Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8.<br><br>Subtilisin EC 3.4.21.62. | Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 106), endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105) og subtilisin produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2 107) med en aktivitet på mindst:<br>Endo- 1,3(4)-beta-glucanase: 100 U/g [14]<br>Endo 1,4-beta-xylanase: 300 U/g [15]<br>Subtilisin: 800 U/g [16] | Slagtekyllinger | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 30 U<br>Endo-1,4-beta-xilanase: 90 U<br>Subtilisin: 240 U | —<br>—<br>— | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:<br>endo-1,3 (4)-beta-glucanase: 30-100 U<br>endo-1,4-beta-xylanase: 90-300 U<br>subtilisin: 240-800 U.<br>3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af mere end 60 % byg. | 30.9.1999 |
| 41 | Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6<br><br>Endo-1,4-beta-xylanse EC 3.2.1.8.<br><br>Subtilisin EC 3.4.21.62. | Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 106), endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2 105) og subtilisin produceret af Bacillus subtilis (ATCC 2 107) med en aktivitet på mindst:<br>Endo-1,3(4)-beta-glucanasea: 100 U/g [17]<br>Endo 1,4-beta-xylanase: 2 500 U/g [18]<br>Subtilisin: 800 U/g [19] | Slagtekyllinger | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 25 U<br>Endo 1,4-beta-xylanase: 625 U<br>Subtilisin: 200 U | —<br>—<br>— | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:<br>endo-1,3 (4)-beta-glucanase: 25-100 U<br>endo-1,4-beta-xylanase: 625-2 500 U<br>subtilisin: 200-800 U.<br>3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af mere end 30 % hvede og 10 % byg. | 30.9.1999 |

| Nr. | Tilsætningsstof | Kemisk betegnelse, beskrivelse | Dyreart eller dyrekategori | Maksimumsalder | Minimumsindhold | Maksimumsindhold | Bestemmelser i øvrigt | Tilladelsens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktivitetsenheder pr. kg fuldfoder | | | |
| | | | Æglæggende høner | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U<br><br>Endo-1,4-beta-xylanase: 2 500 U<br><br>Subtilisin: 800 U | —<br><br>—<br><br>— | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:<br>endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U<br>endo-1,4-beta-xylanase: 2 500 U<br>subtilisin: 800 U.<br>3. Til brug i foderblandinger, dvs. med indhold af mere end 50 % hvede og 25 % byg. | 30.9.1999 |
| 42 | Endo-1,4-beta-xylanase<br>EC 3.2.1.8 | Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) med en aktivitet på mindst:<br>Fast form: 4 000 U/g [20]<br>Det tilladte præparats karakteristika:<br>Endo-1,4-beta-xylanase: 1,99 %<br>Hvede: 97,7 %<br>Calciumpropionat: 0,3 %<br>Lecithin: 0,01 % | Smågrise | 4 måneder | 4 000 U | — | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:<br>4 000 U.<br>3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), dvs. med indhold af mere end 60 % hvede. | 30.9.1999 |

(1) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra havrebetaglucan pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.
(2) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra havrexylan pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.
(3) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra hvedestivelse pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.
(4) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra bygbetaglucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(5) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(6) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra bygbetaglucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(7) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(8) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(9) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikrogram phenolforbindelser (tyrosinækvivalenter) fra et kaseinsubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.
(10) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(11) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikrogram phenolforbindelser (tyrosinækvivalenter) fra et kaseinsubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.
(12) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra bygbetaglucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(13) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(14) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra bygbetaglucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(15) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(16) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikrogram phenolforbindelser (tyrosinækvivalenter) fra et kaseinsubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.
(17) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glukoseækvivalenter) fra bygbetaglucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(18) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
(19) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikrogram phenolforbindelser (tyrosinækvivalenter) fra et kaseinsubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.
(20) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havrespeltxylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.

*BILAG II*

| Nr. | Tilsætningsstof | Kemisk betegnelse, beskrivelse | Dyreart eller dyrekategori | Maksimumsalder | Minimumsindhold | Maksimumsindhold | Bestemmelser i øvrigt | Tilladelsens varighed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg fuldfoder | | | |
| 13 | Enteroccocus faecium<br>DSM 10 663<br>NCIMB 10 415 | Præparat af Enteroccocus faecium med et mindsteindhold af:<br>Pulver- og granulatform:<br>$3,5 \times 10^{10}$ CFU/g tilsætningsstof<br>Coated form:<br>$2,0 \times 10^{10}$ CFU/g tilsætningsstof<br>Flydende form:<br>$1 \times 10^{10}$ CFU/ml tilsætningsstof | Kalve | 6 måneder | $1 \times 10^{9}$ | $1 \times 10^{10}$ | I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet. | 30.9.1999 |
| | | | Slagtekyllinger | — | $1 \times 10^{9}$ | $1 \times 10^{10}$ | 1. I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.<br>2. Kan bruges i foderblandinger med de tilladte coccidiostatika: amprolium amprolium-ethopabat, arprinocid, decoquinat, diclazuril, dinitolmid, halofuginon, lasalocidnatrium, maduramicinammonium, meticlropindol/methylbenzoquat, monensinnatrium, narasin, nicarbazin, robenidin, salinomycinnatrium. | 30.9.1999 |