31999R1636

27.7.1999 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 194/17

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1636/1999
z 26. júla 1999
o povolení používania nových doplnkových látok v krmivách

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o doplnkových látkach v krmivách ([1]), naposledy zmenenú a doplnenú nariadením Komisie (ES) č. 1411/1999 ([2]), a najmä na jej články 9j a 3,

(1) keďže smernica 70/524/EHS ustanovuje, že nové doplnkové látky alebo nové používanie doplnkových látok možno povoliť, s prihliadnutím na pokrok vo vedeckých a technických poznatkoch;

(2) keďže smernica Rady 93/113/ES zo 14. decembra 1993 o používaní a obchodovaní s enzýmami, mikroorganizmami a ich prípravkami vo výžive zvierat ([3]), naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/40/ES ([4]), výnimkou zo smernice 70/524/EHS, zmocňuje členské štáty, aby povolili dočasné používanie a obchodovanie s enzýmami, mikroorganizmami a ich prípravkami;

(3) keďže novú doplnkovú látku alebo nové používanie doplnkových látok možno dočasne povoliť, ak pri najvyššom prípustnom obsahu v krmivách, nemá nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie, tiež neuškodí spotrebiteľovi zmenou vlastností živočíšnych produktov, ak jej prítomnosť v krmivách možno kontrolovať, a je odôvodnené predpokladať so zreteľom na dostupné výsledky, že priaznivo ovplyvňuje vlastnosti krmív alebo živočíšnu produkciu ak sa zapracováva do týchto krmív;

(4) keďže ustanovenia smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 ([5]) na zavedenie opatrení podpory zlepšenia v bezpečnosti a zdravia pracovníkov v práci a jej príslušné osobitné nariadenia, najmä smernica Rady 90/679/EHS z 26. novembra 1990 na ochranu pracovníkov s rizikom súvisiacim s vystavovaním sa biologickým činiteľom na pracovisku ([6]), naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/65/ES ([7]), sú plne použiteľné na pracovníkov pri používaní a manipulácii s doplnkovými látkami v krmivách;

(5) keďže z preskúmania dokumentácie, predkladanej členskými štátmi v súlade s článkom 3 smernice 93/113/ES vyplýva, že určitý počet prípravkov patriacich do skupín enzýmov a mikroorganizmov možno dočasne povoliť;

(6) keďže je stanovisko Vedeckého výboru pre výživu zvierat ohľadne neškodnosti týchto prípravkov priaznivé;

(7) keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok l

Prípravky patriace do skupiny „Enzýmy“ uvedené v prílohe I tohto nariadenia možno povoliť podľa smernice 70/524/EHS ako doplnkovú látku vo výžive zvierat za podmienok ustanovených v prílohe I tohto nariadenia.

Článok 2

Prípravok patriaci do skupiny „Mikroorganizmy“ uvedený v prílohe II tohto nariadenia možno povoliť podľa smernice 70/524/EHS ako doplnkovú látku vo výžive zvierat za podmienok ustanovených v prílohe II tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v *Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev*.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 1999

Za Komisiu
Franz FISCHLER
člen Komisie

([1]) Ú. v. ES. L 270, 14.12.1970, s. 1.
([2]) Ú. v. ES. L 164, 30.6.1999, s. 56.
([3]) Ú. v. ES. L 334, 31.12.1993, s. 17.
([4]) Ú. v. ES. L 180, 9.7.1997, s. 21.
([5]) Ú. v. ES. L 183, 29.6.1989, s. 1.
([6]) Ú. v. ES. L 374, 31.12.1990, s. 1.
([7]) Ú. v. ES. L 335, 6.12.1997, s. 17.

PRÍLOHA I

Číslo	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					Jednotky aktivity na kg kompletného krmiva			
34	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta xylanáza EC 3.2.1.8 alfa-amylása EC 3.2.1.1	Prípravok z endo-1,3(4)-beta-glukanázy a z endo 1,4-beta xylanázy vyprodukovaných kmeňom *Aspergillus niger* (NRRL 25 541) a z alfa-amylázy vyprodukovanej kmeňom *Aspergillus oryzae* (ATCC 66 222) o aktivite najmenej: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 275 U/g ([1])Endo-1,4-beta xylanáza: 400 U/g ([2]) Alfa-amylása: 3 100 U/g ([3])	Prasiatka	4 mesiace	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 165 U Endo 1,4-beta xylanáza: 240 U Alfa-amylása: 1 860 U	- - -	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletných krmív: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 165 U endo 1,4-beta xylanáza: 240 U alfa-amylása: 1 860 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach obsahujúcich obilniny bohaté na škrob a neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a betaglukány), napr. obsahujúcich viac ako 45 % jačmeňa a 10 % pšenice alebo 10 % kukurice.	30.9.1999
35	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok z endo-1,3(4)-beta-glukanázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2 106) a z endo-1,4-beta xylanázy vyprodukovanej s *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2 105), o aktivite najmenej: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 80 U/g ([4]) (Endo-1,4-beta xylanáza: 180 U/g ([5])	Nosnice	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 80 U Endo 1,4-beta xylanáza: 180 U	- -	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 80 U endo-1,4-beta xylanáza: 180 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a betaglukány), napr. obsahujúcich viac ako 60 % jačmeňa.	30.9.1999

Číslo	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					Jednotky aktivity na kg kompletného krmiva			
36	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta xynaláza EC 3.2.1.8	Prípravok z endo-1,3(4)-beta-glukanázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2 106) a z endo 1,4-beta xynalázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), o aktivite najmenej: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U/g [6] Endo-1,4-beta xynaláza: 300 U/g [7]	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U Endo 1,4-beta xynaláza: 300 U	- -	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U endo-1,4-beta xynaláza: 300 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 40 % jačmeňa.	30.9.1999
			Nosnice	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U Endo 1,4-beta xynaláza: 300 U	- -	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U endo-1,4-beta xynaláza: 300 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä arabinoxylány a beta-glukány), napr. obsahujúcich viac ako 35 % jačmeňa.	30.9.1999

Číslo	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					Jednotky aktivity na kg kompletného krmiva			
37	Endo-1,4-beta xynaláza EC 3.2.1.8 Subtilizín ES 3.4.21.62	Prípravok z endo 1,4-beta xynalázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) a subtilizínu vyprodukovaného kmeňom *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) o aktivite najmenej: Endo-1,4-beta xynaláza: 2 500 U/g ([8]) Subtilizín: 800 U/g ([9])	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,4-beta-xynaláza: 500 U Subtilizín: 160 U	- -	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta xynaláza: 500-2 500 U Subtilizín: 160-800 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 65 % pšenice.	30.9.1999
			Morky	-	Endo 1,4-beta xynaláza: 825 U Subtilizín: 265 U	- -	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta xynaláza: 825-2500 U subtilizín: 265-800 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 45 % pšenice.	30.9.1999

Číslo	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					Jednotky aktivity na kg kompletného krmiva			
38	Endo-1,4-beta xynaláza EC 3.2.1.8 Subtilizín EC 3.4.21.62	Prípravok z endo 1,4-beta xynalázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderm longibrachiatum* (ATCC 2105) a subtilizínu vyprodukovaného kmeňom *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) o aktivite najmenej: Endo-1,4-beta xynaláza: 5 000 U/g ([10]) Subtilizín: 500 U/g ([11])	Prasiatka	4 mesiace	Endo-1,4-beta-xynaláza: 5 000 U Subtilizín: 500 U	- -	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,4-beta xynaláza: 5 000 U Subtilizín: 500 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 40 % pšenice.	30.9.1999
39	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta xynaláza EC 3.2.1.8	Prípravok z endo-1,3(4)-beta-glukanázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2 106) a z endo-1,4-beta xynalázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2 105), o aktivite najmenej: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U/g ([12]) Endo-1,4-beta xynaláza: 400 U/g ([13])	Výkrm ošípaných	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U Endo 1,4-beta xynaláza: 400 U	- -	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U endo-1,4-beta-xynaláza: 400 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (najmä beta – glukány a arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 65 % jačmeňa.	30.9.1999

Číslo	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					Jednotky aktivity na kg kompletného krmiva			
40	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta xylanáza EC 3.2.1.8 SubtilizínEC 3.4.21.62	Prípravok z endo-1,3(4)-beta-glukanázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2 106) a z endo-1,4-beta xylanázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2 105) a subtilizínu vyprodukovaného kmeňom *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) o aktivite najmenej: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U/g [14] Endo-1,4-beta xylanáza: 300 U/g [15] Subtilizín: 800 U/g [16]	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 30 U Endo 1,4-beta xylanáza: 90 U Subtilizín: 240 U	- - -	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 30-100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 90-300 U subtilizín: 240-800 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 60 % jačmeňa.	30.9.1999
41	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta xylanáza EC 3.2.1.8 Subtilizín EC 3.4.21.62	Prípravok z endo-1,3(4)-beta-glukanázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) a z endo-1,4-beta xylanázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2 105) a subtilizínu vyprodukovaného kmeňom *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), o aktivite najmenej: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U/g [17] Endo-1,4-beta xylanáza: 2500 U/g [18] Subtilizín: 800 U/g [19]	Výkrm kurčiat	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 25 U Endo 1,4-beta xylanáza: 625 U Subtilizín: 200 U	- - -	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 25-100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 625-2500 U subtilizín: 200-800 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 30 % pšenice a 10 % jačmeňa.	30.9.1999

Číslo	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druhy alebo kategórie zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					Jednotky aktivity na kg kompletného krmiva			
			Nosnice	-	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U Endo 1,4-beta xynaláza: 2 500 U Subtilizín: 800 U	- - -	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xynaláza: 2500 U subtilizín: 800 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach napr. obsahujúcich viac ako 50 % pšenice a 25 % jačmeňa.	30.9.1999
42	Endo-1,4-beta xynaláza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1,4-beta xynalázy vyprodukovanej kmeňom *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), o aktivite najmenej: Pevná forma: 4 000 U/g ([20]) Charakteristiky povoleného prípravku: endo-1,4-beta xynaláza: 1,99 % Pšenica 97,7 % kalcium propanoát: 0,3 % Lecitín: 0,01 %	Prasiatka	4 mesiace	4 000 U	-	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní 2. odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 4 000 U 3. Určené na použitie v kŕmnych zmesiach bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavne arabinoxylány), napr. obsahujúcich viac ako 60 % pšenice	30.9.1999

(1) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúceho cukru (ekvivalent glukózy) z ovseného beta-glukánu za minútu pri pH 4,0 a teplote 30 °C.
(2) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúceho cukru (ekvivalent glukózy) z ovseného xylánu za minútu pri pH 4,0 a teplote 30 °C.
(3) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúceho cukru (ekvivalent glukózy) zo pšeničného škrobu za minútu pri pH 4,0 a teplote 30 °C.
(4) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a teplote 30 °C.
(5) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) zo xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
(6) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu při pH 5,0 a teplote 30 °C.
(7) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) zo xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
(8) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) zo xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
(9) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol fenolických zlúčenín (ekvivalenty tyrozínu) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a teplote 40 °C.
(10) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) zo xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
(11) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol fenolických zlúčenín (ekvivalenty tyrozínu) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a teplote 40 °C.
(12) 1 U je množstvo enzýmu ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúceho cukru (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
(13) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) zo xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
(14) 1 U je množstvo enzýmu ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúceho cukru (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
(15) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) zo xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
(16) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol fenolických zlúčenín (ekvivalenty tyrozínu) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a teplote 40 °C.
(17) 1 U je množstvo enzýmu ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúceho cukru (ekvivalent glukózy) z jačmenného beta-glukánu za minútu pri pH 5,0 a 30 °C.
(18) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) zo xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.
(19) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol fenolických zlúčenín (ekvivalenty tyrozínu) z kazeínového substrátu za minútu pri pH 7,5 a teplote 40 °C.
(20) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) zo xylánu špaldového ovsa za minútu pri pH 5,3 a teplote 50 °C.

PRÍLOHA II

Číslo	Doplnková látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Najvyšší vek	Najnižší obsah	Najvyšší obsah	Iné ustanovenia	Doba povolenia
					živé zárodky/kg kompletného krmiva			
13	*Enterococcus faecium* DSM 10 663 NCIMB 10415	Prípravok *Enterococcus faecium*, o obsahu najmenej: Prášková a granulovaná forma: 3,5 x 10^{10} živých zárodkov/g doplnkovej látky Potiahnutá forma: 2,0 x 10^{10} živých zárodkov/g doplnkovej látky Tekutá forma: 1 x 10^{10} živých zárodkov/ml doplnkovej látky	Teľatá	6 mesiacov	1 x 10^{9}	1 x 10^{10}	V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.	30.9.1999
			Výkrm kurčiat	-	1 x 10^{9}	1 x 10^{10}	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu uveďte teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní. 2. Možno používať v kŕmnych zmesiach obsahujúcich povolené kokcidiostatiká: ampróliu, ampróliu-etopabát, arprinocid, dekochinát, diklazuril, dinitolmid, halofuginon, lasalocid sodný, maduramycín amónny, metichlórpindol/metylbenzochát, monenzinát sodný, narazín, nikarbazín, robenidín, lasalocid sodný, salinomycinát sodný.	30.9.1999