2026/1810

27.7.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1810 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιουλίου 2026

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/901 όσον αφορά την προσθήκη των ουσιών κετοκοναζόλη, μιδαζολάμη και σεβοφλουράνιο, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1950/2006 όσον αφορά την απαλοιφή των ουσιών διγοξίνη, δορζολαμίδη, γκρισεοφουλβίνη, ιμιπραμίνη, κετοκοναζόλη, φαινυτοΐνη και τικαρκιλλίνη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ ([1]), και ιδίως το άρθρο 115 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2025/901 της Επιτροπής ([2]) καταρτίζεται κατάλογος ουσιών που είναι απαραίτητες για τη θεραπεία ειδών ιπποειδών ή που αποφέρουν πρόσθετο κλινικό όφελος σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για τα είδη ιπποειδών και για τις οποίες η περίοδος αναμονής για τα είδη ιπποειδών πρέπει να είναι έξι μήνες.

(2) Σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2025/901, μια ουσία χαρακτηρίζεται «απαραίτητη ουσία» μόνον όταν δεν υπάρχει ικανοποιητική εναλλακτική επιλογή για τη θεραπεία ή τη διάγνωση μιας ένδειξης και όταν η πάθηση θα προκαλέσει περιττή ταλαιπωρία για το ζώο εάν δεν αντιμετωπιστεί. Μια ουσία χαρακτηρίζεται «ουσία που αποφέρει πρόσθετο κλινικό όφελος» μόνον όταν παρέχει κλινικά σημαντικό πλεονέκτημα με βάση τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ή της ασφάλειας ή τη σημαντική συνεισφορά της στη θεραπεία ή τη διάγνωση. Αυτό μπορεί να προκύπτει, μεταξύ άλλων, από διαφορετικούς τρόπους δράσης, διαφορετικά φαρμακοκινητικά ή φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά, διαφορετική διάρκεια αγωγής ή διαφορετική οδό χορήγησης.

(3) Μετά την έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/901, προέκυψαν νέες πληροφορίες που δείχνουν ότι η γκρισεοφουλβίνη, η κετοκοναζόλη, η μιδαζολάμη, η ριφαμπικίνη και το σεβοφλουράνιο ενδέχεται να πληρούν τα κριτήρια για να θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητες ουσίες ή ότι αποφέρουν πρόσθετο κλινικό όφελος σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για τα είδη ιπποειδών όταν χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες ενδείξεις.

(4) Η Επιτροπή ζήτησε ([3]) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (στο εξής: Οργανισμός) να εξετάσει τις εν λόγω πληροφορίες και να παράσχει καθοδήγηση σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6. Στο σχετικό έγγραφο καθοδήγησης που εξέδωσε ([4]), ο Οργανισμός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ουσίες γκρισεοφουλβίνη, κετοκοναζόλη, μιδαζολάμη και σεβοφλουράνιο μπορούν να θεωρηθούν απαραίτητες ή ότι αποφέρουν πρόσθετο κλινικό όφελος σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για τα είδη ιπποειδών όταν χρησιμοποιούνται για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

(5) Στο πλαίσιο του αιτήματος της Επιτροπής, ο Οργανισμός αξιολόγησε επίσης αν μια περίοδος αναμονής έξι μηνών θα ήταν επαρκής όσον αφορά τα ιπποειδή που υποβάλλονται σε θεραπεία με τις ουσίες οι οποίες κρίθηκε ότι είναι απαραίτητες ή ότι αποφέρουν πρόσθετο κλινικό όφελος για τις προτεινόμενες ενδείξεις. Ο Οργανισμός δεν μπορούσε να αποκλείσει τους

([1]) ΕΕ L 4 της 7.1.2019, σ. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2025/901 της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2025, για την κατάρτιση καταλόγου ουσιών που είναι απαραίτητες για τη θεραπεία ειδών ιπποειδών ή που αποφέρουν πρόσθετο κλινικό όφελος σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για τα είδη ιπποειδών και για τις οποίες η περίοδος αναμονής για τα είδη ιπποειδών είναι έξι μήνες, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1950/2006 (ΕΕ L, 2025/901, 20.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/901/oj).

([3]) Ares(2025)10199539· https://link.europa.eu/p4F9hp.

([4]) Guidance under Article 141(1)(f) of Regulation (EU) 2019/6 on veterinary medicinal products with regards five substances not included in Commission Implementing Regulation (EU) 2025/901 [Καθοδήγηση βάσει του άρθρου 141 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 για τα κτηνιατρικά φάρμακα όσον αφορά πέντε ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2025/901 της Επιτροπής] (EMA/CVMP/382370/2025, 16 Απριλίου 2026).

κινδύνους που συνδέονται με την γκρισεοφουλβίνη και την κετοκοναζόλη όταν χρησιμοποιούνται για όλες ή για ορισμένες από τις ενδείξεις που προτείνονται για καθεμία από τις εν λόγω ουσίες, ακόμη και αν τηρείται περίοδος αναμονής έξι μηνών. Οι επιστημονικές συμβουλές του Οργανισμού ([5]), στις οποίες βασίστηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2025/901, κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα όσον αφορά τις ουσίες διγοξίνη, δορζολαμίδη, ιμιπραμίνη και φαινυτοΐνη.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1950/2006 της Επιτροπής ([6]) εξακολουθεί να εφαρμόζεται έως τις 21 Μαΐου 2027. Για να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας των καταναλωτών, είναι σκόπιμο να διακοπεί η χρήση των εν λόγω ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1950/2006.

(7) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1255 ([7]) της Επιτροπής διατήρησε την κατηγορία των καρβοξυπενικιλλινών για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, η χρήση της ουσίας τικαρκιλλίνη σε ζώα δεν επιτρέπεται στην Ένωση. Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1950/2006 εφαρμόζεται έως τις 21 Μαΐου 2027 και για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τις οικείες αρμόδιες αρχές, τους κτηνιάτρους, τους κατόχους ζώων και τους οικονομικούς φορείς, είναι σκόπιμο να απαλειφθεί η εν λόγω ουσία από τον κατάλογο του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1950/2006.

(8) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2025/901 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1950/2006 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(9) Προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των καταναλωτών, να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα φαρμάκων για τροφοπαραγωγά ζώα των ειδών ιπποειδών και να αποφευχθεί οποιαδήποτε απαράδεκτη ταλαιπωρία των εν λόγω ζώων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Κτηνιατρικών Φαρμάκων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/901

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/901 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τροποποίηση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1950/2006

Οι καταχωρίσεις για τις ουσίες διγοξίνη, δορζολαμίδη, γκρισεοφουλβίνη, ιμιπραμίνη, κετοκοναζόλη, φαινυτοΐνη και τικαρκιλλίνη στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1950/2006 απαλείφονται.

([5]) Scientific advice under Article 115(5) of Regulation (EU) 2019/6 for the establishment of a list of substances which are essential for the treatment of equine species, or which bring added clinical benefit compared to other treatment options available for equine species and for which the withdrawal period for equine species shall be six months [Επιστημονική γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 για την κατάρτιση καταλόγου ουσιών που είναι απαραίτητες για τη θεραπεία ιπποειδών ή οι οποίες αποφέρουν πρόσθετο κλινικό όφελος σε σχέση με άλλες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για τα είδη ιπποειδών, και για τις οποίες η περίοδος αναμονής για τα είδη ιπποειδών είναι έξι μήνες] (EMA/CVMP/159047/2023, 18 Ιουλίου 2024).

([6]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1950/2006 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για την κατάρτιση, σύμφωνα με την οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα, καταλόγου ουσιών απαραίτητων για τη θεραπεία των ιπποειδών και ουσιών που αποφέρουν πρόσθετο κλινικό όφελος (ΕΕ L 367 της 22.12.2006, σ. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1950/oj).

([7]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1255 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2022, για τον καθορισμό των αντιμικροβιακών ή των ομάδων αντιμικροβιακών που προορίζονται αποκλειστικά για τη θεραπεία ορισμένων λοιμώξεων στον άνθρωπο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 20.7.2022, σ. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1255/oj).

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομάδες ουσιών

I. **Αναισθητικά**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Οξυβουπροκαΐνη[α]	Τοπική αναισθησία επιφανείας για χρήση στους οφθαλμούς	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Εκτενής κλινική εμπειρία
Πριλοκαΐνη[β]	Τοπική αναισθησία επιφανείας πριν από ενδοφλέβια ένεση ή καθετηριασμό	Λιδοκαΐνη	Σε ειδικά παρασκευάσματα (ευτηκτικό μείγμα τοπικών αναισθητικών), για τοπική εφαρμογή στο δέρμα· μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της ενδοφλέβιας ένεσης ή του καθετηριασμού
Σεβοφλουράνιο[β]	Χορήγηση αναισθησίας με χρήση μάσκας σε πουλάρια.	Ισοφλουράνιο	Καταλληλότερο για τη χορήγηση αναισθησίας με χρήση μάσκας ως λιγότερο καυστικό από την εναλλακτική επιλογή

([1]) Οι δραστικές ουσίες που χαρακτηρίζονται με «α» είναι απαραίτητες ουσίες. Οι ουσίες που χαρακτηρίζονται με «β» είναι ουσίες που αποφέρουν πρόσθετο κλινικό όφελος.

II. **Αναλγητικά**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Βρωμφενάκη[β]	Θεραπεία ραγοειδίτιδας και οφθαλμικής φλεγμονής	Συστηματικά μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) (π.χ. φλουνιξίνη)· κετορολάκη για τοπική επιφανειακή (οφθαλμική) χορήγηση	Τα τοπικά επιφανειακά ΜΣΑΦ ενδέχεται να επιτυγχάνουν μικρότερη ενόχληση του ασθενούς, μείωση της μετεγχειρητικής φλεγμονής, πρόληψη της μύσης και βελτίωση της οπτικής οξύτητας κατά την πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο
Φαιντανύλη[β]	Πολυπαραγοντική προσέγγιση για μέτριας έως υψηλής βαρύτητας οξείες επώδυνες παθήσεις	Βουτορφανόλη, μορφίνη	Παράγει καλύτερη αναλγησία από ορισμένα άλλα οπιοειδή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ επώδυνες παθήσεις· έχει αναγνωρισμένη αξία στη χρήση σε πολυπαραγοντικές προσεγγίσεις
Κετορολάκη[β]	Θεραπεία οφθαλμικού πόνου και φλεγμονής	Θεραπεία με συστηματικά ΜΣΑΦ (π.χ. φλουνιξίνη)	Σκεύασμα για τοπική εφαρμογή
Μεθοκαρβαμόλη[β]	Στο πλαίσιο πρωτοκόλλων θεραπείας για βαριάς μορφής επώδυνους μυϊκούς σπασμούς ή βαριάς μορφής παθήσεις μυϊκής φλεγμονής	Συστηματικά ΜΣΑΦ (π.χ. φλουνιξίνη)	Ισχυρή χαλάρωση των σκελετικών μυών· ειδική δράση στους ενδιάμεσους νευρώνες του νωτιαίου μυελού για τη μείωση των οξέων σπασμών των σκελετικών μυών χωρίς παράλληλη μεταβολή του μυϊκού τόνου
Μορφίνη[β]	Αναλγησία	Βουτορφανόλη, φαιντανύλη	Ισχυρότερη από άλλα αναλγητικά
Ακετονίδιο τριαμσινολόνης[β]	Θεραπεία της φλεγμονής των αρθρώσεων	Μεθυλοπρεδνιζολόνη	Λιγότερο επιβλαβείς επιπτώσεις στον μεταβολισμό των χόνδρων

III. **Αντιμικροβιακά**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Ι. Αντιβιοτικά			
Αμικασίνη[β]	Θεραπεία της σηψαιμίας σε ίππους και πουλάρια	Γενταμικίνη, κεφτιοφούρη	Καλύτερη εικόνα ασφάλειας στο ζώο-στόχο
Αζιθρομυκίνη[β]	Θεραπεία λοιμώξεων από *Rhodococcus equi* ευαίσθητο στην αζιθρομυκίνη	Κλαριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη, γαμιθρομυκίνη, τουλαθρομυκίνη, δοξυκυκλίνη	Πρόσθετο κλινικό όφελος σε περιστατικά λοίμωξης από *Rhodococcus equi* σε πουλάρια, που μπορούν να αντιμετωπιστούν με μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με δοξυκυκλίνη
Κλαριθρομυκίνη[β]	Θεραπεία λοιμώξεων από *Rhodococcus equi* ευαίσθητο στην κλαριθρομυκίνη	Αζιθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη, γαμιθρομυκίνη, τουλαθρομυκίνη, δοξυκυκλίνη	Πιο δραστική κατά του *Rhodococcus equi* in vitro απ' ό,τι η ερυθρομυκίνη ή η αζιθυρομυκίνη· επιτυγχάνει μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο υγρό του πνευμονικού επιθηλίου και στα κυψελιδικά μακροφάγα απ' ό,τι η ερυθρομυκίνη ή η αζιθρομυκίνη, αν και έχει μικρότερο χρόνο ημιζωής
Φουσιδικό οξύ[β]	Τοπική θεραπεία επιφανείας για οφθαλμικές λοιμώξεις από θετικά κατά Gram βακτήρια ευαίσθητα στο φουσιδικό οξύ	Οφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη	Ευρύ φάσμα για τη θεραπεία λοιμώξεων από μικροοργανισμούς θετικούς κατά Gram· πρώτη επιλογή για επιφανειακά, μη επιπλεγμένα έλκη κερατοειδούς και οξεία επιπεφυκίτιδα σε ίππους
Μοξιφλοξασίνη[β]	Τοπική θεραπεία επιφανείας για εξωτερικές οφθαλμικές λοιμώξεις από θετικούς κατά Gram κόκκους ή από αρνητικά κατά Gram, άτυπα και αναερόβια βακτήρια, όπως τα στελέχη *Pseudomonas aeruginosa* που είναι ευαίσθητα στη μοξιφλοξασίνη	Οφλοξασίνη	Πλεονεκτικό προφίλ φαρμακοκινητικής· το φάσμα δραστικότητας περιλαμβάνει κόκκους θετικούς κατά Gram και αναερόβια βακτήρια που μπορεί να είναι ανθεκτικά σε άλλες κινολόνες
Οφλοξασίνη[β]	Θεραπεία εξωτερικών οφθαλμικών λοιμώξεων από θετικούς και αρνητικούς κατά Gram μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην οφλοξασίνη	Μοξιφλοξασίνη	Κλινική εμπειρία· διεισδύει σε ολόκληρο τον κερατοειδή και φθάνει μέχρι τον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού
Πολυμυξίνη Β[β]	Θεραπεία βακτηριακής κερατίτιδας, τοπική επιφανειακή χρήση	Οφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη	Αποτελεσματική εναλλακτική επιλογή αντί των συστηματικών αγωγών· διαφορετικός μηχανισμός δράσης σε σχέση με άλλες εναλλακτικές επιλογές για τοπική επιφανειακή χρήση

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
II. Αντιμυκητιασικά			
Αμφοτερικίνη Β[α]	Θεραπεία μυκητιασικής πνευμονίας, συστηματική χρήση	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Θεραπεία πρώτης επιλογής
Κετοκοναζόλη[β]	Συμπληρωματική θεραπεία υποστήριξης στη θεραπεία της μυκητίασης του λαρυγγικού σάκου, τοπική επιφανειακή χρήση	Ενιλκοναζόλη	Λιγότερο ερεθιστικό σε σύγκριση με την εναλλακτική επιλογή· σκεύασμα για τοπική εφαρμογή
Μικοναζόλη[β]	Θεραπεία μυκητιασικών οφθαλμικών λοιμώξεων	Ναταμυκίνη, νυστατίνη, βορικοναζόλη	Ευρύ φάσμα δραστικότητας· λιγότερο ερεθιστικό σε σύγκριση με άλλα τοπικά επιφανειακά αντιμυκητιασικά
Νυστατίνη[β]	Θεραπεία καντιντιάσεων και μυκητιασικών λοιμώξεων του οφθαλμού και του γεννητικού συστήματος	Μικοναζόλη	Θεραπεία πρώτης επιλογής για καντιντιάσεις
Βορικοναζόλη[β]	Θεραπεία μυκητιασικής κερατίτιδας, τοπική επιφανειακή χρήση	Μικοναζόλη	Ευρύ φάσμα δραστικότητας
III. Αντιικά			
Ακικλοβίρη[β]	Θεραπεία κρουσμάτων λοίμωξης από ερπητοϊό των ιπποειδών που συνδέονται με επιπλοκές, μόνο για τοπική επιφανειακή χρήση	Γκανσικλοβίρη	Θεραπεία πρώτης επιλογής για οφθαλμικά έλκη όταν υπάρχουν υπόνοιες για συμμετοχή ικού παθογόνου
Γκανσικλοβίρη[β]	Θεραπεία κρουσμάτων λοίμωξης από ερπητοϊό των ιπποειδών που συνδέονται με επιπλοκές, τοπική επιφανειακή χρήση	Ακικλοβίρη, βαλακικλοβίρη	Πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων υπέρ της χρήσης στη θεραπεία διαφόρων τύπων ιών που προκαλούν ερπητοϊικές λοιμώξεις
Βαλακικλοβίρη[β]	Θεραπεία κρουσμάτων λοίμωξης από ερπητοϊό των ιπποειδών, χρήση από του στόματος	Ακικλοβίρη	Καλύτερο προφίλ φαρμακοκινητικής και διαφορετική οδός χορήγησης

IV. **Ουσίες για αναπνευστικές διαταραχές**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Αμβροξόλη[β]	Διέγερση επιφανειοδραστικού παράγοντα σε πρόωρα πουλάρια	Στεροειδή, βρωμεξίνη, δεμβρεξίνη, μεταφορά επιφανειοδραστικού παράγοντα από υγιή δότη	Προτιμώμενη κλινική επιλογή για πρόωρα πουλάρια

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Φλουτικαζόνη[β]	Αντιμετώπιση αλλεργικής πνευμονικής νόσου, συμπεριλαμβανομένων των ήπιας έως μέτριας βαρύτητας κρουσμάτων άσθματος των ιπποειδών και υποτύπων αυτού, μέσω της εισπνοής	Βεκλομεθαζόνη	Η εισπνοή συνεπάγεται μικρότερη καταστολή του φλοιού των επινεφριδίων, ταχύτερη ανάκαμψη μετά το πέρας της αγωγής και λιγότερες συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες απ' ό,τι η θεραπεία με συστηματικά κορτικοστεροειδή, λόγω της περιορισμένης συστηματικής απορρόφησης· ενδείκνυται ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του ήπιας έως μέτριας βαρύτητας και του βαρέος δυσίατου άσθματος, καθώς και για μακροχρόνια θεραπεία συντήρησης
Βρωμιούχο ιπρατρόπιο[β]	Ως βρογχοδιαστολέας σε ίππους με άσθμα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας	Κλενβουτερόλη	Αντιχολινεργική δράση, ως εναλλακτική επιλογή έναντι των β-αγωνιστών
Οξυμεταζολίνη[β]	Θεραπεία του ρινικού οιδήματος	Φαινυλεφρίνη	Αγωνιστής των α-αδρενεργικών υποδοχέων με ισχυρές ιδιότητες αγγειοσυστολής και δράση μεγαλύτερης διάρκειας
Φαινυλεφρίνη[β]	Θεραπεία του ρινικού οιδήματος	Οξυμεταζολίνη	Μειώνει την ανάγκη εισαγωγής ρινικών σωλήνων κατά την ανάρρωση

V. **Ουσίες καρδιολογικής χρήσης**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Αμιωδαρόνη[β]	Συστηματική και από του στόματος θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής και των υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών	Θειική/γλυκονική κινιδίνη, σοταλόλη, βεραπαμίλη	Διαφορετικός τρόπος δράσης: αντιαρρυθμικό τάξης ΙΙΙ
Προπαφαινόνη[β]	Θεραπεία κοιλιακής ταχυκαρδίας και κοιλιακής ταχυαρρυθμίας	Θειική/γλυκονική κινιδίνη	Διαφορετικός τρόπος δράσης: ανταγωνιστής διαύλων νατρίου που μειώνει την καρδιακή διεγερσιμότητα
Κιναπρίλη[α]	Θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας· καρδιαγγειακή προστασία σε ίππους με κολπική μαρμαρυγή ή ανεπάρκεια μιτροειδούς	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Διαφορετικός τρόπος δράσης: αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης
Θειική/γλυκονική κινιδίνη[β]	Θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών	Αμιωδαρόνη, σοταλόλη, βεραπαμίλη	Θεραπεία πρώτης επιλογής για την κολπική μαρμαρυγή

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Σοταλόλη[β]	Μακροχρόνια θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών	Αμιωδαρόνη, θειική/ γλυκονική κινιδίνη	Καταλληλότερη για ίππους που χρειάζονται μακροχρόνια αντιαρρυθμική θεραπεία· λιγότερα ανεπιθύμητα συμβάντα απ' ό,τι με την αμιωδαρόνη
Βεραπαμίλη[β]	Θεραπεία υπερκοιλιακών αρρυθμιών	Αμιωδαρόνη, θειική/ γλυκονική κινιδίνη, σοταλόλη	Διαφορετικός τρόπος δράσης: ανταγωνιστής διαύλων ασβεστίου

VI. **Ουσίες για διαγνωστικές πράξεις**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Θειικό βάριο[α]	Βελτιωμένη απεικόνιση του γαστρεντερικού σωλήνα κατά την ακτινογραφική εξέταση	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Δεν υπάρχει ικανοποιητική εναλλακτική αγωγή για βελτιωμένη απεικόνιση του γαστρεντερικού σωλήνα κατά την ακτινογραφική εξέταση
Φλουορεσκεΐνη[β]	Διάγνωση κερατίτιδας ή εξέλκωσης του κερατοειδούς, τοπική επιφανειακή χρήση	Ερυθρό της Βεγγάλης	Διαγνωστικό εργαλείο πρώτης επιλογής όταν στη συνέχεια χρειάζεται ιική καλλιέργεια
Ιωξόλη[α]	Σκιαγραφική ουσία για ακτινογραφική εξέταση κατώτερου ουροποιητικού συστήματος, αρθρογραφία, μυελογραφία, κολπογραφία ή συριγγογραφία και δακρυοκυστογραφία	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Μη ιοντική, υδατοδιαλυτή σκιαγραφική ουσία
Φαινυλεφρίνη[α]	Διάγνωση δυσαυτονομίας των ιπποειδών («ασθένεια του χόρτου»)	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Επικουρική διαγνωστική προσέγγιση στην πολυνευροπαθητική δυσαυτονομία των ιπποειδών («ασθένεια του χόρτου»)
Ερυθρό της Βεγγάλης[β]	Διάγνωση κερατίτιδας ή εξέλκωσης του κερατοειδούς, τοπική επιφανειακή χρήση	Φλουορεσκεΐνη	Διαγνωστικό εργαλείο πρώτης επιλογής για τη διάγνωση οφθαλμικής κερατίτιδας/εξέλκωσης
Εκλυτική ορμόνη θυρεοτροπίνης[α]	Διάγνωση της δυσλειτουργίας της μέσης μοίρας (pars intermedia) της υπόφυσης	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Δεν υπάρχουν ικανοποιητικές εναλλακτικές επιλογές για τη διάγνωση της δυσλειτουργίας της μέσης μοίρας της υπόφυσης

VII. **Ουσίες για γαστρεντερικές διαταραχές**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Μετοκλοπραμίδη[β]	Θεραπεία μετεγχειρητικού ειλεού	Ενδοφλέβια αναπλήρωση υγρών, αναλγητικά (π.χ. φλουνιξίνη), λιδοκαΐνη	Ευκινητικό φάρμακο
Μισοπροστόλη[β]	Θεραπεία της νόσου γαστρικών αδένων (EGGD) και της κολίτιδας	Ομεπραζόλη, σουκραλφάτη	Ανώτερη της ομεπραζόλης για τη θεραπεία της νόσου γαστρικών αδένων των ιπποειδών
Φαινυλεφρίνη[α]	Θεραπεία της νεφροσπληνικής παγίδευσης	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Κλινική αξία στην αντιμετώπιση της νεφροσπληνικής παγίδευσης· προκαλεί δοσοεξαρτώμενη σύσπαση σπληνός
Ρανιτιδίνη[β]	Θεραπεία γαστρικού έλκους σε νεογνά σε κρίσιμη κατάσταση, ενδοφλέβια χρήση	Ομεπραζόλη	Η ενδοφλέβια οδός χορήγησης προσφέρει πρόσθετο κλινικό όφελος σε σχέση με άλλα από του στόματος χορηγούμενα αντιελκωτικά φάρμακα
Σουκραλφάτη[β]	Θεραπεία και πρόληψη γαστρικού έλκους στον ίππο	Ομεπραζόλη	Διαφορετικός τρόπος δράσης από την ομεπραζόλη (προσκόλληση στον βλεννογόνο), που επιτελεί φυσική σταθεροποίηση των βλαβών

VIII. **Ουσίες για μεταβολικές διαταραχές**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Ινσουλίνη[β]	Ως βοήθημα στη θεραπεία της υπερλιπιδαιμίας που δεν ανταποκρίνεται σε αγωγή με γλυκόζη ή της σοβαρής υπερλιπιδαιμίας, σε συνδυασμό με γλυκόζη και άλλες θεραπείες Διάγνωση μεταβολικών διαταραχών (π.χ. αντίσταση στην ινσουλίνη που συνδέεται με το μεταβολικό σύνδρομο των ιπποειδών ή τη δυσλειτουργία της μέσης μοίρας της υπόφυσης)	Ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις υπερλιπιδαιμίας	Η ινσουλίνη είναι η προτιμώμενη κλινική επιλογή

IX. **Ουσίες για μυοσκελετικές διαταραχές**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Ατρακούριο[β]	Επαγωγή μυϊκής παράλυσης υπό γενική αναισθησία	Σισατρακούριο, γουαϊφενεσίνη	Παρέχει πρόσθετο κλινικό όφελος στους ίππους υπό γενική αναισθησία σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη μυϊκή χαλάρωση, όπως οφθαλμολογικές επεμβάσεις, ορισμένες ορθοπαιδικές επεμβάσεις αποκατάστασης και περιστατικά όπου απαιτείται εις βάθος πρόσβαση στην κοιλιακή κοιλότητα.
Σισατρακούριο[β]	Επαγωγή μυϊκής παράλυσης υπό γενική αναισθησία	Ατρακούριο, γουαϊφενεσίνη	Παρέχει πρόσθετο κλινικό όφελος στους ίππους υπό γενική αναισθησία σε περιπτώσεις όπου απαιτείται αυξημένη μυϊκή χαλάρωση, όπως οφθαλμολογικές επεμβάσεις, ορισμένες ορθοπαιδικές επεμβάσεις αποκατάστασης και περιστατικά όπου απαιτείται εις βάθος πρόσβαση στην κοιλιακή κοιλότητα.
Νατριούχος δαντρολένη[β]	Πρόληψη ραβδομυόλυσης Πρόληψη κακοήθους υπερθερμίας κατά την αναισθησία	ΜΣΑΦ, ενδοφλέβια υγρά, βιταμίνη Ε/σελήνιο	Αποτελεσματικός παράγοντας πρόληψης, καθώς αναστέλλει την έκλυση ασβεστίου από το σαρκοπλασματικό δίκτυο και προκαλεί έτσι αποσύζευξη της διέγερσης από τη σύσπαση
Εδροφόνιο[α]	Αναστροφή της μυοπαραλυτικής δράσης του ατρακουρίου	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Αναστολέας χολινεστεράσης, απαραίτητος για την αναστροφή του νευρομυϊκού αποκλεισμού· λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από κάθε άλλον αναστολέα χολινεστεράσης στον ίππο
Γουαϊφενεσίνη[β]	Επαγωγή και διατήρηση γενικής αναισθησίας στο ύπαιθρο	Ατρακούριο, σισατρακούριο	Ενδείκνυται ιδιαίτερα για χρήση στο ύπαιθρο (εκτός νοσοκομείου) όπου ενδέχεται να χρειαστεί αναισθησία· η χαμηλότερη δράση καρδιοπνευμονικής καταστολής βελτιώνει την ασφάλεια της αναισθησίας χωρίς προηγμένο εξοπλισμό παρακολούθησης ή μηχανικό αερισμό

X. **Ουσίες για διαταραχές του νευρικού συστήματος**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Διαζεπάμη[α]	Αντισπασμωδικό βραχυχρόνιας δράσης για την αντιμετώπιση των σπασμών	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Αντισπασμωδικό δεύτερης γενιάς
Μιδαζολάμη[α]	Αντισπασμωδικό βραχυχρόνιας δράσης για την αντιμετώπιση των σπασμών	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Αντισπασμωδικό δεύτερης γενιάς

XI. **Ουσίες για οφθαλμολογική χρήση**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Ακεταζολαμίδη[β]	Θεραπεία του γλαυκώματος, χρήση από του στόματος	Φαινυλεφρίνη	Μηχανισμός δράσης: αναστολέας ανθρακικής ανυδράσης
Κυκλοπεντολάτη[β]	Μυδριατικός παράγοντας	Ατροπίνη, φαινυλεφρίνη	Προκαλεί σημαντική μυδρίαση χωρίς να επηρεάζει την παραγωγή δακρύων, την ενδοφθάλμια πίεση, την πεπτική λειτουργία (δηλαδή την κινητικότητα του εντέρου και την παραγωγή περιττωμάτων) ή την καρδιακή συχνότητα
Κυκλοσπορίνη Α[β]	Θεραπεία αυτοάνοσων οφθαλμικών παθήσεων	Στεροειδή τοπικής επιφανειακής χρήσης	Ανοσοκατασταλτική δράση μέσω της αναστολής του πολλαπλασιασμού των Τ λεμφοκυττάρων και της μείωσης της έκφρασης των γονιδίων των κυτταροκινών
Φαινυλεφρίνη[β]	Θεραπεία του γλαυκώματος και της επιφοράς	Ατροπίνη και τροπικαμίδη	Δεν αυξάνει (ή αυξάνει ελάχιστα) την ενδοφθάλμια πίεση
Συνεφρίνη[β]	Θεραπεία οφθαλμικών βλεννογόνων ως αποσυμφορητικό	Φαινυλεφρίνη, τετρυζολίνη	Ταχεία τοπική δράση· βελτιώνει τη διείσδυση θεραπευτικών παραγόντων τοπικής δράσης και προσφέρει συνεργιστικές επιδράσεις π.χ. με τοπικές αντιμικροβιακές θεραπείες
Τετρυζολίνη[β]	Θεραπεία οφθαλμικών βλεννογόνων ως αποσυμφορητικό	Φαινυλεφρίνη, συνεφρίνη	Ταχεία τοπική δράση
Μηλεϊνική τιμολόλη[β]	Θεραπεία του γλαυκώματος, τοπική επιφανειακή χρήση	Ακεταζολαμίδη	Ο ειδικός τρόπος δράσης της ως μη επιλεκτικού παράγοντα αποκλεισμού των β-αδρενεργικών υποδοχέων την καθιστά σημαντική θεραπευτική επιλογή στη θεραπεία του γλαυκώματος
Ακετονίδιο τριαμσινολόνης[β]	Θεραπεία υποτροπιάζουσας ραγοειδίτιδας σε κρούσματα δυσίατα με άλλες αγωγές	Ατροπίνη, τροπικαμίδη	Αποτελεσματική θεραπεία χαμηλής νοσηρότητας σε κρούσματα δυσίατα με άλλες αγωγές
Τροπικαμίδη[β]	Θεραπεία υποτροπιάζουσας ραγοειδίτιδας	Ατροπίνη, κυκλοπεντολάτη, ακετονίδιο τριαμσινολόνης	Ταχεία έναρξη δράσης

XII. **Ουσίες για καταστολή και προνάρκωση (και ανταγωνιστική δράση)**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Ακεπρομαζίνη[β]	Για μια πολυπαραγοντική προσέγγιση στην επίτευξη ηρεμιστικής δράσης και την προνάρκωση σε συνδυασμό με άλλα ηρεμιστικά	Δετομιδίνη, ρομιφιδίνη, ξυλαζίνη, διαζεπάμη	Ο τρόπος δράσης της ακεπρομαζίνης και η μοναδική ποιότητα της κατασταλτικής της δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν με ηρεμιστικούς α2-αγωνιστές ή βενζοδιαζεπίνες
Ατιπαμεζόλη[α]	Αναστροφή της δράσης των α2-αγωνιστών	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Αναστρέφει την ηρεμιστική και αναλγητική δράση και τις ανεπιθύμητες καρδιαγγειακές αντιδράσεις
Δεξμεδετομιδίνη[β]	Καταστολή ή γενική αναισθησία στο πλαίσιο πρωτοκόλλων μερικής ή ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας	Δετομιδίνη, ρομιφιδίνη, ξυλαζίνη, διαζεπάμη	Ο πλέον επιλεκτικός α2-αγωνιστής· σύντομος χρόνος ημιζωής και ταχεία ανακατανομή, στοιχεία που ευνοούν ιδιαίτερα τη χρήση του με συνεχή έγχυση
Διαζεπάμη[β]	Προνάρκωση και επαγωγή αναισθησίας, ήπια ηρεμιστική δράση με ελάχιστες καρδιαγγειακές και αναπνευστικές ανεπιθύμητες ενέργειες	Ακεπρομαζίνη, δετομιδίνη, ρομιφιδίνη, ξυλαζίνη	Ο τρόπος δράσης [στους υποδοχείς του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA)] προσφέρει μοναδική ηρεμιστική δράση χωρίς καρδιοαναπνευστική καταστολή, δράση που δεν μπορεί να επιτευχθεί από τους ηρεμιστικούς α2-αγωνιστές (δετομιδίνη, ρομιφιδίνη και ξυλαζίνη) ή την ακεπρομαζίνη
Μιδαζολάμη[β]	Προνάρκωση και επαγωγή αναισθησίας, ήπια ηρεμιστική δράση με ελάχιστες καρδιαγγειακές και αναπνευστικές ανεπιθύμητες ενέργειες	Ακεπρομαζίνη, δετομιδίνη, ρομιφιδίνη, ξυλαζίνη	Ο τρόπος δράσης (στους υποδοχείς του GABA) προσφέρει μοναδική ηρεμιστική δράση χωρίς καρδιοαναπνευστική καταστολή, δράση που δεν μπορεί να επιτευχθεί από τους ηρεμιστικούς α2-αγωνιστές (δετομιδίνη, ρομιφιδίνη και ξυλαζίνη) ή την ακεπρομαζίνη
Φλουμαζενίλη[α]	Ενδοφλέβιος παράγοντας αναστροφής της δράσης των βενζοδιαζεπινών κατά την ανάνηψη από τεχνικές ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας (TIVA)	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Ανταγωνιστής που αναστέλλει ανταγωνιστικά τη θέση δέσμευσης των βενζοδιαζεπινών στους υποδοχείς του GABA
Ναλοξόνη[α]	Αναστροφή της δράσης των οπιοειδών σε επείγοντα περιστατικά	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές
Προποφόλη[β]	Επαγωγή αναισθησίας σε πουλάρια μέσω ενδοφλέβιας χορήγησης	Ισοφλουράνιο	Βελτίωση της καρδιαγγειακής σταθερότητας και της ποιότητας της ανάνηψης κατά την αναισθησία δι' εισπνοής σε πουλάρια

XIII. **Ουσίες για συστηματικές διαταραχές**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Αλλοπουρινόλη[β]	Βλάβη από επαναιμάτωση κατόπιν ισχαιμίας σε νεογνά	Βιταμίνη Ε	Διαφορετικός τρόπος δράσης για την αναστολή του σχηματισμού δραστικών μορφών οξυγόνου (ROS) σε σύγκριση με τη βιταμίνη Ε
Δαλτεπαρίνη[β]	Αντιπηκτικό	Ηπαρίνη	Η μείωση του μοριακού μεγέθους συνδέεται με απώλεια δραστικότητας ως προς την αναστολή της θρομβίνης αλλά αύξηση της αναστολής του παράγοντα Xa (FXa) σε σύγκριση με τη μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη
Δοβουταμίνη[β]	Διαχείριση της υπότασης υπό γενική αναισθησία	Εφεδρίνη	Φαρμακευτική αγωγή πρώτης γραμμής για τη θεραπεία της υπότασης σε ενήλικα ιπποειδή υπό γενική αναισθησία
Ντοπαμίνη[α]	Στο πλαίσιο πρωτοκόλλου θεραπείας για οξεία νεφρική βλάβη / νεφρική ανεπάρκεια μόνο	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Έχει διαπιστωθεί ότι οι χαμηλές δόσεις προκαλούν νεφρική αγγειοδιαστολή, αυξημένη νεφρική αιματική ροή και αυξημένη παραγωγή ούρων χωρίς συστηματικές καρδιαγγειακές επιδράσεις σε μη ναρκωμένους υγιείς ίππους
Εφεδρίνη[β]	Αντιμετώπιση της υπότασης υπό γενική αναισθησία	Δοβουταμίνη	Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της υπότασης σε ενήλικα ιπποειδή υπό γενική αναισθησία όπου η δοβουταμίνη είναι αναποτελεσματική. Διαφορετικός τρόπος δράσης από τη δοβουταμίνη, με πιο άμεση επίδραση στην καρδιακή συσταλτικότητα
Πολυηλεκτρική ζελατίνη[β]	Αντιμετώπιση της μακροχρόνιας υπογκαιμίας που οφείλεται σε παθήσεις όπως π.χ. χαμηλή αλβουμίνη	Κρυσταλλοειδή διαλύματα	Τα κολλοειδή αποτελούνται από μεγαλύτερα μόρια σε σύγκριση με τα κρυσταλλοειδή και συνεπώς παραμένουν στον ενδοαγγειακό χώρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για τη διόρθωση της υπογκαιμίας που οφείλεται π.χ. σε υποαλβουμιναιμία
Γλυκοπυρρολάτη[β]	Θεραπεία και πρόληψη της βραδυκαρδίας	Ατροπίνη	Ελάχιστη κεντρική δράση· κατάλληλη για χρήση σε μη ναρκωμένους ίππους, πριν και μετά την αναισθησία
Νοραδρεναλίνη (νορεπινεφρίνη)[β]	Αντιμετώπιση πρώιμου σηπτικού σοκ Υποστήριξη της καρδιαγγειακής λειτουργίας σε πουλάρια σε κρίσιμη κατάσταση	Δοβουταμίνη, ντοπαμίνη	Σε πουλάρια σε κακή κατάσταση (ασθενή), αποτελεί κατά κανόνα τη μόνη κατεχολαμίνη που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την υπόταση

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Βαζοπρεσσίνη[β]	Αντιμετώπιση της κυκλοφορικής κατέρρειψης σε πουλάρια και ενήλικους ίππους	Επινεφρίνη, ντοπαμίνη, δοβουταμίνη	Εναλλακτική επιλογή σε περιπτώσεις όπου οι συνήθεις αγωγές με κατεχολαμίνες, όπως η ντοπαμίνη, η δοβουταμίνη ή η επινεφρίνη, είναι αναποτελεσματικές ή χρειάζονται ενίσχυση για την αποκατάσταση του αγγειακού τόνου σε καταστάσεις δυσίατης καταπληξίας κατανομής

XIV. **Ουσίες για την αντιμετώπιση όγκων**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Ιμικιμόδη[α]	Θεραπεία σαρκοειδών	Δεν έχει υποδειχθεί καμία	Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι τα σαρκοειδή στα ιπποειδή πιθανότατα οφείλονται σε πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή

XV. **Διάφορα**

Δραστική ουσία ([1])	Ενδείξεις	Υπόδειξη εναλλακτικών επιλογών	Επεξήγηση της χρήσης / Ειδικά πλεονεκτήματα
Σετιριζίνη[β]	Θεραπεία παθήσεων στις οποίες κρίνεται αναγκαία η χορήγηση αντιισταμινικών	Χλωροφαιναμίνη	Οι αντίστροφοι αγωνιστές υποδοχέων ισταμίνης 1 (H1) δεύτερης γενιάς είναι εναλλακτικές επιλογές με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες επί του κεντρικού νευρικού συστήματος (ηρεμιστική δράση)
Δομπεριδόνη[β]	Θεραπεία αγαλαξίας/ δυσγαλαξίας σε φοράδες	Σουλπιρίδη	Ικανότητα διέγερσης της έκκρισης προλακτίνης σε καταστάσεις ντοπαμινεργικής αναστολής
Σουλπιρίδη[β]	Θεραπεία αγαλαξίας/ δυσγαλαξίας σε φοράδες	Δομπεριδόνη	Ικανότητα διέγερσης της έκκρισης προλακτίνης σε καταστάσεις ντοπαμινεργικής αναστολής