31995D0411

11.10.1995 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* L 243/29

ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 22. června 1995,

kterým se stanoví pravidla pro mikrobiologické vyšetření na salmonely u vzorků odebraných z čerstvého drůbežího masa určeného pro Finsko a Švédsko

(95/411/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem ([1]), a zejména na čl. 5 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že Komise schválila operační programy předložené Finskem a Švédskem, které se týkají tlumení salmonelóz; že tyto programy obsahují zvláštní opatření pro čerstvé drůbeží maso;

vzhledem k tomu, že provádění mikrobiologických vyšetření v zařízení představuje jednu z doplňkových záruk, kterou je nutné poskytnout Finsku a Švédsku, a poskytuje záruky rovnocenné zárukám vyplývajícím z operačních programů Finska a Švédska, které byly uznány příslušnými rozhodnutími Komise;

vzhledem k tomu, že Finsko a Švédsko musí pro zásilky čerstvého drůbežího masa ze třetích zemí požadovat splnění dovozních podmínek přinejmenším stejně přísných, jako jsou podmínky stanovené tímto rozhodnutím;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit pravidla pro mikrobiologické vyšetřování pomocí odběru vzorků a přijmout metodiku odběru vzorků, počet vzorků, jež se mají odebírat, jakož i mikrobiologickou vyšetřovací metodu umožňující vyšetřování vzorků;

vzhledem k tomu, že při rozhodování o metodách odběru vzorků je třeba odlišovat celá jatečně upravená těla od částí jatečně upravených těl a drobů;

vzhledem k tomu, že je nutné brát v úvahu mezinárodní metody pro mikrobiologické vyšetření vzorků;

vzhledem k tomu, že mikrobiologické vyšetření nesmí být vyžadováno u čerstvého drůbežího masa pocházejícího ze zařízení, pro nějž platí program uznaný jako rovnocenný programu, který provádí Finsko a Švédsko;

vzhledem k tomu, že ustanovení tohoto rozhodnutí se uplatňují, aniž jsou dotčeny změny příloh směrnice 71/118/EHS, které mohou být přijaty podle článku 19 uvedené směrnice,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podle čl. 5 odst. 3 písm.a) směrnice 71/118/EHS se na zásilky čerstvého drůbežího masa určené pro Finsko a Švédsko vztahují pravidla stanovená v článcích 2 a 3.

Článek 2

U čerstvého drůbežího masa určeného pro Finsko a Švédsko musí být provedeno mikrobiologické vyšetření na salmonely prostřednictvím vzorků odebraných podle přílohy v zařízení původu tohoto masa.

Článek 3

U drůbežího masa pocházejícího ze zařízení, na nějž se vztahuje program, který byl postupem podle článku 21 směrnice 71/118/EHS uznán za rovnocenný programu prováděnému ve Finsku a Švédsku, se mikrobiologické vyšetření stanovené v tomto rozhodnutí neprovádí.

Článek 4

Rada na návrh Komise, který vyplyne ze zprávy vypracované na základě výsledků operačních programů prováděných ve Finsku a Švédsku a na základě zkušeností získaných při používání tohoto rozhodnutí, přezkoumá toto rozhodnutí před 1. červencem 1998.

([1]) Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím 91/1/ES, Euratom, ESUO (Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 1).

Článek 5

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 1995.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. června 1995.

Za Radu

předseda

Ph. VASSEUR

PŘÍLOHA

ČÁST A

METODA ODBĚRU VZORKŮ

1. **Jatečně upravená těla (s dosud neoddělenou kůží krku)**

Namátkový odběr vzorků je prováděn rovnoměrně u celé zásilky. Vzorky sestávají z přibližně desetigramových kousků kůže krku, která se odstraní asepticky sterilním skalpelem a pinzetou. Vzorky je třeba až do vyšetření uchovávat v chladu při 4 °C. Pro vyšetření se vzorky vloží do desetinásobného objemu pufrované peptonové vody a inkubují se při 37 °C po dobu 16 až 20 hodin. Potom se zjišťuje přítomnost salmonel rozborem inokulovaných tekutých půd pomocí metody popsané v části C. Za účelem inokulace lze smísit dohromady nejvýše 10 objemových jednotek inokulovaných tekutých půd.

Vzorky jsou řádně označeny identifikačními údaji.

2. **Jatečně upravená těla bez kůže krku, části jatečně upravených těl a droby**

Asi dvaceti pěti gramové části tkáně se získají proseknutím povrchu masa sterilním korkovrtem nebo vyříznutím tenké vrstvy tkáně sterilními nástroji. Vzorky je třeba uchovávat v chladu při 4 °C až do zahájení analýzy. Pro vyšetření se vzorky vloží do desetinásobného objemu pufrované peptonové vody a inkubují se při 37 °C po dobu 16 až 20 hodin. Potom se zjišťuje přítomnost salmonel rozborem inokulovaných tekutých půd pomocí metody popsané v části C. Za účelem inokulace lze smísit dohromady nejvýše 10 objemových jednotek inokulovaných tekutých půd.

Vzorky jsou řádně označeny identifikačními údaji.

ČÁST B

POČET VZORKŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT ODEBRÁNY

Počet jednotek balení v zásilce, z nichž mají být namátkově odebrány jednotlivé vzorky, je tento:

Zásilka (počet jednotek balení)	Počet jednotek balení, z nichž se odeberou vzorky
1–24	Počet rovnající se nejvyššímu počtu jednotek 20
25–29	20
30–39	25
40–49	30
50–59	35
60–89	40
90–199	50
200–499	55
500 nebo více	60

V závislosti na hmotnosti jednotek balení může být počet jednotek balení, z nichž se mají odebrat vzorky, snížen pomocí těchto násobitelů:

Hmotnost jednotky balení	> 20 kg	10–20 kg	< 10 kg
Násobitel	x 1	x 3/4	x 1/2

ČÁST C

MIKROBIOLOGICKÁ METODA PRO VYŠETŘENÍ VZORKŮ

Mikrobiologické vyšetřování vzorků na salmonely musí být prováděno standardní metodou Mezinárodní organizace pro normalizaci, ISO 6579:1993. Rada však může na návrh Komise povolit v jednotlivých případech použití metod, které poskytují rovnocenné záruky.