Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2025/3572

2025 7 9

Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 5 straipsnio 4 dalį [1]

(C/2025/3572)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Cereza del Jerte“

ES Nr.: PDO-ES-0233-AM01 – 2025 4 14

1. **Produkto pavadinimas**

„Cereza del Jerte“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☒ Saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

☐ Saugoma geografinė nuoroda (SGN)

☐ Geografinė nuoroda (GN)

3. **Sektorius**

☒ Žemės ūkio produktai

☐ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Ispanija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura (Estremadūros autonominės srities vyriausybės Žemės ūkio, kaimo plėtros, gyventojų ir teritorijų ministerija), *Dirección General de Agricultura y Ganadería* (Žemės ūkio ir gyvulininkystės generalinis direktoratas)

6. **Pripažinimas standartiniu pakeitimu, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalyje**

Pagal Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalį, pakeitimo paraiška gali būti laikoma standartine.

7. **Patvirtinto standartinio pakeitimo (-ų) aprašymas**

1. *Įtrauktos naujos trešnių veislės*

Dėl klimato pokyčių, Chertės slėnyje įvykusių per pastaruosius kelis dešimtmečius, ir dėl to, kad šia SKVN žymimų produktų gamintojams reikia pailginti sezoną, į produkto specifikaciją įtrauktos trys naujos nevietinės trešnių veislės („Burlat“, „Lapins“ ir „Van“). Šis pakeitimas turi įtakos produkto specifikacijos B, E ir F skirsniams ir bendrojo dokumento 3.2 skirsniui.

Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

2. *Su reguliavimo valdybos logotipu susijęs pakeitimas*

Pakeisti logotipai, naudojami saugomam produktui atskirti. Šis pakeitimas turi įtakos tik produkto specifikacijos H skirsniui ir bendrojo dokumento 3.7 skirsniui.

Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

3. *Su kontrolės įstaiga susijęs pakeitimas*

G skirsnyje (Kontrolės įstaiga) atnaujinti kai kurie konkretūs duomenys.

Pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„Cereza del Jerte“

ES Nr.: PDO-ES-0233-AM01 – 2025 4 14

SKVN (X) SGN ( )

1. **(SKVN ar SGN) pavadinimas (-ai)**

„Cereza del Jerte“

2. **Valstybė narė arba trečioji šalis**

Ispanija

3. Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

— 08 – VALGOMIEJI VAISIAI IR RIEŠUTAI; CITRUSINIŲ VAISIŲ ARBA MELIONŲ ŽIEVELĖS IR LUOBOS

0809 – ABRIKOSAI, VYŠNIOS, PERSIKAI (ĮSKAITANT NEKTARINUS), SLYVOS IR DYGIŲJŲ SLYVŲ VAISIAI, ŠVIEŽI

0809 29 – Kitos

3.2. *Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas*

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Cereza del Jerte“ suteikiama tik rūšies *Prunus avium* L. vietinių veislių „Navalinda“, „Ambrunés“, „Pico Limón Negro“, „Pico Negro“ ir „Pico Colorado“, taip pat nevietinių veislių „Van“, „Lapins“ ir „Burlat“ valgomosioms trešnėms, kurios skirtos vartoti šviežios.

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Cereza del Jerte“ suteikiama šių veislių ir tipų trešnėms:

— veislių „Ambrunés“, „Pico Negro“, „Pico Colorado“ ir „Pico Limón Negro“ vadinamosioms *Picotas* trešnėms. Dalis užaugintų uogų priklauso šiai trešnių veislių grupei; šios trešnės labiausiai išsiskiria tuo, kad skinant savaime atsiskiria nuo kotelio.

— Trešnėms su koteliais: „Navalinda“, „Van“, „Lapins“ ir „Burlat“.

Kalbant apie produkto savybes, vaisių išorės spalva yra raudona, daugiausia pasitaiko vyno ar purpurinės spalvos trešnių. Vaisiaus minkštimas standus ir traškus, minkštimo ir sulčių spalva priklauso nuo veislės – nuo raudonos spalvos minkštimo ir sulčių iki gelsvos ar balkšvos spalvos minkštimo ir bespalvių sulčių. Vaisius gali būti įvairių formų – inksto formos, paplokščias, apvalus, pailgas. Vaisiaus kauliuko dydis ir forma gali būti įvairi priklausomai nuo veislės – kauliukas gali būti apvalus ar pailgas ir mažas, vidutinio dydžio, didelis ar labai didelis.

Šioje lentelėje pateikiami pagrindiniai reikalavimai dėl cukraus kiekio (išreikšto Brikso laipsniais), vaisiaus formos, mažiausio dydžio ir pH.

VEISLĖ	Cukraus kiekis (nurodytas Brikso laipsniais)			Forma	Mažiausias dydis	pH		
	mažiausias	didžiausias	vidutinis			mažiausias	didžiausias	vidutinis
„Navalinda“	12	21,60	14	paplokščia	21 mm	3,80	4,70	4,25
„Ambrunés“	14	25,80	20	paplokščia	21 mm	3,65	4,85	4,25
„Pico Colorado“	13,90	26,40	21	pailga	21 mm	3,80	4,70	4,25
„Pico Negro“	11,80	25,60	19	pailga	21 mm	3,80	4,90	4,35
„Pico Limón Negro“	15,40	26,80	20	pailga	21 mm	3,80	4,70	4,25
„Van“	19,33	21,50	20,42	inksto formos	21 mm	3,68	4,05	3,86
„Lapins“	17,27	18,23	17,75	paplokščia	21 mm	3,67	4,35	4,01
„Burlat“	13,73	17,20	15,47	paplokščia	21 mm	3,83	4,05	3,94

SKVN „Cereza del Jerte“ suteikiama tik kategorijos „Ekstra“ trešnėms, kaip apibrėžta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 214/2004 ([2]) patvirtintame prekybos vyšniomis standarte.

3.3. *Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)*

Produktas auginamas nustatytoje vietovėje.

3.4. *Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje*

Visi šie gamybos etapai turi būti vykdomi nustatytoje geografinėje vietovėje: sodinimas ir auginimas, dažniausiai nedideliuose terasiniuose žemės plotuose su stačiais šlaitais, kuriuose veiklą mechanizuoti sunku, žemės darbai (arimas, tręšimas, genėjimas) ir derliaus nuėmimas rankiniu būdu.

3.5. *Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės*

Produktas paruošiamas ir supakuojamas taip, kad jis būtų visiškai apsaugotas. Pakavimo medžiagos parenkamos kruopščiai, kad nepakistų produkto savybės. Kiekvienos pakuotės turinio kilmė, veislė, kokybė ir dydis turi būti vienodi ir matoma turinio dalis turi būti būdinga visam supakuotam produktui.

Trešnės su SKVN „Cereza del Jerte“ turi būti pakuojamos nustatytoje geografinėje vietovėje. Tai būtina siekiant užtikrinti kokybę bei atsekamumą ir kontroliuoti visą sertifikavimo procesą iki pat jo pabaigos.

([2]) OL L 36, 2004 2 7, p. 6.

3.6. *Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės*

Ant pakuotės privaloma aiškiai nurodyti saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimą, taip pat įmonių ženklus ir taikytinuose teisės aktuose nustatytus bendro pobūdžio duomenis.

Reguliavimo valdyba turi du logotipus. Jie naudojami taip:

logotipas „Cereza del Jerte“: šiuo logotipu gali būti ženklinamos anksčiau minėtų veislių ir kitos trešnės.



Logotipas „Picota del Jerte“: siekiant neklaidinti vartotojo šiuo logotipu gali būti ženklinamos tik anksčiau minėtų veislių trešnės.



Bet kokios rūšies pakuotė, kurioje pateikiamos vartoti skirtos trešnės, ženklinama Reguliavimo valdybos sunumeruota papildoma etikete kitoje pakuotės pusėje arba identifikavimo kodu.

4. Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

Šios trešnės auginamos Kasereso (*Cáceres*) provincijos šiaurėje esančiose apskrityse. Šią vietovę sudaro žemės plotai šiose savivaldybėse (išvardytos pagal apskritį):

— CHERTĖS SLĖNIO (*VALLE DEL JERTE*) APSKRITIS: Baradas (*Barrado*), Kabesuela del Valjė (*Cabezuela del Valle*), Kabreras (*Cabrero*), Kasas del Kastanjaras (*Casas del Castañar*), El Tornas (*El Torno*), Chertė (*Jerte*), Navakonsechas (*Navaconcejo*), Piornalas (*Piornal*), Reboljaras (*Rebollar*), Tornavakas (*Tornavacas*), Valdastillasas (*Valdastillas*).

— DE LA VEROS (*DE LA VERA*) APSKRITIS: Aldeanueva de la Vera, Arojomolinos de la Vera (*Arroyomolinos de la Vera*), Kuakos de Justė (*Cuacos de Yuste*), Garganta de la Olja (*Garganta la Olla*), Garguera (*Gargüera*), Gicho de Santa Barbara (*Guijo de Santa Bárbara*), Charais de la Vera (*Jaraíz de la Vera*), Pasaron de la Vera (*Pasarón de la Vera*) ir Toremenga (*Torremenga*).

— AMBROSO (*AMBROZ*) APSKRITIS: Kabesabeljosa (*Cabezabellosa*), Kasas del Monte (*Casas del Monte*), Gargantilja (*Gargantilla*), Hervasas (*Hervás*), Charilja (*Jarilla*) ir Segura de Toro.

Dėl kokybės, kalnuotose vietovėse esančių ūkių ir auginimo būdo, kurie yra glaudžiai susiję, į geografinę vietovę nepatenka šiose vietovėse ir savivaldybėse esantys žemės plotai ir ūkiai, kurie nėra kalnuotose žemės ūkio paskirties vietovėse:

— De la Veros apskrityje žemiau nei 500 m virš jūros lygio esantys žemės ūkiai,

— Ambroso slėnio apskrityje žemiau nei 600 m virš jūros lygio esantys žemės ūkiai.

Trešnės auginamos, paruošiamos ir supakuojamos toje pačioje geografinėje vietovėje.

5. Ryšys su geografine vietove

5.1. *Geografinės vietovės ypatumai*

Istorinis ryšys

Pavadinimas „Chertė“ (*Jerte*) arba „Chertės slėnis“ (*Valle del Jerte*) yra glaudžiai siejamas su trešnėmis – daugeliui vartotojų Ispanijoje ši vietovė savaime asocijuojasi su trešnėmis arba atvirkščiai. Taigi ji yra puikiai žinoma dėl joje auginamų aukštos kokybės, ypač vadinamųjų *Picotas*, trešnių.

Manoma, kad trešnių vaismedžius atvežė arabai ir po Rekonkistos čia atvykus naujiesiems gyventojams vaismedžiai jau buvo prisitaikę prie šios teritorijos. Tačiau patikimų įrodymų apie čia augančius trešnių vaismedžius randama tik nuo XIV a.

1352 m. birželio 2 d. karaliaus emisarų būrys sustojo pernakvoti viename iš apskrities miestelių. Riteriai čia ragavo upėtakių ir trešnių – tai rodo, kad jau tais laikais jos buvo žinomas produktas, kurio kokybė buvo pakankamai aukšta, kad jį būtų galima pasiūlyti tokiems išskirtiniams keliautojams.

Vėlesniais šimtmečiais trešnės augintos toliau ir vis labiau populiarėjo. XVI a. žymus ispanų gydytojas Luisas de Toro mini Chertės trešnes ir jas giria dėl jų dydžio, spalvos ir skonio.

XVIII a., kai kaštonmedžių giraites sunaikino puvinys, trešnės pradėtos laikyti tikra ekonomine alternatyva. To amžiaus pabaigoje ir XIX a. trešnių vaismedžiai paplito Chertės slėnyje ir dviejuose kaimyniniuose slėniuose.

Pirmaisiais XIX a. dešimtmečiais metraštininkai tvirtina, kad geriausia šioje vietovėje „…yra trešnės, kurios atitinkamai ypač vertinamos karaliaus rūmuose …“ XIX a. trešnių vaismedžiai paplito visuose miesteliuose, taigi XX a. pradžioje ši vietovė jau buvo gerai žinoma dėl „gardžių čia auginamų trešnių“.

Gamtinis ryšys

Chertės slėnyje tradiciškai auginama daug trešnių veislių – kai kurios iš jų tradicinės ir vietinės, kai kurios – nevietinės.

Keturios trešnių veislės ir veislė „Navalinda“ yra vietinės – jos auginamos Chertės slėnyje arba kaimyniniuose Ambroso ir La Veros slėniuose. Šios trešnės auginamos beveik vien tik šioje vietovėje, nes iki šiol pastangos jas pradėti auginti kitur buvo ne itin sėkmingos.

Įvairūs autoriai teigia, kad trešnių, kurių vaisiai skinami lengvai atsiskiria nuo kotelių, veislių auginimą Chertės slėnyje lėmė ilgas aklimatizacijos ir pusiau dirbtinės skirtingų *Prunus avium* L., nuo senų laikų kalnų miškuose augančios vietinės rūšies, poskiepių selekcijos procesas.

Ne mažiau svarbūs buvo Chertės slėnio augintojų atlikti patobulinimai ir klonų selekcija bei aplinkos veiksniai, pvz., didelis drėgnis (net ir vasarą), slėnyje pučiantys vėjai, kryptis, vidutinis saulėtų dienų skaičius per metus, aukštis, mikroklimatas ir dirvos rūgštingumas.

Veislės „Burlat“ ir „Van“ Chertės slėnyje pradėtos auginti praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, o veislė „Lapins“ – devintajame dešimtmetyje. Neseniai atlikti tyrimai parodė, kad Chertės slėnyje augančių nevietinių veislių, visų pirma veislės „Lapins“, uogos pasižymi juslinėmis ir bioaktyviomis savybėmis, dėl kurių jos skiriasi nuo tos pačios veislės uogų, užaugintų kitose Ispanijos auginimo vietovėse.

Dėl vietovės struktūros ir sąlygų, kurias lemia sudėtinga topografija, susiformuoja apželdintas kraštovaizdis su nedidelėmis, kartais ir visai mažomis terasomis, kurios sutvirtinamos akmenų sienomis ir dėl kurių žemė iš esmės negali būti dirbama mechanizuotai.

Chertės slėnio ūkininkai ištobulino tradicinius įgūdžius ir specialias technines žinias, kad auginamas trešnes galėtų prižiūrėti rankomis. Dėl joms skiriamo atidaus individualaus dėmesio, auga su dideliu atsidavimu ir rūpestingumu auginamų ir skinamų trešnių vertė.

Todėl produkto savybes lemia tai, kad auginami tam tikri prie Chertės baseinui ir kaimyniniams slėniams būdingų gamtinių sąlygų prisitaikę ir ten aklimatizavęsi vaismedžiai, taip pat auginimo sistemos ypatumai – tai, kad trešnių vaismedžių auginimas susijęs su kultūros tradicijomis, kurios pagrįstos smulkiais ūkiais ir tuo, kad juose dirbama šeimomis. Auginant vaismedžius ūkiuose, dažniausiai išsidėsčiusiuose nedideliuose terasiniuose žemės plotuose su stačiais šlaitais, kuriuose veiklą mechanizuoti sunku, gaunamą negausų derlių atsveria aukšta jo kokybė.

5.2. *Produkto ypatumai*

Saugoma kilmės vietos nuoroda „Cereza del Jerte“ suteikiama tik rūšies *Prunus avium* L. veislių „Navalinda“, „Ambrunés“, „Pico Limón Negro“, „Pico Negro“, „Pico Colorado“, „Burlat“, „Van“ ir „Lapins“ valgomosioms trešnėms, kurios skirtos vartoti šviežios.

Vaisių išorės spalva yra raudona, jos intensyvumas priklauso nuo veislės. Trešnės dažniausiai yra vyno ar purpurinės spalvos, nes nuimant vietos derlių daugiausia vyrauja vadinamosios *Picotas* trešnės, ypač veislės „Ambrunés“ uogos.

Picotas trešnės nuo kitų trešnių iš esmės skiriasi tuo, kad jas skinant kotelis savaime atsiskiria nuo vaisiaus, tačiau dėl to nenukenčia jų kokybė, atsparumas apdorojant ir galiojimo laikas. Šiai grupei priklauso veislių „Ambrunés“, „Pico Negro“, „Pico Limón Negro“ ir „Pico Colorado“ trešnės.

Jų forma gali būti įvairi – inksto formos, paplokščia, apvali arba pailga.

Vaisiaus minkštimas yra labai standus ir traškus, jis ir sultys yra raudonos spalvos, tačiau atspalviai gali būti įvairūs, priklausomai nuo veislės – nuo raudonos spalvos minkštimo ir sulčių iki bespalvių sulčių ir gelsvos ar balkšvos spalvos minkštimo. Minkštimo ir sulčių, ypač sulčių, spalva paprastai nesikeičia.

Vaisiaus kauliukas yra viena iš pastoviausių savybių. Jis gali būti vidutinio dydžio, didelis arba labai didelis (veislių „Navalinda“ ir „Ambrunés“ vaisių). Kauliukas gali būti apvalus („Ambrunés“), pusapvalis („Pico Colorado“) arba pailgas („Pico Limón Negro“).

Kauliuko ir vaisiaus dydžio santykis svyruoja nuo vidutinio („Pico Colorado“, „Burlat“ ir „Lapins“) iki didelio ir labai didelio („Pico Limón Negro“, „Navalinda“, „Ambrunés“ ir „Van“).

Kotelio ilgis ir storis gali būti labai įvairus:

— trumpas („Van“, „Lapins“ ir „Burlat“), vidutinio ilgio („Ambrunés“ ir „Navalinda“) ir ilgas („Pico Negro“ ir „Pico Colorado“);

— plonas („Pico Negro“ ir „Pico Colorado“), vidutinio storio („Ambrunés“, „Navalinda“, „Burlat“ ir „Lapins“) ir storas („Van“).

Kalbant apie juslines savybes, vidutinis cukraus kiekis yra didesnis nei paprastai, tinkamai sunokusių trešnių lūžio rodiklis, priklausomai nuo skirtingų veislių, yra 12–24 g/100 g šviežio vaisiaus svorio.

SKVN „Cereza del Jerte“ suteikiama tik kategorijos „Ekstra“ trešnėms, kaip apibrėžta Reglamentu (EB) Nr. 214/2004 patvirtintame prekybos vyšniomis standarte.

5.3. *Priežastinis geografinės vietovės ir produkto, kuriam suteikta SKVN, kokybės ar savybių arba geografinės vietovės ir kurios nors produkto, kuriam suteikta SGN, savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšys*

Veislių „Navalinda“, „Ambrunés“, „Pico Limón Negro“, „Pico Negro“ ir „Pico Colorado“ trešnės auginamos beveik vien tik šioje vietovėje, nes iki šiol pastangos jas pradėti auginti kitur buvo ne itin sėkmingos – trešnių vaismedžiai auga prastai, jei dirvos sąlygos, aukštis, saulėtų dienų skaičius, drėgmė ir vyraujantys vėjai nėra tinkami.

Trešnių, kurių vaisiai skinami lengvai atsiskiria nuo kotelių, veislių auginimą Chertėje lėmė ilgas aklimatizacijos ir pusiau dirbtinės *Prunus avium* L. – nuo senų laikų kalnų miškuose augančios vietinės rūšies – selekcijos procesas.

Nevietinės veislės buvo pradėtos auginti nuo 7-ojo dešimtmečio, įgyvendinant įvairias tobulinimo programas, ir dėl unikalių Chertės slėnio dirvožemio ir klimato sąlygų bei tradicinės vietovės gamintojų praktinės patirties visiškai prisitaikė šioje vietovėje.

Be Chertės slėnio augintojų atliktų patobulinimų ir klonų selekcijos, taip pat reikėtų paminėti aplinkos veiksnius, skatinusius šių veislių prisitaikymą, tokius kaip:

— didelis drėgnis (net ir vasarą);

— slėnyje pučiantys vėjai, kryptis, vidutinis saulėtų dienų skaičius per metus, aukštis, mikroklimatas ir dirvos rūgštingumas;

— kalbant apie orografiją, trešnių vaismedžiai trijuose slėniuose auginami įvairiose vietose, pradedant slėnio viduryje ir baigiant daugiau nei 1 200 m aukštyje esančiuose žemės plotuose. Trešnėms auginti labiausiai tinka 600–1 200 m aukštyje esantys žemės plotai, nes tokiu būdu jos ir kitų veislių trešnės kasmet palaipsniui noksta nuo balandžio pabaigos iki rugpjūčio pradžios;

— šios vietovės dirvožemis yra purus ir rupus, dažniausiai priesmėlio tipo. Išorinis drenažas paprastai yra geras. Dirvožemis visada rūgštus (paprastai pH 5–5,5), tai lemia jį sudarančios medžiagos. Dėl šių savybių šis dirvožemis puikiai tinka vyraujančiai trešnių rūšiai (*Prunus avium* arba laukinei trešnei) ir vietinėms jos veislėms auginti;

— kalbant apie klimatą, trijų į nustatytą geografinę vietovę įtrauktų slėnių klimato savybes lemia jų siaurumas, gilumas, kryptis ir tai, kad jie atsiveria į pietus. Dėl įvairaus aukščio ir fragmentuoto reljefo saulės šviesa ir temperatūra tarp kalnų viršūnių ir sąnašinio slėnio dugno pasiskirsto nevienodai, todėl kartais temperatūrų skirtumai yra labai dideli. Šie klimato skirtumai lemia nevienodą augimo ciklo ir žydėjimo bei nokimo laikotarpių trukmę – kaip jau minėta, skirtingose vietose augančios trešnės žydi ir noksta skirtingais etapais ir šie skirtumai yra itin akivaizdūs nuimant derlių. Tos pačios veislės trešnių sunokimo laikas gali skirtis daugiau nei 40 dienų.

Kalbant apie drėgnį, iš mėnesinių bei metinių drėgnio rodiklių bei kritulių pasiskirstymo matyti, kad šiai vietovei būdingas drėgnas Vidužemio jūros klimatas su trumpomis ir labai sausomis vasaromis, nes liepos ir rugpjūčio mėn. karšta ir lyja labai nedaug, praktiškai apskritai nelyja.

Nepaisant to, kad pagal vidutinę metinę temperatūrą klimatas yra gana šiltas, skirtingais metų laikais temperatūra labai svyruoja. Dėl šių temperatūros svyravimų klimato sąlygos yra gana atšiaurios.

Apibendrinant galima teigti, kad aprašytos specifinės orografinės, dirvožemio, klimato ir hidrografinės savybės yra būtinos siekiant išauginti tokį išskirtinį ir autentišką produktą, kaip trešnės su SKVN „Cereza del Jerte“. Išauginti minėtą produktą be kurio nors iš šių veiksnių būtų neįmanoma.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

https://www.juntaex.es/documents/77055/621148/Pliego+DOP+Cereza+del+Jerte_consolidado+200924.pdf