# РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/1905 НА КОМИСИЯТА

**от 11 септември 2025 година**

**за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „desmanol pure“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета**

**(текст от значение за ЕИП)**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) На 19 април 2016 г. в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 дружеството Schülke & Mayr GmbH подаде заявление до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди с наименование „desmanol pure“ от продуктов тип 1, описан в приложение V към посочения регламент, като предостави писмено потвърждение, че компетентният орган на Австрия приема да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-GA023097-64.

(2) „desmanol pure“ съдържа пропан-2-ол като активно вещество, включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества за продуктов тип 1.

(3) На 13 юни 2024 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган предаде на Агенцията доклад за оценката и заключенията от нея.

(4) На 13 декември 2024 г. Агенцията предостави на Комисията своето становище ([2]), заедно с проекта за обобщение на характеристиките („SPC“) на биоцидите от групата „desmanol pure“ и окончателния доклад за оценката на групата биоциди в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5) В становището се стига до заключението, че „desmanol pure“ е група биоциди по смисъла на член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите — отговаря на условията по член 19, параграф 6 от посочения регламент.

(6) На 8 януари 2025 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

(7) Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за идентичната група биоциди „desmanol pure“.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Становище на ECHA от 28 ноември 2024 г. относно разрешението на Съюза за биоцида „desmanol pure“ (ECHA/BPC/455/2024), https://echa.europa.eu/de/opinions-on-union-authorisation.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

*Член 1*

На Schülke & Mayr GmbH се предоставя разрешение на Съюза номер EU-0033833-0000 за предоставяне на пазара и употреба на групата биоциди „desmanol pure“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 23 октомври 2025 г. до 30 септември 2035 г.

*Член 2*

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 септември 2025 година.

*За Комисията*
*Председател*
Ursula VON DER LEYEN

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

**ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДИ**

desmanol pure

**Продуктов(и) тип(ове)**

PT01: Човешка хигиена

**Номер на разрешително** EU-0033833-0000

**Номер на актив R4BP** EU-0033833-0000

ЧАСТ I.

**ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО**

Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Наименование на групата**

| | |
|---|---|
| Име | desmanol pure |

1.2. **Продуктов(и) тип(ове)**

| | |
|---|---|
| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |

1.3. **Притежател на разрешение**

| | | |
|---|---|---|
| Име и адрес на притежателя на разрешението | Име | Schuelke & Mayr GmbH |
| | Адрес | Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE |
| Номер на разрешително | EU-0033833-0000 | |
| *Номер на актив R4BP* | EU-0033833-0000 | |
| Дата на издаване на разрешението | 23 октомври 2025 г. | |
| Дата на изтичане срока на валидност на разрешението | 30 септември 2035 г. | |

1.4. **Производител(и) на продукта**

| | |
|---|---|
| Име на производителя | Schülke & Mayr GmbH |
| Адрес на производителя | Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Германия |
| Местонахождение на производствените обекти | Schülke & Mayr GmbH site 1 Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Германия |

| | |
|---|---|
| Име на производителя | BOCHEMIE a.s. |
| Адрес на производителя | Lidická 326 735 95 Bohumín Чехия |
| Местонахождение на производствените обекти | BOCHEMIE a.s. site 1 Lidická 326 735 95 Bohumín Чехия |

| | |
|---|---|
| Име на производителя | Prisman Chemie GmbH |
| Адрес на производителя | Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Германия |
| Местонахождение на производствените обекти | Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Германия |

| | |
|---|---|
| Име на производителя | A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH |
| Адрес на производителя | Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Германия |
| Местонахождение на производствените обекти | A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH site 1 Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Германия |

| | |
|---|---|
| Име на производителя | Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH |
| Адрес на производителя | Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Германия |
| Местонахождение на производствените обекти | Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH site 1 Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Германия |

| | |
|---|---|
| Име на производителя | Sterisol AB |
| Адрес на производителя | Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Швеция |
| Местонахождение на производствените обекти | Sterisol AB site 1 Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Швеция |

| | |
|---|---|
| Име на производителя | Rudolf Dankwardt GmbH |
| Адрес на производителя | Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Германия |
| Местонахождение на производствените обекти | Rudolf Dankwardt GmbH site 1 Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Германия |

| | |
|---|---|
| Име на производителя | Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz |
| Адрес на производителя | Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Германия |
| Местонахождение на производствените обекти | Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz site 1 Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Германия |

1.5. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

| | |
|---|---|
| Активно вещество | Propan-2-ol |
| Име на производителя | Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) |
| Адрес на производителя | Römerstraße 733 47443 Moers Германия |
| Местонахождение на производствените обекти | Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Германия<br>Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 2 Shamrockstr. 88 44643 Herne Германия |

| | |
|---|---|
| Активно вещество | Propan-2-ol |
| Име на производителя | Shell Chemicals Europe B.V. |
| Адрес на производителя | Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Нидерландия |
| Местонахождение на производствените обекти | Shell Chemicals Europe B.V. site 1 BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Нидерландия |

Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на групата**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 75 % (w/w) |
| 1-Tetradecanol | Tetradecan-1-ol | Неактивно вещество | 112-72-1 | 204-000-3 | 0 - 0,5 % (w/w) |

2.2. **Вид(ове) формулация**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

ЧАСТ II.

**ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО МЕТА SPC**

Глава 1. МЕТА SPC 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 1 идентификатор**

| | |
|---|---|
| Идентификатор | desmanol pure meta SPC1 |

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| | |
|---|---|
| Номер | 1-1 |

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| | |
|---|---|
| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 1

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 - 75 % (w/w) |
| 1-Tetradecanol | Tetradecan-1-ol | Неактивно вещество | 112-72-1 | 204-000-3 | 0,25 - 0,5 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 1**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| Препоръки за безопасност | P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.<br>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.<br>P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.<br>P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P273: Да се избягва изпускане в околната среда.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. |

| | |
|---|---|
| | P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #1 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #2 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #3 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и вируси (вируцидна активност в ограничен спектър): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте 5 ml (свити шепи) в дланта си (2-4 натискания на помпата). Разтривайте ръцете и предмишниците си поне за 45 секунди. Повторете стъпката (изсипване, втриване) още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на хирургичния биоцид за ръце трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #4 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост |

| | |
|---|---|
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.5. **Описание на употребите**

*Таблица 5.*

**Употреба #5 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.6. **Описание на употребите**

*Таблица 6.*

**Употреба #6 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.7. **Описание на употребите**

*Таблица 7.*

**Употреба #7 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | не е релевантно |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #7.1.: (професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост<br>Употреба #7.2.: (професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #7.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #7.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #7.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #7.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируцидна активност в ограничен спектър): Изсипете 5 ml (свити шепи) (2-4 натискания на помпата) от продукта или напръскайте 5 ml (свити шепи) в дланта си. Разтривайте ръцете и предмишниците най-малко за 45 секунди. Повторете стъпката (изсипване, втриване) още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.8. **Описание на употребите**

*Таблица 8.*

**Употреба #8 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #8.1.: (Професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони, като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети, козметични студия, грижи за възрастни хора и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.<br>Употреба #8.2.: (Професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #8.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #8.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #8.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #8.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |

| | |
|---|---|
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируцидна активност в ограничен спектър): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;

* Търговското наименование на биоцида;

* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

* Информацията съгласно CLP.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.9. **Описание на употребите**

*Таблица 9.*

**Употреба #9 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба – бактерии, дрожди – изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.10. **Описание на употребите**

*Таблица 10.*

**Употреба #10 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #10.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)<br>Употреба # 10.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #10.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #10.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #10.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #10.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируцидна активност в ограничен спектър): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 $mg/m^3$ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 1

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| | | |
|---|---|---|
| Търговско наименование | desmanol® pure | Пазарен регион: ЕС |
| | Septoderm® liquid | Пазарен регион: ЕС |
| | Wrights alcohol hand rub | Пазарен регион: ЕС |
| | Rely alcohol hand rub | Пазарен регион: ЕС |
| | HS Handisinfec-tion liquid | Пазарен регион: ЕС |
| | Profect Hand disinfection liquid | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® hand disinfection | Пазарен регион: ЕС |
| | sensiva® hand disinfection liquid | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® N hand disinfection | Пазарен регион: ЕС |
| | unodent hand disinfection | Пазарен регион: ЕС |
| | eurosept hand disinfection | Пазарен регион: ЕС |
| | Innocid Händedesin-fektion | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure pro | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure expert | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure clever | Пазарен регион: ЕС |

| | | |
|---|---|---|
| | desmanol® pure universal | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure pocket | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure client | Пазарен регион: ЕС |
| | microshield® hand rub | Пазарен регион: ЕС |
| | microshield® pure | Пазарен регион: ЕС |
| | Halasept 792 | Пазарен регион: ЕС |
| Номер на разрешително | EU-0033833-0001 1-1 | |

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 % (w/w) |
| 1-Tetradecanol | Tetradecan-1-ol | Неактивно вещество | 112-72-1 | 204-000-3 | 0,5 % (w/w) |

Глава 1. МЕТА SPC 2 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 2 идентификатор**

| | |
|---|---|
| Идентификатор | desmanol pure meta SPC2 |

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| | |
|---|---|
| Номер | 1-2 |

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| | |
|---|---|
| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 2

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 2**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 - 75 % (w/w) |
| 1-Tetradecanol | Tetradecan-1-ol | Неактивно вещество | 112-72-1 | 204-000-3 | 0,25 - 0,5 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 2**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 2

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| Препоръки за безопасност | P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.<br>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.<br>P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.<br>P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P273: Да се избягва изпускане в околната среда.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.<br>P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #11 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #12 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта (1-2 натискания на помпата) или напръскайте в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #13 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |

| | |
|---|---|
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #14 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.5. **Описание на употребите**

*Таблица 5.*

**Употреба #15 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.6. **Описание на употребите**

*Таблица 6.*

**Употреба #16 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони о (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия). |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.7. **Описание на употребите**

*Таблица 7.*

**Употреба #17 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Описание на областта на употреба: #Употреба 17.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) или в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост<br>#Употреба 17.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения и др.), лекарски или зъболекарски кабинети |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>#Употреба 17.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>#Употреба 17.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>#Употреба 17.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>#Употреба 17.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |

| | |
|---|---|
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (една свита шепа) от продукта или го напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.8. **Описание на употребите**

*Таблица 8.*

**Употреба #18 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #18.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони(напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.<br>Употреба #18.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #18.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #18.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>#Употреба 18.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>#Употреба 18.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (една свита шепа) от продукта или го напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.9. **Описание на употребите**

*Таблица 9.*

**Употреба #19 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба – бактерии, дрожди – изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |

| | |
|---|---|
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.10. **Описание на употребите**

*Таблица 10.*

**Употреба #20 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #20.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)<br>Употреба #20.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #20.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #20.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. |

| | |
|---|---|
| | Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #20.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #20.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.11. **Описание на употребите**

*Таблица 11.*

**Употреба #21 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (при специални случаи, напр. конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.12. **Описание на употребите**

*Таблица 12.*

**Употреба #22 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.12.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.12.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.12.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.12.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.12.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.13. **Описание на употребите**

*Таблица 13.*

**Употреба #23 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит) |

| | |
|---|---|
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.13.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.13.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.13.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.13.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.13.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.14. **Описание на употребите**

*Таблица 14.*

**Употреба #24 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.14.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.14.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.14.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.14.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.14.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 2

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 2

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| | | |
|---|---|---|
| Търговско наименование | desmanol® pure gel | Пазарен регион: ЕС |
| | Septoderm® IPA gel | Пазарен регион: ЕС |
| | Wrights alcohol hand gel | Пазарен регион: ЕС |
| | Rely alcohol hand gel | Пазарен регион: ЕС |
| | HS Hand disinfection gel | Пазарен регион: ЕС |
| | Profect Hand disinfection gel | Пазарен регион: ЕС |
| | sensiva® hand gel | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® N gel | Пазарен регион: ЕС |

| | | |
|---|---|---|
| | unodent hand gel | Пазарен регион: ЕС |
| | eurosept gel | Пазарен регион: ЕС |
| | Innocid Händedesin-fektions-Gel | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel pro | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel expert | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel clever | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel universal | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel pocket | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel client | Пазарен регион: ЕС |
| | microshield® gel | Пазарен регион: ЕС |
| | microshield® pure gel | Пазарен регион: ЕС |
| Номер на разрешително | EU-0033833-0002 1-2 | |

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 % (w/w) |
| 1-Tetradecanol | Tetradecan-1-ol | Неактивно вещество | 112-72-1 | 204-000-3 | 0,5 % (w/w) |

Глава 1. МЕТА SPC 3 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 3 идентификатор**

| | |
|---|---|
| Идентификатор | desmanol pure meta SPC3 |

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| | |
|---|---|
| Номер | 1-3 |

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| | |
|---|---|
| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 3

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 3**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 - 75 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 3**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 3

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| Препоръки за безопасност | P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.<br>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.<br>P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.<br>P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. |

| | |
|---|---|
| | P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #25 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #26 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #27 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и вируси (вируцидна активност в ограничен спектър): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #28 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.5. **Описание на употребите**

*Таблица 5.*

**Употреба #29 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.6. **Описание на употребите**

*Таблица 6.*

**Употреба #30 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.7. **Описание на употребите**

*Таблица 7.*

**Употреба #31 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #31.1.: (професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост<br>Употреба #31.2.: (професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #31.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #31.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #31.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #31.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.8. **Описание на употребите**

*Таблица 8.*

**Употреба #32 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #32.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони(напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.<br>Употреба #32.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони, напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети). |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #32.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #32.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #32.1: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #32.2: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.9. **Описание на употребите**

*Таблица 9.*

**Употреба #33 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.10. **Описание на употребите**

*Таблица 10.*

**Употреба #34 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #34.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони о (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия).<br>Употреба #34.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети). |

| | |
|---|---|
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #34.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #34.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #34.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #34.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 3

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 3

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| Търговско наименование | | | desmanol® pure light | Пазарен регион: ЕС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер на разрешително | | | EU-0033833-0003 1-3 | | |
| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 % (w/w) |

Глава 1. МЕТА SPC 4 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 4 идентификатор**

| Идентификатор | desmanol pure meta SPC4 |
|---|---|

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| Номер | 1-4 |
|---|---|

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |
|---|---|

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 4

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 4**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 - 75 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 4**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 4

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| Препоръки за безопасност | P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.<br>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.<br>P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.<br>P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.<br>P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #35 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания). |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #36 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #37 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |

| | |
|---|---|
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #38 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.4.1. Специфични инструкции за употреба

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.5. **Описание на употребите**

*Таблица 5.*

**Употреба #39 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.6. **Описание на употребите**

*Таблица 6.*

**Употреба #40 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.7. **Описание на употребите**

*Таблица 7.*

**Употреба #41 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #41.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост<br>Употреба #41.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #41.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #41.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>#Употреба 41.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>#Употреба 41.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |

| | |
|---|---|
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;

* Търговското наименование на биоцида;

* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

* Информацията съгласно CLP.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.8. **Описание на употребите**

*Таблица 8.*

**Употреба #42 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #42.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост<br>Употреба #42.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #42.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #42.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #42.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #42.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.9. **Описание на употребите**

*Таблица 9.*

**Употреба #43 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |

| | |
|---|---|
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.10. **Описание на употребите**

*Таблица 10.*

**Употреба #44 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #44.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)<br>Употреба #44.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #44.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. |

| | |
|---|---|
| | Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #44.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #44.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #44.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефикасност срещу бактерии, дрожди и обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.11. **Описание на употребите**

*Таблица 11.*

**Употреба #45 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания/специален случай: конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.12. **Описание на употребите**

*Таблица 12.*

**Употреба #46 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.12.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.12.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.12.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.12.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.12.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.13. **Описание на употребите**

*Таблица 13.*

**Употреба #47 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание: |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.13.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.13.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.13.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.13.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.13.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.14. **Описание на употребите**

*Таблица 14.*

**Употреба #48 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания/специален случай: конюнктивит). |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.14.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.14.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.14.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.14.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.14.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 4

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 4

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| Търговско наименование | | | desmanol® pure light gel | | Пазарен регион: ЕС |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер на разрешително | | | EU-0033833-0004 1-4 | | |
| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 % (w/w) |

Глава 1. МЕТА SPC 5 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 5 идентификатор**

| Идентификатор | desmanol pure meta SPC5 |
|---|---|

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| Номер | 1-5 |
|---|---|

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |
|---|---|

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 5

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 5**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 63,1 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 5**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 5

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| Препоръки за безопасност | P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.<br>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.<br>P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.<br>P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.<br>P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #49 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #50 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |

| | |
|---|---|
| | Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #51 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |

| | |
|---|---|
| | Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт 180 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #52 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |

| | |
|---|---|
| | Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.5. **Описание на употребите**

*Таблица 5.*

**Употреба #53 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |

| | |
|---|---|
| | Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.6. **Описание на употребите**

*Таблица 6.*

**Употреба #54 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.7. **Описание на употребите**

*Таблица 7.*

**Употреба #55 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #55.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.<br>Употреба #55.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #55.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вирусидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #55.2.: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 180 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #55.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #55.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.8. **Описание на употребите**

*Таблица 8.*

**Употреба #56 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вирупидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |

| | |
|---|---|
| | Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #56.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.<br>Употреба #56.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #56.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #56.2.: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 180 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #56.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #56.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вирусидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургичен дезинфектант за ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.9. **Описание на употребите**

*Таблица 9.*

**Употреба #57 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба – бактерии, дрожди, гъбички – изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицид, дрождицид, фунгицид: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 180 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.10. **Описание на употребите**

*Таблица 10.*

**Употреба #58 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба – бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |

| | |
|---|---|
| | Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #58.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)<br>Употреба #58.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #58.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #58.2.: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 180 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #58.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #58.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE |

| | |
|---|---|
| | Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургичен дезинфектант за ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 5

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 $mg/m^3$ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 5

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| | | |
|---|---|---|
| Търговско наименование | Septo-derm® soft | Пазарен регион: ЕС |
| | septosoft | Пазарен регион: ЕС |
| | pluradent hand disinfec-tion | Пазарен регион: ЕС |
| | Dezosept | Пазарен регион: ЕС |
| Номер на разрешително | EU-0033833-0005 1-5 | |

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 % (w/w) |

Глава 1. МЕТА SPC 6 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 6 идентификатор**

| | |
|---|---|
| Идентификатор | desmanol pure meta SPC6 |

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| | |
|---|---|
| Номер | 1-6 |

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| | |
|---|---|
| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 6

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 6**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,14 - 63,14 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 6**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 6

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.<br>EUH208: Съдържа Изоевгенол. Може да причини алергична реакция. |
| Препоръки за безопасност | P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.<br>P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #59 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 125, 500 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана)<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #60 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |

| | |
|---|---|
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 125, 500 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана)<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #61 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #61.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)<br>Употреба #61.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #61.1.: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #61.2.: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #61.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #61.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 125, 500 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана)<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургичен дезинфектант за ръце: Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #62 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии и дрожди: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 125, 500 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана)<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат) |

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 6

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 6

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| Търговско наименование | | | AntiLy1 | | Пазарен регион: ЕС |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер на разрешително | | | EU-0033833-0006 1-6 | | |
| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,14 % (w/w) |

Глава 1. META SPC 7 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 7 идентификатор**

| Идентификатор | desmanol pure meta SPC7 |
|---|---|

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| Номер | 1-7 |
|---|---|

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |
|---|---|

Глава 2. СЪСТАВ НА META SPC 7

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 7**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,14 - 63,14 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 7**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 7

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| Препоръки за безопасност | P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.<br>P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #63 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 125, 500 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана)<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #64 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |

| | |
|---|---|
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 125, 500 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана)<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #65 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #65.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)<br>Употреба #65.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #65.1.: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #65.2.: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #65.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #65.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 125, 500 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана)<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургичен дезинфектант за ръце: Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

* Номер на разрешителното;
* Търговското наименование на биоцида;
* Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;
* Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;
* Информацията съгласно CLP.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #66 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване – на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони, напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии и дрожди: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 125, 500 1 000 ml<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана)<br>Кутия: 5, 10, 20, 30 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>Бидон: 220 l<br>Опаковка: HDPE<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали<br>IBC: 1 000 l<br>Опаковка: HDPE със стоманена рамка<br>Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат) |

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 7

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 7

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| Търговско наименование | | | AntiLy2 | Пазарен регион: ЕС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер на разрешително | | | EU-0033833-0007 1-7 | | |
| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,14 % (w/w) |

Глава 1. META SPC 8 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Meta SPC 8 идентификатор**

| | |
|---|---|
| Идентификатор | desmanol pure meta SPC8 |

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| | |
|---|---|
| Номер | 1-8 |

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| | |
|---|---|
| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 8

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 8**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 - 75 % (w/w) |
| 1-Tetradecanol | Tetradecan-1-ol | Неактивно вещество | 112-72-1 | 204-000-3 | 0,25 - 0,5 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 8**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 8

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| Препоръки за безопасност | P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.<br>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.<br>P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.<br>P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P273: Да се избягва изпускане в околната среда.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.<br>P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #67 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #68 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #69 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и вируси (вируцидна активност в ограничен спектър): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |

| | |
|---|---|
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте 5 ml (свити шепи) в дланта си (2-4 натискания на помпата). Разтривайте ръцете и предмишниците най-малко за 45 секунди. Повторете стъпката (изсипване, втриване) още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #70 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.5. **Описание на употребите**

*Таблица 5.*

**Употреба #71 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.6. **Описание на употребите**

*Таблица 6.*

**Употреба #72 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml |

| | |
|---|---|
| | Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.7. **Описание на употребите**

*Таблица 7.*

**Употреба #73 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #73.1.: (професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост<br>Употреба #73.2.: (професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #73.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #73.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Честота: Употреба #73.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #73.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #73.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #73.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) (2-4 натискания на помпата) от продукта или напръскайте 5 ml (свити шепи) в дланта си. Разтривайте ръцете и предмишниците най-малко за 45 секунди. Повторете стъпката (изсипване, втриване) още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.8. **Описание на употребите**

*Таблица 8.*

**Употреба #74 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #74.1.: (Професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони, като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети, козметични студия, грижи за възрастни хора и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.<br>Употреба #74.2.: (Професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #74.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #74.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #74.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #74.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |

| | |
|---|---|
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.9. **Описание на употребите**

*Таблица 9.*

**Употреба #75 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.10. **Описание на употребите**

*Таблица 10.*

**Употреба #76 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #76.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)<br>Употреба #76.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>--- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #76.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #76.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #76.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #76.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 8

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 8

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| | | |
|---|---|---|
| Търговско наименование | desmanol® pure | Пазарен регион: ЕС |
| | Septoderm® liquid | Пазарен регион: ЕС |
| | Wrights alcohol hand rub | Пазарен регион: ЕС |
| | Rely alcohol hand rub | Пазарен регион: ЕС |
| | HS Handisinfec-tion liquid | Пазарен регион: ЕС |
| | Profect Hand disinfection liquid | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® hand disinfection | Пазарен регион: ЕС |
| | sensiva® hand disinfection liquid | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® N hand disinfection | Пазарен регион: ЕС |
| | unodent hand disinfection | Пазарен регион: ЕС |

| | | |
|---|---|---|
| | eurosept hand disinfection | Пазарен регион: ЕС |
| | Innocid Händedesin-fektion | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure pro | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure expert | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure clever | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure universal | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure pocket | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure client | Пазарен регион: ЕС |
| | microshield® hand rub | Пазарен регион: ЕС |
| | microshield® pure | Пазарен регион: ЕС |
| | Halasept 792 | Пазарен регион: ЕС |
| Номер на разрешително | EU-0033833-0008 1-8 | |

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 % (w/w) |
| 1-Tetradecanol | Tetradecan-1-ol | Неактивно вещество | 112-72-1 | 204-000-3 | 0,5 % (w/w) |

Глава 1. МЕТА SPC 9 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 9 идентификатор**

| | |
|---|---|
| Идентификатор | desmanol pure meta SPC9 |

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| | |
|---|---|
| Номер | 1-9 |

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| | |
|---|---|
| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 9

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 9**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 - 75 % (w/w) |
| 1-Tetradecanol | Tetradecan-1-ol | Неактивно вещество | 112-72-1 | 204-000-3 | 0,25 - 0,5 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 9**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 9

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| Препоръки за безопасност | P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.<br>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.<br>P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.<br>P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P273: Да се избягва изпускане в околната среда.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. |

| | |
|---|---|
| | P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #77 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |

| | |
|---|---|
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #78 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта (1-2 натискания на помпата) или напръскайте в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #79 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #80 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.5. **Описание на употребите**

*Таблица 5.*

**Употреба #81 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.6. **Описание на употребите**

*Таблица 6.*

**Употреба #82 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони о (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия). |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.7. **Описание на употребите**

*Таблица 7.*

**Употреба #83 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>#Употреба 83.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) или в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост |

| | |
|---|---|
| | #Употреба 83.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения и др.), лекарски или зъболекарски кабинети |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>#Употреба 83.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>#Употреба 83.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>#Употреба 83.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>#Употреба 83.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (една свита шепа) от продукта или го напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.8. **Описание на употребите**

*Таблица 8.*

**Употреба #84 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #84.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони(напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.<br>Употреба #84.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |

| | |
|---|---|
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #84.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #84.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>#Употреба 84.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>#Употреба 84.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси:

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте в дланта си (2-4 натискания на помпата) и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

--

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.9. **Описание на употребите**

*Таблица 9.*

**Употреба #85 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |

| | |
|---|---|
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи на ръцете) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.10. **Описание на употребите**

*Таблица 10.*

**Употреба #86 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #86.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)<br>Употреба #86.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #86.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #86.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #86.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #86.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси:

Изсипете 3 ml от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.11. **Описание на употребите**

*Таблица 11.*

**Употреба #87 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (при специални случаи, напр. конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.12. **Описание на употребите**

*Таблица 12.*

**Употреба #88 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.12.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

4.12.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.12.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.12.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.12.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.13. **Описание на употребите**

*Таблица 13.*

**Употреба #89 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.13.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.13.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.13.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.13.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.13.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.14. **Описание на употребите**

*Таблица 14.*

**Употреба #90 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |

| | |
|---|---|
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.14.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

4.14.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.14.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.14.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.14.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 9

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 9

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| | | |
|---|---|---|
| Търговско наименование | desmanol® pure gel | Пазарен регион: ЕС |
| | Septoderm® IPA gel | Пазарен регион: ЕС |
| | Wrights alcohol hand gel | Пазарен регион: ЕС |

| | | |
|---|---|---|
| | Rely alcohol hand gel | Пазарен регион: ЕС |
| | HS Hand disinfection gel | Пазарен регион: ЕС |
| | Profect Hand disinfection gel | Пазарен регион: ЕС |
| | sensiva® hand gel | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® N gel | Пазарен регион: ЕС |
| | unodent hand gel | Пазарен регион: ЕС |
| | eurosept gel | Пазарен регион: ЕС |
| | Innocid Händedesin-fektions-Gel | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel pro | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel expert | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel clever | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel universal | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel pocket | Пазарен регион: ЕС |
| | desmanol® pure gel client | Пазарен регион: ЕС |
| | microshield® gel | Пазарен регион: ЕС |
| | microshield® pure gel | Пазарен регион: ЕС |
| Номер на разрешително | EU-0033833-0009 1-9 | |

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 % (w/w) |
| 1-Tetradecanol | Tetradecan-1-ol | Неактивно вещество | 112-72-1 | 204-000-3 | 0,5 % (w/w) |

Глава 1. МЕТА SPC 10 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 10 идентификатор**

| | |
|---|---|
| Идентификатор | desmanol pure meta SPC10 |

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| | |
|---|---|
| Номер | 1-10 |

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| | |
|---|---|
| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 10

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 10**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 - 75 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 10**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 10

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |

| | |
|---|---|
| Препоръки за безопасност | P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.<br>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.<br>P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.<br>P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.<br>P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #91 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |

| | |
|---|---|
| Метод(и) на прилагане | Метод: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #92 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

4.2.2. *Мерки за напаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #93 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и вируцидна активност в ограничен спектър: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #94 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.5. **Описание на употребите**

*Таблица 5.*

**Употреба #95 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml |

| | |
|---|---|
| | Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.6. **Описание на употребите**

*Таблица 6.*

**Употреба #96 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.7. **Описание на употребите**

*Таблица 7.*

**Употреба #97 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #97.1.: (професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост<br>Употреба #97.2.: (професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #97.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #97.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #97.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #97.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.8. **Описание на употребите**

*Таблица 8.*

**Употреба #98 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #98.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони(напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.<br>Употреба #98.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони, напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети). |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #98.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #98.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #98.1: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #98.2: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.9. **Описание на употребите**

*Таблица 9.*

**Употреба #99 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |

| | |
|---|---|
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.10. **Описание на употребите**

*Таблица 10.*

**Употреба #100 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #100.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони о (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия).<br>Употреба #100.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети). |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #100.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Употреба #100.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. |

| | |
|---|---|
| | Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #100.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #100.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вирупидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 10

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 $mg/m^3$ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 10

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| Търговско наименование | | | desmanol ® pure light | Пазарен регион: ЕС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер на разрешително | | | EU-0033833-0010 1-10 | | |
| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 % (w/w) |

Глава 1. META SPC 11 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 11 идентификатор**

| Идентификатор | desmanol pure meta SPC11 |
|---|---|

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| Номер | 1-11 |
|---|---|

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |
|---|---|

Глава 2. СЪСТАВ НА META SPC 11

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 11**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 - 75 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 11**

| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |
|---|---|

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 11

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| Препоръки за безопасност | P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.<br>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.<br>P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.<br>P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.<br>P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #101 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |

| | |
|---|---|
| | Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания). |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #102 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #103 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml |

| | |
|---|---|
| | Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #104 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.5. **Описание на употребите**

*Таблица 5.*

**Употреба #105 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.6. **Описание на употребите**

*Таблица 6.*

**Употреба #106 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.7. **Описание на употребите**

*Таблица 7.*

**Употреба #107 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #107.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост<br>Употреба #107.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #107.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #107.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>#Употреба 107.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>#Употреба 107.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефикасност срещу бактерии, дрожди и обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.8. **Описание на употребите**

*Таблица 8.*

**Употреба #108 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #108.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост<br>Употреба #108.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #108.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #108.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #108.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #108.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси:

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.9. **Описание на употребите**

*Таблица 9.*

**Употреба #109 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.10. **Описание на употребите**

*Таблица 10.*

**Употреба #110 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Микобактерии<br>Общоприето наименование: МусоБактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #110.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)<br>Употреба #110.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #110.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #110.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 90 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #110.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #110.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефикасност срещу бактерии, дрожди и обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.11. **Описание на употребите**

*Таблица 11.*

**Употреба #111 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания/специален случай: конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |

| | |
|---|---|
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.12. **Описание на употребите**

*Таблица 12.*

**Употреба #112 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.12.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.12.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.12.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.12.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

--

4.12.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.13. **Описание на употребите**

*Таблица 13.*

**Употреба #113 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит) |

| | |
|---|---|
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.13.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

4.13.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.13.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.13.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.13.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.14. **Описание на употребите**

*Таблица 14.*

**Употреба #114 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения. (напр. в случай на заболявания/специален случай: конюнктивит) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество.<br>Време за контакт: 120 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.14.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.14.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.14.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.14.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.14.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 11

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 11

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| Търговско наименование | | | desmanol ® pure light gel | Пазарен регион: ЕС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер на разрешително | | | EU-0033833-0011 1-11 | | |
| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 75 % (w/w) |

Глава 1. META SPC 12 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 12 идентификатор**

| Идентификатор | desmanol pure meta SPC12 |
|---|---|

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

| Номер | 1-12 |
|---|---|

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

| | |
|---|---|
| Продуктов(и) тип(ове) | PT01: Човешка хигиена |

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 12

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 12**

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 - 63,1 % (w/w) |

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 12**

| | |
|---|---|
| Тип(ове) формулация | AL Всяка друга течност |

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 12

| | |
|---|---|
| Предупреждения за опасност | H225: Силно запалима течност и пара.<br>H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.<br>H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.<br>EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| Препоръки за безопасност | P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.<br>P102: Да се съхранява извън обсега на деца.<br>P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.<br>P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.<br>P261: Избягвайте вдишване на изпарения.<br>P261: Избягвайте вдишване на аерозоли.<br>P264: Измийте ръцете старателно след употреба.<br>P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място.<br>P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.<br>P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение.<br>P312: Обадете се в лекар при неразположение.<br>P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ.<br>P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.<br>P405: Да се съхранява под ключ.<br>P501: Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните и национални разпоредби.<br>P501: Да се изхвърли съдът в в съответствие с местните и национални разпоредби. |

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

*Таблица 1.*

**Употреба #115 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси:

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вирупидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.2. **Описание на употребите**

*Таблица 2.*

**Употреба #116 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |

| | |
|---|---|
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.3. **Описание на употребите**

*Таблица 3.*

**Употреба #117 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт 180 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml |

| | |
|---|---|
| | Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.4. **Описание на употребите**

*Таблица 4.*

**Употреба #118 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |

| | |
|---|---|
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали |

| | |
|---|---|
| | Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.5. **Описание на употребите**

*Таблица 5.*

**Употреба #119 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |

| | |
|---|---|
| | Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

---

4.6. **Описание на употребите**

*Таблица 6.*

**Употреба #120 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | широка общественост (неспециалисти) |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце:

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.7. **Описание на употребите**

*Таблица 7.*

**Употреба #121 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #121.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.<br>Употреба #121.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #121.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #121.2.: : 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 180 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #121.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #121.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце:

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.8. **Описание на употребите**

*Таблица 8.*

**Употреба #122 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |

| | |
|---|---|
| | Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #122.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост.<br>Употреба #122.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #122.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #122.2.: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 180 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #122.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #122.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | промишлена<br>професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml |

| | |
|---|---|
| | Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вирусидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургичен дезинфектант за ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.9. **Описание на употребите**

*Таблица 9.*

**Употреба #123 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки |
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Бактерицид, дрождицид, фунгицид: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 180 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.10. **Описание на употребите**

*Таблица 10.*

**Употреба #124 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито**

| | |
|---|---|
| Вид продукт | PT01: Човешка хигиена |
| Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба | Неприложимо |
| Целеви организъм(и) (включително етап на развитие) | Научно наименование: Бактерии<br>Общоприето наименование: Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Дрожди<br>Общоприето наименование: Дрожди<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Гъбички<br>Общоприето наименование: Гъбички<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Туберкулозни бактерии<br>Общоприето наименование: Туберкулозни Бактерии<br>Етап на развитие: вегетативни клетки<br>Научно наименование: Обвити вируси<br>Общоприето наименование: Обвити вируси<br>Етап на развитие: неприложимо<br>Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)<br>Етап на развитие: неприложимо |

| | |
|---|---|
| Област(и) на употреба | използване на закрито<br>Употреба #124.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)<br>Употреба #124.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети) |
| Метод(и) на прилагане | Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат)<br>Подробно описание:<br>- |
| Степен и честота на приложение | Дозиране:<br>Употреба #124.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 30 сек.)<br>Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество.<br>Време за контакт: 60 сек. (общо)<br>Употреба #124.2.: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество.<br>Време за контакт: 180 сек. (общо)<br>Брой и времеви график на прилагане:<br>Честота:<br>Употреба #124.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)<br>Употреба #124.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) |
| Категория(и) потребители | професионална |
| Размери и материал на опаковките | Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml<br>Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE<br>Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ;<br>Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали<br>Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий) |

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургичен дезинфектант за ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

---

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

---

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

---

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 12

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

---

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

**Данни за вероятните преки или косвени ефекти:**

Няма.

**Указания за първа помощ:**

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

**Спешни мерки за опазване на околната среда:**

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

---

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 12

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

| | | |
|---|---|---|
| Търговско наименование | Septoderm® soft | Пазарен регион: ЕС |
| | septosoft | Пазарен регион: ЕС |
| | pluradent hand disinfection | Пазарен регион: ЕС |
| | Dezosept | Пазарен регион: ЕС |
| Номер на разрешително | EU-0033833-0012 1-12 | |

| Общоприето наименование | Наименование по IUPAC | Функция | CAS номер | Номер на ЕО | Съдържание (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Propan-2-ol | Propan-2-ol | Активно вещество | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 % (w/w) |