REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1905 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 2025

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «desmanol pure» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 19 aprile 2016 la società Schülke & Mayr GmbH ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per una famiglia di biocidi denominata «desmanol pure», del tipo di prodotto 1 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente dell'Austria aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-GA023097-64.

(2) Il principio attivo contenuto in «desmanol pure» è il propan-2-olo, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 1.

(3) Il 13 giugno 2024 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.

(4) Il 13 dicembre 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il proprio parere ([2]), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi «desmanol pure» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5) Nel parere si conclude che «desmanol pure» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

(6) L'8 gennaio 2025 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «desmanol pure».

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Parere dell'ECHA del 28 novembre 2024 sull'autorizzazione dell'Unione della famiglia di biocidi «desmanol pure» (ECHA/BPC/455/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Schülke & Mayr GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0033833-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «desmanol pure» in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 23 ottobre 2025 al 30 settembre 2035.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PER UNA FAMIGLIA DI BIOCIDI

desmanol pure

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Numero di autorizzazione EU-0033833-0000

Numero dell'approvazione del R4BP EU-0033833-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Nome della famiglia**

Nome	desmanol pure

1.2. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

1.3. **Titolare dell'autorizzazione**

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Schuelke & Mayr GmbH
	Indirizzo	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Numero di autorizzazione	EU-0033833-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0033833-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	23 ottobre 2025	
Data di scadenza dell'autorizzazione	30 settembre 2035	

1.4. **Fabbricante/i del prodotto**

Nome del fabbricante	Schülke & Mayr GmbH
Indirizzo del fabbricante	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Schülke & Mayr GmbH site 1 Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germania

Nome del fabbricante	BOCHEMIE a.s.
Indirizzo del fabbricante	Lidická 326 735 95 Bohumín Cechia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	BOCHEMIE a.s. site 1 Lidická 326 735 95 Bohumín Cechia

Nome del fabbricante	Prisman Chemie GmbH
Indirizzo del fabbricante	Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Germania

Nome del fabbricante	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH
Indirizzo del fabbricante	Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH site 1 Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Germania

Nome del fabbricante	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Indirizzo del fabbricante	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH site 1 Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Germania

Nome del fabbricante	Sterisol AB
Indirizzo del fabbricante	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Svezia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Sterisol AB site 1 Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Svezia

Nome del fabbricante	Rudolf Dankwardt GmbH
Indirizzo del fabbricante	Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Rudolf Dankwardt GmbH site 1 Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Germania

Nome del fabbricante	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz
Indirizzo del fabbricante	Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz site 1 Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Germania

1.5. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Propan-2-ol
Nome del fabbricante	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol)
Indirizzo del fabbricante	Römerstraße 733 47443 Moers Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Germania Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 2 Shamrockstr. 88 44643 Herne Germania

Principio attivo	Propan-2-ol
Nome del fabbricante	Shell Chemicals Europe B.V.
Indirizzo del fabbricante	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Paesi Bassi
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Paesi Bassi

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,1 - 75 % (p/p)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0 - 0,5 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO – META SPC(S)

Capitolo 1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 1 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-1

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 1

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 1**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (p/p)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 1**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273: Non disperdere nell'ambiente. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

	P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 1 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 2 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali

	Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 3 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: VVirus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 5 ml (un pugno) nel palmo (2-4 erogazioni). Strofinare mani e braccia per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione (versamento, strofinamento) una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per lo strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*.

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 4 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore industriale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare

Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Uso n. 5 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Uso n. 6 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*.

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Uso n. 7 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 7.1: (professionale, industriale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare Uso n. 7.2: (professionale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari come ospedali (comprese UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici), studi medici o dentistici
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 7.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 7.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 7.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 7.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività virucida a spettro limitato): Versare 5 ml (un pugno) (2-4 erogazioni) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 5 ml (un pugno) nel palmo. Strofinare mani e braccia per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione (versamento, strofinamento) una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Uso n. 8 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 8.1: (Professionale, industriale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come ospedali (compresi UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici) ambulatori medici o dentistici, studi di medicina estetica, strutture di assistenza agli anziani e in settori industriali come l'industria farmaceutica o alimentare. Uso n. 8.2: (Professionale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 8.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 8.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 8.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 8.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)

Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività virucida a spettro limitato): Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;

* Il nome commerciale del prodotto biocida;

* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;

* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;

* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Uso n. 9 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale – batteri, lieviti – versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri e lieviti: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Uso n. 10 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 10.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) Uso n. 10.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari come ospedali (comprese UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici), studi medici o dentistici
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 10.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 10.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 10.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 10.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività virucida a spettro limitato): Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*.

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 1

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1:Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2:Strofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3:Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4:Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5:Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6:Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m^3 per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	desmanol® pure	Area di mercato: UE
	Septoderm® liquid	Area di mercato: UE
	Wrights alcohol hand rub	Area di mercato: UE
	Rely alcohol hand rub	Area di mercato: UE
	HS Handisinfec-tion liquid	Area di mercato: UE
	Profect Hand disinfection liquid	Area di mercato: UE
	desmanol® hand disinfection	Area di mercato: UE
	sensiva® hand disinfection liquid	Area di mercato: UE
	desmanol® N hand disinfection	Area di mercato: UE
	unodent hand disinfection	Area di mercato: UE
	eurosept hand disinfection	Area di mercato: UE
	Innocid Händedesin-fektion	Area di mercato: UE
	desmanol® pure pro	Area di mercato: UE
	desmanol® pure expert	Area di mercato: UE
	desmanol® pure clever	Area di mercato: UE

	desmanol® pure universal	Area di mercato: UE
	desmanol® pure pocket	Area di mercato: UE
	desmanol® pure client	Area di mercato: UE
	microshield® hand rub	Area di mercato: UE
	microshield® pure	Area di mercato: UE
	Halasept 792	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0033833-0001 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 % (p/p)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0,5 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 2 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC2

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-2

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 2

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 2**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (p/p)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 2**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273: Non disperdere nell'ambiente. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 11 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 12 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 13 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)

Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 14 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore industriale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali

	IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Uso n. 15 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Uso n. 16 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Uso n. 17 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Descrizione del campo di utilizzo: #Uso n. 17.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) o in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare #Uso n. 17.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari come ospedali (comprese UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici), studi medici o dentistici
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: #Uso n. 17.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) #Uso n. 17.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: #Uso n. 17.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) #Uso n. 17.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)

Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani: Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani: Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Uso n. 18 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 18.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare. Uso n. 18.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 18.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 18.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: #Uso n. 18.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) #Uso n. 18.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani: Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani: Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Uso n. 19 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale – batteri, lieviti – versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)

Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri e lieviti: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Uso n. 20 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 20.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) Uso n. 20.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 20.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 20.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo

	Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 20.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 20.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani: Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani: Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.11. **Descrizione degli usi**

Tabella 11.

Uso n. 21 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (in casi speciali, ad es. congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.11.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.11.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

Evitare la disinfezione in presenza di bambini di età <6 anni.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.11.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.11.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.11.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.12. **Descrizione degli usi**

Tabella 12.

Uso n. 22 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come gli studi medici (soltanto in casi speciali, ad es. congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.12.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.12.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.12.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.12.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.12.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.13. **Descrizione degli usi**

Tabella 13.

Uso n. 23 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come gli studi medici (soltanto in casi speciali, ad es. congiuntivite)

Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.13.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.13.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.13.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.13.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.13.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.14. **Descrizione degli usi**

Tabella 14.

Uso n. 24 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come gli studi medici (soltanto in casi speciali, ad es. congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.14.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.14.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.14.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.14.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.14.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 2

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1: Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2: S trofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3: Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4: Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5: Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6: Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m³ per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	desmanol® pure gel	Area di mercato: UE
	Septoderm® IPA gel	Area di mercato: UE
	Wrights alcohol hand gel	Area di mercato: UE
	Rely alcohol hand gel	Area di mercato: UE
	HS Hand disinfection gel	Area di mercato: UE
	Profect Hand disinfection gel	Area di mercato: UE
	sensiva® hand gel	Area di mercato: UE
	desmanol® N gel	Area di mercato: UE

	unodent hand gel	Area di mercato: UE
	eurosept gel	Area di mercato: UE
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel pro	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel expert	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel clever	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel universal	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel pocket	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel client	Area di mercato: UE
	microshield® gel	Area di mercato: UE
	microshield® pure gel	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0033833-0002 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 % (p/p)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0,5 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 3 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC3

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-3

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 3

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 3**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 3**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

	P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 25 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 26 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 27 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: VVirus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 28 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore industriale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Uso n. 29 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali

	Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Uso n. 30 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Uso n. 31 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 31.1: (professionale, industriale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare Uso n. 31.2: (professionale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 31.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 31.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 31.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 31.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività contro i virus (attività virucida a spettro limitato)): Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*.

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Uso n. 32 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 32.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare. Uso n. 32.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari, ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 32.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 32.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 32.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 32.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività contro i virus (attività virucida a spettro limitato)): Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Uso n. 33 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri e lieviti: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Uso n. 34 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 34.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica). Uso n. 34.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/ unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici).

Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 34.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 34.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 34.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 34.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività contro i virus (attività virucida a spettro limitato)): Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 3

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1: Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2: Strofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3: Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4: Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5: Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6: Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m³ per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	desmanol® pure light	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0033833-0003 1-3	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 4 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 4 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC4

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-4

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 4

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 4**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 4**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 4

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 35 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 36 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 37 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)

Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 38 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore industriale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali

	IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*.

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Uso n. 39 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Uso n. 40 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Uso n. 41 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 41.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare Uso n. 41.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 41.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 41.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: #Uso n. 41.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) #Uso n. 41.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)

Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani: Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;

* Il nome commerciale del prodotto biocida;

* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;

* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;

* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Uso n. 42 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 42.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare Uso n. 42.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 42.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 42.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 42.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 42.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani: Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Uso n. 43 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)

Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri e lieviti: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Uso n. 44 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 44.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) Uso n. 44.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 44.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo

	Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 44.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 44.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 44.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani: Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.11. **Descrizione degli usi**

Tabella 11.

Uso n. 45 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie/caso speciale: congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.11.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.11.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

Evitare la disinfezione in presenza di bambini di età <6 anni.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.11.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.11.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.11.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.12. **Descrizione degli usi**

Tabella 12.

Uso n. 46 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come gli studi medici (soltanto in casi speciali, ad es. congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.12.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.12.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.12.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.12.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.12.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.13. **Descrizione degli usi**

Tabella 13.

Uso n. 47 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come gli studi medici (soltanto in casi speciali, ad es. congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata:
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.13.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.13.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.13.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.13.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.13.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.14. **Descrizione degli usi**

Tabella 14.

Uso n. 48 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie/caso speciale: congiuntivite).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.14.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.14.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

Evitare la disinfezione in presenza di bambini di età <6 anni.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.14.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.14.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.14.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*.

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 4

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1: Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2: Strofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3: Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4: Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5: Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6: Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m³ per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 4

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	desmanol® pure light gel	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0033833-0004 1-4	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 5 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 5 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC5

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-5

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 5

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 5**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 5**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 5

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 49 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 50 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative

	Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 51 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative

	Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto 180 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 90 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 52 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore industriale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative

	Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Uso n. 53 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative

	Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Uso n. 54 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE): 36 mesi

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Uso n. 55 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 55.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare. Uso n. 55.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/ unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 55.1: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 55.2: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 180 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 55.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 55.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani:

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 90 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da 1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Uso n. 56 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative

	Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 56.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare. Uso n. 56.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 56.1: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 56.2: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 180 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 56.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 56.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali

	IBC: 1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Strofinamento chirurgico delle mani:

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 90 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Uso n. 57 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale – batteri, lieviti, funghi – versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, funghicida: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 180 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC:1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali

	Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 90 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Uso n. 58 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore professionale – batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative

	Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 58.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) Uso n. 58.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 58.1: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 58.2: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 180 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 58.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 58.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE

	Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC:1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Strofinamento chirurgico delle mani:

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 90 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*.

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (HDPE), tanica (HDPE), fusto (HDPE), IBC (HDPE con telaio in acciaio): 36 mesi

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 5

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1:Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2:Strofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3:Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4:Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5:Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6:Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m^3 per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 5

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Septo-derm® soft	Area di mercato: UE
	septosoft	Area di mercato: UE
	pluradent hand disinfec-tion	Area di mercato: UE
	Dezosept	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0033833-0005 1-5	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,1 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 6 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 6 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC6

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-6

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 6

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 6**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 6**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 6

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. EUH208: Contiene Isoeugenolo. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza	P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 59 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, batteri della tubercolosi virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, batteri della tubercolosi e virus incapsulati: 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 125, 500 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: Tappo a scatto: PP o Dispositivo di pompaggio: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile) Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC:1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), LDPE, PE-LD (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo. Strofinare per almeno 30 secondi.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza: 36 mesi

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 60 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, batteri della tubercolosi virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)

Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, batteri della tubercolosi e virus incapsulati: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 125, 500 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: Tappo a scatto: PP o Dispositivo di pompaggio: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile) Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC:1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), LDPE, PE-LD (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 30 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza: 36 mesi

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 61 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, batteri della tubercolosi virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 61.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) Uso n. 61.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 61.1: Contro batteri, lieviti, batteri della tubercolosi e virus incapsulati: 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 61.2: Contro batteri, lieviti, batteri della tubercolosi e virus incapsulati: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 61.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 61.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 125, 500 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: Tappo a scatto: PP o Dispositivo di pompaggio: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile) Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC:1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), LDPE, PE-LD (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani: Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo. Strofinare per almeno 30 secondi.

Strofinamento chirurgico delle mani: Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 30 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza: 36 mesi

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 62 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri e lieviti: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 125, 500 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: Tappo a scatto: PP o Dispositivo di pompaggio: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile) Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC:1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), LDPE, PE-LD (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato)

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 30 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza: 36 mesi

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 6

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1: Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2: Strofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3: Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4: Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5: Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6: Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m³ per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 6

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	AntiLy1	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0033833-0006 1-6	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,14 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 7 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 7 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC7

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-7

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 7

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 7**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 7**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 7

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 63 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, batteri della tubercolosi virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, batteri della tubercolosi e virus incapsulati: 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 125, 500 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: Tappo a scatto: PP o Dispositivo di pompaggio: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile) Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC:1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), LDPE, PE-LD (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo. Strofinare per almeno 30 secondi.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza: 36 mesi

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 64 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, batteri della tubercolosi virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)

Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, batteri della tubercolosi e virus incapsulati: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 125, 500 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: Tappo a scatto: PP o Dispositivo di pompaggio: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile) Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC:1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), LDPE, PE-LD (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 30 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza: 36 mesi

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 65 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, batteri della tubercolosi virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 65.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) Uso n. 65.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 65.1: Contro batteri, lieviti, batteri della tubercolosi e virus incapsulati: 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 65.2: Contro batteri, lieviti, batteri della tubercolosi e virus incapsulati: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 65.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 65.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 125, 500 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: Tappo a scatto: PP o Dispositivo di pompaggio: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile) Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC:1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), LDPE, PE-LD (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani: Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo. Strofinare per almeno 30 secondi.

Strofinamento chirurgico delle mani: Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 30 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Tanica da 5-30 l, fusto da 220 l, contenitore da1 000 l: Rabboccare o trasferire in altri contenitori/dispositivi se necessario.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

Tutti i materiali devono essere completamente compatibili con il prodotto. L'erogatore o il contenitore che viene rabboccato deve riportare le seguenti informazioni di etichettatura minime:

* Il numero di autorizzazione;
* Il nome commerciale del prodotto biocida;
* L'identità e il contenuto di ciascun principio attivo;
* Le istruzioni per l'uso, compreso il tempo di incorporazione richiesto per l'azione biocida;
* Le informazioni secondo il regolamento CLP.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza: 36 mesi

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 66 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti - versamento o pompaggio – ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri e lieviti: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 125, 500 1 000 ml Imballaggio: HDPE Chiusura: Tappo a scatto: PP o Dispositivo di pompaggio: sistema complesso (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acciaio inossidabile) Contenitore: 5, 10, 20, 30 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali Fusto: 220 l Imballaggio: HDPE Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali IBC:1 000 l Imballaggio: HDPE con telaio in acciaio Chiusura: HDPE, LDPE, PP o una combinazione di questi materiali

	Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), LDPE, PE-LD (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato)

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 30 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza: 36 mesi

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 7

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1:Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2:Strofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3:Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4:Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5:Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6:Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m³ per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 7

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i			AntiLy2	Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione			EU-0033833-0007 1-7		
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,14 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 8 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 8 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC8

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-8

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 8

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 8**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (p/p)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 8**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 8

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273: Non disperdere nell'ambiente. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 67 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali

	Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza: Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 68 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 69 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: VVirus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)

Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 5 ml (un pugno) nel palmo (2-4 erogazioni). Strofinare mani e braccia per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione (versamento, strofinamento) una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 70 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore industriale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Uso n. 71 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Uso n. 72 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Uso n. 73 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 73.1: (professionale, industriale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare Uso n. 73.2: (professionale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari come ospedali (comprese UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici), studi medici o dentistici
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 73.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 73.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Frequenza: Uso n. 73.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 73.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 73.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 73.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 3 ml (una manciata) nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività contro i virus (attività virucida a spettro limitato)): Versare 5 ml (un pugno) (2-4 erogazioni) del prodotto nel palmo o in alternativa erogare 5 ml (un pugno) nel palmo. Strofinare mani e braccia per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione (versamento, strofinamento) una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Uso n. 74 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 74.1: (Professionale, industriale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come ospedali (compresi UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici) ambulatori medici o dentistici, studi di medicina estetica, strutture di assistenza agli anziani e in settori industriali come l'industria farmaceutica o alimentare. Uso n. 74.2: (Professionale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 74.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 74.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 74.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 74.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)

Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività contro i virus (attività virucida a spettro limitato)): Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Uso n. 75 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri e lieviti: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Uso n. 76 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 76.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) Uso n. 76.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari come ospedali (comprese UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici), studi medici o dentistici
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: ---
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 76.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 76.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 76.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 76.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività contro i virus (attività virucida a spettro limitato)): Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 8

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1:Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2:Strofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3:Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4:Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5:Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6:Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m³ per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 8

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	desmanol® pure	Area di mercato: UE
	Septoderm® liquid	Area di mercato: UE
	Wrights alcohol hand rub	Area di mercato: UE
	Rely alcohol hand rub	Area di mercato: UE
	HS Handisinfec-tion liquid	Area di mercato: UE
	Profect Hand disinfection liquid	Area di mercato: UE
	desmanol® hand disinfection	Area di mercato: UE
	sensiva® hand disinfection liquid	Area di mercato: UE
	desmanol® N hand disinfection	Area di mercato: UE
	unodent hand disinfection	Area di mercato: UE

	eurosept hand disinfection	Area di mercato: UE
	Innocid Händedesin-fektion	Area di mercato: UE
	desmanol® pure pro	Area di mercato: UE
	desmanol® pure expert	Area di mercato: UE
	desmanol® pure clever	Area di mercato: UE
	desmanol® pure universal	Area di mercato: UE
	desmanol® pure pocket	Area di mercato: UE
	desmanol® pure client	Area di mercato: UE
	microshield® hand rub	Area di mercato: UE
	microshield® pure	Area di mercato: UE
	Halasept 792	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0033833-0008 1-8	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 % (p/p)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0,5 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 9 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 9 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC9

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-9

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 9

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 9**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (p/p)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 9**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 9

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P273: Non disperdere nell'ambiente. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

	P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 77 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)

Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 78 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali

	Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 79 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 80 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore industriale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Uso n. 81 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali

	Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Uso n. 82 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Uso n. 83 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso #Uso n. 83.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) o in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare

	#Uso n. 83.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari come ospedali (comprese UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici), studi medici o dentistici
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: #Uso n. 83.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) #Uso n. 83.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: #Uso n. 83.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) #Uso n. 83.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani: Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani: Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Uso n. 84 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 84.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare. Uso n. 84.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)

Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 84.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 84.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: #Uso n. 84.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) #Uso n. 84.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati):

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani:

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (2-4 erogazioni) e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

--

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Uso n. 85 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri e lieviti: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)

Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Uso n. 86 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 86.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) Uso n. 86.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 86.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 86.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 86.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 86.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati):

Versare 3 ml del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni). Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani:

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.11. **Descrizione degli usi**

Tabella 11.

Uso n. 87 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (in casi speciali, ad es. congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.11.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.11.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

Evitare la disinfezione in presenza di bambini di età <6 anni.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.11.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.11.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.11.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.12. **Descrizione degli usi**

Tabella 12.

Uso n. 88 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come gli studi medici (soltanto in casi speciali, ad es. congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.12.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

4.12.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.12.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.12.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.12.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.13. **Descrizione degli usi**

Tabella 13.

Uso n. 89 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come gli studi medici (soltanto in casi speciali, ad es. congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.13.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.13.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.13.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.13.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.13.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.14. **Descrizione degli usi**

Tabella 14.

Uso n. 90 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come gli studi medici (soltanto in casi speciali, ad es. congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)

Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.14.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

4.14.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.14.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.14.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.14.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 9

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1:Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2:Strofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3:Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4:Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5:Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6:Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m³ per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 9

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	desmanol® pure gel	Area di mercato: UE
	Septoderm® IPA gel	Area di mercato: UE
	Wrights alcohol hand gel	Area di mercato: UE

	Rely alcohol hand gel	Area di mercato: UE
	HS Hand disinfection gel	Area di mercato: UE
	Profect Hand disinfection gel	Area di mercato: UE
	sensiva® hand gel	Area di mercato: UE
	desmanol® N gel	Area di mercato: UE
	unodent hand gel	Area di mercato: UE
	eurosept gel	Area di mercato: UE
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel pro	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel expert	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel clever	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel universal	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel pocket	Area di mercato: UE
	desmanol® pure gel client	Area di mercato: UE
	microshield® gel	Area di mercato: UE
	microshield® pure gel	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0033833-0009 1-9	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 % (p/p)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Sostanza non attiva	112-72-1	204-000-3	0,5 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 10 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 10 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC10

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-10

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 10

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 10**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 10**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 10

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 91 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)

Metodo/i di applicazione	Metodo: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 92 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 93 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: VVirus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e attività virucida a spettro limitato: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali

	Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 94 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore industriale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable

Campo/i di applicazione	Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Uso n. 95 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Uso n. 96 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati): Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Uso n. 97 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 97.1: (professionale, industriale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare Uso n. 97.2: (professionale): Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 97.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 97.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 97.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 97.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati):

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività contro i virus (attività virucida a spettro limitato)): Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Uso n. 98 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 98.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare. Uso n. 98.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari, ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 98.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 98.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 98.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 98.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati):

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività contro i virus (attività virucida a spettro limitato)): Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Uso n. 99 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)

Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri e lieviti: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Uso n. 100 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 100.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica). Uso n. 100.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 100.1: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Uso n. 100.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo

	Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 100.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 100.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (compresa attività contro virus incapsulati):

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani (compresa attività contro i virus (attività virucida a spettro limitato)): Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*.

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 10

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1:Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2:Strofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3:Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4:Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5:Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6:Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m^3 per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 10

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		desmanol ® pure light	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0033833-0010 1-10			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 11 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 11 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC11

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-11

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 11

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 11**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 11**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 11

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 101 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative

	Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 102 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 103 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 104 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore industriale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Uso n. 105 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Uso n. 106 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Uso n. 107 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 107.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare Uso n. 107.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 107.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 107.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: #Uso n. 107.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) #Uso n. 107.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati):

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani:

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Uso n. 108 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 108.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare Uso n. 108.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 108.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 108.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 108.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 108.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati):

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani:

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Uso n. 109 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro batteri e lieviti: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Uso n. 110 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Micobatteri Denominazione comune: Mycobatteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: not applicable

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 110.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) Uso n. 110.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 110.1: Contro batteri, lieviti e virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Contro micobatteri: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,9 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 110.2: Contro batteri, lieviti, micobatteri e virus incapsulati: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 90 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 110.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 110.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (Efficacia contro batteri, lieviti e virus incapsulati):

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore efficacia micobattericida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani:

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 45 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.11. **Descrizione degli usi**

Tabella 11.

Uso n. 111 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie/caso speciale: congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.11.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.11.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

Evitare la disinfezione in presenza di bambini di età <6 anni.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.11.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.11.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.11.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.12. **Descrizione degli usi**

Tabella 12.

Uso n. 112 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come gli studi medici (soltanto in casi speciali, ad es. congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali

	Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.12.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.12.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.12.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.12.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

--

4.12.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.13. **Descrizione degli usi**

Tabella 13.

Uso n. 113 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari come gli studi medici (soltanto in casi speciali, ad es. congiuntivite)

Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.13.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

4.13.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.13.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.13.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.13.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.14. **Descrizione degli usi**

Tabella 14.

Uso n. 114 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche. (ad es. in caso di malattie/caso speciale: congiuntivite)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Contro i virus (attività virucida a spettro limitato): 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 3,16 g di principio attivo Tempo di contatto: 120 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali

	Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.14.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare le mani. Strofinare per almeno 60 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.14.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

Evitare la disinfezione in presenza di bambini di età <6 anni.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.14.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.14.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.14.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio*.

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 11

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1: Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2: Strofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3: Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4: Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5: Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6: Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m³ per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 11

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		desmanol ® pure light gel	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0033833-0011 1-11			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	75 % (p/p)

Capitolo 1. META SPC 12 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 12 identificativo**

identificativo	desmanol pure meta SPC12

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-12

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana

Capitolo 2. COMPOSIZIONE DEL META SPC 12

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 12**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 12**

Tipo/i di formulazione	AL Qualsiasi altro liquido

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 12

Indicazioni di pericolo	H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319: Provoca grave irritazione oculare. H336: Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P261: Evitare di respirare i vapori. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P312: Contattare un CENTRO ANTIVELENI in caso di malessere. P312: Contattare un medico in caso di malessere. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. P403+P235: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto in in conformità con le normative locali e nazionali. P501: Smaltire il contenitore in in conformità con le normative locali e nazionali.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1.

Uso n. 115 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati:

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2.

Uso n. 116 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3.

Uso n. 117 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto 180 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 90 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.4. **Descrizione degli usi**

Tabella 4.

Uso n. 118 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore industriale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali

	Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.4.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati: Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

4.4.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.4.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.4.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.4.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.5. **Descrizione degli usi**

Tabella 5.

Uso n. 119 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative

	Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in aree private/ambienti sanitari in aree domestiche (ad es. in caso di malattie)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.5.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati):

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.5.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Garantire un'adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione del prodotto aprendo le finestre o azionando la ventilazione meccanica in bagno/nello spazio della cucina.

Tenere lontano dagli animali domestici.

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

L'uso è limitato esclusivamente agli adulti.

4.5.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.5.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.5.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

4.6. **Descrizione degli usi**

Tabella 6.

Uso n. 120 Strofinamento igienico delle mani - utilizzatore non professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 3 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.6.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani:

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Il prodotto è limitato all'uso esclusivo da parte di adulti.

4.6.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

In caso di secchezza cutanea, utilizzare un'adeguata lozione per la cura della pelle.

4.6.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.6.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.6.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE) e bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.7. **Descrizione degli usi**

Tabella 7.

Uso n. 121 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 121.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare. Uso n. 121.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 121.1: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 121.2: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 180 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 121.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 121.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.7.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani:

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani:

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 90 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.7.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.7.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.7.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.7.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.8. **Descrizione degli usi**

Tabella 8.

Uso n. 122 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore industriale, professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative

	Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 122.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) e in settori industriali, ad es. industria farmaceutica o alimentare. Uso n. 122.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 122.1: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 122.2: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 180 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 122.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 122.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	industriale professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.8.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati):

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Strofinamento chirurgico delle mani:

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 90 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.8.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.8.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.8.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.8.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.9. **Descrizione degli usi**

Tabella 9.

Uso n. 123 Strofinamento chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, funghi - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative
Campo/i di applicazione	uso al chiuso Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Battericida, lieviticida, funghicida: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 180 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.9.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 90 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.9.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.9.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.9.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.9.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

4.10. **Descrizione degli usi**

Tabella 10.

Uso n. 124 Strofinamento igienico/chirurgico delle mani - utilizzatore professionale - batteri, lieviti, funghi, batteri della tubercolosi, virus incapsulati, virus (attività virucida a spettro limitato) - versamento o pompaggio - ambienti interni

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 1: Igiene umana
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non pertinente
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: batteri Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Funghi Denominazione comune: funghi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Batteri della tubercolosi Denominazione comune: Batteri della tuberculosi Fase di sviluppo: cellule vegetative Denominazione scientifica: Virus incapsulati Denominazione comune: Virus incapsulati Fase di sviluppo: non applicabile Denominazione scientifica: Virus (attività virucida a spettro limitato) Denominazione comune: Virus (attività virucida a spettro limitato) Fase di sviluppo: non applicabile

Campo/i di applicazione	uso al chiuso Uso n. 124.1: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento igienico delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici, strutture di assistenza agli anziani, studi di medicina estetica) Uso n. 124.2: Prodotto pronto all'uso per la disinfezione mediante strofinamento chirurgico delle mani per la disinfezione delle mani in ambienti sanitari (ad es. ospedali, UTI/unità di terapia intensiva, reparti pediatrici, ambulatori medici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Versamento o pompaggio (specifica dell'erogatore: pompa a goccia/emissione: gocce) Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Uso n. 124.1: Battericida, lieviticida, attività virucida contro i virus incapsulati: 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 30 sec. Attività virucida a spettro limitato, efficacia funghicida e tubercolicida: 2 x 3 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 1,65 g di principio attivo Tempo di contatto: 60 sec. (in totale) Uso n. 124.2: 2 x 5 ml per disinfezione, corrispondenti a 2 x 2,76 g di principio attivo Tempo di contatto: 180 sec. (in totale) Numero e tempi di applicazione: Frequenza: Uso n. 124.1: secondo necessità (solitamente 25 applicazioni al giorno) Uso n. 124.2: secondo necessità (solitamente 4 applicazioni al giorno)
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bottiglia: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali sacchetto/bustina: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Imballaggio: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Chiusura: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinazione di questi materiali ; Dispositivo di pompaggio: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acciaio inossidabile, silicone, gel di silice, NBR, TPE, vetro o una combinazione di questi materiali Abbreviazioni: HDPE (polietilene ad alta densità), PP (polipropilene), PC (policarbonato), PE (polietilene), LDPE (polietilene a bassa densità), EVA (etilene vinil acetato), POM (poliossimetilene), PBT (polibutilene tereftalato), PET (polietilene tereftalato), NBR (gomma di nitrile butadiene), TPE (elastomero termoplastico), ALU (alluminio)

4.10.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare il prodotto solo su superficie cutanea umana intatta. Lavare e asciugare le mani prima di usare il prodotto.

Strofinamento igienico delle mani (efficacia contro batteri, lieviti, virus incapsulati):

Versare 3 ml (una manciata) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo nel palmo (1-2 erogazioni) e strofinare le mani. Strofinare per almeno 30 secondi. Per un'ulteriore attività virucida a spettro limitato e un'efficacia funghicida e tubercolicida, ripetere l'operazione una seconda volta.

Strofinamento chirurgico delle mani:

Versare 5 ml (un pugno) del prodotto nel palmo o in alternativa erogarlo (2-4 erogazioni) nel palmo e strofinare mani e braccia. Strofinare per almeno 90 secondi. Ripetere l'operazione una seconda volta. Accertarsi che le mani e le braccia siano inumidite con il prodotto per l'intero tempo di applicazione.

Il travaso/rabbocco del prodotto biocida per l'uso di strofinamento chirurgico delle mani deve essere eseguito esclusivamente in condizioni asettiche.

4.10.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

4.10.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

4.10.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

4.10.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Tenere il recipiente ben chiuso. Proteggere dalla luce solare diretta.

Conservare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Data di scadenza:

Flacone (PE), bustina/sacchetto (PE): 6 giorni

Capitolo 5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 12

5.1. **Istruzioni d'uso**

Tecnica di applicazione:

Passaggio 1: Applicare il disinfettante e strofinarlo nel palmo della mano. Strofinare palmo a palmo per distribuire il disinfettante su tutta la superficie di mani e dita.

Passaggio 2: Strofinare il dorso della mano sinistra con il palmo della mano destra. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 3: Aprire le dita e strofinare i lembi di pelle tra un dito e l'altro. Invertire le mani e ripetere l'azione.

Passaggio 4: Strofinare palmo a palmo con le dita intrecciate (5 volte).

Passaggio 5: Strofinare il pollice di ciascuna mano con un movimento rotatorio.

Passaggio 6: Strofinare le punte delle dita contro il palmo opposto con un movimento circolare. Strofinare il polso con entrambe le mani. Lasciare asciugare completamente le mani.

Non usare il prodotto insieme ad altri prodotti.

Leggere sempre l'etichetta o il foglio informativo e seguire tutte le istruzioni fornite.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio o degli animali domestici.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Accertarsi che il prodotto applicato si sia completamente asciugato prima di entrare in una stanza o accedere a un'area in cui è prevista la permanenza di persone per un periodo di tempo più lungo.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Informazioni su probabili effetti diretti o indiretti:

Nessuno.

Istruzioni di pronto soccorso:

Informazioni generali

Trasferire le persone in un luogo sicuro. Rispettare le norme di auto-protezione per il primo soccorso. Rimuovere immediatamente indumenti e calzature contaminati. Richiedere assistenza medica in caso di sintomi.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione accidentale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare all'aria aperta e mantenere a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112 o un'ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Avviare misure di rianimazione, se necessario.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi possono includere bruciore, lacrimazione, arrossamento, gonfiore e offuscamento della vista. I vapori hanno un effetto narcotico e possono causare cefalea, affaticamento, capogiri e nausea. Tosse. In caso di respirazione faticosa contattare un CENTRO ANTIVELENI.

Misure d'emergenza per la protezione dell'ambiente:

Evitare lo sversamento di concentrati nel suolo, nelle acque di superficie o nelle acque sotterranee, ad es. attraverso vaschette di raccolta

Raccogliere il prodotto che fuoriesce per mezzo di un materiale idoneo (ad es. terra, sabbia, diatomite, vermiculite, agenti leganti universali).

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

In caso di contaminazione del suolo o di organismi acquatici avvisare le autorità competenti.

Prestare attenzione al pericolo di esplosione.

I vapori sono più pesanti dell'aria e tendono a diffondersi lungo il suolo e accumularsi in zone basse o confinate (fognature, scantinati, serbatoi).

Utilizzare utensili antiscintillamento e attrezzature a prova di esplosione.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Garantire una continuità elettrica dotando tutte le attrezzature di collegamento equipotenziale e di messa a terra.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Smaltire il contenuto/contenitore presso un apposito punto di raccolta rifiuti in conformità con le normative locali/nazionali/internazionali.

I residui di prodotto devono essere raccolti e smaltiti in conformità con la normativa nazionale sullo smaltimento dei rifiuti e qualsiasi disposizione delle autorità regionali e/o locali.

Evitare l'emissione (diretta) (di prodotto non diluito) nell'ambiente/nella rete fognaria.

Non gettare negli scarichi.

Diluire gli sversamenti con acqua e asciugare con uno straccio.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

Raccomandazione per l'uso professionale:

P280 Indossare dispositivi di protezione degli occhi

Tenere presente il valore di riferimento europeo di 129,2 mg/m³ per il principio attivo propan-2-olo (N. CAS: 67-63-0) che è stato usato per la valutazione del rischio della famiglia di biocidi.

Con riferimento alla nota "Categoria/e di utilizzatori": Professionali (compresi gli utilizzatori industriali) si riferisce a professionisti qualificati se ciò è richiesto dalla normativa nazionale.

Capitolo 7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 12

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	Septoderm® soft	Area di mercato: UE
	septosoft	Area di mercato: UE
	pluradent hand disinfection	Area di mercato: UE
	Dezosept	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0033833-0012 1-12	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio attivo	67-63-0	200-661-7	63,1 % (p/p)