Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/1905

3.10.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/1905

(2025. gada 11. septembris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei *desmanol pure*

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) Uzņēmums *Schülke & Mayr GmbH* 2016. gada 19. aprīlī Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu, lai saņemtu Savienības atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 1. produkta veida biocīdu saimei *desmanol pure*, un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka pieteikumu novērtēt ir piekritusi Austrijas kompetentā iestāde. Pieteikums ar lietas numuru BC-GA023097-64 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) Biocīdu saimes *desmanol pure* sastāvā aktīvā viela ir propān-2-ols, kas attiecībā uz 1. produkta veidu ir iekļauts Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2024. gada 13. jūnijā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu Aģentūrai iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtējuma secinājumus.

(4) 2024. gada 13. decembrī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([2]), *desmanol pure* biocīda raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka *desmanol pure* ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē, ka tā ir tiesīga saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tā atbilst minētās regulas 19. panta 6. punkta nosacījumiem.

(6) Aģentūra 2025. gada 8. janvārī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu Komisijai nosūtīja BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi biocīdu saimei *desmanol pure* piešķirt Savienības atļauju.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) *Opinion of 28 November 2024 on the Union authorisation of the biocidal product family "desmanol pure"* (ECHA/BPC/455/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam *Schülke & Mayr GmbH* piešķir Savienības atļauju (atļaujas numurs EU-0033833-0000) piedāvāt tirgū un lietot biocīdu saimi *desmanol pure* atbilstoši pielikumā dotajam biocīda raksturojuma kopsavilkumam.

Savienības atļauja ir derīga no 2025. gada 23. oktobra līdz 2035. gada 30. septembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 11. septembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

PRODUKTA APRAKSTA KOPSAVILKUMS BIOCĪDU SAIMEI

desmanol pure

Produkta tips(-i)

PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

Atļaujas numurs EU-0033833-0000

R4BP vienuma numurs EU-0033833-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. nodaļa. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	desmanol pure

1.2. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

1.3. **Atļaujas turētājs**

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Schuelke & Mayr GmbH
	Adrese	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Atļaujas numurs	EU-0033833-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0033833-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	2025. gada 23. oktobris	
Atļaujas derīguma termiņš	2035. gada 30. septembris	

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	Schülke & Mayr GmbH
Ražotāja adrese	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Schülke & Mayr GmbH site 1 Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Vācija

Ražotāja nosaukums	BOCHEMIE a.s.
Ražotāja adrese	Lidická 326 735 95 Bohumín Čehija
Ražotņu atrašanās vietas	BOCHEMIE a.s. site 1 Lidická 326 735 95 Bohumín Čehija

Ražotāja nosaukums	Prisman Chemie GmbH
Ražotāja adrese	Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Vācija

Ražotāja nosaukums	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH
Ražotāja adrese	Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH site 1 Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Vācija

Ražotāja nosaukums	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Ražotāja adrese	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH site 1 Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Vācija

Ražotāja nosaukums	Sterisol AB
Ražotāja adrese	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Zviedrija
Ražotņu atrašanās vietas	Sterisol AB site 1 Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Zviedrija

Ražotāja nosaukums	Rudolf Dankwardt GmbH
Ražotāja adrese	Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Rudolf Dankwardt GmbH site 1 Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Vācija

Ražotāja nosaukums	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz
Ražotāja adrese	Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz site 1 Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Vācija

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Propān-2-ols
Ražotāja nosaukums	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol)
Ražotāja adrese	Römerstraße 733 47443 Moers Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Vācija Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 2 Shamrockstr. 88 44643 Herne Vācija

Aktīvā viela	Propān-2-ols
Ražotāja nosaukums	Shell Chemicals Europe B.V.
Ražotāja adrese	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nīderlande

2. nodaļa. PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,1 - 75 % (m/m)
Tetradekanols	Tetradekanols	Neaktīva viela	112-72-1	204-000-3	0 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

II daļa

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PAK

1. nodaļa. META PAK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 1 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC1

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 1

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 1**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
Tetradekanols	Tetradekanols	Neaktīva viela	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 1**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 1

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus. P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu.

	P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 1: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g aktīvās vielas (a.v.) Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet plaukstās vai 3 ml iespiest plaukstās (pilnu sauju) (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 2: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija

	Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet plaukstās vai 3 ml iespiest plaukstās (pilnu sauju) (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 3: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet plaukstās vai 5 ml (sauju) iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru). Berzēt plaukstas un apakšdelmus vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību (liešanu, berzēšanu) vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 4: Higiēniska roku dezinfekcija - rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā

Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet plaukstās vai 3 ml iespiest plaukstās (pilnu sauju) (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietojums Nr. 5: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai 3 ml (pilnu sauju) iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lietojums Nr. 6: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet plaukstās vai 3 ml iespiest plaukstās (pilnu sauju) (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lietojums Nr. 7: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 7.1: (profesionāls, rūpniecisks): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā Lietojums Nr. 7.2: (profesionāls): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai medicīnas jomā, piemēram, slimnīcās (tostarp intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās), ārstu vai zobārstu prakses iestādēs
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 7.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 7.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 7.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 7.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai 3 ml (pilnu sauju) iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp ierobežota spektra viricīda iedarbība): 5 ml (sauju) produkta ieliet plaukstās vai 5 ml (sauju) iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru). Berzēt plaukstas un apakšdelmus vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību (liešanu, berzēšanu) vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lietojums Nr. 8: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 8.1: (Profesionāls, rūpniecisks): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, slimnīcās (tostarp intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās), ārstu vai zobārstu prakses iestādēs, kosmetoloģijas iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā. Lietojums Nr. 8.2: (Profesionāls): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 8.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 8.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 8.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 8.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)

Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp ierobežota spektra viricīda iedarbība): 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;

* Biocīda tirdzniecības nosaukums;

* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;

* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;

* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Lietojums Nr. 9: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs – baktērijas, raugi – ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām un raugiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Lietojums Nr. 10: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 10.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) Lietojums Nr. 10.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai medicīnas jomā, piemēram, slimnīcās (tostarp intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās), ārstu vai zobārstu prakses iestādēs
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 10.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 10.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 10.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 10.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp ierobežota spektra viricīda iedarbība): 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 1

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m³, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 1

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	desmanol® pure	Tirdzniecības vieta ES
	Septoderm® liquid	Tirdzniecības vieta ES
	Wrights alcohol hand rub	Tirdzniecības vieta ES
	Rely alcohol hand rub	Tirdzniecības vieta ES
	HS Handisinfec-tion liquid	Tirdzniecības vieta ES
	Profect Hand disinfection liquid	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® hand disinfection	Tirdzniecības vieta ES
	sensiva® hand disinfection liquid	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® N hand disinfection	Tirdzniecības vieta ES
	unodent hand disinfection	Tirdzniecības vieta ES
	eurosept hand disinfection	Tirdzniecības vieta ES
	Innocid Händedesin-fektion	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure pro	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure expert	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure clever	Tirdzniecības vieta ES

	desmanol® pure universal	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure pocket	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure client	Tirdzniecības vieta ES
	micros-hield® hand rub	Tirdzniecības vieta ES
	micros-hield® pure	Tirdzniecības vieta ES
	Halasept 792	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0033833-0001 1-1	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
Tetradekanols	Tetradekanols	Neaktīva viela	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

1. nodaļa. META PAK 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 2 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC2

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 2

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 2**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
Tetradekanols	Tetradekanols	Neaktīva viela	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 2**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 2

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus. P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 11: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 12: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 13: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni stingri noslēgt. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 14: Higiēniska roku dezinfekcija - rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija

	IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietojums Nr. 15: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lietojums Nr. 16: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotie vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lietojums Nr. 17: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanas jomas apraksts: #Liet ojums Nr. 17.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) vai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā #Lietojums Nr. 17.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai medicīnas jomā, piemēram, slimnīcās (tostarp intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās u. c.), ārstu vai zobārstu prakses iestādēs
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: #Lietojums Nr. 17.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) #Lietojums Nr. 17.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: #Lietojums Nr. 17.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) #Lietojums Nr. 17.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)

Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija: Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija: 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lietojums Nr. 18: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 18.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā. Lietojums Nr. 18.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 18.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 18.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: #Lietojums Nr. 18.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) #Lietojums Nr. 18.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija: Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija: 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Lietojums Nr. 19: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs – baktērijas, raugi – ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)

Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām un raugiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Lietojums Nr. 20: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 20.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) Lietojums Nr. 20.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 20.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 20.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v.

	Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 20.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 20.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija: Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija: 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.11. **Lietošanas veidu apraksts**

11. tabula

Lietojums Nr. 21: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (īpašās situācijās, piemēram, konjunktivīta gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.11.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.11.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Izvairīties no dezinfekcijas bērnu vecumā līdz 6 gadiem klātbūtnē..

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.11.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.11.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.11.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.12. **Lietošanas veidu apraksts**

12. tabula

Lietojums Nr. 22: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu prakses iestādēs (tikai īpašos gadījumos, piemēram, konjunktivīta gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.12.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.12.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.12.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.12.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.12.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.13. **Lietošanas veidu apraksts**

13. tabula

Lietojums Nr. 23: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu prakses iestādēs (tikai īpašos gadījumos, piemēram, konjunktivīta gadījumā)

Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.13.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.13.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.13.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.13.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.13.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.14. **Lietošanas veidu apraksts**

14. tabula

Lietojums Nr. 24: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu prakses iestādēs (tikai īpašos gadījumos, piemēram, konjunktivīta gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.14.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.14.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.14.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.14.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.14.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 2

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m³, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 2

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	desmanol® pure gel	Tirdzniecības vieta ES
	Septoderm® IPA gel	Tirdzniecības vieta ES
	Wrights alcohol hand gel	Tirdzniecības vieta ES
	Rely alcohol hand gel	Tirdzniecības vieta ES
	HS Hand disinfection gel	Tirdzniecības vieta ES
	Profect Hand disinfection gel	Tirdzniecības vieta ES
	sensiva® hand gel	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® N gel	Tirdzniecības vieta ES

	unodent hand gel	Tirdzniecības vieta ES
	eurosept gel	Tirdzniecības vieta ES
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel pro	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel expert	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel clever	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel universal	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel pocket	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel client	Tirdzniecības vieta ES
	microshield® gel	Tirdzniecības vieta ES
	microshield® pure gel	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0033833-0002 1-2	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
Tetradekanols	Tetradekanols	Neaktīva viela	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

1. nodaļa. META PAK 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 3 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC3

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-3

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 3

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 3**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 3**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 3

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus. P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu.

	P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 25: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 26: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 27: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 28: Higiēniska roku dezinfekcija - rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietojums Nr. 29: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija

	Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lietojums Nr. 30: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lietojums Nr. 31: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 31.1: (profesionāls, rūpniecisks): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā Lietojums Nr. 31.2: (profesionāls): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 31.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 31.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 31.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 31.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp iedarbība uz vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība)): 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lietojums Nr. 32: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 32.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā. Lietojums Nr. 32.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 32.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 32.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 32.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 32.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp iedarbība uz vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība)): 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Lietojums Nr. 33: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām un raugiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Lietojums Nr. 34: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 34.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs). Lietojums Nr. 34.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs).

Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 34.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 34.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 34.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 34.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp iedarbība uz vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība)): 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 3

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m^3, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 3

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			desmanol® pure light	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0033833-0003 1-3		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

1. nodaļa. META PAK 4 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 4 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC4

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-4

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 4

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 4**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 4**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 4

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus. P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 35: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotie vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 36: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 37: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 38: Higiēniska roku dezinfekcija - rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija

	IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.4.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotie vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietojums Nr. 39: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lietojums Nr. 40: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lietojums Nr. 41: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 41.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā Lietojums Nr. 41.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 41.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 41.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: #Lietojums Nr. 41.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) #Lietojums Nr. 41.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)

Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (Iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija: 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;

* Biocīda tirdzniecības nosaukums;

* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;

* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;

* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lietojums Nr. 42: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 42.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā Lietojums Nr. 42.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 42.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 42.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 42.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 42.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (Iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija: 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Lietojums Nr. 43: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)

Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām un raugiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Lietojums Nr. 44: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 44.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) Lietojums Nr. 44.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 44.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v.

	Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 44.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 44.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 44.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija: 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.11. **Lietošanas veidu apraksts**

11. tabula

Lietojums Nr. 45: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā/īpašās situācijās: konjunktivīts)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.11.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.11.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Izvairīties no dezinfekcijas bērnu vecumā līdz 6 gadiem klātbūtnē..

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.11.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.11.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.11.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.12. **Lietošanas veidu apraksts**

12. tabula

Lietojums Nr. 46: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu prakses iestādēs (tikai īpašos gadījumos, piemēram, konjunktivīta gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.12.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.12.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.12.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.12.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.12.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.13. **Lietošanas veidu apraksts**

13. tabula

Lietojums Nr. 47: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu prakses iestādēs (tikai īpašos gadījumos, piemēram, konjunktivīta gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts:
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.13.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.13.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.13.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.13.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.13.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.14. **Lietošanas veidu apraksts**

14. tabula

Lietojums Nr. 48: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā/īpašās situācijās: konjunktivīts).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.14.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.14.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Izvairīties no dezinfekcijas bērnu vecumā līdz 6 gadiem klātbūtnē..

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.14.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.14.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.14.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 4

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m³, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 4

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			desmanol® pure light gel		Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs			EU-0033833-0004 1-4		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

1. nodaļa. META PAK 5 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 5 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC5

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-5

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 5

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 5**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 5**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 5

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus. P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 49: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 50: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas

	Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 51: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas

	Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 2,76 g a.v. Iedarbības laiks 180 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 90 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 52: Higiēniska roku dezinfekcija - rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas

	Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Iedarbības laiks 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietojums Nr. 53: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas

	Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Iedarbības laiks 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Iedarbības laiks 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lietojums Nr. 54: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE): 36 mēneši

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lietojums Nr. 55: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 55.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā. Lietojums Nr. 55.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 55.1: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 55.2: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 2,76 g a.v. Saskares laiks: 180 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 55.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 55.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija:

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 90 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lietojums Nr. 56: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas

	Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 56.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā. Lietojums Nr. 56.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 56.1: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 56.2: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 2,76 g a.v. Saskares laiks: 180 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 56.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 56.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija

	IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija:

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 90 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Lietojums Nr. 57: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs – baktērijas, raugi, sēnītes – ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un sēnītēm: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 2,76 g a.v. Saskares laiks: 180 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija

	Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 90 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Lietojums Nr. 58: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs – baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas

	Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 58.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) Lietojums Nr. 58.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 58.1: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 58.2: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 2,76 g a.v. Saskares laiks: 180 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 58.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 58.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE

	Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija:

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 90 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (HDPE), kanna (HDPE), muca (HDPE), IBC (HDPE ar tērauda ietvaru): 36 mēneši

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 5

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m^3, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 5

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Septoderm® soft	Tirdzniecības vieta ES
	septosoft	Tirdzniecības vieta ES
	pluradent hand disinfection	Tirdzniecības vieta ES
	Dezosept	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0033833-0005 1-5	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)

1. nodaļa. META PAK 6 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 6 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC6

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-6

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 6

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 6**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 6**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 6

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. EUH208: Satur Izoeugenols. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Drošības prasību apzīmējumi	P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 59: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, tuberkulozes baktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2,76 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 125, 500, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: Uzliekams vāciņš: PP vai dozēšanas ierīce: kompleksa sistēma (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūsošais tērauds) Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), LDPE, PE-LD (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks: 36 mēneši

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 60: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)

Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, tuberkulozes baktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 125, 500, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: Uzliekams vāciņš: PP vai dozēšanas ierīce: kompleksa sistēma (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūsošais tērauds) Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), LDPE, PE-LD (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 30 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks: 36 mēneši

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 61: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 61.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) Lietojums Nr. 61.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 61.1: Pret baktērijām, raugiem, tuberkulozes baktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2,76 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 61.2: Pret baktērijām, raugiem, tuberkulozes baktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 61.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 61.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 125, 500, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: Uzliekams vāciņš: PP vai dozēšanas ierīce: kompleksa sistēma (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūsošais tērauds) Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), LDPE, PE-LD (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija: 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija: Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 30 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks: 36 mēneši

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 62: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām un raugiem: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 125, 500, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: Uzliekams vāciņš: PP vai dozēšanas ierīce: kompleksa sistēma (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūsošais tērauds) Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), LDPE, PE-LD (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts)

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 30 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks: 36 mēneši

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 6

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m^3, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 6

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			AntiLy1	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0033833-0006 1-6		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)

1. nodaļa. META PAK 7 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 7 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC7

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-7

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 7

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 7**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 7**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 7

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 63: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, tuberkulozes baktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2,76 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 125, 500, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: Uzliekams vāciņš: PP vai dozēšanas ierīce: kompleksa sistēma (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūsošais tērauds) Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), LDPE, PE-LD (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks: 36 mēneši

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 64: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)

Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, tuberkulozes baktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 125, 500, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: Uzliekams vāciņš: PP vai dozēšanas ierīce: kompleksa sistēma (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūsošais tērauds) Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), LDPE, PE-LD (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 30 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks: 36 mēneši

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 65: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 65.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) Lietojums Nr. 65.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 65.1: Pret baktērijām, raugiem, tuberkulozes baktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2,76 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 65.2: Pret baktērijām, raugiem, tuberkulozes baktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 65.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 65.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 125, 500, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: Uzliekams vāciņš: PP vai dozēšanas ierīce: kompleksa sistēma (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūsošais tērauds) Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), LDPE, PE-LD (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija: 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija: Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 30 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

5–30 l kanna, 220 l muca, 1 000 l tvertne: Pēc vajadzības uzpildīt vai pārnest uz citām tvertnēm/ierīcēm.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

Visiem materiāliem jābūt pilnībā saderīgiem ar produktu. Dozatora vai atkārtoti uzpildītās tvertnes marķējumā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

* Atļaujas numurs;
* Biocīda tirdzniecības nosaukums;
* Katras aktīvās vielas identifikācijas numurs un saturs;
* Lietošanas norādījumi, tostarp iestrādāšanas laiks, lai nodrošinātu biocīdu iedarbību;
* Informācija saskaņā ar regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (Regulation on the classification, labelling and packaging of substances and mixtures – CLP).

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks: 36 mēneši

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 66: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi - ieliešana vai dozēšana – telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām un raugiem: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 125, 500, 1 000 ml Iepakojums: HDPE Aizbāznis: Uzliekams vāciņš: PP vai dozēšanas ierīce: kompleksa sistēma (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerūsošais tērauds) Kanna: 5, 10, 20, 30 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija Muca: 220 l Iepakojums: HDPE Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija IBC: 1 000 l Iepakojums: HDPE ar tērauda ietvaru Aizbāznis: HDPE, LDPE, PP vai šo materiālu kombinācija

	Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), LDPE, PE-LD (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts)

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 30 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu.

Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks: 36 mēneši

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 7

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m^3, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 7

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			AntiLy2		Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs			EU-0033833-0007 1-7		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)

1. nodaļa. META PAK 8 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 8 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC8

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-8

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 8

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 8**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
Tetradekanols	Tetradekanols	Neaktīva viela	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 8**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 8

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus. P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 67: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija

	Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet plaukstās vai 3 ml (pilnu sauju) iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks: Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 68: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet plaukstās vai 3 ml (pilnu sauju) iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 69: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet plaukstās vai 5 ml (sauju) iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru). Berzēt plaukstas un apakšdelmus vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību (liešanu, berzēšanu) vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 70: Higiēniska roku dezinfekcija - rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet plaukstās vai 3 ml (pilnu sauju) iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietojums Nr. 71: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet plaukstās vai 3 ml (pilnu sauju) iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lietojums Nr. 72: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet plaukstās vai 3 ml (pilnu sauju) iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lietojums Nr. 73: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 73.1: (profesionāls, rūpniecisks): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā Lietojums Nr. 73.2: (profesionāls): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai medicīnas jomā, piemēram, slimnīcās (tostarp intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās), ārstu vai zobārstu prakses iestādēs
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 73.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 73.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Biežums: Lietojums Nr. 73.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 73.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 73.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 73.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai 3 ml (pilnu sauju) iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp iedarbība uz vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība)): 5 ml (sauju) produkta ieliet plaukstās vai 5 ml (sauju) iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru). Berzēt plaukstas un apakšdelmus vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību (liešanu, berzēšanu) vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lietojums Nr. 74: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 74.1: (Profesionāls, rūpniecisks): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, slimnīcās (tostarp intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās), ārstu vai zobārstu prakses iestādēs, kosmetoloģijas iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā. Lietojums Nr. 74.2: (Profesionāls): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 74.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 74.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 74.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 74.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)

Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp iedarbība uz vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība)): 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Lietojums Nr. 75: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām un raugiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Lietojums Nr. 76: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 76.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) Lietojums Nr. 76.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai medicīnas jomā, piemēram, slimnīcās (tostarp intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās), ārstu vai zobārstu prakses iestādēs
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: ---
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 76.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 76.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 76.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 76.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp iedarbība uz vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība)): 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 8

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m^3, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 8

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	desmanol® pure	Tirdzniecības vieta ES
	Septoderm® liquid	Tirdzniecības vieta ES
	Wrights alcohol hand rub	Tirdzniecības vieta ES
	Rely alcohol hand rub	Tirdzniecības vieta ES
	HS Handisinfec-tion liquid	Tirdzniecības vieta ES
	Profect Hand disinfection liquid	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® hand disinfection	Tirdzniecības vieta ES
	sensiva® hand disinfection liquid	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® N hand disinfection	Tirdzniecības vieta ES
	unodent hand disinfection	Tirdzniecības vieta ES

	eurosept hand disinfection	Tirdzniecības vieta ES
	Innocid Händedesin-fektion	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure pro	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure expert	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure clever	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure universal	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure pocket	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure client	Tirdzniecības vieta ES
	micros-hield® hand rub	Tirdzniecības vieta ES
	micros-hield® pure	Tirdzniecības vieta ES
	Halasept 792	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0033833-0008 1-8	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
Tetradekanols	Tetradekanols	Neaktīva viela	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

1. nodaļa. META PAK 9 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 9 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC9

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-9

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 9

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 9**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
Tetradekanols	Tetradekanols	Neaktīva viela	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 9**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 9

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus. P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu.

	P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 77: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)

Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 78: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija

	Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 79: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 80: Higiēniska roku dezinfekcija - rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietojums Nr. 81: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija

	Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lietojums Nr. 82: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lietojums Nr. 83: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās #Lietojums Nr. 83.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) vai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā

	#Lietojums Nr. 83.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai medicīnas jomā, piemēram, slimnīcās (tostarp intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās u. c.), ārstu vai zobārstu prakses iestādēs
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: #Lietojums Nr. 83.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) #Lietojums Nr. 83.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: #Lietojums Nr. 83.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) #Lietojums Nr. 83.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija: Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija: 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lietojums Nr. 84: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 84.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā. Lietojums Nr. 84.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)

Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 84.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 84.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: #Lietojums Nr. 84.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) #Lietojums Nr. 84.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem):

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija:

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt saujās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

--

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Lietojums Nr. 85: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām un raugiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Lietojums Nr. 86: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 86.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) Lietojums Nr. 86.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 86.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 86.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 86.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 86.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem):

3 ml produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru). Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija:

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.11. **Lietošanas veidu apraksts**

11. tabula

Lietojums Nr. 87: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (īpašās situācijās, piemēram, konjunktivīta gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.11.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.11.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Izvairīties no dezinfekcijas bērnu vecumā līdz 6 gadiem klātbūtnē..

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.11.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.11.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.11.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.12. **Lietošanas veidu apraksts**

12. tabula

Lietojums Nr. 88: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu prakses iestādēs (tikai īpašos gadījumos, piemēram, konjunktivīta gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.12.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

4.12.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.12.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.12.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.12.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.13. **Lietošanas veidu apraksts**

13. tabula

Lietojums Nr. 89: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu prakses iestādēs (tikai īpašos gadījumos, piemēram, konjunktivīta gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.13.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.13.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.13.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.13.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.13.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.14. **Lietošanas veidu apraksts**

14. tabula

Lietojums Nr. 90: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu prakses iestādēs (tikai īpašos gadījumos, piemēram, konjunktivīta gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.14.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

4.14.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.14.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.14.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.14.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 9

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m³, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 9

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	desmanol® pure gel	Tirdzniecības vieta ES
	Septoderm® IPA gel	Tirdzniecības vieta ES
	Wrights alcohol hand gel	Tirdzniecības vieta ES

	Rely alcohol hand gel	Tirdzniecības vieta ES
	HS Hand disinfection gel	Tirdzniecības vieta ES
	Profect Hand disinfection gel	Tirdzniecības vieta ES
	sensiva® hand gel	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® N gel	Tirdzniecības vieta ES
	unodent hand gel	Tirdzniecības vieta ES
	eurosept gel	Tirdzniecības vieta ES
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel pro	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel expert	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel clever	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel universal	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel pocket	Tirdzniecības vieta ES
	desmanol® pure gel client	Tirdzniecības vieta ES
	microshield® gel	Tirdzniecības vieta ES
	microshield® pure gel	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0033833-0009 1-9	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
Tetradekanols	Tetradekanols	Neaktīva viela	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

1. nodaļa. META PAK 10 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 10 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC10

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-10

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 10

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 10**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 10**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 10

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus. P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 91: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)

Lietošanas metode(-es)	Metode: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 92: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstā (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 93: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un mikobaktērijām un ierobežota spektra viricīda iedarbība: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija

	Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 94: Higiēniska roku dezinfekcija - rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietojums Nr. 95: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lietojums Nr. 96: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem): 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lietojums Nr. 97: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 97.1: (profesionāls, rūpniecisks): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā Lietojums Nr. 97.2: (profesionāls): Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 97.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 97.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 97.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 97.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem):

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp iedarbība uz vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība)): 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lietojums Nr. 98: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 98.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā. Lietojums Nr. 98.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 98.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 98.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 98.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 98.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem):

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp iedarbība uz vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība)): 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Lietojums Nr. 99: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)

Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām un raugiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Lietojums Nr. 100: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 100.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs). Lietojums Nr. 100.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 100.1: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Lietojums Nr. 100.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem un vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v.

	Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 100.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 100.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (tostarp iedarbojas uz apvalkotiem vīrusiem):

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (tostarp iedarbība uz vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība)): 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 10

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m^3, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 10

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			desmanol ® pure light	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0033833-0010 1-10		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

1. nodaļa. META PAK 11 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 11 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC11

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-11

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 11

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 11**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 11**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 11

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus. P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 101: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas

	Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā).
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 102: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 103: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. 5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 104: Higiēniska roku dezinfekcija - rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietojums Nr. 105: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lietojums Nr. 106: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lietojums Nr. 107: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 107.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā Lietojums Nr. 107.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 107.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 107.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: #Lietojums Nr. 107.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) #Lietojums Nr. 107.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem):

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija:

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lietojums Nr. 108: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 108.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā Lietojums Nr. 108.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 108.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 108.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 108.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 108.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (Iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem):

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija:

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Lietojums Nr. 109: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām un raugiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.9.3. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

---

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Lietojums Nr. 110: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, mikobaktērijas, apvalkotie vīrusi - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 110.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) Lietojums Nr. 110.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 110.1: Pret baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,9 g a.v. Saskares laiks: 30 s Pret mikobaktērijām: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,9 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 110.2: Pret baktērijām, raugiem, mikobaktērijām un apvalkotiem vīrusiem: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 90 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 110.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 110.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (Iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem):

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu mikobaktericīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija:

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 45 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.11. **Lietošanas veidu apraksts**

11. tabula

Lietojums Nr. 111: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā/īpašās situācijās: konjunktivīts)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.11.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.11.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Izvairīties no dezinfekcijas bērnu vecumā līdz 6 gadiem klātbūtnē..

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.11.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.11.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.11.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.12. **Lietošanas veidu apraksts**

12. tabula

Lietojums Nr. 112: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu prakses iestādēs (tikai īpašos gadījumos, piemēram, konjunktivīta gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizes dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija

	Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.12.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.12.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.12.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.12.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

--

4.12.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.13. **Lietošanas veidu apraksts**

13. tabula

Lietojums Nr. 113: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs, piemēram, ārstu prakses iestādēs (tikai īpašos gadījumos, piemēram, konjunktivīta gadījumā)

Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizes dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.13.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

4.13.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.13.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.13.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.13.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.14. **Lietošanas veidu apraksts**

14. tabula

Lietojums Nr. 114: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā/īpašās situācijās: konjunktivīts)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret vīrusiem (ierobežota spektra viricīda iedarbība): 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 3,16 g a.v. Saskares laiks: 120 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija

	Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.14.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 60 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.14.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Izvairīties no dezinfekcijas bērnu vecumā līdz 6 gadiem klātbūtnē..

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.14.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.14.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.14.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 11

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m³, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 11

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			desmanol ® pure light gel	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0033833-0011 1-11		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

1. nodaļa. META PAK 12 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 12 identifikators**

Identifikators	desmanol pure meta SPC12

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

Numurs	1-12

1.3. **Produkta tips(-i)**

Produkta tips(-i)	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 12

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 12**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (m/m)

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 12**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 12

Bīstamības apzīmējumi	H225: Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336: Var izraisīt miegainību vai reiboņus. EUH066: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasību apzīmējumi	P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102: Sargāt no bērniem. P103: Rūpīgi izlasiet un izpildiet visus norādījumus. P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P312: Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Saņemiet medicīnisko palīdzību. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Deponējiet saturs saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem. P501: Deponējiet tvertni saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Lietojums Nr. 115: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem:

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lietojums Nr. 116: Higiēniska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lietojums Nr. 117: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 2,76 g a.v. Iedarbības laiks 180 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 90 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lietojums Nr. 118: Higiēniska roku dezinfekcija - rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Iedarbības laiks 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija

	Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Iedarbība uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem: 3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lietojums Nr. 119: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas

	Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai privātajā jomā/veselības aprūpes iestāžu sabiedriskajās zonās (piemēram, slimību gadījumā)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Iedarbības laiks 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Iedarbības laiks 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem):

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Produkta lietošanas laikā un pēc lietošanas jānodrošina atbilstoša vēdināšana, atverot logus vai ieslēdzot mehānisko ventilāciju vannas istabas/virtuves zonā.

Nelietot mājdzīvnieku klātbūtnē

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

Drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lietojums Nr. 120: Higiēniska roku dezinfekcija - neprofesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 3 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija:

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Produktu drīkst lietot tikai pieaugušie.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE) un maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lietojums Nr. 121: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 121.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā. Lietojums Nr. 121.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 121.1: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 121.2: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 2,76 g a.v. Saskares laiks: 180 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 121.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 121.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija:

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija:

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstā (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 90 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lietojums Nr. 122: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls un rūpniecisks lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas

	Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 122.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) un rūpnieciskajā jomā, piemēram, farmācijas vai pārtikas ražošanas jomā. Lietojums Nr. 122.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 122.1: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 122.2: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 2,76 g a.v. Saskares laiks: 180 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 122.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 122.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	rūpniecisks profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem):

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija:

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstā (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 90 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Lietojums Nr. 123: Ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Pret baktērijām, raugiem un sēnītēm: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 2,76 g a.v. Saskares laiks: 180 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un nosusināt rokas.

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 90 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Lietojums Nr. 124: Higiēniska/ķirurģiska roku dezinfekcija - profesionāls lietotājs - baktērijas, raugi, sēnītes, tuberkulozes baktērijas, apvalkotie vīrusi, vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) - ieliešana vai dozēšana - telpās

Produkta tips	PT01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Nav attiecināms
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Tuberkulozes baktērijas Attīstības stadija: veģetatīvās šūnas Zinātniskais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Apvalkotie vīrusi Attīstības stadija: nav piemērojams Zinātniskais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi (ierobežota spektra viricīda iedarbība) Attīstības stadija: nav piemērojams

Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Lietojums Nr. 124.1: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts higiēniskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs, veco ļaužu aprūpes namos, kosmetoloģijas iestādēs) Lietojums Nr. 124.2: Lietošanai gatavs dezinfekcijas produkts ķirurģiskai roku dezinfekcijai veselības aprūpes iestādēs (piemēram, slimnīcā, intensīvās terapijas nodaļā, pediatrijas nodaļās, ārstu prakses iestādēs)
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ieliešana vai dozēšana (dozatora specifikācija: pilienu dozators / izvade: pilināšana) sīks apraksts: -
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietojums Nr. 124.1: Baktericīda, pretraugu, viricīda iedarbība pret apvalkotiem vīrusiem: 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 1,65 g a.v. Saskares laiks: 30 s Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbība, fungicīda un tuberkulocīda efektivitāte: 2 x 3 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 1,65 g a.v. Saskares laiks: 60 s (kopējais) Lietojums Nr. 124.2: 2 x 5 ml vienā dezinfekcijas reizē, kas atbilst 2 x 2,76 g a.v. Saskares laiks: 180 s (kopējais) Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums: Lietojums Nr. 124.1: pēc nepieciešamības (parasti 25 lietošanas reizēm dienā) Lietojums Nr. 124.2: pēc nepieciešamības (parasti 4 lietošanas reizēm dienā)
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija. Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Maiss/maisiņš: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Iepakojums: PET/ALU/PE, PET/PE vai PET-SiO/PE Aizbāznis: PP, PC, PE, HDPE, LDPE vai šo materiālu kombinācija ; Dozēšanas ierīce: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerūsošais tērauds, silikons, silikagēls, NBR, TPE, stikls vai šo materiālu kombinācija Saīsinājumi: HDPE (augsta blīvuma polietilēns), PP (polipropilēns), PC (polikarbonāts), PE (polietilēns), LDPE (zema blīvuma polietilēns), EVA (etilēna vinilacetāts), POM (polioksimetilēns), PBT (polibutilēna tereftalāts), PET (polietilēna tereftalāts), NBR (nitrilbutadiēnkaučuks), TPE (termoplastisks elastomērs), ALU (alumīnijs)

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts ir lietošanai gatavs. Uzklāt produktu tikai uz veselas cilvēka ādas. Pirms produkta lietošanas nomazgāt un noslaucīt rokas.

Higiēniska roku dezinfekcija (iedarbojas uz baktērijām, raugiem un apvalkotiem vīrusiem):

3 ml (pilnu sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstās (1–2 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās. Berzēt vismaz 30 sekundes. Papildu ierobežota spektra viricīda iedarbībai, fungicīdai un tuberkulocīdai iedarbībai atkārtot šo darbību vēl vienu reizi.

Ķirurģiska roku dezinfekcija:

5 ml (sauju) produkta ieliet vai iespiest plaukstā (2–4 reizes nospiest dozatoru) un ieberzēt plaukstās un apakšdelmos. Berzēt vismaz 90 sekundes. Atkārtot šo darbību vēl vienu reizi. Nodrošināt, ka visu lietošanas laiku plaukstas un apakšdelmi ir samitrināti ar produktu.

Biocīda dekantēšanu/uzpildīšanu ķirurģiskai roku dezinfekcijai drīkst veikt tikai aseptiskos apstākļos.

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Tvertni turēt cieši noslēgtu. Sargāt no tiešu saules staru iedarbības.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā.

Uzglabāšanas laiks:

Pudele (PE), maiss/maisiņš (PE): 6 dienas

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 12

5.1. **Lietošanas pamācība**

Lietošanas metode:

1. Darbība. Uzklāt dezinfekcijas līdzekli un ieberzēt plaukstā. Berzēt plaukstu pret plaukstu, lai dezinfekcijas līdzekli vienmērīgi uzklātu uz visas plaukstas un pirkstiem.
2. Darbība. Ar labās rokas plaukstu berzēt kreisās plaukstas aizmuguri. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
3. Darbība. Izplest pirkstus un berzēt ādu pirkstu starpās. Ar kreisās rokas plaukstu berzēt labās plaukstas aizmuguri un atkārtot darbību.
4. Darbība. Berzēt plaukstu pret plaukstu ar savstarpēji savienotiem pirkstiem (5 reizes).
5. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt abus īkšķus.
6. Darbība. Veicot apļveida kustību, berzēt pirkstu galus pret pretējo plaukstu. Berzēt plaukstas locītavu ar abām plaukstām. Uzgaidīt, līdz plaukstas pilnībā nožūst.

Nelietot produktu kopā ar citiem produktiem.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus.

Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Izvairīties no nokļūšanas acīs.

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

Pirms ieiešanas telpā vai vietā, kur cilvēki uzturēsies ilgāku laiku, jānodrošina, ka uzklātais produkts ir pilnībā nožuvis.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi:

Nav.

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīga informācija

Nogādāt personas drošā vietā. Sniedzot neatliekamo palīdzību, gādāt par pašaizsardzību. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Ja rodas simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja rodas kairinājums, mazgāt ar ūdeni un meklēt medicīnisku palīdzību. Nejaušas saskares ar ādu gadījumā: mazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Ja nepieciešams, sāciet dzīvības uzturēšanas pasākumus.

Visvarīgākie akūtie un novēlotie simptomi un ietekme

Simptomi var ietvert dzelošas sāpes, asarojošas acis, apsārtumu, pietūkumu un neskaidru redzi. Tvaikiem ir narkotiska iedarbība, un tie var izraisīt galvassāpes, nogurumu, reiboni un sliktu dūšu. Klepus. Elpas trūkums. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:

Nepieļaut koncentrātu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, piemēram, izmantojot savākšanas teknes.

Savākt noplūdušo produktu, izmantojot piemērotu materiālu (piemēram, zemi, smiltis, diatomītu, vermikulītu, universālas saistvielas).

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Augsnes vai ūdenstilpju piesārņojuma gadījumā informējiet atbildīgās iestādes.

Uzmanīties no sprādziena apdraudējuma.

Tvaiki ir smagāki par gaisu, tāpēc tie izplatās pa zemi un uzkrājas zemās vai norobežotās vietās (kanalizācijas sistēmā, pagrabos, cisternās).

Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles, un sprādziendrošas iekārtas.

Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.

Nodrošināt elektroapgādes nepārtrauktību, savienojot un iezemējot visas iekārtas.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējām/valsts/starptautiskajām prasībām.

Produkta atliekas jāsavāc un jāiznīcina saskaņā ar valsts tiesību aktu prasībām attiecībā uz atkritumu iznīcināšanu un piemērojamajām reģionālām un/vai pašvaldības prasībām.

Nepieļaujiet (tiešu) (neatšķaidīta produkta) noplūdi vidē/notekūdeņu sistēmā.

Neizliet kanalizācijā.

Izšļakstītos šķidrumus atšķaida ar ūdeni un uzslauka.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

---

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

Ieteikums profesionālai lietošanai:

P280 Izmantot acu aizsargus.

Lūdzu, ņemiet vērā aktīvās vielas propān-2-ola (CAS Nr.: 67-63-0) Eiropas atsauces vērtību 129,2 mg/m³, kas tika izmantota biocīdu saimes novērtējumā.

Attiecībā uz lietotāju kategorijām jāņem vērā: Profesionāļi (tostarp rūpnieciski lietotāji) ir apmācīti speciālisti, ja tas ir paredzēts valsts tiesību aktos.

7. nodaļa. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 12

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Septoderm® soft	Tirdzniecības vieta ES
	septosoft	Tirdzniecības vieta ES
	pluradent hand disinfection	Tirdzniecības vieta ES
	Dezosept	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0033833-0012 1-12	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Propān-2-ols	Propān-2-ols	Aktīvā viela	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)