Jornal Oficial
da União Europeia

PT
Série L

2025/1905

3.10.2025

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2025/1905 DA COMISSÃO

de 11 de setembro de 2025

que concede uma autorização da União para a família de produtos biocidas «desmanol pure» em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas ([1]), nomeadamente o artigo 44.º n.º 5, primeiro parágrafo,

Considerando o seguinte:

(1) Em 19 de abril de 2016, a empresa Schülke & Mayr GmbH apresentou à Agência Europeia dos Produtos Químicos («Agência»), em conformidade com o artigo 43.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012, um pedido de autorização da União para uma família de produtos biocidas denominada «desmanol pure», do tipo de produtos 1, tal como descrito no anexo V desse regulamento, fornecendo uma confirmação escrita de que a autoridade competente da Áustria tinha concordado em avaliar o pedido. O pedido foi registado com o número de processo BC-GA023097-64 no Registo de Produtos Biocidas.

(2) A «desmanol pure» contém propan-2-ol como substância ativa, o qual está incluído na lista da União de substâncias ativas aprovadas referida no artigo 9.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 528/2012 para o tipo de produtos 1.

(3) Em 13 de junho de 2024, a autoridade competente de avaliação apresentou à Agência, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 528/2012, um relatório de avaliação e as conclusões da sua avaliação.

(4) Em 13 de dezembro de 2024, a Agência apresentou à Comissão o seu parecer ([2]), o projeto de resumo das características do produto biocida («RCP») da «desmanol pure» e o relatório de avaliação final sobre a família de produtos biocidas, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 528/2012.

(5) O parecer conclui que a «desmanol pure» é uma família de produtos biocidas na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea s), do Regulamento (UE) n.º 528/2012, que é elegível para autorização da União nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do referido regulamento e que, sob reserva da conformidade com o projeto de RCP, satisfaz as condições estabelecidas no artigo 19.º, n.º 6, do mesmo regulamento.

(6) Em 8 de janeiro de 2025, a Agência transmitiu à Comissão o projeto de RCP em todas as línguas oficiais da União, em conformidade com o artigo 44.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 528/2012.

(7) A Comissão concorda com o parecer da Agência e considera, por conseguinte, adequado conceder uma autorização da União para a família de produtos biocidas «desmanol pure».

(8) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos Produtos Biocidas,

([1]) JO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Parecer de 28 de novembro de 2024 sobre a autorização da União para a família de produtos biocidas «desmanol pure» (ECHA/BPC/455/2024), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

É concedida uma autorização da União, com o número de autorização EU-0033833-0000, à empresa Schülke & Mayr GmbH para a disponibilização no mercado e a utilização da família de produtos biocidas «desmanol pure», em conformidade com o resumo das características do produto biocida que consta do anexo.

A autorização da União é válida de 23 de outubro de 2025 a 30 de setembro de 2035.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 11 de setembro de 2025.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO PARA UMA FAMÍLIA DE PRODUTOS BIOCIDAS (SPC BPF)

desmanol pure

Tipo(s) de produto

PT01: Higiene humana

Número de autorização EU-0033833-0000

Número da decisão de autorização R4BP EU-0033833-0000

PARTE I

PRIMEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Nome da família de produtos**

Nome	desmanol pure

1.2. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

1.3. **Titular da autorização**

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Schuelke & Mayr GmbH
	Endereço	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Número de autorização	EU-0033833-0000	
Número da decisão de autorização R4BP	EU-0033833-0000	
Data da autorização	23 de outubro de 2025	
Data de caducidade da autorização	30 de setembro de 2035	

1.4. **Fabricante(s) do produto**

Nome do fabricante	Schülke & Mayr GmbH
Endereço do fabricante	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Schülke & Mayr GmbH site 1 Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Alemanha

Nome do fabricante	BOCHEMIE a.s.
Endereço do fabricante	Lidická 326 735 95 Bohumín Chéquia
Localização das instalações de fabrico	BOCHEMIE a.s. site 1 Lidická 326 735 95 Bohumín Chéquia

Nome do fabricante	Prisman Chemie GmbH
Endereço do fabricante	Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Alemanha

Nome do fabricante	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH
Endereço do fabricante	Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Alemanha
Localização das instalações de fabrico	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH site 1 Otto-Brenner--Straße 16 21337 Lüneburg Alemanha

Nome do fabricante	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Endereço do fabricante	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH site 1 Kaiser--Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Alemanha

Nome do fabricante	Sterisol AB
Endereço do fabricante	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Suécia
Localização das instalações de fabrico	Sterisol AB site 1 Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Suécia

Nome do fabricante	Rudolf Dankwardt GmbH
Endereço do fabricante	Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Rudolf Dankwardt GmbH site 1 Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Alemanha

Nome do fabricante	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz
Endereço do fabricante	Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz site 1 Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Alemanha

1.5. **Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)**

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol)
Endereço do fabricante	Römerstraße 733 47443 Moers Alemanha
Localização das instalações de fabrico	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Alemanha Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 2 Shamrockstr. 88 44643 Herne Alemanha

Substância ativa	Propan-2-ol
Nome do fabricante	Shell Chemicals Europe B.V.
Endereço do fabricante	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Países Baixos

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTOS

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição da família**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,1 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

PARTE II

SEGUNDO NÍVEL DE INFORMAÇÃO META-SPC(S)

Capítulo 1. META-SPC 1 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 1 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC1

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-1

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 1

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 1**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 1**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 1

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as Evitar respirar os vapores. P261: Evitar respirar as Evitar respirar o spray. P264: Lavar Larvar cuidadosamente as mãos após manuseamento cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

	P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um Caso a irritação ocular persista: Consulte um oftalmologistamédico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais..

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 1 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 2 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 3 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus (atividade virucida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) na palma (2-4 jatos da bomba). Esfregar as mãos e os antebraços durante pelo menos 45 segundos. Repetir o passo (verter, esfregar) mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 4 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;

* O nome comercial do produto biocida;

* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

* As informações de acordo com o CRE.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização n.º 5 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização n.º 6 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização n.º 7 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 7.1: (profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/ /unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 7.2: (profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), clínicas ou consultórios odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 7.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 7.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 7.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 7.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo atividade virucida de espectro limitado): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) (2-4 jatos da bomba) do produto na palma ou bombear 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) na palma. Esfregar as mãos e os antebraços durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo (verter, esfregar) mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;

* O nome comercial do produto biocida;

* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

* As informações de acordo com o CRE.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização n.º 8 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 8.1: (profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde como hospitais (incluindo UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), consultórios médicos ou odontológicos, gabinetes de cosmética, cuidados de idosos e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 8.2: (profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 8.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 8.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 8.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 8.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo atividade virucida de espectro limitado): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;

* O nome comercial do produto biocida;

* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

* As informações de acordo com o CRE.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização n.º 9 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional – bactérias, leveduras – verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização n.º 10 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 10.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 10.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), clínicas ou consultórios odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 10.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 10.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 10.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 10.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo atividade virucida de espectro limitado): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;

* O nome comercial do produto biocida;

* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

* As informações de acordo com o CRE.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 1

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota “Categoria(s) de utilizadores”: Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 1

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	desmanol® pure	Mercado: UE
	Septoderm® liquid	Mercado: UE
	Wrights alcohol hand rub	Mercado: UE
	Rely alcohol hand rub	Mercado: UE
	HS Handisinfec-tion liquid	Mercado: UE
	Profect Hand disinfection liquid	Mercado: UE
	desmanol® hand disinfection	Mercado: UE
	sensiva® hand disinfection liquid	Mercado: UE
	desmanol® N hand disinfection	Mercado: UE
	unodent hand disinfection	Mercado: UE
	eurosept hand disinfection	Mercado: UE
	Innocid Händedesin-fektion	Mercado: UE
	desmanol® pure pro	Mercado: UE
	desmanol® pure expert	Mercado: UE
	desmanol® pure clever	Mercado: UE

	desmanol® pure universal	Mercado: UE
	desmanol® pure pocket	Mercado: UE
	desmanol® pure client	Mercado: UE
	microshield® hand rub	Mercado: UE
	microshield® pure	Mercado: UE
	Halasept 792	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0033833-0001 1-1	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 2 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 2 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC2

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-2

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 2

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 2**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 2**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 2

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as Evitar respirar os vapores. P261: Evitar respirar as Evitar respirar o spray. P264: Lavar Larvar cuidadosamente as mãos após manuseamento cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um Caso a irritação ocular persista: Consulte um oftalmologistamédico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais..

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 11 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 12 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma (1-2 jatos da bomba) ou bombear na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;

* O nome comercial do produto biocida;

* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

* As informações de acordo com o CRE.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 13 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 14 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização n.º 15 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização n.º 16 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização n.º 17 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Descrição do campo de utilização: #Utilização n.º 17.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) ou em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar #Utilização n.º 17.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, etc.), consultórios médicos ou odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: #Utilização n.º 17.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) #Utilização n.º 17.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 17.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 17.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização n.º 18 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 18.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 18.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 18.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 18.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 18.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 18.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização n.º 19 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional – bactérias, leveduras – verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização n.º 20 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 20.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 20.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 20.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 20.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa.

	Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 20.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 20.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.11. **Descrição de utilizações**

Tabela 11.

Utilização n.º 21 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (em casos especiais: por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.11.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.12. **Descrição de utilizações**

Tabela 12.

Utilização n.º 22 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.12.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.12.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.12.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.12.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.12.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.13. **Descrição de utilizações**

Tabela 13.

Utilização n.º 23 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.13.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.13.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.13.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.13.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.13.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.14. **Descrição de utilizações**

Tabela 14.

Utilização n.º 24 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.14.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.14.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.14.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.14.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.14.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 2

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 2

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	desmanol® pure gel	Mercado: UE
	Septoderm® IPA gel	Mercado: UE
	Wrights alcohol hand gel	Mercado: UE
	Rely alcohol hand gel	Mercado: UE
	HS Hand disinfection gel	Mercado: UE
	Profect Hand disinfection gel	Mercado: UE
	sensiva® hand gel	Mercado: UE
	desmanol® N gel	Mercado: UE

	unodent hand gel	Mercado: UE
	eurosept gel	Mercado: UE
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Mercado: UE
	desmanol® pure gel pro	Mercado: UE
	desmanol® pure gel expert	Mercado: UE
	desmanol® pure gel clever	Mercado: UE
	desmanol® pure gel universal	Mercado: UE
	desmanol® pure gel pocket	Mercado: UE
	desmanol® pure gel client	Mercado: UE
	microshield® gel	Mercado: UE
	microshield® pure gel	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0033833-0002 1-2	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 3 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 3 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC3

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-3

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 3

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 3**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 3**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 3

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

	P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 25 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 26 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 27 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré--cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus (atividade virucida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 28 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização n.º 29 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização n.º 30 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização n.º 31 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 31.1: (profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/ /unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 31.2: (profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 31.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 31.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 31.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 31.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização n.º 32 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 32.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 32.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 32.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 32.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 32.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 32.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização n.º 33 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização n.º 34 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 34.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética). Utilização n.º 34.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos).

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 34.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 34.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 34.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 34.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 3

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 3

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto			desmanol® pure light		Mercado: UE
Número de autorização			EU-0033833-0003 1-3		
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 4 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 4 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC4

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-4

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 4

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 4**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 4**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 4

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 35 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 36 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;

* O nome comercial do produto biocida;

* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

* As informações de acordo com o CRE.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 37 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 38 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. Instruções específicas de utilização

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização n.º 39 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização n.º 40 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização n.º 41 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 41.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 41.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 41.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 41.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 41.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 41.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;

* O nome comercial do produto biocida;

* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;

* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;

* As informações de acordo com o CRE.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização n.º 42 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 42.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 42.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 42.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g a.s.g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 42.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 42.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 42.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização n.º 43 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização n.º 44 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 44.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 44.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 44.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 44.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total)

	Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 44.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 44.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras , e vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.11. **Descrição de utilizações**

Tabela 11.

Utilização n.º 45 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças/caso especial: conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.11.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.12. **Descrição de utilizações**

Tabela 12.

Utilização n.º 46 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.12.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.12.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.12.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.12.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.12.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.13. **Descrição de utilizações**

Tabela 13.

Utilização n.º 47 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada:
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.13.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.13.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.13.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.13.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.13.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.14. **Descrição de utilizações**

Tabela 14.

Utilização n.º 48 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças/caso especial: conjuntivite).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.14.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.14.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.14.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.14.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.14.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 4

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não esvaziar para os esgotosNão vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 4

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto			desmanol® pure light gel	Mercado: UE	
Número de autorização			EU-0033833-0004 1-4		
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 5 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 5 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC5

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-5

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 5

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 5**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 5**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 5

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 49 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 50 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 51 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 52 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização n.º 53 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização n.º 54 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE): 36 meses

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização n.º 55 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 55.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 55.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 55.1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 55.2: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 55.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 55.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização n.º 56 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 56.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 56.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 56.1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 56.2: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 56.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 56.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização n.º 57 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional – bactérias, leveduras, fungos – verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Bactericida, leveduricida, fungoscida: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização n.º 58 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional – bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 58.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 58.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 58.1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 58.2: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 58.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 58.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE

	Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (HDPE), recipiente (HDPE), tambor (HDPE), GRG (HDPE com armação de aço): 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 5

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota “Categoria(s) de utilizadores”: Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 5

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Septo-derm® soft	Mercado: UE
	septosoft	Mercado: UE
	pluradent hand disinfec-tion	Mercado: UE
	Dezosept	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0033833-0005 1-5	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 6 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 6 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC6

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-6

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 6

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 6**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 6**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 6

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida. EUH208: Contém Isoeugenol. Pode provocar uma reação alérgica.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 59 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 5 ml por desinfeção, correspondente a 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 60 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa . Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 61 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 61.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 61.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 61.1: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 5 ml por desinfeção, correspondente a 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 61.2: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 61.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 61.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Preparação pré-cirúrgica das mãos: Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 62 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia)) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 6

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 6

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto			AntiLy1	Mercado: UE	
Número de autorização			EU-0033833-0006 1-6		
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 7 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 7 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC7

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-7

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 7

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 7**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 7**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 7

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 63 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 5 ml por desinfeção, correspondente a 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 64 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 65 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 65.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 65.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 65.1: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 5 ml por desinfeção, correspondente a 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 65.2: Contra bactérias, leveduras, bactérias da tuberculose e vírus envelopados: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 65.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 65.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Preparação pré-cirúrgica das mãos: Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

recipiente de 5-30 l, tambor de 220 l, recipiente de 1 000 l: Reabastecer ou transferir para outros recipientes/ /dispositivos conforme necessário.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

Todos os materiais têm de ser totalmente compatíveis com o produto. O doseador ou recipiente que é reabastecido, tem de apresentar as seguintes informações mínimas na rotulagem:

* O número de autorização;
* O nome comercial do produto biocida;
* A identidade e o conteúdo de cada ingrediente ativo;
* As instruções de utilização, incluindo o tempo de incorporação necessário para a ação biocida;
* As informações de acordo com o CRE.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 66 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear – interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 125, 500 1 000 ml Embalagens: HDPE Fecho: Tampa tipo “clack”: PP ou dispositivo da bomba: sistema complexo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, aço inoxidável) Recipiente: 5, 10, 20, 30 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais Tambor: 220 l Embalagens: HDPE Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais GRG: 1 000 l Embalagens: HDPE com armação de aço Fecho: HDPE, LDPE, PP ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado.

Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: 36 meses

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 7

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 7

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto		AntiLy2	Mercado: UE		
Número de autorização		EU-0033833-0007 1-7			
Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 8 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 8 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC8

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-8

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 8

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 8**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 8**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 8

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as Evitar respirar os vapores. P261: Evitar respirar as Evitar respirar o spray. P264: Lavar Larvar cuidadosamente as mãos após manuseamento cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um Caso a irritação ocular persista: Consulte um oftalmologistamédico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais..

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 67 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade: Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 68 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 69 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus (atividade virucida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) na palma (2-4 jatos da bomba). Esfregar as mãos e os antebraços durante pelo menos 45 segundos. Repetir o passo (verter, esfregar) mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 70 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização n.º 71 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização n.º 72 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização n.º 73 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 73.1: (profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/ /unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 73.2: (profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), clínicas ou consultórios odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 73.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 73.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Frequência: Utilização n.º 73.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 73.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 73.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 73.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha em forma de concha) (2-4 jatos da bomba) do produto na palma ou bombear 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) na palma. Esfregar as mãos e os antebraços durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo (verter, esfregar) mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização n.º 74 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 74.1: (Profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde como hospitais (incluindo UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), consultórios médicos ou odontológicos, gabinetes de cosmética, cuidados de idosos e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 74.2: (Profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 74.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 74.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 74.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 74.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização n.º 75 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização n.º 76 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 76.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 76.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas), clínicas ou consultórios odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: ---
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 76.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 76.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 76.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 76.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 8

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 8

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	desmanol® pure	Mercado: UE
	Septoderm® liquid	Mercado: UE
	Wrights alcohol hand rub	Mercado: UE
	Rely alcohol hand rub	Mercado: UE
	HS Handisinfec-tion liquid	Mercado: UE
	Profect Hand disinfection liquid	Mercado: UE
	desmanol® hand disinfection	Mercado: UE
	sensiva® hand disinfection liquid	Mercado: UE
	desmanol® N hand disinfection	Mercado: UE
	unodent hand disinfection	Mercado: UE

	eurosept hand disinfection	Mercado: UE
	Innocid Händedesin-fektion	Mercado: UE
	desmanol® pure pro	Mercado: UE
	desmanol® pure expert	Mercado: UE
	desmanol® pure clever	Mercado: UE
	desmanol® pure universal	Mercado: UE
	desmanol® pure pocket	Mercado: UE
	desmanol® pure client	Mercado: UE
	microshield® hand rub	Mercado: UE
	microshield® pure	Mercado: UE
	Halasept 792	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0033833-0008 1-8	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 9 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 9 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC9

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-9

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 9

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 9**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 9**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 9

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as Evitar respirar os vapores. P261: Evitar respirar as Evitar respirar o spray. P264: Lavar Larvar cuidadosamente as mãos após manuseamento cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273: Evitar a libertação para o ambiente. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

	P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um Caso a irritação ocular persista: Consulte um oftalmologistamédico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais..

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 77 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 78 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) no produto na palma (1-2 jatos da bomba) ou bombear na palma. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 79 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré--cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 80 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização n.º 81 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização n.º 82 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização n.º 83 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores #Utilização n.º 83.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) ou em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar

	#Utilização n.º 83.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas médicas, como hospitais (incluindo a UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, etc.), consultórios médicos ou odontológicos
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: #Utilização n.º 83.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) #Utilização n.º 83.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 83.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 83.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos: Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos: Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização n.º 84 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 84.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 84.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 84.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 84.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 84.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 84.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear na palma (2-4 jatos da bomba) e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

--

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização n.º 85 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização n.º 86 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 86.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 86.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 86.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 86.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 86.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 86.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados):

Verter 3 ml do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba). Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.11. **Descrição de utilizações**

Tabela 11.

Utilização n.º 87 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (em casos especiais: por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.11.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.12. **Descrição de utilizações**

Tabela 12.

Utilização n.º 88 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.12.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

4.12.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.12.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.12.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.12.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.13. **Descrição de utilizações**

Tabela 13.

Utilização n.º 89 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.13.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.13.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.13.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.13.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.13.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.14. **Descrição de utilizações**

Tabela 14.

Utilização n.º 90 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)

Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.14.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

4.14.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.14.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.14.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.14.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 9

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 9

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	desmanol® pure gel	Mercado: UE
	Septoderm® IPA gel	Mercado: UE
	Wrights alcohol hand gel	Mercado: UE

	Rely alcohol hand gel	Mercado: UE
	HS Hand disinfection gel	Mercado: UE
	Profect Hand disinfection gel	Mercado: UE
	sensiva® hand gel	Mercado: UE
	desmanol® N gel	Mercado: UE
	unodent hand gel	Mercado: UE
	eurosept gel	Mercado: UE
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Mercado: UE
	desmanol® pure gel pro	Mercado: UE
	desmanol® pure gel expert	Mercado: UE
	desmanol® pure gel clever	Mercado: UE
	desmanol® pure gel universal	Mercado: UE
	desmanol® pure gel pocket	Mercado: UE
	desmanol® pure gel client	Mercado: UE
	microshield® gel	Mercado: UE
	microshield® pure gel	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0033833-0009 1-9	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Substância não ativa	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 10 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 10 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC10

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-10

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 10

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 10**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 10**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 10

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.

Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 91 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)

Método(s) de aplicação	Método: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Vertererter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 92 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 93 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias (atividade virucida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 94 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable

Campo(s) de utilização	Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização n.º 95 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização n.º 96 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados): Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização n.º 97 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 97.1: (profissional, industrial): Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/ /unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 97.2: (profissional): Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 97.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 97.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 97.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 97.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização n.º 98 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 98.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 98.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 98.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 98.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 98.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 98.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização n.º 99 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização n.º 100 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 100.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética). Utilização n.º 100.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 100.1: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Utilização n.º 100.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados e vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa.

	Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 100.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 100.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (incluindo atividade contra vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos (incluindo contra vírus [atividade virucida de espectro limitado]): Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 10

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota “Categoria(s) de utilizadores”: Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 10

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	desmanol ® pure light	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0033833-0010 1-10	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 11 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 11 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC11

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-11

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 11

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 11**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 11**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 11

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 101 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças).
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 102 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 103 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 104 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização n.º 105 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização n.º 106 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização n.º 107 Higienizador para mãos/preparação pré-preparação cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 107.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 107.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 107.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 107.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: #Utilização n.º 107,.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) #Utilização n.º 107,.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização n.º 108 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 108.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, por ex., indústria da produção farmacêutica ou alimentar Utilização n.º 108.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 108.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 108.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 108.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 108.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (Eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização n.º 109 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra bactérias e leveduras: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização n.º 110 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, micobactérias, vírus envelopados - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Micobactérias Nome comum: MycoBactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Enveloped viruses Nome comum: Enveloped viruses Estadio de desenvolvimento: not applicable

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 110.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 110.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 110.1: Contra bactérias, leveduras e vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Contra micobactérias: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,9 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 110.2: Contra bactérias, leveduras, micobactérias e vírus envelopados: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 90 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 110.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 110.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras e vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para atividade adicional contra micobactérias, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 45 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.11. **Descrição de utilizações**

Tabela 11.

Utilização n.º 111 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças/caso especial: conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -

Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.11.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.11.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.11.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.11.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.12. **Descrição de utilizações**

Tabela 12.

Utilização n.º 112 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g a.s.g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.12.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.12.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.12.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.12.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

--

4.12.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.13. **Descrição de utilizações**

Tabela 13.

Utilização n.º 113 Higienizador para mãos - utilizador profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas de cuidados de saúde, como consultórios médicos (apenas em casos especiais, por ex., conjuntivite)

Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.13.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

4.13.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.13.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.13.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.13.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.14. **Descrição de utilizações**

Tabela 14.

Utilização n.º 114 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças/caso especial: conjuntivite)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Contra vírus (espectro limitado da atividade virucida): 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 3,16 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 120 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.14.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 60 segundos. Repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.14.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Evitar a desinfeção na presença de crianças com menos de 6 anos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.14.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.14.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.14.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 11

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 11

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	desmanol ® pure light gel	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0033833-0011 1-11	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

Capítulo 1. META-SPC 12 INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-SPC 12 identificador**

Identificador	desmanol pure meta SPC12

1.2. **Sufixo do número de autorização**

Número	1-12

1.3. **Tipo(s) de produto**

Tipo(s) de produto	PT01: Higiene humana

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO DO META-SPC 12

2.1. **Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do meta-SPC 12**

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulação do meta-SPC 12**

Tipo(s) de formulação	AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA DO META-SPC 12

Advertências de perigo	H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis. H319: Provoca irritação ocular grave. H336: Pode provocar sonolência ou vertigens. EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada por exposição repetida.
Recomendações de prudência	P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261: Evitar respirar as vapores. P261: Evitar respirar as spray. P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P312: Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS P312: Em caso de indisposição, contacte um médico P337+P313: Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405: Armazenar em local fechado à chave. P501: Eliminar o conteúdo em de acordo com os regulamentos locais e nacionais. P501: Eliminar o recipiente em de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S) DO META-SPC

4.1. **Descrição de utilizações**

Tabela 1.

Utilização n.º 115 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.1.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados:

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.1.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.1.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.1.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.2. **Descrição de utilizações**

Tabela 2.

Utilização n.º 116 Higienizador para mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional

Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.2.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

4.2.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.2.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.2.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.2.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.3. **Descrição de utilizações**

Tabela 3.

Utilização n.º 117 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.3.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.3.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.3.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.3.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.4. **Descrição de utilizações**

Tabela 4.

Utilização n.º 118 Higienizador para mãos - utilizador industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante

Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas industriais, por ex., indústria de produção farmacêutica ou alimentar
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.4.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados: Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

4.4.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.4.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.4.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.4.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.5. **Descrição de utilizações**

Tabela 5.

Utilização n.º 119 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas privadas/cuidados de saúde em áreas domésticas (por ex., em caso de doenças)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto de 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.5.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Garantir uma ventilação adequada durante e após a aplicação do produto ao abrir as janelas ou ligar a ventilação mecânica nas casas de banho/cozinhas.

Manter afastado de animais domésticos.

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.5.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.5.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.5.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

4.6. **Descrição de utilizações**

Tabela 6.

Utilização n.º 120 Higienizador para mãos - utilizador não profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 3 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.6.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos:

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Exclusivamente para utilização em adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

Em caso de secura da pele, utilizar loção apropriada para a pele.

4.6.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.6.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.6.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE) e saco/saqueta (PE): 6 dias

4.7. **Descrição de utilizações**

Tabela 7.

Utilização n.º 121 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 121.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 121.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 121.1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g a.s.g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 121.2: : 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 121.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 121.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.7.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos:

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.7.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.7.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.7.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.7.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.8. **Descrição de utilizações**

Tabela 8.

Utilização n.º 122 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional, industrial - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas

	Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 122.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) e em áreas industriais, como na indústria da produção farmacêutica ou alimentar. Utilização n.º 122.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 122.1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 122.2: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 122.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 122.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	industrial profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.8.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.8.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.8.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.8.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.8.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.9. **Descrição de utilizações**

Tabela 9.

Utilização n.º 123 Preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Bactericida, leveduricida, fungoscida: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.9.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.9.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.9.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.9.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

4.10. **Descrição de utilizações**

Tabela 10.

Utilização n.º 124 Higienizador para mãos/preparação pré-cirúrgica das mãos - utilizador profissional - bactérias, leveduras, fungos, bactérias da tuberculose, vírus envelopados, vírus (atividade virucida de espectro limitado) - verter ou bombear - interior

Tipo de produto	PT01: Higiene humana
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante
Organismo(s)-alvo (incluindo estádio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Fungos Nome comum: fungos Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Bactérias da tuberculose Nome comum: Tuberculosis Bactérias Estadio de desenvolvimento: células vegetativas Nome científico: Vírus envelopados Nome comum: Vírus envelopados Estadio de desenvolvimento: não aplicável Nome científico: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Nome comum: Vírus (atividade virucida de espectro limitado) Estadio de desenvolvimento: não aplicável

Campo(s) de utilização	utilização em interiores Utilização n.º 124.1: Produto pronto a utilizar para a desinfeção com higienizador para mãos em áreas relacionadas com os cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos, cuidados de idosos, gabinetes de cosmética) Utilização n.º 124.2: Produto pronto a utilizar para a desinfeção na preparação pré-cirúrgica das mãos em áreas de cuidados de saúde (por ex., hospital, UCI/unidade de cuidados intensivos, alas pediátricas, consultórios médicos)
Método(s) de aplicação	Método: Verter ou bombear (especificação do doseador: bomba de gotas/saída: gotejamento) Descrição detalhada: -
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Utilização n.º 124.1: Atividade bactericida, leveduricida, virucida contra vírus envelopados: 3 ml por desinfeção, correspondente a 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 30 seg. Atividade virucida de espectro limitado, eficácia fungoscida e tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 1,65 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 60 seg. (no total) Utilização n.º 124.2: 2 x 5 ml por desinfeção, correspondente a 2 x 2,76 g. de substância ativa. Tempo de contacto: 180 seg. (no total) Número e calendário da aplicação: Frequência: Utilização n.º 124.1: conforme necessário (tipicamente 25 aplicações por dia) Utilização n.º 124.2: conforme necessário (tipicamente 4 aplicações por dia)
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Frasco: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais saco/saqueta: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalagens: PET/ALU/PE, PET/PE ou PET-SiO/PE Fecho: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ou uma combinação destes materiais ; Dispositivo da bomba: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, aço inoxidável, silicone, gel de sílica, NBR, TPE, vidro ou uma combinação destes materiais Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidade), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baixa densidade), EVA (acetato-vinilo de etileno), POM (polioximetileno), PBT (politereftalato de butileno), PET (politereftalato de etileno), NBR (borracha de butadieno nitrilo), TPE (elastómero termoplástico), ALU (alumínio)

4.10.1. *Instruções específicas de utilização*

O produto está pronto a utilizar. Aplicar o produto apenas em superfície cutânea humana intacta. Lavar e secar as suas mãos antes de utilizar o produto.

Higienizador para mãos (eficácia contra bactérias, leveduras, vírus envelopados):

Verter 3 ml (uma palma da mão em forma de concha cheia) do produto na palma ou bombear na palma (1-2 jatos da bomba) e esfregar nas mãos. Esfregar durante pelo menos 30 segundos. Para eficácia fungoscida e tuberculocida e atividade virucida de espectro limitado adicional, repetir esse passo mais uma vez.

Preparação pré-cirúrgica das mãos:

Verter 5 ml (uma palma da mão em forma de concha) do produto na palma ou bombear (2-4 jatos da bomba) na palma e esfregar nas mãos e antebraços. Esfregar durante pelo menos 90 segundos. Repetir esse passo mais uma vez. Garantir que as suas mãos e antebraços são mantidos húmidos pelo produto durante todo o tempo de aplicação.

A decantação/reabastecimento do produto biocida para preparação pré-cirúrgica das mãos deve ser realizada apenas em condições assépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigação do risco específicas*

4.10.3. *Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente*

4.10.4. *Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem*

4.10.5. *Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento*

Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz solar direta.

Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original.

Prazo de validade:

Frasco (PE), saco/saqueta (PE): 6 dias

Capítulo 5. INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS META-SPC 12

5.1. **Instruções de utilização**

Técnica de aplicação:

Passo 1: Aplicar o desinfetante e esfregar na palma da mão. Esfregar palma contra palma para espalhar o desinfetante nas mãos e dedos.

Passo 2: Esfregar as costas da mão esquerda com a palma da mão direita. Trocar e repetir a ação.

Passo 3: Abrir os dedos e esfregar nas membranas entre os dedos. Trocar e repetir a ação.

Passo 4: Esfregar palma contra palma com os dedos entrelaçados (5 vezes).

Passo 5: Esfregar o polegar de cada mão utilizando um movimento repetitivo.

Passo 6: Esfregar as pontas dos dedos contra a palma oposta utilizando um movimento circular. Esfregar o pulso com ambas as mãos. Deixar as mãos secar completamente.

Não utilizar o produto juntamente com outros produtos.

Leia sempre o rótulo ou o folheto antes do uso e siga todas as instruções.

Manter fora do alcance das crianças e animais não visados/animais de estimação.

Evitar o contacto com os olhos.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Garantir que o produto aplicado é completamente seco antes de entrar numa divisão ou área onde as pessoas permanecerão durante um período mais longo.

5.2. **Medidas de redução do risco**

5.3. **Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

Características de efeitos diretos ou indiretos prováveis:

Nenhum.

Instruções de primeiros socorros:

Informações gerais

Levar as pessoas para um local seguro. Observar a autoproteção para primeiros socorros. Retirar a roupa e o calçado contaminados imediatamente. Em caso de sintomas, consultar um médico.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Em caso de irritação, lavar com água e procurar aconselhamento médico. Em caso de exposição dérmica não intencional: lavar com água.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água. Remover as lentes de contacto, se existirem e se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar durante 5 minutos. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INALAÇÃO: Levar para uma zona ao ar livre e manter em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxaguar a boca.

Em caso de sintomas: Ligar para o 112/ambulância para obter assistência médica.

Se não ocorrerem sintomas: Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

Informações para o pessoal dos cuidados de saúde/médico: Iniciar as medidas de suporte da vida se necessário.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Os sintomas podem incluir ardência, lacrimejar, vermelhidão, inchaço e visão turva. Os vapores têm um efeito narcótico e podem causar dores de cabeça, fadiga, tonturas e náuseas. Tosse. Falta de ar posteriormente. Contactar um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

Medidas de emergência para proteger o ambiente:

Evitar o derrame de concentrados para o solo, águas superficiais ou águas subterrâneas, por ex., através de bacias de recolha

Recolher o produto derramado com um material adequado (por ex., terra, areia, terra de diatomáceas, vermiculite, agentes aglutinantes universais).

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Em caso de contaminação de organismos do solo ou aquáticos, notificar as autoridades competentes.

Ter atenção ao perigo de explosão.

Os vapores são mais pesados do que o ar e serão espalhados pelo solo e irão acumular-se em áreas baixas ou confinadas (esgotos, caves, tanques).

Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosões.

Tomar medidas de precaução contra descarga estática.

Garantir a continuidade elétrica através da ligação à terra de todo o equipamento.

5.4. **Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha de resíduos especiais, em conformidade com os requisitos locais/nacionais/internacionais.

Os resíduos do produto têm de ser recolhidos e eliminados de acordo com a legislação nacional de eliminação de resíduos e quaisquer requisitos das autoridades regionais e/ou locais.

Evitar a libertação (direta) (de produto não diluído) para o ambiente/sistema de esgotos.

Não vazar em canalizações.

Diluir os derrames com água e absorver.

5.5. **Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Recomendação para utilização profissional:

P280 Usar proteção ocular

Deve estar ciente do valor de referência europeu de 129,2 mg/m³ para a substância ativa propan-2-ol (CAS n.º: 67-63-0) que foi utilizado para a avaliação dos riscos da família de produtos biocidas.

Relativamente à nota "Categoria(s) de utilizadores": Profissionais (incluindo utilizadores profissionaisindustriais) significa profissionais com formação, caso seja exigido pela legislação nacional.

Capítulo 7. TERCEIRO NÍVEL DE INFORMAÇÃO: PRODUTOS INDIVIDUAIS NO META-SPC 12

7.1. **Nome(s) comercial(ais), número de autorização e composição específica de cada produto individual**

Nome(s) comercial(ais) do produto	Septoderm® soft	Mercado: UE
	septosoft	Mercado: UE
	pluradent hand disinfection	Mercado: UE
	Dezosept	Mercado: UE
Número de autorização	EU-0033833-0012 1-12	

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Substância ativa	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)