Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2025/1905

3.10.2025

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/1905

z dne 11. septembra 2025

o izdaji dovoljenja Unije za družino biocidnih proizvodov „desmanol pure“ v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ([1]) ter zlasti člena 44(5), prvi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Družba Schülke & Mayr GmbH je 19. aprila 2016 v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 pri Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) vložila vlogo za dovoljenje Unije za družino biocidnih proizvodov z imenom „desmanol pure“ vrste proizvodov 1, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni uredbi, in predložila pisno potrdilo, da se pristojni organ Avstrije strinja, da bo ocenil vlogo. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-GA023097-64.

(2) Družina biocidnih proizvodov „desmanol pure“ kot aktivno snov vsebuje propan-2-ol, ki je vključen na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 za vrsto proizvodov 1.

(3) Ocenjevalni pristojni organ je Agenciji 13. junija 2024 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in ugotovitve ocenjevanja.

(4) Agencija je 13. decembra 2024 v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji predložila mnenje ([2]), osnutek povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) „desmanol pure“ in končno poročilo o oceni družine biocidnih proizvodov.

(5) V mnenju je ugotovljeno, da je „desmanol pure“ družina biocidnih proizvodov v smislu člena 3(1), točka (s), Uredbe (EU) št. 528/2012, da se zanjo lahko izda dovoljenje Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da ob upoštevanju skladnosti z osnutkom SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(6) navedene uredbe.

(6) Agencija je v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji 8. januarja 2025 predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih Unije.

(7) Komisija se strinja z mnenjem Agencije in torej meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za družino biocidnih proizvodov „desmanol pure“.

(8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

([1]) UL L 167, 27.6.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Mnenje z dne 28. novembra 2024 o dovoljenju Unije za družino biocidnih proizvodov „desmanol pure“ (ECHA/BPC/455/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi Schülke & Mayr GmbH se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0033833-0000 za dostopnost na trgu in uporabo družine biocidnih proizvodov „desmanol pure“ v skladu s povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda iz Priloge.

Dovoljenje Unije velja od 23. oktobra 2025 do 30. septembra 2035.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. septembra 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI DRUŽINE BIOCIDNEGA PROIZVODA

desmanol pure

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

Številka dovoljenja EU-0033833-0000

Številka proizvoda v R4BP EU-0033833-0000

DEL I.

PRVA RAVEN INFORMACIJ

POGLAVJE 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Ime družine**

Ime	desmanol pure

1.2. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

1.3. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Schuelke & Mayr GmbH
	Naslov	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Številka dovoljenja		EU-0033833-0000
Številka proizvoda v R4BP		EU-0033833-0000
Datum dovoljenja		23. oktober 2025
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		30. september 2035

1.4. **Proizvajalec(-ci) proizvoda**

Ime proizvajalca	Schülke & Mayr GmbH
Naslov proizvajalca	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Schülke & Mayr GmbH site 1 Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Nemčija

Ime proizvajalca	BOCHEMIE a.s.
Naslov proizvajalca	Lidická 326 735 95 Bohumín Češka
Kraj proizvodnih obratov	BOCHEMIE a.s. site 1 Lidická 326 735 95 Bohumín Češka

Ime proizvajalca	Prisman Chemie GmbH
Naslov proizvajalca	Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Nemčija

Ime proizvajalca	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH
Naslov proizvajalca	Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH site 1 Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Nemčija

Ime proizvajalca	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Naslov proizvajalca	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH site 1 Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Nemčija

Ime proizvajalca	Sterisol AB
Naslov proizvajalca	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Švedska
Kraj proizvodnih obratov	Sterisol AB site 1 Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Švedska

Ime proizvajalca	Rudolf Dankwardt GmbH
Naslov proizvajalca	Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Rudolf Dankwardt GmbH site 1 Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Nemčija

Ime proizvajalca	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz
Naslov proizvajalca	Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz site 1 Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Nemčija

1.5. **Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi**

Aktivna snov	Propan-2-ol
Ime proizvajalca	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol)
Naslov proizvajalca	Römerstraße 733 47443 Moers Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Nemčija Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 2 Shamrockstr. 88 44643 Herne Nemčija

Aktivna snov	Propan-2-ol
Ime proizvajalca	Shell Chemicals Europe B.V.
Naslov proizvajalca	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nizozemska
Kraj proizvodnih obratov	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nizozemska

POGLAVJE 2. SESTAVA IN FORMULACIJA DRUŽINE PROIZVODOV

2.1. **Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi družine**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	63,1–75 % (m/m)
1-tetradekanol	Tetradekan-1-ol	Neaktivna snov	112-72-1	204-000-3	0–0,5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

DEL II.

DRUGA RAVEN INFORMACIJ – META SPC(-JI)

POGLAVJE 1. META SPC 1 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 1 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC1

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-1

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 1

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 1**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75–75 % (m/m)
1-tetradekanol	Tetradekan-1-ol	Neaktivna snov	112-72-1	204-000-3	0,25–0,5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 1**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 1

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

	P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 1 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo za odrasle osebe.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 2 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov

	Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 3 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali odmerite majhno količino, 5 ml, v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke. Roke in podlakti drgnite vsaj 45 sekund. Ponovite korak (zlivanje, vtiranje) Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega proizvoda za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 4 Higiensko umivanje rok - industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji

Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte ga vsaj 30 sekund.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številka dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba 5 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba 6 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba 7 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - vlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 7.1: (poklicna, industrijska): proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih področjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji Uporaba 7.2: (poklicna): proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s kirurškim umivanjem rok za dezinfekcijo rok v medicinskih prostorih, kot so bolnišnice (vključno z enotami intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnimi oddelki), zdravniške ali zobozdravniške ordinacije
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 7.1: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g učinkovine Kontaktni čas: 30 s Uporaba 7.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: Uporaba 7.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) Uporaba 7.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok z dezinfekcijo (vključno z virucidnim delovanjem z omejenim spektrom): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali z 2–4 potegi odmerne črpalke odmerite majhno količino, 5 ml, v pokrčeno dlan. Roke in podlakti drgnite vsaj 45 sekund. Ta korak (zlivanje, vtiranje) ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega proizvoda za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba 8 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 8.1: (poklicna, industrijska): proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo, kot so bolnišnice (vključno z enotami intenzivne terapije, pediatričnimi oddelki), zdravniške ali zobozdravniške ordinacije, v kozmetičnih studiih, pri oskrbi starejših in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji. Uporaba 8.2: (poklicna): proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 8.1: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 8.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 8.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 8.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)

Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok z dezinfekcijo (vključno z virucidnim delovanjem z omejenim spektrom): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Drgnite vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega proizvoda za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;

* trgovsko ime biocidnega proizvoda;

* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;

* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;

* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba 9 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik – bakterije, kvasovke – vlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam in kvasovkam: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke ter natrite roke in podlakti. Drgnite vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega proizvoda za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev.

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba 10 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik – bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 10.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih) Uporaba 10.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s kirurškim umivanjem rok za dezinfekcijo rok v medicinskih prostorih, kot so bolnišnice (vključno z enotami intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnimi oddelki), zdravniške ali zobozdravniške ordinacije
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 10.1: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 10.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 10.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 10.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok z dezinfekcijo (vključno z virucidnim delovanjem z omejenim spektrom): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Drgnite vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega proizvoda za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 1

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Če se pojavijo simptomi, pokličite 112. Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov“: Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 1

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	desmanol® pure	Področje trženja: EU
	Septoderm® liquid	Področje trženja: EU
	Wrights alcohol hand rub	Področje trženja: EU
	Rely alcohol hand rub	Področje trženja: EU
	HS Handisinfec-tion liquid	Področje trženja: EU
	Profect Hand disinfection liquid	Področje trženja: EU
	desmanol® hand disinfection	Področje trženja: EU
	sensiva® hand disinfection liquid	Področje trženja: EU
	desmanol® N hand disinfection	Področje trženja: EU
	unodent hand disinfection	Področje trženja: EU
	eurosept hand disinfection	Področje trženja: EU
	Innocid Händedesin-fektion	Področje trženja: EU
	desmanol® pure pro	Področje trženja: EU
	desmanol® pure expert	Področje trženja: EU
	desmanol® pure clever	Področje trženja: EU

	desmanol® pure universal	Področje trženja: EU
	desmanol® pure pocket	Področje trženja: EU
	desmanol® pure client	Področje trženja: EU
	microshield® hand rub	Področje trženja: EU
	microshield® pure	Področje trženja: EU
	Halasept 792	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0033833-0001 1-1	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-tetradekanol	Tetradekan-1-ol	Neaktivna snov	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

POGLAVJE 1. META SPC 2 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 2 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC2

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-2

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 2

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 2**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75–75 % (m/m)
1-tetradekanol	Tetradekan-1-ol	Neaktivna snov	112-72-1	204-000-3	0,25 × 0,5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 2**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 2

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 11 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: Vlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje v kopalnici/kuhinji.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 12 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: Vlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 13 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Proizvod nanesite samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Vlijte majhno količino, 5 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

Plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 14 Higiensko umivanje rok - industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov

	IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Proizvod nanesite samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: Vlijte manjšo količino, 3 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: Po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številka dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

Plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba 15 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovito proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje v kopalnici/kuhinji.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba 16 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih).
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba 17 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Opis področja uporabe: #Uporaba 17.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji Uporaba 17.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s kirurškim umivanjem rok za dezinfekcijo rok v medicinskih prostorih, kot so bolnišnice (vključno z enotami intenzivne terapije/ intenzivne terapije, pediatričnimi oddelki), zdravniške ali zobozdravniške ordinacije
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 17.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 17.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 17.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 17.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)

Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok: učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok: zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: Po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številka dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba 18 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 18.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji. Uporaba 18.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 18.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 18.2: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 18.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 18.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok: učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok: zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega proizvoda za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba 19 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik – bakterije, kvasovke – zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)

Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam in kvasovkam: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega proizvoda za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba 20 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 20.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih) Uporaba 20.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 20.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 20.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi

	Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 20.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 20.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok: učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte 3 ml proizvoda v dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok: zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega proizvoda za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.11. **Opis uporabe**

Tabela 11.

Uporaba 21 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v gospodinjstvih (v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.11.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.11.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

Izogibajte se dezinfekciji v prisotnosti otrok, starih <6 let.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.11.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.11.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.11.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.12. **Opis uporabe**

Tabela 12.

Uporaba 22 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih zdravstvenega varstva, kot so zdravniške ordinacije (samo v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.12.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali odmerite majhno količino v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.12.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.12.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.12.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.12.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.13. **Opis uporabe**

Tabela 13.

Uporaba #23 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih zdravstvenega varstva, kot so zdravniške ordinacije (samo v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)

Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.13.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.13.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.13.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.13.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.13.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.14. **Opis uporabe**

Tabela 14.

Uporaba 24 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih zdravstvenega varstva, kot so zdravniške ordinacije (samo v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.14.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.14.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.14.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.14.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.14.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 2

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: sperite z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta.

Če se pojavijo simptomi, pokličite 112.

Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov“: Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 2

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	desmanol® pure gel	Področje trženja: EU
	Septoderm® IPA gel	Področje trženja: EU
	Wrights alcohol hand gel	Področje trženja: EU
	Rely alcohol hand gel	Področje trženja: EU
	HS Hand disinfection gel	Področje trženja: EU
	Profect Hand disinfection gel	Področje trženja: EU
	sensiva® hand gel	Področje trženja: EU
	desmanol® N gel	Področje trženja: EU

	unodent hand gel	Področje trženja: EU
	eurosept gel	Področje trženja: EU
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel pro	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel expert	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel clever	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel universal	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel pocket	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel client	Področje trženja: EU
	microshield® gel	Področje trženja: EU
	microshield® pure gel	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0033833-0002 1-2	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-tetradekanol	Tetradekan-1-ol	Neaktivna snov	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

POGLAVJE 1. META SPC 3 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 3 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC3

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-3

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 3

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 3**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75–75 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 3**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 3

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

	P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 25 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 26 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 27 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega proizvoda za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 28 Higiensko umivanje rok - industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba 29 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov

	Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba 30 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

Plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba 31 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 31.1: (poklicna, industrijska): proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih) in na industrijskih področjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji Uporaba 31.2: (poklicna): proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 31.1: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 31.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 31.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 31.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok (vključno protivirusnim delovanjem (omejen spekter virucidnega delovanja)): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega proizvoda za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba 32 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 32.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji. Uporaba 32.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s kirurškim umivanjem rok za dezinfekcijo rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnici, enoti intenzivne terapije/intenzivne terapije, na pediatričnih oddelkih, v zdravstvenih ordinacijah).
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 32.1: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 32.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 32.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 32.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok (vključno protivirusnim delovanjem (omejen spekter virucidnega delovanja)): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega proizvoda za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba 33 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam in kvasovkam: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba 34 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 34.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih). Uporaba 34.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s kirurškim umivanjem rok za dezinfekcijo rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnici, enoti intenzivne terapije/intenzivne terapije, na pediatričnih oddelkih, v zdravstvenih ordinacijah).

Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 34.1: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 34.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 34.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 34.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok (vključno protivirusnim delovanjem (omejen spekter virucidnega delovanja)): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 3

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: sperite z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Če se pojavijo simptomi, pokličite 112. Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov“: Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 3

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime			desmanol® pure light	Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja			EU-0033833-0003 1-3		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

POGLAVJE 1. META SPC 4 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 4 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC4

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-4

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 4

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 4**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75–75 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 4**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 4

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 35 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni).
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 36 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 37 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 38 Higiensko umivanje rok - industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov

	IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba 39 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba 40 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba 41 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 41.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih področjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji Uporaba 41.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 41.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 41.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 41.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 41.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)

Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok: zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: Po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;

* trgovsko ime biocidnega proizvoda;

* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;

* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;

* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba 42 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 42.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih področjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji Uporaba 42.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 42.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 42.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 42.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 42.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Proizvod nanesite samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico): Vlijte manjšo količino, 3 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Drgnite vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok: Vlijte majhno količino, 5 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Drgnite vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: Po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številka dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

Plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba 43 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)

Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam in kvasovkam: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Vlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba 44 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 44.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih) Uporaba 44.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 44.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g učinkovine.

	Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 44.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 44.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 44.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok: zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.11. **Opis uporabe**

Tabela 11.

Uporaba 45 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v gospodinjstvih (npr. v primeru bolezni/ poseben primer: konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.11.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Vlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Drgnite vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.11.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

Izogibajte se razkuževanju v prisotnosti otrok, starih <6 let.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.11.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.11.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.11.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.12. **Opis uporabe**

Tabela 12.

Uporaba 46 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih zdravstvenega varstva, kot so zdravniške ordinacije (samo v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.12.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.12.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.12.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.12.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.12.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.13. **Opis uporabe**

Tabela 13.

Uporaba 47 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih zdravstvenega varstva, kot so zdravniške ordinacije (samo v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis:
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.13.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.13.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.13.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.13.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.13.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.14. **Opis uporabe**

Tabela 14.

Uporaba 48 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v gospodinjstvih (npr. v primeru bolezni/ poseben primer: konjunktivitis).
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.14.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.14.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

Izogibajte se dezinfekciji v prisotnosti otrok, starih <6 let..

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.14.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.14.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.14.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 4

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: sperite z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Če se pojavijo simptomi, pokličite 112. Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov": Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 4

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	desmanol® pure light gel	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0033833-0004 1-4	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

POGLAVJE 1. META SPC 5 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 5 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC5

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-5

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 5

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 5**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	63,1–63,1 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 5**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 5

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 49 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 50 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice

	Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 51 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice

	Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 2,76 g aktivne snovi Čas stika 180 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 90 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 52 Higiensko umivanje rok - industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice

	Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Čas stika 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba 53 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice

	Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Čas stika 30 s. Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Čas stika 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba 54 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: Vlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g učinkovine Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g učinkovine Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: Po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Proizvod nanesite samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok: Vlijte manjšo količino, 3 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Drgnite vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

Plastenka (HDPE): 36 mesecev

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba 55 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 55.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji. Uporaba 55.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 55.1: baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 55.2: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 180 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 55.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 55.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok:

Vlijte majhno količino, 5 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Drgnite vsaj 90 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: Po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številka dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba 56 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice

	Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 56.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji. Uporaba 56.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 56.1: baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 56.2: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 180 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 56.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 56.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov

	IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok:

Vlijte majhno količino, 5 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Drgnite vsaj 90 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: Po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številka dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba 57 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik – bakterije, kvasovke, glive – zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericid, sredstvo proti kvasovkam, fungicid: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 180 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov

	Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 90 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba 58 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik – bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice

	Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 58.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih) Uporaba 58.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 58.1: baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 58.2: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 180 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 58.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 58.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE

	Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok:

zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 90 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (HDPE), kanister (HDPE), sod (HDPE), IBC (HDPE z jeklenim ogrodjem): 36 mesecev

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 5

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: sperite z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Če se pojavijo simptomi, pokličite 112. Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov“: Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 5

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Septo-derm® soft	Področje trženja: EU
	septosoft	Področje trženja: EU
	pluradent hand disinfec-tion	Področje trženja: EU
	Dezosept	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0033833-0005 1-5	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)

POGLAVJE 1. META SPC 6 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 6 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC6

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-6

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 6

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 6**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	63,14–63,14 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 6**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 6

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. EUH208: Vsebuje Izoeugenol. Lahko povzroči alergijski odziv.
Previdnostni stavki	P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 59 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, bakterijam tuberkuloze in virusom z ovojnico: 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 125, 500 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: pokrovček: z zaskočnim pokrovčkom: PP ali črpalka: kompleksen sistem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerjaveče jeklo) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), LDPE, PE-LD (polietilen nizke gostote), EVA (etilena vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml,proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti: 36 mesecev

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 60 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)

Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, bakterijam tuberkuloze in virusom z ovojnico: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 125, 500 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: pokrovček: z zaskočnim pokrovčkom: PP ali črpalka: kompleksen sistem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerjaveče jeklo) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), LDPE, PE-LD (polietilen nizke gostote), EVA (etilena vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Vlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 30 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti: 36 mesecev

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 61 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 61.1: Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih) Uporaba 61.2: Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 61.1: proti bakterijam, kvasovkam, bakterijam tuberkuloze in virusom z ovojnico: 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 61.2: Proti bakterijam, kvasovkam, bakterijam tuberkuloze in virusom z ovojnico: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 61.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 61.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 125, 500 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: pokrovček: z zaskočnim pokrovčkom: PP ali črpalka: kompleksen sistem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerjaveče jeklo) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), LDPE, PE-LD (polietilen nizke gostote), EVA (etilena vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok: zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok: poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 30 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti: 36 mesecev

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 62 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam in kvasovkam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 125, 500 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: pokrovček: z zaskočnim pokrovčkom: PP ali črpalka: kompleksen sistem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerjaveče jeklo) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), LDPE, PE-LD (polietilen nizke gostote), EVA (etilena vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat)

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 30 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti: 36 mesecev

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 6

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: sperite z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Če se pojavijo simptomi, pokličite 112. Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov“: Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 6

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime		AntiLy1	Področje trženja: EU		
Številka dovoljenja		EU-0033833-0006 1-6			
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)

POGLAVJE 1. META SPC 7 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 7 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC7

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-7

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 7

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 7**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	63,14–63,14 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 7**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 7

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 63 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, bakterijam tuberkuloze in virusom z ovojnico: 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 125, 500 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: pokrovček: z zaskočnim pokrovčkom: PP ali črpalka: kompleksen sistem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerjaveče jeklo) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), LDPE, PE-LD (polietilen nizke gostote), EVA (etilena vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti: 36 mesecev

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 64 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)

Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, bakterijam tuberkuloze in virusom z ovojnico: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 125, 500 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: pokrovček: z zaskočnim pokrovčkom: PP ali črpalka: kompleksen sistem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerjaveče jeklo) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), LDPE, PE-LD (polietilen nizke gostote), EVA (etilena vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 30 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti: 36 mesecev

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 65 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 65.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih) Uporaba 65.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 65.1: proti bakterijam, kvasovkam, bakterijam tuberkuloze in virusom z ovojnico: 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 65.2: proti bakterijam, kvasovkam, bakterijam tuberkuloze in virusom z ovojnico: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 65.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 65.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 125, 500 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: pokrovček: z zaskočnim pokrovčkom: PP ali črpalka: kompleksen sistem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerjaveče jeklo) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), LDPE, PE-LD (polietilen nizke gostote), EVA (etilena vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok: zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok: poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Vlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 30 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

5–30 l kanister, 220 l sod, 1 000 l posoda: po potrebi ponovno napolnite ali prenesite v druge posode/pripomočke.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

Vsi materiali morajo biti popolnoma združljivi s proizvodom. Dozirnik ali posoda, ki se ponovno napolni, mora na oznaki vsebovati naslednje minimalne podatke:

* številko dovoljenja;
* trgovsko ime biocidnega proizvoda;
* identiteto in vsebnost vsake aktivne sestavine;
* navodila za uporabo, vključno s časom, ki je potreben za biocidno delovanje;
* informacije v skladu z uredbo CLP.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti: 36 mesecev

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 66 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke - zlivanje ali črpanje – v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnici, enoti intenzivne terapije/intenzivne terapije, na pediatričnih oddelkih, v zdravstvenih ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam in kvasovkam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 125, 500 1 000 ml Embalaža: HDPE Zapiranje: pokrovček: z zaskočnim pokrovčkom: PP ali črpalka: kompleksen sistem (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerjaveče jeklo) Kanister: 5, 10, 20, 30 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov Sod: 220 l Embalaža: HDPE Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov IBC: 1 000 l Embalaža: HDPE z jeklenim ogrodjem Zapiranje: HDPE, LDPE, PP ali kombinacija teh materialov

	Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), LDPE, PE-LD (polietilen nizke gostote), EVA (etilena vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat)

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 30 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti: 36 mesecev

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 7

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: sperite z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Če se pojavijo simptomi, pokličite 112. Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov“: Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 7

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime			AntiLy2		Področje trženja: EU
Številka dovoljenja			EU-0033833-0007 1-7		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)

POGLAVJE 1. META SPC 8 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 8 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC8

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-8

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 8

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 8**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75–75 % (m/m)
1-tetradekanol	Tetradekan-1-ol	Neaktivna snov	112-72-1	204-000-3	0,25–0,5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 8**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 8

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 67 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov

	Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti: plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 68 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 69 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali odmerite majhno količino, 5 ml, v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke. Roke in podlakti drgnite vsaj 45 sekund. Ponovite korak (zlivanje, vtiranje) Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 70 Higiensko umivanje rok - industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba 71 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba 72 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba 73 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 73.1: (poklicna, industrijska): proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih področjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji Uporaba 73.2: (poklicna): proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s kirurškim umivanjem rok za dezinfekcijo rok v medicinskih prostorih, kot so bolnišnice (vključno z enotami intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnimi oddelki), zdravniške ali zobozdravniške ordinacije
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 73.1: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 73.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Pogostost: uporaba 73.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 73.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 73.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 73.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga manjšo količino, 3 ml, odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok (vključno protivirusnim delovanjem (omejen spekter virucidnega delovanja)): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali z 2–4 potegi odmerne črpalke odmerite majhno količino, 5 ml, v pokrčeno dlan. Roke in podlakti drgnite vsaj 45 sekund. Ta korak (zlivanje, vtiranje) ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba 74 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 74.1: (poklicna, industrijska): proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo, kot so bolnišnice (vključno z enotami intenzivne terapije, pediatričnimi oddelki), zdravniške ali zobozdravniške ordinacije, v kozmetičnih studiih, pri oskrbi starejših in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji. Uporaba 74.2: (poklicna): proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 74.1: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 74.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 74.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 74.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)

Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok (vključno protivirusnim delovanjem (omejen spekter virucidnega delovanja)): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba 75 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam in kvasovkam: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba 76 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 76.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih) Uporaba 76.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s kirurškim umivanjem rok za dezinfekcijo rok v medicinskih prostorih, kot so bolnišnice (vključno z enotami intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnimi oddelki), zdravniške ali zobozdravniške ordinacije
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: ---
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 76.1: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 76.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 76.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 76.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok (vključno protivirusnim delovanjem (omejen spekter virucidnega delovanja)): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Prepričajte se, da so dlani in podlakti ves čas nanašanja navlažene s proizvodom.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 8

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: sperite z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Če se pojavijo simptomi, pokličite 112. Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov“: Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 8

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	desmanol® pure	Področje trženja: EU
	Septoderm® liquid	Področje trženja: EU
	Wrights alcohol hand rub	Področje trženja: EU
	Rely alcohol hand rub	Področje trženja: EU
	HS Handisinfec-tion liquid	Področje trženja: EU
	Profect Hand disinfection liquid	Področje trženja: EU
	desmanol® hand disinfection	Področje trženja: EU
	sensiva® hand disinfection liquid	Področje trženja: EU
	desmanol® N hand disinfection	Področje trženja: EU
	unodent hand disinfection	Področje trženja: EU

	eurosept hand disinfection	Področje trženja: EU
	Innocid Händedesin-fektion	Področje trženja: EU
	desmanol® pure pro	Področje trženja: EU
	desmanol® pure expert	Področje trženja: EU
	desmanol® pure clever	Področje trženja: EU
	desmanol® pure universal	Področje trženja: EU
	desmanol® pure pocket	Področje trženja: EU
	desmanol® pure client	Področje trženja: EU
	microshield® hand rub	Področje trženja: EU
	microshield® pure	Področje trženja: EU
	Halasept 792	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja		EU-0033833-0008 1-8

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-tetradekanol	Tetradekan-1-ol	Neaktivna snov	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

POGLAVJE 1. META SPC 9 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 9 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC9

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-9

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 9

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 9**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75–75 % (m/m)
1-tetradekanol	Tetradekan-1-ol	Neaktivna snov	112-72-1	204-000-3	0,25–0,5 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 9**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 9

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

	P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 77 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)

Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 78 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov

	Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 79 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 80 Higiensko umivanje rok - industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba 81 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov

	Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba 82 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih).
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba 83 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih #Uporaba 83.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji

	#Uporaba 83.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s kirurškim umivanjem rok za dezinfekcijo rok v medicinskih prostorih, kot so bolnišnice (vključno z enotami intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnimi oddelki), zdravniške ali zobozdravniške ordinacije
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: #Uporaba 83.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) #Uporaba 83.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 83.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 83.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok: učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok: zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba 84 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 84.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji. Uporaba 84.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)

Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 84.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi. Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 84.2: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 84.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 84.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico):

zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok:

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

--

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba 85 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam in kvasovkam: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Proizvod nanesite samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Vlijte majhno količino, 5 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Drgnite vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

Plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba 86 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 86.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih) Uporaba 86.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 86.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 86.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 86.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 86.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Proizvod nanesite samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico):

Vlijte manjšo količino, 3 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke. Drgnite vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno delovanje ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok:

Vlijte majhno količino, 5 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Drgnite vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

Plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.11. **Opis uporabe**

Tabela 11.

Uporaba 87 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v gospodinjstvih (v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.11.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.11.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

Izogibajte se razkuževanju v prisotnosti otrok, starih <6 let.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.11.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.11.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.11.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.12. **Opis uporabe**

Tabela 12.

Uporaba 88 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih zdravstvenega varstva, kot so zdravniške ordinacije (samo v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.12.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

4.12.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.12.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.12.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.12.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.13. **Opis uporabe**

Tabela 13.

Uporaba 89 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih zdravstvenega varstva, kot so zdravniške ordinacije (samo v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.13.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Vlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.13.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.13.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.13.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.13.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.14. **Opis uporabe**

Tabela 14.

Uporaba 90 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih zdravstvenega varstva, kot so zdravniške ordinacije (samo v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)

Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.14.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

4.14.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.14.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.14.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.14.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 9

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: sperite z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Če se pojavijo simptomi, pokličite 112. Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov“: Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 9

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	desmanol® pure gel	Področje trženja: EU
	Septoderm® IPA gel	Področje trženja: EU
	Wrights alcohol hand gel	Področje trženja: EU

	Rely alcohol hand gel	Področje trženja: EU
	HS Hand disinfection gel	Področje trženja: EU
	Profect Hand disinfection gel	Področje trženja: EU
	sensiva® hand gel	Področje trženja: EU
	desmanol® N gel	Področje trženja: EU
	unodent hand gel	Področje trženja: EU
	eurosept gel	Področje trženja: EU
	Innocid Händedesin-fektions-Gel	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel pro	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel expert	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel clever	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel universal	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel pocket	Področje trženja: EU
	desmanol® pure gel client	Področje trženja: EU
	microshield® gel	Področje trženja: EU
	microshield® pure gel	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0033833-0009 1-9	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-tetradekanol	Tetradekan-1-ol	Neaktivna snov	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

POGLAVJE 1. META SPC 10 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 10 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC10

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-10

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 10

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 10**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75–75 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 10**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 10

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 91 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)

Način(-i) uporabe	Metoda: Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 92 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 93 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in z omejenim spektrom virucidnega delovanja: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov

	Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 94 Higiensko umivanje rok - industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba 95 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba 96 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico): zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba 97 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 97.1: (poklicna, industrijska): proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih področjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji Uporaba 97.2: (poklicna): proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 97.1: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 97.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 97.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 97.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico):

Vlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok (vključno protivirusnim delovanjem (omejen spekter virucidnega delovanja)): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba 98 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 98.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji. Uporaba 98.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnici, enoti intenzivne terapije/intenzivne terapije, na pediatričnih oddelkih, v zdravstvenih ordinacijah).
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 98.1: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Uporaba 98.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 98.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 98.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico):

zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok (vključno protivirusnim delovanjem (omejen spekter virucidnega delovanja)): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba 99 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)

Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam in kvasovkam: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba 100 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 100.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih). Uporaba 100.2: Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnici, enoti intenzivne terapije/intenzivne terapije, na pediatričnih oddelkih, v zdravstvenih ordinacijah).
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 100.1: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s

	Uporaba 100.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam, virusom z ovojnico in virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 100.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 100.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (vključno z delovanjem proti virusom z ovojnico):

Vlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte jih vsaj 30 sekund.

Kirurško umivanje rok (vključno protivirusnim delovanjem (omejen spekter virucidnega delovanja)): zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 10

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: sperite z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Če se pojavijo simptomi, pokličite 112. Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov“: Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 10

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime			desmanol ® pure light	Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja			EU-0033833-0010 1-10		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

POGLAVJE 1. META SPC 11 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 11 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC11

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-11

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 11

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 11**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75–75 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 11**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 11

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 101 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice

	Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni).
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga s črpalko odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 102 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 103 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 104 Higiensko umivanje rok - industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba 105 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba 106 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba 107 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 107.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih področjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji Uporaba 107.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 107.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 107.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 107.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 107.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico):

Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok:

zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba 108 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 108.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih področjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji Uporaba 108.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 108.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi. Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 108.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 108.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 108.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico):

zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok:

zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba 109 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti bakterijam in kvasovkam: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali z 2–4 potegi odmerne črpalke odmerite majhno količino proizvoda v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba 110 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, mikobakterije, virusi z ovojnico - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Mikobakterije Splošno ime: mikrobakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 110.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih) Uporaba 110.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 110.1: proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Proti mikobakterijam: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,9 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 110.2: proti bakterijam, kvasovkam, mikobakterijam in virusom z ovojnico: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 90 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 110.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 110.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico):

zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno mikobaktericidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok:

zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 45 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.11. **Opis uporabe**

Tabela 11.

Uporaba 111 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v gospodinjstvih (npr. v primeru bolezni/ poseben primer: konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.11.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.11.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

Izogibajte se razkuževanju v prisotnosti otrok, starih <6 let.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.11.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.11.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.11.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.12. **Opis uporabe**

Tabela 12.

Uporaba 112 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih zdravstvenega varstva, kot so zdravniške ordinacije (samo v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov

	Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.12.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.12.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.12.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.12.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

--

4.12.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.13. **Opis uporabe**

Tabela 13.

Uporaba 113 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih zdravstvenega varstva, kot so zdravniške ordinacije (samo v posebnih primerih, npr. konjunktivitis)

Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.13.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

4.13.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.13.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.13.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.13.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.14. **Opis uporabe**

Tabela 14.

Uporaba 114 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju. (npr. pri boleznih/ posebnem primeru: konjunktivitis)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Proti virusom (omejen spekter virucidnega delovanja): 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 3,16 g aktivne snovi Kontaktni čas: 120 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov

	Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.14.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan in natrite roke. Vtirajte vsaj 60 sekund. Ta korak ponovite še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.14.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

Izogibajte se razkuževanju v prisotnosti otrok, starih <6 let.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.14.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.14.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.14.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 11

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: sperite z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Če se pojavijo simptomi, pokličite 112. Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov“: Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 11

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime			desmanol ® pure light gel	Področje trženja: EU	
Številka dovoljenja			EU-0033833-0011 1-11		
Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)

POGLAVJE 1. META SPC 12 UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. **Identifikator 12 meta SPC**

Identifikator	desmanol pure meta SPC12

1.2. **Pripona k številki dovoljenja**

Številka	1-12

1.3. **Vrsta(-e) proizvoda(-ov)**

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena

POGLAVJE 2. SESTAVA META SPC 12

2.1. **Kvalitativne in kvantitativne informacije o sestavi meta SPC 12**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	63,1–63,1 % (m/m)

2.2. **Vrsta(-e) formulacije meta SPC 12**

Vrsta(-e) formulacije	AL Druge tekočine

POGLAVJE 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI ZA META SPC 12

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261: Ne vdihavati hlapov. P261: Ne vdihavati razpršila. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. P312: Ob slabem počutju pokličite zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,: poiščite zdravniško pomoč. P403 + P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. P501: Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

POGLAVJE 4. DOVOLJENE UPORABE META SPC

4.1. **Opis uporabe**

Tabela 1.

Uporaba 115 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnico:

zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.2. **Opis uporabe**

Tabela 2.

Uporaba 116 Higiensko umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (virucidno delovanje z omejenim spektrom) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak

Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Proizvod nanesite samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnico: Vlijte manjšo količino, 3 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Drgnite vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

Plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.3. **Opis uporabe**

Tabela 3.

Uporaba 117 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 180 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 90 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.4. **Opis uporabe**

Tabela 4.

Uporaba 118 Higiensko umivanje rok - industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Čas stika 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov

	Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnico: zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.5. **Opis uporabe**

Tabela 5.

Uporaba 119 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice

	Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s higienskim umivanjem rok v zasebnem prostoru/ zdravstveni oskrbi v domačem okolju (npr. v primeru bolezni)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Čas stika 30 s. Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Čas stika 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.5.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnicami):

Zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.5.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med uporabo proizvoda in po njej zagotovite ustrezno prezračevanje, tako da odprete okna ali vklopite mehansko prezračevanje na območju kopalnice/kuhinje.

Ne uporabljajte v bližini domačih živali.

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

Uporaba je omejena samo na odrasle.

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

4.6. **Opis uporabe**

Tabela 6.

Uporaba 120 Higiensko umivanje rok - nepoklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: po potrebi (običajno 3 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.6.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok:

zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Proizvod je omejen na uporabo samo pri odraslih.

4.6.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

V primeru izsušitve kože uporabite ustrezen losjon za nego kože.

4.6.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.6.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.6.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE) in vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.7. **Opis uporabe**

Tabela 7.

Uporaba 121 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 121.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji. Uporaba 121.2: proizvod, pripravljen za uporabo za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 121.1: baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 121.2: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 180 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 121.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 121.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.7.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok:

zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok:

zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 90 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.7.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.7.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.7.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.7.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.8. **Opis uporabe**

Tabela 8.

Uporaba 122 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni, industrijski uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice

	Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 122.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih), in na industrijskih območjih, npr. v farmacevtski ali živilski industriji. Uporaba 122.2: proizvod, pripravljen za uporabo za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 122.1: baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 122.2: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 180 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 122.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 122.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.8.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Proizvod nanesite samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnicami):

Vlijte manjšo količino, 3 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Drgnite vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok:

Vlijte majhno količino, 5 ml, proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke v dlan ter natrite roke in podlakti. Drgnite vsaj 90 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.8.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.8.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.8.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.8.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

Plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.9. **Opis uporabe**

Tabela 9.

Uporaba 123 Kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Proizvod pripravljen za uporabo za kirurško razkuževanje rok v zdravstvenih ustanovah (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: Vlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Baktericid, sredstvo proti kvasovkam, fungicid: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 2,76 g učinkovine Kontaktni čas: 180 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: Po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.9.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 90 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.9.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.9.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.9.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.9.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

4.10. **Opis uporabe**

Tabela 10.

Uporaba 124 Higiensko/kirurško umivanje rok - poklicni uporabnik - bakterije, kvasovke, glive, bakterije tuberkuloze, virusi z ovojnico, virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) - zlivanje ali črpanje - v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 01 (PT01): Človekova osebna higiena
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ne zadeva
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: bakterije Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Glive Splošno ime: glive Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Bakterije tuberkuloze Splošno ime: bakterije tuberkuloze Razvojna faza: vegetativne celice Znanstveno ime: Virusi z ovojnico Splošno ime: virusi z ovojnico Razvojna faza: se ne uporablja Znanstveno ime: Virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Splošno ime: virusi (omejen spekter virucidnega delovanja) Razvojna faza: se ne uporablja

Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Uporaba 124.1: proizvod, pripravljen za uporabo, za dezinfekcijo s higienskim umivanjem rok na območjih, povezanih z zdravstveno oskrbo (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah, pri oskrbi starejših, v kozmetičnih studiih) Uporaba 124.2: proizvod, pripravljen za uporabo, za razkuževanje s kirurškim umivanjem rok za razkuževanje rok v zdravstvenih prostorih (npr. v bolnišnicah, enotah intenzivne terapije/intenzivne terapije, pediatričnih oddelkih, zdravniških ordinacijah)
Način(-i) uporabe	Metoda: zlivanje ali črpanje (specifikacija dozirnika: kapljična črpalka/izhod: kapljanje) Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Uporaba 124.1: baktericidno delovanje, delovanje proti kvasovkam in virucidno delovanje proti virusom z ovojnico: 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 30 s Virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidna in tuberkulocidna učinkovitost: 2 × 3 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 1,65 g aktivne snovi Kontaktni čas: 60 s (skupaj) Uporaba 124.2: 2 × 5 ml na dezinfekcijo, kar ustreza 2 × 2,76 g aktivne snovi Kontaktni čas: 180 s (skupaj) Število in časovni razpored uporabe: Pogostost: uporaba 124.1: po potrebi (običajno 25 nanosov na dan) uporaba 124.2: po potrebi (običajno 4 nanosi na dan)
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastenka: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov vreča/vrečka: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Embalaža: PET/ALU/PE, PET/PE ali PET-SiO/PE Zapiranje: PP, PC, PE, HDPE, LDPE ali kombinacija teh materialov ; Črpalka: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, nerjaveče jeklo, silikon, silikagel, NBR, TPE, steklo ali kombinacija teh materialov Okrajšave: HDPE (polietilen visoke gostote), PP (polipropilen), PC (polikarbonat), PE (polietilen), LDPE (polietilen nizke gostote), EVA (etilen vinil acetat), POM (polioksimetilen), PBT (polibutilen tereftalat), PET (polietilen tereftalat), NBR (nitril butadienska guma), TPE (termoplastični elastomer), ALU (aluminij)

4.10.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Proizvod je pripravljen za uporabo. Nanesite ga samo na nepoškodovano površino človeške kože. Pred uporabo proizvoda si umijte in osušite roke.

Higiensko umivanje rok (učinkovitost proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnicami):

zlijte manjšo količino, 3 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali pa ga odmerite v dlan z 1–2 potegoma odmerne črpalke in natrite roke. Vtirajte vsaj 30 sekund. Za dodatno virucidno delovanje z omejenim spektrom, fungicidno in tuberkulocidno učinkovitost ponovite ta korak še enkrat.

Kirurško umivanje rok:

zlijte majhno količino, 5 ml proizvoda v pokrčeno dlan ali ga odmerite v dlan z 2–4 potegi odmerne črpalke ter natrite roke in podlakti. Vtirajte vsaj 90 sekund. Ta korak ponovite še enkrat. Poskrbite, da bodo vaše roke in podlakti ves čas nanašanja vlažne.

Prelivanje/ponovno polnjenje biocidnega pripravka za kirurško umivanje rok se sme izvajati le v aseptičnih pogojih.

4.10.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

4.10.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja*

4.10.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

4.10.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Hraniti v tesno zaprti posodi. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

Shranjujte pri sobni temperaturi v originalni embalaži.

Rok uporabnosti:

plastenka (PE), vreča/vrečka (PE): 6 dni

POGLAVJE 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO META SPC 12

5.1. **Navodila za uporabo**

Tehnika uporabe:

Korak 1: nanesite razkužilo in ga vtrite v dlan. Drgnite dlan ob dlan, da razkužilo razporedite po celotni dlani in prstih.

Korak 2: z dlanjo desne roke podrgnite hrbtno stran leve roke. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 3: razprite prste in podrgnite predele med prsti. Ukrep obrnite in ga ponovite.

Korak 4: s prepletenimi prsti drgnite dlan ob dlan (5-krat).

Korak 5: z vrtečim gibom podrgnite palec vsake roke.

Korak 6: s krožnimi gibi drgnite konice prstov ob nasprotno dlan. Z obema rokama drgnite zapestje. Počakajte, da se roke popolnoma posušijo.

Proizvoda ne uporabljajte skupaj z drugimi proizvodi.

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa navodila.

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih živali.

Izogibajte se stiku z očmi.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

Prepričajte se, da se je uporabljeni proizvod popolnoma posušil, preden vstopite v sobo ali prostor, kjer se bodo dlje časa zadrževali ljudje.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

Podrobnosti o verjetnih neposrednih ali posrednih učinkih:

Brez.

Navodila za prvo pomoč:

Splošni podatki

Osebe odpeljite na varen kraj. Pri prvi pomoči upoštevajte samozaščito. Takoj slecite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

PRI STIKU S KOŽO: če pride do draženja, umijte z vodo, posvetujte se z zdravnikom. V primeru nenamerne izpostavljenosti kože: sperite z vodo.

PRI STIKU Z OČMI: izperite z vodo. Previdno odstranite kontaktne leče. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI VDIHAVANJU: umaknite se na svež zrak in počivajte v položaju, udobnem za dihanje. Posvetujte se z zdravnikom.

PRI ZAUŽITJU: izperite usta. Če se pojavijo simptomi, pokličite 112. Če nimate simptomov, se posvetujte z zdravnikom. Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika: zagotovite življenjske funkcije, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi lahko vključujejo zbadanje, solzenje, rdečico, zatekanje in zamegljen vid. Hlapi imajo narkotični učinek in lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost, kašelj, zadihanost.

Nujni ukrepi za zaščito okolja:

Preprečite razlitje koncentratov v tla, površinske vode ali podtalnico, npr. prek zbiralnikov

Iztekajoči proizvod zbirajte s primernim materialom (npr. zemlja, pesek, diatomejska zemlja, vermikulit, univerzalna vezivna sredstva).

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Ob morebitnem onesnaženju tal ali vodnih teles obvestite pristojne organe.

Pazite na nevarnost eksplozije.

Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh ter se zbirajo v nizkih ali zaprtih prostorih (kanalizacija, kleti, rezervoarji).

Uporabljajte orodje, ki se ne iskri, in opremo, odporno proti eksploziji.

Sprejmite previdnostne ukrepe proti statični razelektritvi.

Zagotovite električno neprekinjenost s povezovanjem in ozemljitvijo vse opreme.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Ostanke proizvoda je treba zbrati in odstraniti v skladu z nacionalno zakonodajo o odstranjevanju odpadkov in morebitnimi zahtevami regionalnih in/ali lokalnih organov.

Preprečite (neposredno) izlitje (nerazredčenega proizvoda) v okolje/kanalizacijo.

Ne praznite v odtoke.

Razlitje razredčite z vodo in pobrišite s krpo.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

POGLAVJE 6. DRUGE INFORMACIJE

Priporočilo za poklicno uporabo:

P280 Uporabljajte zaščito za oči.

Upoštevajte evropsko referenčno vrednost 129,2 mg/m³; za aktivno snov propan-2-ol (št. CAS: 67-63-0), ki je bila uporabljena za oceno tveganja družine biocidnih proizvodov.

V zvezi z opombo „Skupina(-e) uporabnikov“: Strokovnjaki (vključno z industrijskimi uporabniki) pomenijo usposobljene poklicne uporabnike, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

POGLAVJE 7. TRETJA RAVEN INFORMACIJ: POSAMEZNI PROIZVODI V META SPC 12

7.1. **Trgovsko(-a) ime(-na), številka avtorizacije in specifična sestava za vsak posamezni proizvod**

Trgovsko ime	Septoderm® soft	Področje trženja: EU
	septosoft	Področje trženja: EU
	pluradent hand disinfection	Področje trženja: EU
	Dezosept	Področje trženja: EU
Številka dovoljenja	EU-0033833-0012 1-12	

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Aktivna snov	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)