372L0180

Ἀριθ. N 108/8 Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων 8.5.72

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τῆς 14ης Ἀπριλίου 1972

περί καθορισμοῦ τῶν χαρακτηριστικῶν καί τῶν ἐλαχίστων προϋποθέσεων γιά τήν ἐξέταση ποικιλιῶν καλλιεργουμένων φυτικῶν εἰδῶν

(72/180/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος,

τήν ὁδηγία τοῦ Συμβουλίου τῆς 29ης Σεπτεμβρίου 1970([1]) περί κοινοῦ καταλόγου ποικιλιῶν καλλιεργουμένων φυτικῶν εἰδῶν, καί ἰδίως τό ἄρθρο 7 παράγραφος 2,

Ἐκτιμώντας:

ὅτι σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τῆς προαναφερθείσης ὁδηγίας, τά Κράτη μέλη πρέπει νά καταρτίσουν ἕναν ἤ περισσότερους καταλόγους τῶν ποικιλιῶν πού εἶναι ἐπισήμως ἀποδεκτές γιά τήν πιστοποίηση καί τήν ἐμπορία στό ἔδαφός τους·

ὅτι ἡ ἀποδοχή ποικιλιῶν ὑπόκειται σέ κοινοτικούς ὅρους, τῶν ὁποίων ὁ σεβασμός πρέπει νά ἐξασφαλίζεται μέ ἐπίσημες ἐξετάσεις καί ἰδίως μέ καλλιεργητικούς ἐλέγχους·

ὅτι οἱ ἐξετάσεις πρέπει νά καλύπτουν ἕναν ἱκανοποιητικό ἀριθμό χαρακτηριστικῶν πού νά ἐπιτρέπει τήν περιγραφή τῶν ποικιλιῶν·

ὅτι πρέπει νά καθορίζονται σέ κοινοτικό ἐπίπεδο τά χαρακτηριστικά πρίν ἀπό τήν ἐξέτασή τους·

ὅτι, ἄλλωστε, γιά τήν ἐκτέλεση τῶν ἐξετάσεων πρέπει νά καθορίζονται ἐλάχιστες προϋποθέσεις·

ὅτι αὐτά τά χαρακτηριστικά καί οἱ ἐλάχιστες προϋποθέσεις ἐξετάσεως πρέπει νά καθορίζονται ἔχοντας ὑπόψη τήν κατάσταση τῶν ἐπιστημονικῶν καί τεχνικῶν γνώσεων·

ὅτι τά μέτρα πού προβλέπονται στήν παρούσα ὁδηγία εἶναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τῆς Μονίμου Ἐπιτροπῆς Σπόρων πρός Σπορά καί Γεωργικῶν, Δενδροκηπευτικῶν καί Δασικῶν Φυτῶν πρός Φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Ἄρθρο 1

Τά Κράτη μέλη καθορίζουν ὅτι οἱ ἐπίσημες ἐξετάσεις πού διεξάγονται γιά τήν ἀποδοχή ποικιλιῶν καλλιεργουμένων φυτικῶν εἰδῶν καλύπτουν τουλάχιστον τά χαρακτηριστικά πού ἀπαριθμοῦνται στό παράρτημα I.

Τά Κράτη μέλη φροντίζουν ὥστε οἱ ἐλάχιστες προϋποθέσεις πού ἀπαριθμοῦνται στό παράρτημα II νά καλύπτονται ἀπό τήν ἐκτέλεση τῶν ἐξετάσεων.

Ἄρθρο 2

Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ἰσχύ, τό ἀργότερο τήν 1η Ἰουλίου 1972, τίς ἀπαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές ἤ διοικητικές διατάξεις γιά τή συμμόρφωση πρός τίς διατάξεις τῆς παρούσης ὁδηγίας. Πληροφοροῦν ἀμέσως περί αὐτοῦ τήν Ἐπιτροπή.

Ἄρθρο 3

Ἡ παρούσα ὁδηγία ἀπευθύνεται στά Κράτη μέλη.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 14 Ἀπριλίου 1972.

Γιά τήν Ἐπιτροπή

Ὁ Πρόεδρος

S. L. MANSHOLT

([1]) ΕΕ ἀριθ. N 225 τῆς 12.10.1970, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΡΟΣ Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ

Ὅλα τά χαρακτηριστικά πού ἀπαριθμοῦνται γιά τά διάφορα εἴδη ἰσχύουν γιά τήν ἐξέταση τῆς διακρίσεως καί τῆς σταθερότητος τῶν ποικιλιῶν. Τά κριτήρια πού θεσπίζονται γιά τήν ἐξέταση τῆς ὁμοιομορφίας δεικνύονται ὡς ἀκολούθως:

(H) γιά ὅλες τίς ποικιλίες ἑνός εἴδους,

(H_1) γιά τίς ποικιλίες ἐλευθέρας γονιμοποιήσεως, ἑνός εἴδους,

(H_2) γιά τίς καθαρές σειρές καί τά ἁπλά ὑβρίδια ἑνός εἴδους,

(H_3) γιά τά λοιπά ὑβρίδια ἑνός εἴδους.

1. ΤΕΥΤΛΑ

Σακχαρότευτλα καί τεῦτλα κτηνοτροφικά τοῦ εἴδους *Beta vulgaris* L.

1. Ὑποκοτύλιος ἄξων: χρωματισμός
2. Ρίζα:
   - 2.1 χρωματισμός τοῦ λαιμοῦ
   - 2.2 χρωματισμός τοῦ ὑπεργείου τμήματος (H)
   - 2.3 χρωματισμός τοῦ ὑπογείου τμήματος (H)
   - 2.4 σχῆμα (H)
   - 2.5 ἀναλογία τοῦ ὑπεργείου τμήματος (τεῦτλα κτηνοτροφικά)
   - 2.6 περιεκτικότης σέ ξηρή οὐσία (τεῦτλα κτηνοτροφικά)
   - 2.7 περιεκτικότης σέ ζάχαρη (ζαχαρότευτλα)
   - 2.8 βάρος τῆς ρίζας (πού ἐκφράζεται σέ ἑκατοστιαία ἀναλογία τοῦ ὁλικοῦ βάρους τοῦ φυτοῦ)
3. Φύλλο:
   - 3.1 χρωματισμός τοῦ ἐλάσματος
   - 3.2 χρωματισμός τῶν νεύρων τοῦ φύλλου (τεῦτλα κτηνοτροφικά)
   - 3.3 ὁλικό μῆκος τοῦ μίσχου καί τοῦ ἐλάσματος
   - 3.4 πλάτος τοῦ μίσχου
   - 3.5 χρωματισμός τῆς βάσεως τοῦ μίσχου (τεῦτλα κτηνοτροφικά)
   - 3.6 σχῆμα τῆς φυλλώδους δέσμης
   - 3.7 βάρος τοῦ φυλλώματος περιλαμβανομένου τοῦ λαιμοῦ (πού ἀναλογεῖ στό ἐπί τοῖς ἑκατό τοῦ ὁλικοῦ βάρους τοῦ φυτοῦ)
4. Πλοειδία:
   - 4.1 ἐπίπεδο πλοειδίας
   - 4.2 ἑκατοστιαία ἀναλογία τῶν διαφόρων ἐπιπέδων τῆς πλοειδίας (πολυπλοειδεῖς ποικιλίες)
5. Μονοσπερμία (H)

2. ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ

Ψευδαγρόστις ἡ τοῦ κυνός	*Agrostis canina* L. ssp. *canina* Hwd.
Ψευδαγρόστις ἡ γιγάντειος	*Agrostis gigantea* Roth
Ψευδαγρόστις ἡ σπονδυλωτή	*Agrostis stolonifera* L.
Ψευδαγρόστις ἡ λεπτή	*Agrostis tenuis* Sibth.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (στό στάδιο τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Παραφυάδες: παρουσία ἤ ἀπουσία (νά καθορισθεῖ τό βλαστικό στάδιο κατά τή στιγμή τῆς παρατηρήσεως)
4. Φύλλο:
   4.1 χρῶμα (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς, πρό τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
   4.2 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου (κατά τήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
   4.3 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η) (κατά τήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
5. Ταξιανθία: σχῆμα (μετά τήν ἄνθηση)
6. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
7. Ἐπανεμφάνιση στάχεων σέ διαφορετικές κοπές (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
8. Ἀριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

3. ΑΛΩΠΕΚΟΥΡΟΣ Ο ΛΕΙΜΩΝΙΟΣ

Alopecurus pratensis L.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (κατά τό στάδιο τοῦ ξεσταχιάσματος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Παραφυάδες: παρουσία ἤ ἀπουσία (καθορίσατε τό βλαστικό στάδιο κατά τή στιγμή τῆς παρατηρήσεως)
4. Φύλλο (κατά τήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως):
   4.1 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου
   4.2 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η)
5. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
6. Ἐπανεμφάνιση στάχεων σέ διάφορες κοπές (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
7. Ἀριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

4. ΒΡΩΜΗ Η ΥΨΗΛΗ

Arrhenatherum elatius (L) J. καί C. Presl.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (κατά τό στάδιο τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Φύλλο (κατά τήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως):
   3.1 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου
   3.2 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η)
4. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
5. Ἐπανεμφάνιση στάχεων στίς διάφορες κοπές (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
6. Ἀριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

5. ΔΑΚΤΥΛΙΣ Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΗ

Dactylis glomerata L.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (κατά τό στάδιο τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Φύλλο:
   3.1 χρῶμα (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς, πρό τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
   3.2 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
   3.3 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η) (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
4. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἔτος τῆς σπορᾶς)
5. Ἐπανεμφάνιση στάχεων στίς διάφορες κοπές (Η) (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
6. Ἐναλλακτικότης
7. Ἀριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

6. ΦΕΣΤΟΥΚΑ Η ΚΑΛΑΜΟΕΙΔΗΣ

Festuca arundinacea Schreb.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (κατά τό στάδιο τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Φύλλο (κατά τήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως):
   3.1 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου
   3.2 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η)
4. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
5. Ἐπανεμφάνιση στάχεων σέ διάφορες κοπές (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
6. Ἀριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

7. ΦΕΣΤΟΥΚΑ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ

Festuca ovina L.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (κατά τό στάδιο τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Φύλλο (κατά τήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως):
   3.1 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου
   3.2 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η)
4. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
5. Ἐπανεμφάνιση στάχεων σέ διάφορες κοπές (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
6. Ἀριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

8. ΦΕΣΤΟΥΚΑ Η ΛΕΙΜΩΝΙΟΣ

Festuca pratensis Huds.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (κατά τό στάδιο τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Φύλλο (κατά τήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως):
   3.1 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου
   3.2 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η)
4. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
5. Ἐπανεμφάνιση στάχεων σέ διάφορες κοπές (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς)
6. Ἀριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

9. ΦΕΣΤΟΥΚΑ Η ΕΡΥΘΡΑ

Festuca rubra L.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (κατά τό στάδιο τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Παραφυάδες: παρουσία ἤ ἀπουσία (νά καθορισθεῖ τό βλαστικό στάδιο κατά τή στιγμή τῆς παρατηρήσεως)
4. Φύλλο:
   4.1 χρῶμα (τό ἑπόμενο ἔτος ἀπό τῆς σπορᾶς, πρό τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
   4.2 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
   4.3 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η) (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
5. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἔτος τῆς ἀνθήσεως)
6. Ἐπανεμφάνιση στάχεων στίς διάφορες κοπές (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος)
7. Ἀριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

10. ΛΟΛΙΟΝ

Λόλιον τό ὑβρίδιον	*Lolium hybridum* Hausskn.
Λόλιον τό ἰταλικόν	*Lolium multiflorum* Lam.
Λόλιον τό πολυετές	*Lolium perenne* L.

1. 'Εμφάνιση τοῦ φυτοῦ (κατά τό στάδιο τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Φύλλο (κατά τήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως):
   3.1 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου (Η)
   3.2 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η)
4. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος καί γιά τίς ἐτήσιες ποικιλίες τό ἔτος σπορᾶς)
5. 'Επανεμφάνιση στάχεων στίς διάφορες κοπές (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος)
6. 'Εναλλακτικότης
7. 'Αριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

11. ΦΛΕΟΝ ΤΟ ΛΕΙΜΩΝΙΟΝ

Phleum pratense L.

1. 'Εμφάνιση τοῦ φυτοῦ (κατά τό στάδιο τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Φύλλο:
   3.1 χρῶμα (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος, πρό τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
   3.2 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
   3.3 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η) (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
4. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος)
5. 'Επανεμφάνιση στάχεων στίς διάφορες κοπές (Η) (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος)
6. 'Αριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

12. ΠΟΑΙ

Πόα ἡ ἐτησία	*Poa annua* L.
Πόα ἡ δασική	*Poa nemoralis* L.
Πόα ἡ ἕλειος	*Poa palustris* L.
Πόα ἡ λειμώνιος	*Poa pratensis* L.
Πόα ἡ κοινή	*Poa trivialis* L.

1. 'Εμφάνιση τοῦ φυτοῦ (κατά τό στάδιο τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Παραφυάδες: παρουσία ἤ ἀπουσία (νά καθορισθεῖ τό βλαστικό στάδιο κατά τή στιγμή τῆς παρατηρήσεως)
4. Φύλλο:
   4.1 χρῶμα (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος, πρό τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
   4.2 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
   4.3 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η) (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
5. Κολεός: χρῶμα (πόα ἡ λειμώνιος)
6. Γλωσσίς (πόα ἡ λειμώνιος):
   6.1 χρῶμα
   6.2 σχῆμα
   6.3 χνούδι
7. Ταξιανθία: χρῶμα (κατά τήν ἄνθηση)
8. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος)
9. 'Επανεμφάνιση στάχεων στίς διάφορες κοπές (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος)
10. 'Αριθμός χρωμοσωμάτων (Η) (μέ ἐξαίρεση τήν πόα τή λειμώνιο)

13. ΤΡΙΣΕΤΤΟΝ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟΝ

Trisetum flavescens (L) Pal. Beauv.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (κατά τό στάδιο τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (κατά τό τέλος τῆς ἀνθήσεως)
3. Φύλλο:
   3.1 χρῶμα (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος, πρό τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
   3.2 σχῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
   3.3 διαστάσεις τοῦ τελευταίου φύλλου (Η) (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
4. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος ἤ τῆς ἀνθήσεως (Η) (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος)
5. Ἐπανεμφάνιση στάχεων στίς διάφορες κοπές (Η) (τό ἑπόμενο ἀπό τῆς σπορᾶς ἔτος)
6. Ἀριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

14. ΗΔΥΣΑΡΟΗ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΜΑΤΙΚΟΝ

Hedysarum coronarium L.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (Η)
2. Στέλεχος:
   2.1 μῆκος
   2.2 διάμετρος στό μέσο τοῦ στελέχους
   2.3 διακλάδωση (ἀριθμός κλάδων ἀνά στέλεχος)
3. Φύλλο: (παρατηρεῖται, στό μεσαῖο τρίτο τοῦ φυτοῦ)
   3.1 ἀριθμός φύλλων ἀνά στέλεχος
   3.2 σχῆμα τοῦ τελικοῦ φυλλαρίου (Η)
   3.3 διαστάσεις τοῦ τελικοῦ φυλλαρίου (Η)
   3.4 ἀριθμός φυλλαρίων ἀνά φύλλο
4. Ἄνθος: χρῶμα τοῦ ἀνωτέρου πετάλου (Η)
5. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)
6. Βλαστικός κύκλος:
   6.1 διατήρηση τῆς βλαστήσεως κατά τό φθινόπωρο
   6.2 διάρκεια τῆς πολυετίας στήν καλλιέργεια (Η)

15. ΛΩΤΟΣ Ο ΚΕΡΑΤΙΟΦΟΡΟΣ

Lotus corniculatus L.

1. Στέλεχος: μῆκος (Η)
2. Φύλλο:
   2.1 σχῆμα τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
   2.2 διαστάσεις τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
3. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)

16. ΛΟΥΠΙΝΑ

Λούπινο τό λευκό	*Lupinus albus* L.
Λούπινο τό στενόφυλλο	*Lupinus angustifolius* L.
Λούπινο τό κίτρινο	*Lupinus Luteus* L.

1. Στέλεχος: μῆκος (Η)
2. Ἀνθός: χρῶμα τοῦ ἀνωτέρου πετάλου (Η)

3. Λοβός:
   3.1 σχῆμα (Η)
   3.2 χνούδι: διατήρηση ἢ μή (Η)
4. Σπόρος:
   4.1 σχῆμα (Η)
   4.2 διαστάσεις (Η)
   4.3 βασικό χρῶμα (Η)
   4.4 διακόσμηση (Η)
5. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)
6. Περιεκτικότης σέ ἀλκαλοειδῆ:
   6.1 τοῦ φύλλου (Η)
   6.2 τοῦ κόκκου (Η)

17. ΜΗΔΙΚΗ Η ΛΥΚΙΣΚΗ

Medicago lupulina L.

1. Στέλεχος: μῆκος (Η)
2. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)

18. ΜΗΔΙΚΕΣ

Luzerne Medicago sativa L. καί *Medicago varia Martyn*

1. Στέλεχος: μῆκος (Η)
2. Φύλλο:
   2.1 σχῆμα τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
   2.2 διαστάσεις τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
3. 'Ανθός: χρῶμα τοῦ ἀνωτέρου πετάλου
4. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)

19. ΟΝΟΒΡΥΧΙΣ Η ΗΜΕΡΟΣ

Onobrychis sativa L.

1. Στέλεχος: μῆκος (Η)
2. Φύλλο:
   2.1 σχῆμα τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
   2.2 διαστάσεις τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
3. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)

20. ΠΙΣΟΝ ΤΟ ΑΡΟΥΡΑΙΟ

Pisum arvense L.

1. Στέλεχος: μῆκος (Η)
2. Φύλλο:
   2.1 σχῆμα τῶν παραφύλλων τῶν δύο πρώτων ζευγῶν (Η)
   2.2 διαστάσεις τῶν δύο πρώτων παραφύλλων (Η)
   2.3 σχῆμα τοῦ φυλλαρίου (Η)
   2.4 διαστάσεις τοῦ φυλλαρίου (Η)
   2.5 σχῆμα τοῦ ἄκρου τοῦ φυλλαρίου (Η)
3. Παράφυλλα τοῦ στελέχους:
   3.1 σχῆμα (Η)
   3.2 διαστάσεις (Η)
   3.3 κηλίδες: παρουσία ἢ ἀπουσία (Η)

3.4 σχῆμα τοῦ δακτυλίου (Η)

3.5 χρῶμα τοῦ δακτυλίου (Η)

4. Ἄνθος:
   4.1 χρῶμα τοῦ ἀνωτέρου πετάλου (Η)
   4.2 σχῆμα τῆς βάσεως τοῦ ἀνωτέρου πετάλου (Η)
5. Λοβός:
   5.1 σχῆμα (Η) (στό στάδιο τοῦ χλωροῦ ὥριμου)
   5.2 σχῆμα τοῦ ἄκρου (Η) (στό στάδιο τοῦ χλωροῦ ὥριμου)
6. Σπόρος:
   6.1 σχῆμα, περιλαμβανομένης τῆς ἐμφανίσεως τοῦ σπόρου (Η)
   6.2 βασικό χρῶμα (Η)
   6.3 διακόσμηση (Η)
7. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)
8. Διάρκεια τῆς ἀνθήσεως (Η)

21. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ

Trifolium alexandrinum L.

1. 'Εμφάνιση τοῦ φυτοῦ (Η) (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η) (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
3. Φύλλο (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως):
   3.1 σχῆμα τοῦ κεντρικοῦ τελικοῦ φυλλαρίου (Η)
   3.2 διαστάσεις τοῦ κεντρικοῦ τελικοῦ φυλλαρίου (Η)
4. Ταξιανθία:
   4.1 διακλαδώσεις (Η)
   4.2 μετά ἢ ἄνευ ποδίσκου (Η)
   4.3 μῆκος τῶν βρακτίων σέ σχέση μέ τόν κάλυκα
5. Ἄνθος: χρῶμα τοῦ ἀνωτέρου πετάλου
6. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)

22. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΟ

Trifolium hybridum L.

1. Στέλεχος: μῆκος (Η)
2. Φύλλο:
   2.1 σχῆμα τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
   2.2 διαστάσεις τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
3. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)
4. 'Αριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

23. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΤΟ ΣΑΡΚΟΧΡΟΥΝ

Trifolium incarnatum L.

1. Στέλεχος: μῆκος (Η)
2. Ἄνθος: χρῶμα τοῦ ἀνωτέρου πετάλου (Η)
3. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)

24. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΤΟ ΛΕΙΜΩΝΙΟ

Trifolium pratense L.

1. Στέλεχος: μῆκος (Η)
2. Φύλλο:
   2.1 σχῆμα τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
   2.2 διαστάσεις τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
   2.3 φυλλῶδες γνώρισμα
3. Ἄνθος: χρῶμα τοῦ ἀνωτέρου πετάλου
4. Σπόρος: βασικό χρῶμα
5. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)
6. Ἀριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

25. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΤΟ ΕΡΠΟΝ

Trifolium repens L.

1. Φύλλο:
   1.1 σχῆμα τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
   1.2 διαστάσεις τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
   1.3 φυλλῶδες γνώρισμα
   1.4 μῆκος τοῦ μίσχου (Η)
2. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)
3. Ἀριθμός χρωμοσωμάτων (Η)

26. ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΤΟ ΥΠΤΙΟΝ (ΠΕΡΣΙΑΣ)

Trifolium resupinatum L.

1. Στέλεχος (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως):
   1.1 σχῆμα
   1.2 μῆκος (Η)
   1.3 χνούδι: παρουσία ἢ ἀπουσία
2. Φύλλο (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως):
   2.1 σχῆμα τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
   2.2 διαστάσεις τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
3. Ἄνθος: χρῶμα τοῦ ἀνωτέρου πετάλου
4. Λοβός: σχῆμα (στό στάδιο πλήρους ὡριμάνσεως)
5. Σπόρος: χρῶμα
6. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)

27. ΤΡΙΓΩΝΙΣΚΗ

Trigonella foenum-graecum L.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (Η) (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως)
2. Στέλεχος:
   2.1 μῆκος (Η)
   2.2 χνούδι: παρουσία ἢ ἀπουσία (Η)
3. Φύλλο (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως):
   3.1 σχῆμα τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)
   3.2 διαστάσεις τοῦ κεντρικοῦ φυλλαρίου (Η)

4. Λοβός (στό στάδιο πλήρους ὡριμάνσεως):
   4.1 συνολικό μῆκος (H)
   4.2 μῆκος τοῦ ἄκρου (H)
5. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (H)

28. ΚΥΑΜΟΣ Ο ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ

Κύαμος ὁ μεγαλόσπερμος *Vicia faba* L. ssp. *faba* var. *equina* Pers.
Κύαμος ὁ μικρόσπερμος *Vicia faba* L. var. *minor* (Peterm.) Bull.

1. Στέλεχος: μῆκος (H_1) (H_2)
2. Λοβός (στό στάδιο πλήρους ὡριμάνσεως):
   2.1 σχῆμα (H_2)
   2.2 χνούδι (H_2)
3. Σπόρος:
   3.1 σχῆμα (H_1) (H_2)
   3.2 μέγεθος (H_2)
   3.3 βασικό χρῶμα (H_1) (H_2)
   3.4 διακόσμηση (H_2)
   3.5 χρῶμα τοῦ ὀφθαλμοῦ (H_2)
4. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (H_2)

29. ΒΙΚΟΣ Ο ΗΜΕΡΟΣ

Vicia sativa L.

1. Φύλλο:
   1.1 σχῆμα τῶν πρώτων ἀρχικῶν φύλλων (H)
   1.2 διαστάσεις τῶν πρώτων ἀρχικῶν φύλλων (H)
   1.3 σχῆμα τοῦ φυλλαρίου (H)
   1.4 διαστάσεις τοῦ φυλλαρίου (H)
2. Ἄνθος: χρῶμα τοῦ ἀνωτέρου πετάλου (H)
3. Λοβός (στό στάδιο τῆς πλήρους ὡριμάνσεως):
   3.1 σχῆμα (H)
   3.2 χνούδι (H)
4. Κόκκος:
   4.1 σχῆμα (H)
   4.2 μέγεθος (H)
   4.3 βασικό χρῶμα (H)
   4.4 διακόσμηση (H)
   4.5 χρῶμα τῶν κοτυληδόνων (H)
5. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (H)

30. ΒΙΚΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Vicia pannonica Crantz

ΒΙΚΟΣ Ο ΤΡΙΧΩΤΟΣ

Vicia villosa Roth

1. Φύλλο:
   1.1 σχῆμα τοῦ φυλλαρίου (H)
   1.2 διαστάσεις τοῦ φυλλαρίου (H)
   1.3 ἀριθμός φυλλαρίων
2. Ἄνθος: χρῶμα τοῦ ἀνωτέρου πετάλου (H)

3. Λοβός (στό στάδιο τῆς πλήρους ὡριμάνσεως):
   3.1 σχῆμα (H)
   3.2 χνούδι (H)
4. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (H)

31. ΓΟΓΓΥΛΟΚΡΑΜΒΗ

Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Peterm.

1. Φυτό: ὕψος
2. Ρίζα:
   2.1 σχῆμα (H)
   2.2 ποσοστό τοῦ τμήματος τοῦ ὑπεράνω τοῦ ἐδάφους
   2.3 χρῶμα τῆς ρίζης (H)
   2.4 χρῶμα τοῦ τμήματος τοῦ ὑπεράνω τοῦ ἐδάφους
   2.5. χρῶμα τῆς σαρκός (H)
3. Κορυφή: μῆκος (H)
4. Ἔλασμα τῶν φύλλων:
   4.1 διαστάσεις (H)
   4.2 σχῆμα
   4.3 ἄκρη: κατσαρή ἤ ὀδοντωτή
   4.4 ἀνθοκυάνη: παρουσία ἤ ἀπουσία (H)
   4.5 τό γλαυκόν
5. Μίσχος τῶν φύλλων:
   5.1 σχῆμα
   5.2 μῆκος
   5.3 πάχος
   5.4 ἀνθοκυάνη: παρουσία ἤ ἀπουσία

32. ΚΡΑΜΒΗ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ

Brassica oleracea L. Conver. *acephala* (DC)

1. Φυτό (παρατήρηση ὅταν τό φυτό εὑρίσκεται σέ πλήρη ἀνάπτυξη):
   1.1 ὕψος (H_1) (H_2)
   1.2 διακλάδωση (H_2)
2. Στέλεχος:
   2.1 μῆκος (H_2)
   2.2 πάχος (H_1) (H_2) (κράμβη μέ μυελῶδες στέλεχος)
   2.3 σχῆμα (H_1) (H_2) (κράμβη μέ μυελῶδες στέλεχος)
   2.4 χρῶμα (H_2)
3. Ἔλασμα τῶν φύλλων:
   3.1 διαστάσεις (H_1) (H_2)
   3.2 σχῆμα (H_2)
   3.3 μορφή (H_2)
   3.4 ἄκρο: κατσαρό ἤ ὀδοντωτό (H_2)
   3.5 ἀνθοκυάνη: παρουσία ἤ ἀπουσία (H_1) (H_2)
   3.6 τό γλαυκόν (H_2)
4. Μίσχος τῶν φύλλων:
   4.1 σχῆμα (H_2)
   4.2 μῆκος (H_2)
   4.3 πάχος (H_2)
   4.4 ἀνθοκυάνη: παρουσία ἤ ἀπουσία (H_1) (H_2)

33. ΕΛΑΙΟΦΟΡΟ ΡΑΠΑΝΙ

Raphanus sativus L. ssp. *oleifera* (DC) Metzg.

1. Φυτό: (στό στάδιο τῆς ὡριμάνσεως):
   1.1 ὕψος
   1.2 μέγεθος τῆς διακλαδώσεως
   1.3 ὕψος ἐκφύσεως τῆς 1ης διακλαδώσεως
2. Στέλεχος (στό στάδιο τῆς ὡριμάνσεως):
   2.1 μῆκος τοῦ κυρίου στελέχους (Η)
   2.2 πάχος τοῦ κυρίου στελέχους (νά μετρᾶται 25 ἑκατ. ὑπεράνω τοῦ λαιμοῦ)
3. Φύλλο τῆς ροζέττας (κατά τό χρόνο ἐμφανίσεως τῶν ἀνθοφόρων ὀφθαλμῶν):
   3.1 σχῆμα
   3.2 διαστάσεις
4. Ἄνθος: χρῶμα τῶν πετάλων
5. Κεράτιο: μῆκος τοῦ ἄκρου (Η)
6. Σπόρος: πάχος (Η)
7. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)

34. ΒΡΩΜΗ

Avena sativa L.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (Η) (στό στάδιο τοῦ ἀδελφώματος)
2. Στέλεχος:
   2.1 μῆκος (Η)
   2.2 χνούδι τοῦ ἀνωτέρου γονάτου (Η)
3. Φύλλο: χνούδι τοῦ ἄκρου τοῦ ἐλάσματος (Η)
4. Φόβη: σχῆμα (Η)
5. Κολεός: τό γλαυκόν (Η) (κατά τό στάδιο τῆς ἀνθήσεως)
6. Κόκκος:
   6.1 χρῶμα τῶν λεπυριδίων (Η)
   6.2 ἄγανα στά λεπυρίδια: παρουσία ἤ ἀπουσία (Η)
   6.3 τό τριχωτό τῆς βάσεως τῶν κόκκων τῆς πρώτης σειρᾶς
   6.4 γυμνός ἤ ἐνδεδυμένος κόκκος
7. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος (Η)

35. ΚΡΙΘΗ

Δίστοιχη Κριθή	*Hordeum distichum* L.
Πολύστοιχη Κριθή	*Hordeum polystichum* L.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (Η) (στό τέλος τοῦ ἀδελφώματος)
2. Στέλεχος: μῆκος (Η)
3. Ὠτίδιο: χρῶμα (Η)
4. Κολεός:
   4.1 χνούδι τοῦ κολεοῦ τῆς βάσεως (Η)
   4.2 τό γλαυκόν (Η)
5. Στάχυς:
   5.1 τύπος: 2, 4 ἤ 6 σειρές (Η)
   5.2 ἄγανα: παρουσία ἤ ἀπουσία (Η)
   5.3 ὀδοντωτό τῶν ἀγάνων (Η)
   5.4 σχῆμα (Η)
   5.5 τό συμπαγές (Η)

5.6 τό γλαυκόν (H)
5.7 χρῶμα τῶν στείρων ἀνθέων (H)
5.8 σχῆμα τῶν στείρων ἀνθέων (H)
5.9 μῆκος τοῦ κατωτέρου τμήματος τῆς ράχεως (H)

6. Λέπυρα: μῆκος (H)
7. Κόκκος:
7.1 μῆκος τῶν τριχῶν τοῦ ραχιδίου (H)
7.2 τό ὀδοντωτό τῶν λεπυριδίων (H)
7.3 γυμνός ἤ ἐνδεδυμένος (H)
7.4 χνούδι τοῦ αὐλακος (H)
7.5 ἀνθοκυάνη στίς νευρώσεις τοῦ λεπυριδίου: παρουσία ἤ ἀπουσία (H)
8. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος (H)
9. Ἐναλλακτικότης (H)
10. Ἀντιδράσεις στό DDT ἤ σέ ἄλλο ἀντιδραστήριο μέ συγκρίσιμα ἀποτελέσματα (H)

36. ORYZA

Oryza sativa L.

1. Στέλεχος:
1.1 χρῶμα τῶν γονάτων: πράσινο ἤ ἔγχρωμο (H) (κατά τή διάρκεια τῆς ἀναπτύξεως)
1.2 ὕψος κατά τήν ὡρίμανση, μετρούμενο ἀπό τό λαιμό μέχρι τό ἀκρότατο σημεῖο τῆς ὑψηλότερης φόβης (H) (στό στάδιο τῆς ὡριμάνσεως)
2. Φύλλο: πράσινο ἤ ἔγχρωμο (H) (κατά τήν θλάστηση)
3. Ὠτίδιο: πράσινο ἤ ἔγχρωμο (H) (κατά τήν θλάστηση)
4. Φόβη:
4.1 ἄγανα: παρουσία ἤ ἀπουσία (H)
4.2 σχῆμα (H) (στό στάδιο τῆς ὡριμάνσεως)
4.3 χρῶμα τῶν στιγμάτων: ἄχρωμα ἤ ἔγχρωμα (H)
5. Λεπυρίδιο:
5.1 χρῶμα τῆς καρίνας: πράσινη ἤ ἔγχρωμη (H)
5.2 χρῶμα τῆς τρόπιδος: πράσινη ἤ ἔγχρωμη (H)
5.3 χρῶμα τοῦ ἄκρου: πράσινο ἤ ἔγχρωμο (H)
5.4 χνούδι (H)
6. Κόκκος:
6.1 πλάγια ὄψη τοῦ ἀποφλοιωμένου κόκκου([1]) (H)
6.2 τό μαργαριτοειδές: παρουσία ἤ ἀπουσία (H)
7. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος (H)

37. ΦΑΛΑΡΙΣ

Phalaris canariensis L.

1. Στέλεχος: μῆκος (H)
2. Φύλλο: σχῆμα (H) (πρό τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος)
3. Στάχυς: σχῆμα
4. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος (H)

([1]) Αὐτό ἀναφέρεται στήν ἀναλογία μῆκος/ὕψος: στρογγυλός: ὀλιγώτερο τοῦ 1,75, ἡμιστρογγυλός: μεταξύ 1,75 καί 1,99, ἡμικωνικός: μεταξύ 2,00 καί 2,45, κωνικός: ἄνω τοῦ 2,45.

38. ΣΙΚΑΛΙΣ

Secale cereale L.

1. Κολεόπτιλο: χρωματισμός
2. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ:
   2.1 στό τέλος τοῦ ἀδελφώματος (τήν ἄνοιξη)
   2.2 στό στάδιο τῆς ἀνορθώσεως
3. Στέλεχος:
   3.1 μῆκος (Η)
   3.2 χρῶμα τοῦ ἀνώτερου γόνατου
   3.3 πυκνότητα τοῦ χνουδιοῦ κάτω ἀπό τό στάχυ
4. Κολεός: χνούδι (στό στάδιο τῆς ἀνορθώσεως)
5. Στάχυς:
   5.1 σχῆμα (στό στάδιο τῆς ἀνθήσεως ἤ στό γαλακτῶδες στάδιο)
   5.2 χρῶμα (στό γαλακτῶδες στάδιο)
   5.3 χρῶμα τῶν ἀνθήρων
   5.4 ἀνθοκυάνη: παρουσία ἤ ἀπουσία
6. Ἄγανα: ἔνταση οἱουδήποτε ἀνθοκυανικοῦ χρωματισμοῦ
7. Κόκκος:
   7.1 σχῆμα
   7.2 χρῶμα
8. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος (Η)
9. Ἐναλλακτικότης: χειμερινός τύπος ἤ ἐαρινός τύπος (Η)
10. Πλοειδία (Η)

39. ΣΙΤΟΣ

Μαλακός σῖτος	*Triticum aestivum* L.
Σκληρός σῖτος	*Triticum durum* L.

1. Κολεόπτιλο: χρωματισμός (Η)
2. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (Η) (στό τέλος τοῦ ἀδελφώματος)
3. Στέλεχος:
   3.1 μῆκος (Η)
   3.2 βαθμός πληρώσεως τοῦ ἄχυρου στό μέσο τοῦ ἀνώτερου μεσογονατίου: κενό ἤ πλῆρες (Η)
   3.3 τό γλαυκόν (Η)
   3.4 ἀνθοκυάνη: παρουσία ἤ ἀπουσία (Η)
4. Φύλλο (ἀκριβῶς πρό τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος):
   4.1 σχῆμα (Η)
   4.2 τό γλαυκόν τοῦ ἐλάσματος (Η)
5. Κολεός:
   5.1 χνούδι τοῦ κολεοῦ τοῦ τελευταίου φύλλου (Η)
   5.2 τό γλαυκόν (Η)
6. Στάχυς:
   6.1 σχῆμα (Η)
   6.2 τό συμπαγές (Η)
   6.3 βαθμός τοῦ ἀγανώδους (Η)
   6.4 χρῶμα τῶν ἀγάνων (Η)
   6.5 τό γλαυκόν (Η)
   6.6 χρῶμα τῶν ἀνθήρων (Η)
   6.7 χρῶμα τῶν στάχυων (Η) (στό στάδιο πού ἀρχίζουν νά κιτρινίζουν)
7. Λέπυρα:
   7.1 σχῆμα τῆς κολοβώσεως (Η)
   7.2 εὖρος τῆς κολοβώσεως (Η)

7.3 σχῆμα τοῦ ἄκρου (Η)
7.4 μῆκος τοῦ ἄκρου (Η)
7.5 χνούδι τῆς ἐξωτερικῆς ὄψεως (Η)
7.6 χνούδι τῆς ἐσωτερικῆς ὄψεως (Η)

8. Κόκκος:
8.1. σχῆμα (Η)
8.2 χρῶμα (Η)
8.3 χνούδι τοῦ ἄκρου (Η)
8.4 χρωματισμός σέ φαινικό ὀξύ (Η)

9. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος (Η)

10. Ἐναλλακτικότης (Η)

40. ΣΙΤΟΣ ΣΠΕΛΤΑ

Triticum spelta L.

1. Κολεόπτιλο: χρωματισμός (Η)

2. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (Η) (στό τέλος τοῦ ἀδελφώματος)

3. Στέλεχος:
3.1 μῆκος (Η)
3.2 θαθμός πληρώσεως τοῦ ἀχύρου στό μέσο τοῦ ἀνώτερου μεσογονατίου: κενό ἤ πλῆρες (Η)

4. Φύλλο (ἀκριθῶς πρό τοῦ σχηματισμοῦ τοῦ στάχυος):
4.1 σχῆμα (Η)
4.2 τό γλαυκόν τοῦ ἐλάσματος (Η)

5. Κολεός:
5.1 χνούδι τοῦ κολεοῦ τοῦ τελευταίου φύλλου (Η)
5.2 τό γλαυκόν (Η)

6. Στάχυς:
6.1 σχῆμα (Η)
6.2 τό συμπαγές (Η)
6.3 θαθμός τοῦ ἀγανώδους (Η)
6.4 χρῶμα τῶν ἀγάνων (Η)
6.5 τό γλαυκόν (Η)
6.6 χρῶμα τῶν στάχυων (Η) (στό στάδιο πού ἀρχίζουν νά κιτρινίζουν):
6.7 στερεότης τῆς ράχεως

7. Λέπυρα:
7.1 σχῆμα τῆς κολοθώσεως (Η)
7.2 εὖρος τῆς κολοθώσεως (Η)
7.3 σχῆμα τοῦ ἄκρου (Η)
7.4 μῆκος τοῦ ἄκρου (Η)
7.5 χνούδι τῆς ἐξωτερικῆς ὄψεως (Η)
7.6 χνούδι τῆς ἐσωτερικῆς ὄψεως (Η)

8. Φλοιός:
8.1. σχῆμα (Η)
8.2 χρῶμα (Η)

9. Ταξινόμηση τοῦ ξεσταχιάσματος (Η)

10. Ἐναλλακτικότης (Η)

41. ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

(ἐξαιρουμένων τοῦ ἀραβοσίτου τοῦ μικροσπέρμου (πόπ-κόρν) καί τοῦ σακχαρώδους ἀραβοσίτου)

Zea mays L. (ἐξαιρουμένων τοῦ convar. *microsperma* Koern. καί τοῦ convar. *saccharata* Koern.)

1. Στέλεχος:
   - 1.1 μῆκος τοῦ κυρίου στελέχους (H_2)
   - 1.2 ἀνθοκυάνη στά γόνατα: παρουσία ἤ ἀπουσία (H_2)
   - 1.3 ὕψος ἐκφύσεως τοῦ ἀνωτέρου σπάδικος τοῦ κυρίου στελέχους (H_1) (H_2) (H_3)
2. Φύλλο:
   - 2.1 σχῆμα (H_2) (κατά τό χρόνο ἐμφανίσεως τῆς φόθης (ἄρρενος ταξιανθίας)
   - 2.2 συνολικός ἀριθμός (H_2)
   - 2.3 εὖρος τοῦ ἐλάσματος τοῦ φύλλου πού ἐκφύεται ἀπό τό γόνατο ὑπεράνω τοῦ ἀνωτέρου στάχυος (H_2)
3. Κολεός:
   - 3.1 ἀνθοκυάνη: παρουσία ἤ ἀπουσία (H_2) (φύλλα τοῦ μεσαίου τρίτου τοῦ φυτοῦ)
   - 3.2 χνούδι τοῦ ἄκρου τοῦ κολεοῦ τοῦ τελευταίου φύλλου (H_2)
4. Φόθη:
   - 4.1 μῆκος τοῦ κεντρικοῦ ἄξονος (H_2)
   - 4.2 ἀριθμός διακλαδώσεων: δευτερογενεῖς ἤ τριτογενεῖς (H_2)
   - 4.3 σχῆμα τῶν διακλαδώσεων (H_2) (κατά τή διάρκεια τῆς πλήρους ἀνθήσεως τῶν ἀρρένων)
   - 4.4 χρῶμα τῶν ἀνθήρων (H_2) (κατά τή διάρκεια ἐκτινάξεως τῆς γύρεως)
5. Σπάδικας:
   - 5.1 χρῶμα τῶν στιγμάτων (H_1) (H_2) (δύο μέ τρεῖς ἡμέρες μετά τήν ἔξοδό τους)
   - 5.2 μῆκος (H_2)
   - 5.3 σχῆμα (H_2)
   - 5.4 διάμετρος στό μεσαῖο τρίτο τοῦ σπάδικος (H_2)
   - 5.5 ἀριθμός σειρῶν (H_2)
   - 5.6 μῆκος τοῦ μίσχου (H_1) (H_2)
   - 5.7 ἀριθμός τῶν γονίμων σπαδίκων στό κύριο στέλεχος (H_2)
   - 5.8 μῆκος τῶν θρακτίων φύλλων σέ σχέση μέ τόν σπάδικα (H_1) (H_2)
   - 5.9 κάλυψη τοῦ σπάδικος (H_2) (στό στάδιο τῆς πλήρους ὡριμάνσεως ὅταν τά θράκτια εἶναι τελείως ξηρά)
   - 5.10 χρῶμα τοῦ ἄξονα (H_1) (H_2) (στό στάδιο τῆς πλήρους ὡριμάνσεως)
   - 5.11 διάμετρος τοῦ ἄξονα (H_2)
6. Σπόρος:
   - 6.1 τύπος τοῦ συγκομιζομένου σπόρου (H_1) (H_2) (H_3)
   - 6.2 χρῶμα τῆς κορυφῆς καί τῶν πλευρῶν (H_2)
   - 6.3 σχῆμα (H_2)
7. Περίοδος μεταξύ τοῦ φυτρώματος καί:
   - 7.1 τῆς ἀνθήσεως τῆς φόθης (H_2)
   - 7.2 τῆς ἐμφανίσεως τῶν στιγμάτων τοῦ σπάδικος (H_1) (H_2) (H_3)
8. Κλάσις ὡριμάνσεως καθοριζομένη μέ βάση τήν περίοδο μεταξύ τοῦ φυτρώματος:
   - 8.1 καί τοῦ σταδίου μέ περιεκτικότητα τοῦ σπόρου σέ νερό 60% (H_2)
   - 8.2 καί τοῦ σταδίου μέ περιεκτικότητα τοῦ σπόρου σέ νερό 30% (H_2)

42. ΓΕΩΜΗΛΑ

Solanum tuberosum L.

1. Κόνδυλος:
   - 1.1 σχῆμα: περιγραφή, κανονικότης καί ὁμοιομορφία (H)
   - 1.2 χρῶμα τῆς ἐπιδερμίδος (H)
   - 1.3 χρῶμα τῆς σαρκός (H)

2. Φύτρο:
   2.1 χρῶμα (Η)
   2.2 σχῆμα (Η)
   2.3 χνούδι (Η)
3. Στέλεχος: χρῶμα (Η)
4. Ἄνθος:
   4.1 παρουσία ἢ ἀπουσία (Η)
   4.2 χρῶμα τῶν σεπάλων στό στάδιο τοῦ κλειστοῦ ἄνθους (Η)
   4.3 χρῶμα τῶν πετάλων (Η)

43. ΑΡΑΧΙΣ Η ΥΠΟΓΕΙΟΣ

Arachis hypogaea L.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (Η) (στό στάδιο τῆς ἀνθήσεως)
2. Στέλεχος: χνούδι: παρουσία ἢ ἀπουσία (Η)
3. Φύλλο (στό στάδιο τῆς ἀνθήσεως):
   3.1 σχῆμα τῶν φυλλαρίων (Η)
   3.2 χνούδι τοῦ ἐλάσματος (Η)
   3.3 περίμετρος: παρουσία ἢ ἀπουσία τριχιδίων (Η)
4. Παράφυλλα: μῆκος ἐν σχέσει μέ τό μίσχο (Η)
5. Φύτρο: μῆκος (Η) (κατά τό χρόνο τῆς φυτεύσεως)
6. Λοβός (στό στάδιο τῆς ὡριμάνσεως):
   6.1 σχῆμα (Η)
   6.2 στένωση: παρουσία ἢ ἀπουσία (Η)
   6.3 συνοχή τοῦ περικαρπίου (Η)
   6.4 ἀριθμός σπόρων: μέχρι δύο ἢ περισσότεροι ἀπό δύο (Η)
7. Σπόρος:
   7.1 σχῆμα (Η)
   7.2 χρῶμα τῆς ἐφυμενίδος (Η)

44. ΕΛΑΙΟΦΟΡΟ ΓΟΓΓΥΛΙ

Brassica campestris L. ssp. *oleifera* (Metzg.) Sinsk.

1. Κοτυληδόνες: διαστάσεις
2. Φυτό (στό στάδιο τῆς ὡριμάνσεως):
   2.1 ὕψος
   2.2 σημασία τῆς διακλαδώσεως
   2.3 ὕψος ἐκφύσεως τῆς 1ης διακλαδώσεως
3. Στέλεχος (στό στάδιο τῆς ὡριμάνσεως):
   3.1 μῆκος τοῦ κυρίως στελέχους (Η)
   3.2 πάχος τοῦ κυρίως στελέχους μετρουμένου 25 ἑκατ. ὑπεράνω τοῦ λαιμοῦ
4. Φύλλο τῆς ροζέττας (κατά τό χρόνο ἐμφανίσεως τῶν ἀνθοφόρων ὀφθαλμῶν):
   4.1 σχῆμα (Η)
   4.2 διαστάσεις (Η)
5. Ἄνθος: χρῶμα τῶν πετάλων (Η)
6. Σπόρος: διαστάσεις (πάχος)
7. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)
8. Ἐναλλακτικότης (Η)

45. ΣΙΝΑΠΙ ΤΟ ΦΑΙΟΝ

Brassica juncea L.

1. Στέλεχος: μῆκος (Η) (στό στάδιο τῆς πλήρους ὡριμάνσεως)
2. Φύλλα τῆς ροζέττας: σχῆμα (Η) (κατά τό χρόνο ἐμφανίσεως τῶν ἀνθοφόρων ὀφθαλμῶν)
3. Ἄνθος: χρῶμα τῶν πετάλων (Η)
4. Σπόρος:
   4.1 διαστάσεις (Η)
   4.2 χρῶμα (Η)
5. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)

46. ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

Brassica napus L. ssp. *oleifera* (Metzg.) Sinsk

1. Κοτυληδόνες: διαστάσεις (Η)
2. Φυτό: σημασία τῆς διακλαδώσεως (Η) (στό στάδιο τῆς ὡριμάνσεως)
3. Στέλεχος: μῆκος τοῦ κυρίως στελέχους (Η) (στό στάδιο τῆς ὡριμάνσεως)
4. Φύλλα τῆς ροζέττας: σχῆμα (Η) (κατά τό χρόνο ἐμφανίσεως τῶν ἀνθοφόρων ὀφθαλμῶν)
5. Ἄνθος: χρῶμα τῶν πετάλων (Η)
6. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)
7. Ἐναλλακτικότης (Η)

47. ΣΙΝΑΠΙ ΤΟ ΜΕΛΑΝ

Brassica nigra (L.) W. Koch

1. Φυτό: ὕψος τοῦ κυρίως στελέχους (Η) (σέ πλήρη ὡρίμανση)
2. Ἄνθος: χρῶμα τῶν πετάλων (Η)
3. Κεράτιο: συγκράτηση στό στέλεχος (Η) (στό στάδιο τῆς ὡριμάνσεως)
4. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (Η)

48. ΚΑΝΝΑΒΙΣ Η ΚΟΙΝΗ

Cannabis sativa L.

1. Στέλεχος (φυτά φέροντα θήλεα ἄνθη):
   1.1 ραβδώσεις: παρουσία ἢ ἀπουσία
   1.2 χρῶμα
2. Φύλλο: ἀριθμός λοβῶν (φυτά φέροντα θήλεα ἄνθη)
3. Καρπός (φυτά φέροντα θήλεα ἄνθη):
   3.1 σχῆμα
   3.2 πτέρνα: παρουσία ἢ ἀπουσία
4. Ταξινόμηση τῆς πρωιμότητος (Η)
5. Μόνοικος ἢ δίοικος (Η)

49. ΚΥΜΙΝΟ

Carum carvi L.

1. Στέλεχος: μῆκος (Η)

2. Φύλλο:
   2.1 σχῆμα πρό τῆς ἀνορθώσεως
   2.2 χρῶμα
3. Καρπός: ἀχαίνιο διαχωριζόμενο εὐκόλως ἤ μή (H)
4. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (H)

50. BAMBAKI

Gossypium sp.

1. Ἐμφάνιση τοῦ φυτοῦ (H)
2. Στελέχη (στό στάδιο τῆς ἀνθήσεως):
   2.1 τύπος διακλαδώσεων
   2.2 ἀριθμός βλαστικῶν καί ἀνθοφόρων κλάδων
   2.3 χνούδι
3. Φύλλο τοῦ βλαστικοῦ κλάδου (στήν ἀρχή τῆς ἀνθήσεως):
   3.1 χνούδι τοῦ ἐλάσματος (H)
   3.2 ἀριθμός τῶν λοβῶν
   3.3 βάθος τῶν ἐγκοπῶν (H)
4. Ἄνθος (πρό τῆς ἀνθήσεως):
   4.1 μῆκος τῶν βρακτίων σέ σχέση μέ τή στεφάνη (H)
   4.2 χρῶμα τῶν πετάλων
5. Κάψα:
   5.1 σχῆμα (H) (στό στάδιο τοῦ πράσινου καρυδιοῦ πρό τοῦ ἀνοίγματος)
   5.2 στίξη: παρουσία ἤ ἀπουσία (H) (στό στάδιο τοῦ πράσινου καρυδιοῦ πρό τοῦ ἀνοίγματος)
   5.3 διάρρηξη: πλήρης ἤ μή πλήρης (H) (στό στάδιο τῆς πλήρους ὡριμάνσεως)
   5.4 ἀριθμός φατνιδίων (στό στάδιο τῆς πλήρους ὡριμάνσεως)
6. Ἴνα (στό στάδιο τῆς πλήρους ὡριμάνσεως):
   6.1 σγουρή ἤ λεία
   6.2 μέσο μῆκος
   6.3 κανονικότης τοῦ μήκους
7. Σπόρος:
   7.1 γυμνός ἤ μέ χνούδι
   7.2 χρῶμα τοῦ χνουδιοῦ

51. ΗΛΙΑΝΘΟΣ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ

Helianthus annuus L.

1. Ὑποκοτύλιο: ἀνθοκυάνη: παρουσία ἤ ἀπουσία (H_2)
2. Φύλλο:
   2.1 φερόμενο στό μέσο τοῦ στελέχους (H_2)
   2.2 χρῶμα τοῦ ἐλάσματος (H_2) (στό στάδιο τῶν τεσσάρων φύλλων)
   2.3 διαστάσεις (H_1) (H_2)
3. Θύσανος:
   3.1 σχῆμα (H_2)
   3.2 ταινιόστενα ἄνθη: παρουσία ἤ ἀπουσία (H_2)
4. Γόνιμο ἄνθος:
   4.1 χρῶμα τῶν πετάλων: κίτρινο ἤ πορτοκαλόχρουν (H_1) (H_2)
   4.2 ἀνθοκυάνη τῶν σεπάλων: παρουσία ἤ ἀπουσία (H_2)
   4.3 χρῶμα τῶν στιγμάτων (H_2)
5. Σπόρος:
   5.1 σχῆμα (H_2)
   5.2 βασικό χρῶμα (H_1) (H_2)

5.3 λωρίδες: παρουσία ἢ ἀπουσία (H_1) (H_2)

5.4 χρῶμα τῶν λωρίδων (H_2)

5.5 ἀναλογία φλοιῶν (H_2)

6. Ταξινόμηση τῆς πρωιμότητος (H_1) (H_2)

52. ΛΙΝΟ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΩΤΑΤΟ (ΛΙΝΑΡΙ)

Linum usitatissimum L.

1. Φυτό:
   1.1 ὕψος τοῦ στελέχους (H)
   1.2 ὕψος ἐκφύσεως τῆς διακλαδώσεως (H)
2. Ἄνθος:
   2.1 διάμετρος (H)
   2.2 κηλίδες τῶν σεπάλων (H)
   2.3 χρῶμα τῶν πετάλων (H)
   2.4 χρῶμα τῶν νεύρων τῶν πετάλων (H)
   2.5 χρῶμα τῶν νημάτων τῶν στημόνων (H)
   2.6 χρῶμα τῶν ἀνθήρων (H)
   2.7 χρῶμα τοῦ στύλου (H)
   2.8 χρῶμα τοῦ στίγματος (H)
3. Κάψα: τριχωτό τῶν διαφραγμάτων (H)
4. Σπόρος:
   4.1 χρῶμα (H)
   4.2 σχῆμα (H)
   4.3 πάχος (H)
5. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (H)

53. ΜΗΚΩΝ Η ΥΠΝΟΦΟΡΟΣ

Papaver somniferum L.

1. Στέλεχος:
   1.1 μῆκος (H)
   1.2 χνούδι τῆς κορυφῆς τοῦ κυρίως στελέχους (H)
2. Φύλλο (πρό τῆς ἀνορθώσεως):
   2.1 κηλίδες: παρουσία ἢ ἀπουσία (H)
   2.2 χρῶμα τῶν κηλίδων
3. Ἄνθος:
   3.1 ἀνθοκυάνη τῶν σεπάλων: παρουσία ἢ ἀπουσία (H)
   3.2 χρῶμα τῶν πετάλων (H)
4. Κάψα (στό στάδιο τῆς ὡριμάνσεως):
   4.1 σχῆμα (H)
   4.2 χρῶμα (H)
5. Σπόρος: χρῶμα (H)
6. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (H)

54. ΣΙΝΑΠΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟ

Sinapis alba L.

1. Φυτό (στό στάδιο τῆς πλήρους ὡριμάνσεως):
   1.1 ὕψος τοῦ κυρίως στελέχους (H)
   1.2 σημασία τῆς διακλαδώσεως
   1.3 ὕψος ἐκφύσεως τῆς πρώτης διακλαδώσεως

2. Φύλλα τῆς ροζέττας (κατά τήν ἐμφάνιση τῶν ἀνθοφόρων ὀφθαλμῶν):
   2.1 ἀριθμός
   2.2 σχῆμα
   2.3 χνούδι
3. Ἄνθος: χρῶμα τῶν πετάλων (H)
4. Σπόρος:
   4.1 πάχος
   4.2 καφέ χρῶμα: παρουσία ἤ ἀπουσία (H)
5. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (H)

55. ΣΟΓΙΑ

Soia hispida L.

1. Κοτυληδών: ἀνθοκυάνη: παρουσία ἤ ἀπουσία (H)
2. Στέλεχος: μῆκος (H)
3. Ἄνθος: χρῶμα (H)
4. Λοβός: χρῶμα (H)
5. Σπόρος:
   5.1 βασικό χρῶμα (H)
   5.2 διακόσμηση: παρουσία ἤ ἀπουσία (H)
   5.3 σχῆμα (H)
6. Ταξινόμηση τῆς ἀνθήσεως (H)

ΜΕΡΟΣ Β

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ

Τά κατωτέρω χαρακτηριστικά ἰσχύουν γιά ὅλα τά εἴδη πού καταγράφονται στό μέρος Α.

1. 'Αποδόσεις
2. 'Ανθεκτικότης σέ ἐπιβλαβεῖς ὀργανισμούς
3. Συμπεριφορά ὅσον ἀφορᾶ τούς συντελεστές τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος
4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά
5. 'Εναλλακτικότης – γιά ἐαρινούς καί χειμερινούς τύπους ποικιλιῶν
6. Ρυθμοί παραγωγῆς – γιά τά ἀγροστώδη

Οἱ χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δηλώνονται ὅταν ὑποβάλλονται τά ἀποτελέσματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εἴδη	Κριτήρια: Δ Διακριτική φύση Σ σταθερότης Ο ὁμοιογένεια	Ἀριθμός φυτῶν ἢ ἔκταση ἐπιφανείας τῶν τεμαχίων			Τεμάχια ἀνά ἔτος	Δοκιμές ἀνά ἔτος	Ἔτη σπορᾶς
		Μεμονωμένα φυτά	Ἀπόγονοι	Σέ τεμάχια μέ γραμμοειδῆ σπορά: Φ: φυτά $μ^2$: τετραγ. μέτρα μ : μέτρα σειρᾶς			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Τεῦτλα	Δ, Σ, Ο	120	—	—	2	2	2
2. Κτηνοτροφικά φυτά							
2.1 Ἀγροστώδη	Δ, Σ	—	—	10 μ	2	2	2
	Ο	50	—	—	2	1	1
2.2. Ψυχανθῆ							
2.2.1 Πίσον τό ἀρουραῖο	Δ, Σ	—	—	100 Φ	2	2	2
	Ο	—	50	—	2	1	1
2.2.2 Βίκοι	Δ, Σ	—	—	100 Φ	2	1	2
	Ο	—	50	—	2	1	1
2.2.3 Κύαμος ὁ κτηνοτροφικός							
2.2.3.1 Ἐνδοανοπαραγόμενες γραμμές	Δ, Σ, Ο	20	—	—	2	1	2
2.2.3.2 Ἄλλα ὑβρίδια καί ποικιλίες ἐλεύθερης γονιμοποιήσεως	Δ, Σ, Ο	50	—	—	2	1	2
2.2.4 Ἄλλα ψυχανθῆ	Δ, Σ	—	—	10 μ	2	2	2
	Ο	50	—	—	2	1	2
2.3 Κράμβη ἡ κτηνοτροφική							
2.3.1 Ἐνδοαναπαραγόμενες γραμμές καί ἁπλά ὑβρίδια	Δ, Σ, Ο	20	—	—	2	1	2
2.3.2 Ἄλλα ὑβρίδια καί ποικιλίες ἐλεύθερης γονιμοποιήσεως	Δ, Σ, Ο	50	—	—	2	1	2
2.4 Ἄλλα εἴδη κτηνοτροφικῶν φυτῶν	Δ, Σ	—	—	100 Φ	2	1	1
	Ο	—	—	100 Φ	2	1	1
3. Σιτηρά							
3.1 Αὐτόγαμα εἴδη	Δ, Σ	—	—	2000 Φ	2	1	2
3.1.1 Χειμερινοί τύποι	Ο	—	150	2000 Φ	2	1	1
3.1.2 Ἐαρινοί τύποι	Ο	—	100	2000 Φ	2	1	1
3.2 Ἑτερόγαμα εἴδη μέ ἐξαίρεση τόν ἀραβόσιτο	Δ, Σ, Ο	—	—	2000 Φ	2	1	2
3.3 Ἀραβόσιτος							
3.3.1 Ἐνδοαναπαραγόμενες γραμμές καί ἁπλά ὑβρίδια	Δ, Σ, Ο	20	—	—	2	1	2
3.3.2 Ἄλλα ὑβρίδια καί ποικιλίες ἐλεύθερης γονιμοποιήσεως	Δ, Σ, Ο	50	—	—	2	1	2
4. Γεώμηλα	Δ, Σ, Ο	80	—	—	2	2	2

Εἴδη	Κριτήρια: Δ: διάκριση Σ: σταθερότης Ο: ὁμοιομορφία	Ἀριθμός φυτῶν ἢ ἔκταση ἐπιφανείας τῶν τεμαχίων			Τεμάχια ἀνά πείραμα	Δοκιμές ἀνά ἔτος	Ἔτη σποράς
		Μεμονωμένα φυτά	Ἀπόγονοι	Σέ τεμάχια μέ γραμμική σπορά: Φ: φυτά μ²: τετραγ. μέτρα μ : μέτρα γραμμῆς			
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Ἐλαιοῦχα καί κλωστικά φυτά							
5.1 Ἐλαιοκράμβη καί μήκων	Δ, Σ	—	—	1000 Φ	2	1	2
	Ο	—	—	1000 Φ	2	1	1
5.2 Κάνναβις	Δ, Σ, Ο	—	—	500 Φ	2	1	2
5.3 Κύμινον	Δ, Σ, Ο	—	—	10 μ	2	1	2
5.4 Βάμβαξ	Δ, Σ, Ο	—	—	30 μ²	3	2	2
5.5 Ἡλίανθος							
5.5.1 Καθαρές σειρές καί ἁπλά ὑβρίδια	Δ, Σ, Ο	20	—	—	2	1	2
5.5.2 Ἄλλα ὑβρίδια καί ποικιλίες ἐλεύθερης γονιμοποιήσεως	Δ, Σ, Ο	50	—	—	2	1	2
5.6 Λινάρι	Δ, Σ	—	—	2000 Φ	2	1	2
	Ο	—	50	—	2	1	1
5.7 Σόγια	Δ, Σ	—	—	500 Φ	2	1	2
	Ο	—	50	—	2	1	1
5.8 Ἄλλα εἴδη	Δ, Σ	—	—	500 Φ	2	1	2
	Ο	—	—	500 Φ	2	1	1

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ὁ αἰτῶν θέτει στή διάθεση τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν τίς ποσότητες τῶν σπόρων πρός σπορά ἤ τῶν φυτῶν πρός φύτευση πού οἱ τελευταῖες θεωροῦν ἀπαραίτητες γιά τίς δοκιμές καί τούς ἐπακολουθοῦντες ἐλέγχους.

2. Οἱ σπόροι πρός σπορά ἤ τά φυτά πρέπει νά πληροῦν τίς προϋποθέσεις ποιότητος πού καθορίζονται γιά τή βασική κατηγορία σπόρων πρός σπορά ἤ φυτῶν πρός φύτευση ἀπό τίς ὁδηγίες τοῦ Συμβουλίου τῆς 14ης Ἰουνίου 1966([1]) περί ἐμπορίας σπόρων τεύτλων, σπόρων κτηνοτροφικῶν φυτῶν, σπόρων σιτηρῶν καί σπόρων γεωμήλων καί τήν ὁδηγία τοῦ Συμβουλίου τῆς 30ῆς Ἰουνίου 1969([2]) περί ἐμπορίας σπόρων πρός σπορά τῶν ἐλαιούχων καί κλωστικῶν φυτῶν.

3. Ἡ ἑκατοστιαία ἀναλογία σέ ἀριθμό τῶν κονδύλων γεωμήλων τῶν προσβεβλημένων ὑπό μελανώσεως τοῦ λαιμοῦ (jambe noire) δέν ὑπερβαίνει τό 2%. Τά φυτά πρέπει νά εἶναι ἀπηλλαγμένα ἀπό χυτρίδιο τό σαρκῶδες (gale verruquese) καί ἀπό βακτηριακή σήψη (pourriture bactériose vasculaire). Ἡ ἑκατοστιαία ἀναλογία σέ βάρος τῶν παραμορφωμένων ἤ προσβεβλημένων κονδύλων δέν πρέπει νά ὑπερβαίνει τό 3%.

4. Στήν περίπτωση πολυετῶν φυτῶν οἱ δοκιμές πρέπει νά συνεχίζονται ἕως ὅτου ὅλα τά χαρακτηριστικά ἔχουν παρατηρηθεῖ καί σημειωθεῖ τουλάχιστον μία φορά.

5. Ἐάν ὑπάρχει ἀμφιβολία σχετικά μέ τήν ἀπόφαση πού λαμβάνεται στό θέμα τῆς ὁμοιομορφίας, ὅσον ἀφορᾶ τά εἴδη πού ἀπαριθμοῦνται στό παράρτημα Ι μέρος Α ἀριθ. 20, 29, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 45, 46, 50, 52, 53, ἤ 55, οἱ ἀπόγονοι τοῦ φυτικοῦ ὑλικοῦ, πού ἀναπτύχθηκε τό προηγούμενο ἔτος, πρέπει ἐπίσης νά ἐξετάζονται.

5. Ἐάν δέν εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ χρησιμοποιουμένη μέθοδος ἐξετάσεως σέ ἕνα Κράτος μέλος ἐφαρμόζεται ἐπίσης στά ἄλλα Κράτη μέλη, ἡ μέθοδος αὐτή πρέπει νά δηλώνεται.

([1]) ΕΕ ἀριθ. 125 τῆς 11.7.1966, σ. 2290/66.
([2]) ΕΕ ἀριθ. N 169 τῆς 10.7.1969, σ. 3.