I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1534/81

af 19. maj 1981

om fastsættelse for 1981—høsten af målpriserne, interventionspriserne og de præmier, der ydes til købere af tobak i blade, de afledte interventionspriser for tobak i baller, samt referencekvaliteterne

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak (1), senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1979, særlig artikel 2, stk. 5, artikel 4, stk. 4, og artikel 6, stk. 8,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg (4)

under henvisning til udtalelse fra Det monetære Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved fastsættelsen af priserne for råtobak bør der tages hensyn såvel til målsætningen for den fælles landbrugspolitik som til det bidrag, som Fællesskabet tilstræber at yde til den harmoniske udvikling af verdenshandelen; den fælles landbrugspolitik tilsigter særlig at garantere landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, at sikre forsyningerne og at garantere forbrugerne leverancer til rimelige priser;

målpriserne og interventionspriserne for tobak i blade bør fastsættes efter de kriterier, der omhandles i artikel 2, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 727/70, med henblik på at fremme en produktionsudvikling i retning af en omlægning af avlen henimod de sorter, der er mest efterspurgte og mest konkurrencedygtige;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 1535/81 af 19. maj 1981 om særlige foranstaltninger for visse sorter råtobak fra høsten 1981, 1982 og 1983 (5) er det fastsat, at interventionsprisen for disse sorter nedsættes;

for 1981-høsten bør der endvidere fastsættes afledte interventionspriser for de sorter, for hvilke der inden iværksættelsen af den fælles markedsordning eller for sorter dyrket i Grækenland, inden tiltrædelsen fandtes en prisgaranti for tobak i baller, samt for de sorter, der hovedsagelig dyrkes i Tyskland, for at tage hensyn til handelssædvanerne i dette land; med henblik herpå bør der tages hensyn til pris- og omkostningsstigningen og forøgelsen af produktiviteten;

formålet med den præmie, der ydes til køberne af den i Fællesskabet producerede tobak, er at gøre det muligt for dem at betale producenterne af tobal i blade en pris, som ligger på samme niveau som målprisen, under hensyntagen til prisudviklingen på verdensmarkedet og til det prisniveau, som er en følge af forholdet mellem udbud og efterspørgsel på Fællesskabets marked;

(1) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1
(2) EFT nr. C 65 af 25. 3. 1981, s. 2.
(3) EFT nr. C 90 af 21. 4. 1981, s. 101.
(4) Udtalelse afgivet den 25.—26. 3. 1981 (endnu ikke offentliggjort i EFT)

(5) Se side 19 i denne Tidende.

de ovennævnte priser og præmiebeløbet skal for hver sort fastsættes i forhold til en referencekvalitet, der er definert således, at det er muligt at bedømme tobakkens kvalitet så objektivt som muligt;

en ny vurdering af sorten Forchheimer Havanna II C fører til at optage den i gruppen af sorter under løbe-nr. 11 på grund af dens store lighed med sorten Nostrano del Brenta;

siden undertegnelsen af tiltrædelsesakten af 1979 har Grækenland ændret klassificeringen af sorterne i dete land, bl.a. ved at omgruppere visse ensartede sorter for bedre at tilpasse den Fællesskabets regler; denne nye klassificering bør derfor anvendes i stedet for klassificeringen i bilag II til tiltrædelsesakten;

ifølge artikel 87, stk. 1, og artikel 58 i tiltrædelsesakten af 1979 fastsættes de interventionspriser, der anvendes i Grækenland for tobak fra høsten 1981, på et niveau, der gør det muligt for producenterne i denne sektor at opnå markedspriser svarende til dem, der er opnået under den tidligere nationale ordning i en repræsentativ periode; høsten 1980 bør vælges som repræsentativ periode;

i artikel 87, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 1979 bestemmes det, at de målpriser, der svarer til ovennævnte interventionspriser, i Grækenland for høsten 1981 fastsættes på et niveau, som afspejler det klassificeringen i bilag II til tiltrædelsesakten;

ifølge artikel 87, stk. 1, og artikel 58 i tiltrædelsesakten af 1979 fastsættes de interventionspriser, der anvendes i Grækenland for tobak fra høsten 1981, på et niveau, der gør det muligt for producenterne i denne sektor at opnå markedspriser svarende til dem, der er opnået under den tidligere nationale ordning i en repræsentativ periode; høsten 1980 bør vælges som repræsentativ periode;

i artikel 87, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 1979 bestemmes det, at de målpriser, der svarer til ovennævnte interventionspriser, i Grækenland for høsten fastsættes på et niveau, som afspejler det forhold, der eksisterer mellem målprisen og interventionsprisen i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, andet afsnit i forordning (EØF) nr. 727/70;

ved Rådets forordning (EØF) nr. 850/81 [1], er det fastsat, at en ny repræsentativ kurs for tobakssektoren finder anvendelse for visse medlemsstaters valutaer fra den 6. april 1981, denne bestemmelse medfører fra denne dato en nedsættelse i den nationale valuta af de i regningsenheder udtrykte præmier for en betydelig del af høsten i de medlemsstater, hvis repræsentative kurs er revalueret; det synes dog mere i overensstemmelse med denne sektors karakter at sikre samme behandling af hele årets høst; dette mål kan nås, såfremt de pågældende medlemsstaters gamle omregningskurs anvendes for de for 1980-høsten ydede præmier —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For 1981-høsten fastsættes de i artikel 2, stk. 3, litra c), i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede referencekvaliteter for hver af de i Fællesskabet producerede sorter af tobak i blade som angivet i bilag I.

Artikel 2

For 1981-høsten fastsættes de i artikel 6, stk. 3, litra c), i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede referencekvaliteter for hver af de i Fællesskabet producerede sorter af tobak i baller, for hvilke der er fastsat en afledt interventionspris, som angivet i bilag II.

Artikel 3

For 1981-høsten fastsættes de i artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 727/70 omhandlede målpriser, interventionspriser og præmiebeløb, der ydes til køberne af tobak i blade, samt de i artikel 6 i samme forordning omhandlede afledte interventionspriser for tobak i baller som angivet i bilag III.

Artikel 4

Indtil den 31. marts 1982 er den omregningskurs, som i Forbundsrepublikken Tyskland finder anvendelse på præmierne for tobakshøsten 1980, den repræsentative kurs, der var gældende for den pågældende valuta inden den 6. april 1981.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

[1] EFT nr. L 90 af 4. 4. 1981, s. 1.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 1981.

På Rådets vegne

D. F. van der MEI

Formand

BILAG I

Tobak i blade i sorter og deres referencekvalitet for 1981-høsten

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
1	Badischer Geudertheimer	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: módne, sunde, ubeskadigede blade af mørkebrun til meleret farve, af ensartet længde Præsentation: sorteret tobak, i bundter eller i foreløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 26 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af rødligbrun til lysebrun farve, af ensartet længde Præsentation: sorteret tobak, i bundter eller i foreløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 25 %
3	Virgin D	Blade af klasse 1 Klasse 1: modne, sunde, ubeskadigede blade; afvigelser i brunlige til grønliggule farver er tilladt op til en tredjedel af bladfladen Præsentation: sorteret tobak i bundter eller i foreløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 19 %
4	a) Paraguay og hybrider deraf b) Dragon vert og hybrider deraf Philippin Petit-Grammont-(Flobecq) Semois Appelterre	Midterste blade (Leaves) af klasse 2 Klasse 2: sunde blade med lette farvnings-, bladvævs- og modenhedsfejl, men med tilstrækkelig combustibilitet Præsentation: sorteret og bundet eller sammenrullet tobak Fugtighed: 27 %
5	Nijkerk	Øverste blade (Tips) af klasse 2 Klasse 2: — enten blade af anden længde (45 cm eller eller derunder) med meget trækfast, kødfuldt, ubeskadiget modstandsdygtigt og elastisk bladvæv, uden fremtrædende åring, af god modenhed, der viser sig ved en brun til mørkebrun farve, af varm tone — eller blade af første længde (over 45 cm), med trækfast, kødfuldt, endnu ubeskadiget, modstandsdygtigt bladvæv, med mere eller mindre fremtrædende åring, af alle farver med undtagelse af flaskegrøn Præsentation: sorteret og bundtet eller sammenrullet tobak Fugtighed: 27 %

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
6	a) Misionero og hybrider deraf b) Rio Grande og hybrider deraf	Blade af 2. kvalitet 2. kvalitet: fuldt udviklede blade af længde over 45 cm, uden groft bladvæv, med en lys noget gullig farve, af en varm eller temmelig varm tone, tilstrækkeligt faste og stort set ubeskadigede, med forholdsmæssig god combustibilitet Præsentation: sorteret og bundtet eller sammenrullet tobak Fugtighed: 27 %
7	Bright	Blade af kategori A Kategori A: blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt tørrede, af åben textur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige schatteringer Præsentation: i foreløbige baller på 30—40 kg Fugtighed: 16 %
8	Burley I	Blade af kategori A Kategori A: blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt tørrede, af åben textur, også faste, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre varm nøddebrun farve Præsentation: i foreløbige baller på 30—40 kg eller i bundter på 25—30 blade bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 19 %
9	Maryland	Blade af kategori A Kategori A: blade af tilstrækkelig modenhed, med lette tørringsfejl med meget få bronzefarvede nuancer, med et bladvæv af middel textur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af en rødligbrun, nærmest varm farve Præsentation: i foreløbige baller på 30—40 kg eller i bundter på 25—30 blade bundet med andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 19 %
10	a) Kentucky og hybrider deraf b) Moro di Cori c) Salento	Blade af kategori B Kategori B: fuldmodne blade med fast bladevæv uden fejl som følge behandling og opbevaring, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god combustibilitet Præsentation: i bundter på 25—30 blade bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 23 %

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
11	a) Forchheimer Havanna II C b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: modne, sunde, ubeskadigede blade af mørkebrun til meleret farve, af ensartet længde Præsentation: sorteret tobak, i bundter eller i foreløbige baller, bundet med et andet materiale end tobak Fugtighed: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile, Selvaggio o.lign. sorter	Blade af kategori B Kategori B: blade af tilstrækkelig modenhed, med fast eller endog groft eller magert bladvæv, med ubetydelige fejl som følge af tørring, fermentering og beskadigelse Præsentation: i bundter på 25—30 blade bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 24 %
13	Xanti Yakà	Blade af kategori B Kategori B: tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse, af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet de midterste blades længde overstiger ikke 20 cm Præsentation: i foreløbige baller på 15—20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30—40 kg Fugtighed: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Blade af kategori B Kategori B: tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptisk-runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest skarpvinklede årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet de midterste blades længde overstige ikke 25 cm Præsentation: i foreløbige baller på 15—20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30—40 kg Fugtighed: 17 %

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
15	Erzegovins og lign. sorter	Blade af kategori B Kategori B: tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse af oval eller elliptisk form med nogenlunde fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god combustibilitet de midterste blades længde overstiger ikke 35 cm Præsentation: i foreløbige baller på 15—20 kg eller i kasser med »guirlander« af blade på 30—40 kg Fugtighed: 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Blade af kategori B Kategori B: midterste nedre blade sorteret efter længde i følgende størrelsesforhold: første længde (38 cm og derover) 60 % anden længde (på 32 cm og derover men under 38 cm) 35 % tredje længde (på 25 cm og derover men under 32 cm) 5 % blade af god form; fuldmodne og af ensartet farve, sunde, ubeskadigede, af fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, uden fremtrædende ribber og årer, tilpas fermenteret og godt bevaret, af god combustibilitet, med typisk smag og aroma egnet til cigardæksblad, med ca. 25 % beskadigede blade Præsentation: i bundter bundet med et andet materiale end tobak (fascicoli) Fugtighed: 22 %
17	Basmas	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne, ubeskadigede, sunde blade uden tørringsfejl; tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), længde op til 15 cm, farve: gylden, orange til rødgul, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde; tyndkornede og af god tekstur, med kraftig behagelig aroma god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl; nogle spor af sygdom; tages fra alle bladpositioner; op til 20 cm lange; farve: lysegul, gulgrøn, rødlig eller lysebrun; af temmelig løs struktur og god tekstur; middel elastiske; med moderat glans; moderat kødfulde, med kraftig behagelig aroma meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: bondeballer på 15—25 kg, præsenteret på traditionel vis i to rækker pasteller (i lignende blade). (Det bør bemærkes, at områderne Antakos og Chrysupolis præsenteres tobakken i »armathodom«) Fugtighed: 17 %

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
18	Katerini og lignende sorter	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne, beskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til til rødlig, af løs struktur, meget elastiske, med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovennævnte blade udgør 45 % af kvalitet I/III. Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, nogle spor af sygdom, tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, orange, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af løs struktur, gennemsnitlig elasticitet og skinnende moderat kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: cuirlanderne samles for det meste efter præsentationsmåden »Baski« før emballeringen. Præsentation i baller på 25—35 kg efter den traditionelle metode kaldet »Kalup« Fugtighed: 15 %
19	Klassisk Kaba Koulak	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topblade, op til 25 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og op til 20 cm lange for Karatzova og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, elastiske og med glans; af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III. Modne blade med nogle lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm lange for Karatzeva og Kontoula, farve: gul, gulgrøn, rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, middel elastiske og med moderat glans, meget god combustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: bondeballer på 15—30 kg, præsenteret på traditionel i to rækker »armathodema« Fugtighed: 17 %
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous og Phi 1	Blade af Kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, og til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm for Elassona, og Phi 1 og op til 15 cm for Myrodata Smyrne, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og udmærket kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet	
20 *(fortsat)*	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous og Phi 1		modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 cm lange for Elassona og Phi 1 og op til 20 cm for Myrodata Smyrne, farve: gul, gulgrøn eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III
		Præsentation:	bondeballer på 25—35 kg, præsenteret på traditionel vis i »armathodema« eller på 35—50 kg i form af »Kaloup«
		Fugtighed:	17 %
21	Myridata Agrinion	Blade af kvalitet I/III	
		Kvalitet I/III:	modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første »protomana«), op til 25 cm lange, farve: gul til mørkeorange, meget elastiske og med glans; af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor stammer fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske med glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III
		Præsentation:	I bondeballer på 15—30 kg præsenteret på traditionel vis i to rækker »armathodema«.
		Fugtighed:	15 %
22	Zichnomyrodata	Blade af kvalitet I/III	
		Kvalitet I/III:	modne ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III modne, og tilstrækkeligt ubeskadigede blade med få lette tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul, gulgrøn eller lys rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III
		Præsentation:	i bondeballer på 15—30 kg præsenteret på traditionel vis i to rækker »armathodema«.
		Fugtighed:	17 %
23	Tsebelia	Blade af kvalitet I/III	
		Kvalitet I/III:	modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første, op til 35 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, god elasticitet og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III modne og tilstrækkeligt ubeskadigede blade

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet	
23 *(fortsat)*	Tsebelia		med nogle lette tørringsfejl, stammer fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: lyesegul, gulgrøn rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med middel glans, temmelig kødfulde, af temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere angrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser.
			De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III
		Præsentation:	i bondeballer på 30—40 kg, præsenteret i to rækker »armathodema«.
		Fugtighed:	14 %
24	Mavra	Blade af kvalitet I/III.	
		Kvalitet I/III:	modne, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 30 cm lange, farve: fra rødlig gul til orange og det rødlige, af løs struktur, god tekstur, god elasticitet og mod glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet.
			De ovenfor beskrevne udgør 45 % af kvalitet I/III
			modne og tilstrækkeligt ubeskadiged blade med lette tørringsfejl der stammer fra alle bladpositioner, op til 40 cm lange, farve: gullig, grøngul (citron), rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet
			denne kategori omfatter endvidere lettere angrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser.
			De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III
		Præsentation:	i bondeballer på 30—50 kg præsenteret i to rækker »armathodema«
		Fugtighed:	14 %
25	Burley GR	Blade af kvalitet A	
		Kvalitet A:	helmodne, blade, fuldstændig udviklede, ubeskadigede og sunde blade uden tørringsfejl, tages fra midterpositionen, farve: ensartet middelbrun til rødbrun, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet
		Præsentation:	i bondeballer på 40 kg, præsenteret i to rækker »armathodema«, uden snor (i løse blade)
		Fugtighed:	22 %
26	Virginia GR	Blade af kvalitet A	
		Kvalitet A:	helmodne fuldstændigt udviklede, sunde og ubeskadigede blade uden tørringsfejl, farve: ensartet citrongul til middel orange, kødfulde, af god tekstur og god kombustibilitet, tages hovedsagelig fra midterpositionen
		Præsentation:	i bondeballer på 30—40 kg, præsenteret i to rækker »armathodema«, uden snor (i løse blade)
		Fugtighed:	19 %

BILAG II

Tobaksballer i sorter og deres referencekvaliteter for 1981-høsten

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
1	Badischer Geudetheimer	Hauptgut (Leaves) af klasse I Klasse 1: modne, sunde, ubeskadigede blade af meleret til mørkebrun farve, af ensartet længde; normalt fermenteret Præsentation: i baller eller kasser på ca. 75—200 kg eller i fade på ca. 225—450 kg Fugtighed: 16 %
2	Badischer Burley E	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af lysebrun, rødlig brun til mørkebrun farve, af ensartet længde; normalt fermenteret Præsentation: i baller eller kasser på ca. 75—175 kg eller i fade på ca. 225—450 kg Fugtighed: 15 %
3	Virgin D	Blade af klasse 1 Klasse 1: modne, sunde, ubeskadigede blade af gul, gulrød til brunliggul farve; normalt fermenteret Præsetation: i baller eller kasser på ca. 75—175 kg eller i fade på ca. 225—450 kg Fugtighed: 13 %
7	Bright	Blade af kategori A Kategori A: blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt behandlet, af åben textur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige schatteringer Præsentation: i fade på ca. 280—450 kg eller i kasser på ca. 150—210 kg Fugtighed: 13 %
8	Burley I	Blade af kategori A Kategori A: blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt behandlet, af åben textur, også faste, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre varm nøddebrun farve Præsentation: i fade på 280—450 kg eller i kasser på ca. 150—210 kg Fugtighed: 13 %

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
9	Maryland	Blade af kategori A Kategori A: blade af tilstrækkelig modenhed, med lette tørringsfejl med meget få bronzefarvede nuancer, med et bladvæv af middel textur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af en rødligbrun mere eller mindre varm farve Præsentation: i fade på ca. 280—450 kg eller i kasser på ca. 150—210 kg Fugtighed: 13 %
10	a) Kentucky og hybrider deraf b) Moro di Cori c) Salento	Blade af kategori B Kategori B: fuldmodne blade med fast bladvæv, uden fejl som følge behandling og opbevaring, af brun farve, med nogle beskadigelser, med god kombustibilitet Præsentation: i fade på ca. 280—450 kg eller i baller på ca. 170—200 kg Fugtighed: 16 %
11	a) Forchheimer Havanna II C b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Hauptgut (Leaves) af klasse 1 Klasse 1: modne, sunde, ubeskadigede blade af meleret til mørkebrun farve, af ensartet længde; normalt fermenteret Præsentation: i baller eller kasser på ca. 75—200 kg eller i fade på ca. 225—450 kg Fugtighed: 16 %
12	a) Beneventano b) Brasile, Selvaggio o.lign. sorter	Blade af kategori B Kategori B: blade af tilstrækkelig modenhed, med fast eller endog groft eller magert bladvæv, med ubetydeligt fejl som følge af behandling, fermentering og beskadigelse Præsentation: i baller på ca. 120 kg eller i fade på ca. 330 kg Fugtighed: 16 %
13	Xanti-Yakà	Blade af kategori B Kategori B: tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse, af oval-elliptisk form, med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet de midterste blades længde overstiger ikke 20 cm Præsentation: i små baller på ca. 18—50 kg Fugtighed: 13 %

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
14	a) Perustitza b) Samsun	Blade af kategori B Kategori B: tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse (Perustitza) eller med stilk (Samsun), elliptisk-lancetformede med tynde spidser (Perustitza) eller elliptiske -runde (Samsun), med ikke for fremtrædende ribber og med nærmest skarpvinklede årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve (Perustitza) eller henimod det rødlige (Samsun), med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet de midterste blades længde overstiger ikke 25 cm Præsentation: i små baller på ca. 18—50 kg Fugtighed: 13 %
15	Erzegovina og lign. sorter	Blade af kategori B Kategori B: tilstrækkeligt sunde og modne blade, stilkløse, af oval eller elliptisk form med nogenlunde fremtrædende ribber og nærmest åbenvinklede sekundære årer, kan have nogle tørringsfejl, oftest med let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt bevarede, fra alle bladpositioner, med diskret smag, tilstrækkelig aroma og god kombustibilitet de midterste blades længde overstiger ikke 35 cm Præsentation: i små baller på ca. 18—50 kg eller i kasser Fugtighed: 13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Blade af kategori B Kategori B: midterste nedre blade, sorteret efter længde i følgende størrelsesforhold: første længde (38 cm og derover) 60 % anden længde (på 32 cm og derover men under 38 cm) 35 % tredje længde (på 25 cm og derover men under 32 cm) 5 % blade af god form, fuldmodne og af ensartet farve sunde, ubeskadeligede, af fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, uden fremtrædende ribber og årer, tilpas fermenteret og godt bevaret, af god kombustibilitet, med typisk smag og aroma, egnet til cigardæksblad med ca. 25 % beskadigede blade Præsentation: i baller på ca. 70—90 kg eller i kasser på ca. 180—210 kg Fugtighed: 16 %

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
17	Basmas	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade; tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 15 cm lange; farve: gylden, orange til rødgul; meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, af løs struktur og god tekstur med kraftig behagelig aroma god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 40 % af kvalitet I/III modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, nogle spor af sygdom, op til 20 cm lange, farvet lysegul, rødlig eller eller lysebrun; af temmelig løs struktur, og god tekstur, middel elastiske og med middel glans, moderat kødfulde; med kraftig behagelig aroma meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: i såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
18	Katerini og lignende sorter	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, tages fra alle bladpositioner (protomana), op til 20 cm lange, farve: lysegul eller orange til rødlig, af løs struktur, meget elastiske og med glans, temmelig kødfulde, af god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III modne blade med nogle beskadigelser og tørringsfejl, nogle spor af sygdom, stammer fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange farve: gul, orange, gulgrøn, rødlig eller lysebrun, af løs struktur, temmelig kødfulde god tekstur gennemsnitlig elasticitet og skinnende og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: i såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
19	Klassisk Kaba Koulak	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne ubeskadigede, grunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange for Karatzeva og Kontoula, farve: middelgul til mørkegul, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur, og udmærket kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III. Modne blade med lette beskadigelser og/eller tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og 25 cm for Karatzova og Kontoula, farve: gul til rødlig, af temmelig god tekstur, middel elastiske og med glans, meget god kombustibilietet. De ovenfor beskrevne blade udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: i såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg. Fugtighed: 13 %

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous og Phi 1	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne, ubeskadigede, sunde og veltørrede blade, stammer fra alle bladpositioner, med undtagelse af topbladene, op til 30 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 20 cm lange for Elassona og Phi 1, og op til 15 cm lange for Myrodata Smyrne, farve: lysegul til rødlig, meget elastiske og med glans, af temmelig løs struktur, god tekstur og med god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 35 cm lange for Macedonia Kaba Koulak og Trapezous, op til 25 for Elessona og Phi 1, og op til 20 cm for Myrodata Smyrne, farve: gul til lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: i såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
21	Myrodata	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, stammer fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (Protomana), op til 25 cm lange, farve: gul mørk orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 47 % af kvalitet I/III. Modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor stammer fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gul til lys rødlig, temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: i såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 14 %
22	Zichomyrodata	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af topbladene, op til 20 cm lange, farve: lysegul til lys orange, meget elastiske og med glans, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 47 % af kvalitet I/III modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, med små sygdomsspor tages fra alle bladpositioner, op til 25 cm lange, farve: gul til lys rødlig, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, meget god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (III) udgør 53 % af kvalitet I/III Præsentation: i såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %

Løbenr.	Sorter	Referencekvalitet
23	Tsebelia	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne, ubeskadigede, sunde og velplejede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (protomana), op til 30 cm lange, farve: rødgul, orange til rødlig, af løs struktur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde, god tekstur, og megen god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade (I/II) udgør 45 % af kvalitet I/III modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 40 cm, lange, farve: lysegul til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur, temmelig elastiske og med temmelig stærk glans, temmelig kødfulde, temmelig god tekstur og meget god kombustibilitet. Denne kategori omfatter endvidere lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser. De ovenfor beskrevne blade udgør 55 % af kvalitet I/III Præsentation: i såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
24	Mavra	Blade af kvalitet I/III Kvalitet I/III: modne, ubeskadigede, sunde og omhyggeligt tørrede blade, tages fra alle bladpositioner med undtagelse af den første (»protomana«), op til 30 cm lange, farve: fra rødgul eller orange til rødlig, af løs struktur, god tekstur, elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. De ovenfor beskrevne blade udgør 45 % af kvalitet I/III modne og tilstrækkelig ubeskadigede blade med lette tørringsfejl, tages fra alle bladpositioner, op til 30 cm lange, farve: gullig til rødlig eller lysebrun, af temmelig løs struktur og temmelig god tekstur, temmelig elastiske og med glans, temmelig kødfulde og god kombustibilitet. Denne kategori omfatter også lettere sygdomsangrebne blade og/eller blade med lette beskadigelser. De ovenfor nævnte blade udgør 55 % af kvalitet I/III. Præsentation: i såkaldte »tongas«-baller på ca. 30 kg Fugtighed: 13 %
25	Burley GR	Blade af kvalitet A Kvalitet A: helmodne, fuldstændigt udviklede, ubeskadigende, sunde og veltørrede blade, tages fra midterpositionen, farve: fra en ensartet middel nøddebrun til en ensartet middel rødbrun, af løs struktur, god tekstur og meget god kombustibilitet. Præsentation: i baller på ca. 100 kg eller i kasser på ca. 200 kg eller i fade på ca. 240—280 kg Fugtighed: 13 %
26	Virginia GR	Blade af kvalitet A Kvalitet A: helt modne og fuldstændigt udviklede blade, tages fra midterpositionen, sunde, ubeskadigede, velplejede, farve: ensfarvet gul, der går fra citrongul til middelgul, af god tekstur og god kombustibilitet Præsentation: i baller på ca. 100 kg Fugtighed: 13 %

BILAG III

Målpriser, interventionspriser og præmier for tobak i blade for 1981-høsten

Afledte interventionspriser for tobak i baller for 1981-høsten

(ECU/kg)

Løbenr.	Sorter	Målpris	Interventionspris	Præmie	Afledt interventionspris
1	Badischer Geudertheimer	3,165	2,849	2,219	4,160
2	Badischer Burley E	3,783	3,405	2,384	4,734
3	Virgin D	3,690	3,321	2,243	4,331
4	a) Paraguay og hybrider deraf b) Dragon vert og hybrider deraf, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	2,993	2,694	1,979	–
5	Nijkerk	2,915	2,624	1,818	–
6	a) Misionero og hybrider deraf b) Rio Grande og hybrider deraf	2,717	2,445	1,892	–
7	Bright	3,247	2,922	1,885	3,976
8	Burley I	2,387	2,148	1,331	3,084
9	Maryland	2,722	2,450	1,479	3,427
10	a) Kentucky og hybrider deraf b) Moro di Cori c) Salento	2,339	1,871 (1)	1,373	2,650 (1)
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	3,135	2,822	2,157	4,127
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter	1,693	1,524	1,218	2,205
13	Xanti-Yakà	3,184	2,547 (1)	2,220	4,015 (1)
14	a) Perustitza	3,016	2,413 (1)	2,114	3,514 (1)
	b) Samsun	3,016	2,714	2,114	3,859
15	Erzegovina og lignende sorter	2,708	2,166 (1)	1,904	3,166 ( )
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	14,200	12,780	8,122	18,831
17	Basmas	4,270	3,843	2,292	5,240
18	Katerini og lignende sorter	3,735	3,362	2,038	4,896
19	Klassisk Kaba Koulak	3,317	2,986	1,802	4,258

(1) I medfør af forordning (EØF) nr. 1535/81 om særlige foranstaltninger for visse sorter råtobak fra høsten 1981, 1982 og 1983.

(ECU/kg)

Løbenr.	Sorter	Målpris	Interventionspris	Præmie	Afledt interventionspris
20	a) Ikke-klassisk Kaba Koulak b) Elassona, Myrodata Smyrne, Trapezous og Phi 1	2,654	2,389	1,366	3,588
21	Myrodata Agrinion	3,422	3,080	1,882	4,308
22	Zichnomyrodata	3,434	3,091	1,919	4,376
23	Tsebelia	3,663	3,297	2,900	4,607
24	Mavra	3,575	3,218	2,371	4,519
25	Burley GR	1,729	1,556	0,797	2,480
26	Virginia GR	2,783	2,505	1,421	3,508