REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/87 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1987

che fissa, per il raccolto 1987, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonché le qualità di riferimento e le zone di produzione e che modifica il regolamento (CEE) n. 1577/86

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/87 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

visto il parere del comitato monetario,

considerando che nel fissare i prezzi per il settore del tabacco greggio occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune, ha, più particolarmente, lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70, per promuovere l'orientamento della produzione, in particolare nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste e più competitive;

considerando che è opportuno fissare, anche per il raccolto 1987, prezzi d'intervento derivati per le varietà che, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati o, per le varietà coltivate in Grecia, Spagna e Portogallo, prima dell'adesione, beneficiavano di una garanzia di prezzo nella fase del tabacco in colli, nonché per le varietà principalmente coltivate in Germania, al fine di tener conto degli usi commerciali vigenti in tale paese;

considerando che il premio concesso agli acquirenti di tabacco comunitario deve consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi risultante dal gioco dell'offerta e della domanda sul mercato comunitario;

considerando che i prezzi di cui sopra e l'importo del premio devono essere fissati per ciascuna varietà coltivata nelle zone di produzione riconosciute in rapporto ad una qualità di riferimento definita in modo da consentire la valutazione più obiettiva possibile della qualità del tabacco;

considerando che, per il raccolto 1987, è opportuno indicare le zone di produzione riconosciute di ogni varietà di tabacco e utilizzare le definizioni delle qualità di riferimento stabilite dal regolamento (CEE) n. 1577/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa, per il raccolto 1986, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonché le qualità di riferimento e le zone di produzione [6];

considerando che nell'elenco delle zone riconosciute di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1577/86 sono state omesse sei zone di produzione; che, per consentire ai produttori di tabacco di tali zone di beneficiare delle misure previste dal citato regolamento occorre modificare l'allegato in questione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1890/87 [7] ha previsto che, per il settore del tabacco, si applichi a decorrere dal 1° aprile 1988, un nuovo tasso rappresentativo per le monete di taluni Stati membri; che, negli Stati membri il cui tasso rappresentativo è rivalutato, questa disposizione provocherebbe, a decorrere dalla suddetta data, una diminuzione in moneta nazionale dei premi fissati in unità di conto per una parte cospicua del raccolto; che è non di meno più opportuno, attese le caratteristiche del settore, assicurare lo stesso trattamento a tutto il raccolto di un'annata; che questo obiettivo può essere conseguito se il tasso di cambio precedentemente in vigore negli Stati membri interessati è reso applicabile ai premi versati per il raccolto 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1987, le qualità di riferimento e le zone di produzione riconosciute ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3,

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 67.
(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.

(6) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 3.
(7) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.

lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna varietà di tabacco in foglia prodotta nella Comunità sono quelle stabilite rispettivamente negli allegati I e III del presente regolamento.

Articolo 2

Per il raccolto 1987, le qualità di riferimento e le zone di produzione riconosciute ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna varietà di tabacco in colli prodotta nella Comunità per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato sono quelle stabilite negli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 3

1. Per il raccolto 1987, i prezzi d'obiettivo e d'intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

2. I prezzi e i premi si applicano solo a condizione che ciascuna delle suddette varietà sia stata coltivata nelle zone di produzione corrispondenti indicate nell'allegato III.

Articolo 4

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1577/86 è modificato come segue:

— per la varietà «2. Badischer Burley E e ibridi derivati», le zone di produzione riconosciute per l'Italia sono sostituite dalle seguenti: «Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna»;

— per la varietà «3. Virgin D.», le zone di produzione riconosciute per la Repubblica federale di Germania sono sostituite dalle seguenti: «Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Franconia, pianura del Reno e valli adiacenti»;

— per la varietà «4. a) Paraguay e ibridi derivati» è aggiunto fra i paesi «Belgio» con «Fiandre» per zona di produzione riconosciuta;

— per la varietà «17. Basmas», le zone di produzione riconosciute per la Grecia sono sostituite dalle seguenti: «Tracia, Macedonia, Sterea Hellas e Tessaglia»;

— il punto 18 è sostituito dal testo seguente:

«18. a) Katerini	Grecia	Macedonia
b) Varietà simili		Macedonia, Sterea Hellas, Epiro e Tessaglia»

Articolo 5

Il tasso di conversione da applicare nella Repubblica federale di Germania ai prezzi in vigore per la raccolta di tabacco 1986 è il tasso rappresentativo valido per la moneta in questione prima del 1° aprile 1988.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 4 è applicabile a decorrere dal 24 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN

ALLEGATO I

Tabacco in foglia: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1987

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	Badischer Geudertheimer e ibridi derivati	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo a tonalità scura, di lunghezza uniforme Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità: 26 %
2	Badischer Burley E e ibridi derivati	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità: 25 %
3	Virgin D	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità: 19 %
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Foglie mediane (Leaves) di classe 2 Classe 2: foglie sane con leggeri difetti di colorazione, di natura di tessuto, di maturità, ma di combustibilità soddisfacente Allestimento: foglie cernite, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità: 27 %
5	Nijkerk	Foglie apicali (Tips) di classe 2 Classe 2: — sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm), con tessuto molto gommoso, sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione da marrone a marrone scuro, di tonalità vivace — sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm), con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione (ad esclusione del verde bottiglia) Allestimento: tabacco cernito, o manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità: 27 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	Foglie di seconda qualità Seconda qualità: foglie di oltre 45 cm di lunghezza, di tessuto non grossolano, di colorazione chiara leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità Allestimento: tabacco cernito, a manocchi o a foglie sciolte orientate Umidità: 27 %
7	Bright	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg Umidità: 16 %
8	Burley I	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 19 %
9	Maryland	Foglie di grado A Grado A: foglie di maturità sufficiente, anche con leggero difetto di cura, con vaghe sfumature verdastre, tessuto di media consistenza, costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colorazione marrone rossastra piuttosto vivace Allestimento: in balle provvisorie di 30/40 kg o in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 19 %
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	Foglie di grado B Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità Allestimento: in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 23 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Foglie di grado B Grado B: foglie con tessuto consistente o leggero, sane, senza difetto di essiccazione, di colore bruno verdognolo, con difetti di integrità Allestimento: tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso Umidità: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità Allestimento: in fascicoli di 25/30 foglie Umidità: 24 %
13	Xanti-Yaka	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale ellittica, a costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg Umidità: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondate (Samsun), costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con difetti accentuati di integrità ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg Umidità: 17 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
15	Erzegovina e varietà simili	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm Allestimento: in balle provvisorie di 15/20 kg o in casse di «ghirlande» di foglie di 30/40 kg Umidità: 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Foglie di grado B Grado B: foglie mediane inferiori suddivise per lunghezza secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 % 2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 % 3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm) 5 % foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fino, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre Allestimento: in fascicoli Umidità: 22 %
17	Basmas	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III foglie mature, con qualche lieve difetto d'integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al giallo verde, al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III Allestimento: in ballette campagnole di 15/25 kg costituite di manocchi di foglie spianate in due ranghi. (Si noti che nei distretti di Astakos e Chrysoupolis la presentazione si effettua secondo il metodo «armathodema») Umidità: 17 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
18	Katerini e varietà simili	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, di sostanza media, mediamente elastiche e brillanti e di ottima combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III Allestimento: le filze sono generalmente raccolte secondo il metodo «Baski» prima dell'imballaggio Presentazione in balle di 25/35 kg secondo il metodo tradizionale «Kaloup» Umidità: 16 %
19	a) Kaba Koulak classico b) Elassona	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per l'Elassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per l'Elassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al giallo-verde o al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III Allestimento: in ballette campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema» Umidità: 17 %
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per il Phi I e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per il Phi I e a 20 cm per il Myrodata

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
20 *(segue)*	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I	Smyrne, di colore giallo-verde o marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III Allestimento: in ballette campagnole di 25/35 kg, condizionate secondo il metodo tradizionale «armathodema» ovvero di 35/50 kg secondo il metodo «Kaloup» Umidità: 17 %
21	Myrodata Agrinion	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore giallo, giallo-verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III Allestimento: in ballette campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema» Umidità: 15 %
22	Zichnomyrodata	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, giallo verde o rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III Allestimento: in ballette campagnole di 15/30 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo tradizionale «armathodema» Umidità: 17 %
23	Tsebelia	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima, lunghe fino a 35 cm, di colore rosso-giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di media sostanza, di tessuto gentile e di ottima combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
23 *(segue)*	Tsebelia	foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo chiaro, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III Allestimento: in ballette campagnole di 30/40 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo «armathodema» Umidità: 14 %
24	Mavra	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore giallo-verde (limone), rossastro o marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie leggermente danneggiate e/o con lievi difetti d'integrità Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III Allestimento: in ballette campagnole di 30/50 kg, condizionate in due ranghi secondo il metodo «armathodema» Umidità: 14 %
25	Burley EL	Foglie della qualità A Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità Allestimento: in ballette campagnole da 50 a 70 kg, condizionate in due ranghi senza spago (foglia sciolta) secondo il metodo «armathodema» Umidità: 22 %
26	Virginia EL	Foglie della qualità A Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, sostanziose, di tessuto gentile e di buona combustibilità, provenienti essenzialmente dalle corone mediane Allestimento: in ballette campagnole di 30/40 kg, condizionate in due ranghi senza spago (foglia sciolta) secondo il metodo «armathodema» Umidità: 19 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
27	Santafé	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, senza difetti di cura, costola completamente ridotta, di colore marrone, con qualche difetto di integrità Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie omogenee Umidità: 18 %
28	Burley fermentato	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, senza difetti di cura, costola completamente ridotta, di buona combustibilità, di colore da nocciola a cannella, con qualche difetto di integrità Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie omogenee Umidità: 18 %
29	Havana E	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, con tessuto fine, con la costola e le nervature poco accentuate, senza difetti di essiccazione, costola completamente ridotta, di colore marrone, marrone chiaro o verdastro, con qualche difetto di integrità Presentazione: tabacco cernito in balle provvisorie uniformi Umidità: 18 %
30	Round Scafati	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie sufficientemente ampie, di buona maturità, di colore uniforme, sane, senza difetti d'integrità, di tessuto sottile, elastiche e resistenti, con costola e nervature poco accentuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, utilizzabili per le fasce dei sigari. È tollerata una percentuale del 25 % circa di foglie non integre Presentazione: in balle provvisorie e omogenee contenenti fascicoli legati con materiale diverso Umidità: 18 %
31	Virginia E	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie sufficientemente mature, senza difetti di essiccazione, a tessuto aperto, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di color cammello, nelle varie gradazioni Presentazione: in balle provvisorie omogenee di 33/45 kg di tabacco non legato in fascicoli e separato per corona fogliare Umidità: 16 %
32	Burley E	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie sufficientemente mature, senza difetti di essiccazione, tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di color cannella, nelle varie gradazioni Presentazione: in balle provvisorie omogenee di 33/45 kg di tabacco non legato in fascicoli e separato per corona fogliare Umidità: 18 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
33	Virginia P	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, tessuto a grana aperta ed elastico, oleose, di colore da giallo limone a arancio, brillanti, di lunghezza superiore a 40 cm, escluse la prima e l'ultima delle corone fogliari Presentazione: in balle provvisorie di 45 kg con le foglie ordinate Umidità: 17 %
34	Burley P	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, tessuto a grana aperta ed elastico, colore brillante, lunghezza superiore a 40 cm, esclusa la prima e l'ultima corona fogliare Presentazione: in balle provvisorie di 35 kg con le foglie ordinate Umidità: 20 %

ALLEGATO II

Tabacco in colli: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1987

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	Badischer Geudertheimer e ibridi derivati	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/200 kg circa o in botti di 225/450 kg circa Umidità: 16 %
2	Badischer Burley E e ibridi derivati	Hauptgut (Leaves) di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro, bruno rossastro al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale Allestimento: in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa Umidità: 15 %
3	Virgin D	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo, giallo-rosso al giallo brunastro e fermentazione normale Allestimento: in balle o casse di 75/175 kg circa o in botti di 225/450 kg circa Umidità: 13 %
7	Bright	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa Umidità: 13 %
8	Burley I	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa Umidità: 13 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
9	Maryland	Foglie di grado A Grado A: foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura ed anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace Allestimento: botti di 280/450 kg circa o in cartoni di 150/210 kg circa Umidità: 13 %
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	Foglie di grado B Grado B: foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità, di buona combustibilità Allestimento: botti di 280/450 kg circa o balle di 170/200 kg circa o cartoni di 150/200 kg Umidità: 16 %
11	a) Forcheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Foglie di grado B Grado B: foglie con tessuto consistente o leggero, sane, senza difetto di essiccazione, di colore bruno-verdognolo, con difetti di integrità Allestimento: in balle, casse o cartoni di 75/200 kg circa o in botti di 225/450 kg circa Umidità: 16 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà simili	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità Allestimento: balle di 120 kg circa o botti di 330 kg circa Umidità: 16 %
13	Xanti-Yakà	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale-ellittica, costole non eccessivamente accentuate e nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con difetti accentuati di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 20 cm Allestimento: ballette di 18/50 kg circa Umidità: 13 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
14	a) Perustitza b) Samsun	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili (Perustitza) o picciolate (Samsun), di forma ellittica lanceolata a punta sfilata (Perustitza) o ellittica arrotondata (Samsun), con costole poco accentuate e nervature secondarie ad angolo quasi acuto, che possono presentare alcuni difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone (Perustitza) o tendente al rossiccio (Samsun), con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 25 cm Allestimento: ballette di 18/50 kg circa Umidità: 13 %
15	Erzegovina e varietà simili	Foglie di grado B Grado B: foglie sufficientemente sane e mature, sessili, di forma ovale o ellittica, costole mediamente accentuate, nervature secondarie ad angolo piuttosto aperto, che possono presentare lievi difetti di cura, di tessuto in genere leggero, di colore da giallo a marrone, con accentuati difetti di integrità, ma ben conservate, provenienti da tutte le corone fogliari, di gusto discreto, di aroma sufficiente e di buona combustibilità La lunghezza delle foglie mediane non supera i 35 cm Allestimento: ballette di 18/50 kg circa Umidità: 13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Foglie di grado B Grado B: foglie mediane inferiori suddivise per lunghezza secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza (uguale o superiore a 38 cm) 60 % 2ª lunghezza (da 32 a meno di 38 cm) 35 % 3ª lunghezza (da 25 a meno di 32 cm) 5 % foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, senza difetti di integrità, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre Allestimento: in balle di 70/90 kg circa o in cartoni di 180/210 kg circa Umidità: 16 %
17	Basmas	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 15 cm, di colore dal giallo oro all'arancio e al rosso giallastro, elastiche e brillanti, di sostanza media, a grana aperta, di tessuto gentile, di aroma tipico e pronunciato e di buona combustibilità

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
17 *(segue)*	Basmas	Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura e qualche traccia di malattia, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di aroma tipico e pronunciato e di ottima combustibilità Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 55 % della qualità I/III Allestimento: in balle di circa 30 kg dette «Tongas» Umidità: 13 %
18	Katerini e varietà simili	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio e al rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di buona combustibilità Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e di cura e con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore giallo, arancio, giallo-verde, rossastro o marrone chiaro, a grana aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas» Umidità: 13 %
19	a) Kaba Koula classico b) Elassona	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 25 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 20 cm per l'Elassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo medio al giallo carico, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III foglie mature, con qualche lieve difetto di integrità e/o di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e a 25 cm per l'Elassona, il Karatzova e il Kontoula, di colore dal giallo al rossastro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 53 % della qualità I/III Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas» Umidità: 13 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi I	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 30 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 20 cm per il Phi I e a 15 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo chiaro al rossastro, elastiche e brillanti, a grana relativamente aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47 % della qualità I/III foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 35 cm per il Macedonia Kaba Koulak e il Trapezous, a 25 cm per il Phi I e a 20 cm per il Myrodata Smyrne, di colore dal giallo al marrone chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas» Umidità: 13 %
21	Myrodata Agrinion	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 25 cm di colore dal giallo all'arancio carico, elastiche e brillanti, a grana aperta di tessuto gentile e di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 47 % della qualità I/III foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 30 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas» Umidità: 14 %
22	Zichnomyrodata	Foglie dalla qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo le foglie apicali, lunghe fino a 20 cm, di colore dal giallo chiaro all'arancio chiaro, elastiche e brillanti, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 47 % della qualità I/III foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, con qualche traccia di malattia, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 25 cm, di colore dal giallo al rosso chiaro, a grana relativamente aperta, di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di eccellente combustibilità Le foglie sopra descritte (III) costituiscono il 53 % della qualità I/III Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas» Umidità: 13 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
23	Tsebelia	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore rosso giallo, arancio o rossastro, a grana aperta, elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto gentile e di ottima combustibilità Le foglie sopra descritte (I/II) costituiscono il 45 % della qualità I/III foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallo chiaro al rossastro o al marrone chiaro, di grana relativamente aperta, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media, di tessuto sufficientemente gentile, di ottima combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas» Umidità: 13 %
24	Mavra	Foglie della qualità I/III Qualità I/III: foglie mature, integre, sane, ben curate, provenienti da tutte le corone fogliari salvo la prima (protomana), lunghe fino a 30 cm, di colore dal rosso-giallo all'arancio o al rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile, elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità Le foglie sopra descritte costituiscono il 45 % della qualità I/III foglie mature e sufficientemente integre, con qualche lieve difetto di cura, provenienti da tutte le corone fogliari, lunghe fino a 40 cm, di colore dal giallastro al rossastro o al marrone chiaro, a grana relativamente aperta e di tessuto sufficientemente gentile, mediamente elastiche e brillanti, di sostanza media e di buona combustibilità. Questa categoria comprende anche foglie con lievi difetti dovuti a malattie e/o con lievi difetti d'integrità Le foglie sopra descritte costituiscono il 55 % della qualità I/III Allestimento: in balle di 30 kg circa dette «Tongas» Umidità: 13 %
25	Burley EL	Foglie della qualità A Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, integre, sane, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal marroncino al marroncino rossastro, a grana aperta, di tessuto gentile e di eccellente combustibilità Allestimento: in balle di 100 kg o in casse di 200 kg o in botti di 240/280 kg circa Umidità: 13 %
26	Virginia EL	Foglie della qualità A Qualità A: foglie mature, completamente sviluppate, sane, integre, ben curate, provenienti dalle corone fogliari mediane, di colore uniforme dal giallo limone all'arancio medio, di tessuto gentile e di buona combustibilità Allestimento: in balle di 100 kg circa Umidità: 13 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
27	Santafé	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, ben fermentate, di colore marrone o marrone scuro, con qualche difetto di integrità Presentazione: in balle di 80-100 kg o in cartoni di 150-210 kg Umidità: 14 %
28	Burley fermentato	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, ben fermentate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità Presentazione: in balle di 80-100 kg o in cartoni di 150-210 kg Umidità: 14 %
29	Havana E	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie mature, sane, tessuto fine, con la costola e le nervature poco accentuate, ben fermentate, di colore marrone, marrone chiaro, o con tonalità verdastre, con qualche difetto di integrità Presentazione: in balle di 80-100 kg o in cartoni di 150-210 kg Umidità: 14 %
30	Round Scafati	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie sufficientemente ampie, di buona maturità, di colore uniforme, sane, senza gravi difetti di integrità, di tessuto fine, elastiche e resistenti con la costola e le nervature fini, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e di aroma tipici, ben fermentate, utilizzabili per le fasce dei sigari. È ammessa una percentuale del 25 % circa di foglie non integre Presentazione: in balle di 70-100 kg o in cartoni di 180-210 kg Umidità: 14 %
31	Virginia E	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie abbastanza mature, di tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, di colore giallo, con diverse gradazioni da limone a arancio Presentazione: in cartoni di 170-210 kg Umidità: 14 %
32	Burley E	Foglie di classe 1 Classe 1: foglie abbastanza mature, tessuto a grana aperta, con la costola e le nervature poco accentuate, sane, nelle varie gradazioni, di colore cannella Presentazione: in cartoni di 150-210 Umidità: 14 %

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento	
33	Virginia P	Foglie di classe 1	
		Classe 1:	foglie mature, ben curate, tessuto a grana aperta, elastiche, oleose, di color da giallo limone a arancio, brillanti, di lunghezza superiore a 40 cm, escluse la prima e l'ultima delle corone fogliari
		Presentazione:	in cartoni di tabacco non legato in mannocchi di 200 kg
		Umidità:	12,5 %
34	Burley P	Foglie di classe 1	
		Classe 1:	foglie mature, ben curate, tessuto a grana aperta, elastico, colore brillante, lunghezza superiore a 40 cm, esclusa la prima e l'ultima delle corone fogliari
		Presentazione:	in cartoni di tabacco non legato in mannocchi di 180 kg
		Umidità:	13 %

ALLEGATO III

Zone di produzione riconosciute per ciascuna delle varietà di tabacco prodotte nella Comunità

Varietà	Stato membro	Zone di produzione
1. Badischer Geudertheimer e suoi ibridi	R.f. di Germania	Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale
	Francia	Nord-Pas-de-Calais, Piccardia, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Valle della Loira e Poitou-Bretagna
	Italia	Veneto, Toscana, Molise, Campania e Lazio
2. Badischer Burley e suoi ibridi	R.f. di Germania	Pianura del Reno e valli adiacenti, Franconia centrale
	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca-Contea, Valle della Loira, Centro, Poitou-Bretagna e Borgogna e Charante
	Italia	Piemonte, Lombardia, Veneto
3. Virginia D	R.f. di Germania	Schleswig-Holstein, Bassa-Sassonia, Franconia e pianura del Reno e valli adiacenti
	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca-Contea, Provenza, Valle della Loira, Centro, Poitou-Bretagna, Charente, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord-Pas de Calais, Piccardia
4. a) Paraguay e i suoi ibridi	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvergna-Limosino, Poitou-Bretagna, Valle della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza, Franca-Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Piccardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia e Borgogna
	Belgio	Fiandre
	Italia	Molise e Campania
b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Francia	Nord-pas-de-Calais, Piccardia, Champagne, Ardenne, Valle della Loira
	Belgio	Fiandre, Hainaut, Namur, Lussemburgo
5. Nijkerk	Francia	Dipartimenti Lot e Aveyron
6. Misionero	Francia	Isola della Riunione
7. Bright	Italia	Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglie e Calabria
8. Burley I	Italia	Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglie e Sicilia
9. Maryland	Italia	Friuli, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise e Campania
10. Kentucky	Italia	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania
11. F. Havana	Italia	Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise e Campania
12. Beneventano Brasile selvaggio	Italia	Campania Sicilia
13. Xanti-Yaka	Italia	Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglie
14. a) Perustitza b) Samsun	Italia	Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglie e Sicilia
15. Erzegovina	Italia	Lazio, Abruzzo e Puglie

Varietà	Stato membro	Zone di produzione
16. Round Tip	Grecia Italia	Macedonia centrale Campania
17. Basmas	Grecia	Tracia, Macedonia, Sterea Hellas e Tessalia
18. a) Katerini b) Varietà simili	Grecia	Macedonia Macedonia, Sterea Hellas, Epiro e Tessalia
19. a) Kaba Koulak classico b) Elassona	Grecia Grecia	Macedonia Tessaglia
20. Kaba Koulak non classico	Grecia	Macedonia, Tessaglia, Sterea Hellas, Tracia, Epiro, Peloponneso, Isole
21. Myrodata Agrinion	Grecia	Sterea Hellas
22. Zichnomyrodata	Grecia	Tessaglia
23. Tsebelia	Grecia	Epiro e Sterea Hellas
24. Mavra	Grecia	Tessaglia, Peloponneso e Sterea Hellas
25. Burley EL	Grecia	Macedonia, Tessaglia
26. Virginia EL	Grecia	Sterea Hellas, Tessaglia, Macedonia, Tracia e Peloponneso
27. Santa Fé	Spagna	Andalusia
28. Burley fermentato	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid
29. Havana E	Spagna	Castiglia-Léon, Navarra, Galizia, Asturie e Cantabria
30. Round Scafati	Spagna	Galizia, Asturie, Navarra, Castiglia-Léon e Cantabria
31. Virginia E	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia
32. Burley E	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia
33. Virginia P	Portogallo	Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo e Regione autonoma delle Azzorre
34. Burley P	Portogallo	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-Montes, Regione autonoma delle Azzorre

ALLEGATO IV

Prezzi d'obiettivo, prezzi d'intervento e premi per i tabacchi in foglia del raccolto 1987

Prezzi d'intervento derivati per i tabacchi in colli del raccolto 1987

(in ECU/kg)

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi di intervento derivati
1	Badischer Geudertheimer e ibridi derivati	3,643	3,097	2,534	4,644
2	Badischer Burley E e ibridi derivati	4,512	3,835	2,932	5,426
3	Virgin D	4,626	3,932	2,870	5,179
4	a) Paraguay e suoi ibridi b) Dragon vert e suoi ibridi, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,400	2,890	2,352	–
5	Nijkerk	3,357	2,853	2,132	–
6	a) Misionero e suoi ibridi b) Rio Grande e suoi ibridi	3,128	2,659	2,159	–
7	Bright	4,070	3,459	2,413	4,764
8	Burley I	2,848	2,421	1,637	3,565
9	Maryland	3,313	2,816	1,856	4,014
10	a) Kentucky e suoi ibridi b) Moro di Cori c) Salento	2,796	2,376	1,765	3,347
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	2,942	2,501	2,075	3,858
12	a) Beneventano b) Brasile selvaggio e varietà simili	1,589	1,350	1,171	2,134
13	Xanti-Yakà	3,465	2,945	2,552	4,725
14	a) Perustitza b) Samsun	3,280	2,788	2,429 2,364	4,116 4,140
15	Erzegovina e varietà simili	2,947	2,505	2,188	3,712
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	15,596	13,257	9,420	20,478
17	Basmas	6,090	5,177	3,012	6,914
18	Katerini e varietà simili	5,073	4,312	2,680	6,196
19	a) Kaba Koulak classico b) Elassona	4,279	3,637	2,211	5,170
20	a) Kaba Koulak non classico b) Myrodata Smyrne, Trapezous e Phi 1	3,223	2,740	1,514	4,163
21	Myrodata Agrinion	4,253	3,615	2,233	5,080
22	Zichnomyrodata	4,419	3,756	2,355	5,303
23	Tsebelia	3,473	2,952	2,819	4,401

Numero d'ordine	Varietà	Prezzi d'obiettivo	Prezzi d'intervento	Importo del premio	Prezzi di intervento derivati
24	Mavra	3,391	2,882	2,304	4,323
25	Burley EL	2,251	1,688 (1)	1,207 (1)	2,748 (1)
26	Virginia EL	3,806	3,235	3,083	4,465
27	Santa Fé	1,383	1,176	0,301	2,034
28	Burley fermentato	2,240	1,904	0,922	2,923
29	Havana E	2,878	2,447	1,952	3,634
30	Round Scafati	8,669	7,369	5,911	12,615
31	Virginia E	4,531	3,851	2,308	5,305
32	Burley E	2,965	2,520	1,384	3,789
33	Virginia P	4,263	3,624	2,308	4,953
34	Burley P	3,072	2,611	1,384	3,896

(1) Tenendo conto dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 727/70.