I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2200/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2001

σχετικά με τις προσωρινές εγκρίσεις πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [2], και ιδίως τα άρθρα 3, 9ε και 9θ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 9ε παράγραφος 1 και το άρθρο 9θ παράγραφος 1 της οδηγίας προβλέπουν τη χορήγηση προσωρινής έγκρισης μιας νέας πρόσθετης ύλης ή νέας χρήσης μιας πρόσθετης ύλης για συγκεκριμένη περίοδο.

(2) Το άρθρο 4 της οδηγίας καθορίζει τη διαδικασία για μια τέτοια έγκριση.

(3) Οι τρέχουσες προσωρινές εγκρίσεις πολλών πρόσθετων υλών λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2001 και είναι ενδεδειγμένο να παρατείνεται η περίοδος αυτών των εγκρίσεων μέχρι το ανώτατο όριο που επιτρέπει η οδηγία 70/524/ΕΟΚ, δηλαδή έως το τέταρτο έτος από την αρχική προσωρινή έγκριση για τις ύλες που έχουν εγκριθεί προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 9ε παράγραφος 1 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, και έως το πέμπτο έτος για τις ύλες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ πριν από την 1η Απριλίου 1998.

(4) Οι προσωρινές εγκρίσεις σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό χορηγούνται για ορισμένη περίοδο, με την επιφύλαξη της δυνατότητας να μπορεί να αποσυρθούν οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με τα άρθρα 9μ και 11 της οδηγίας.

(5) Ειδικότερα, επανεξετάζονται σήμερα εγκρίσεις για τη χρήση των αντιβιοτικών ως πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές λόγω των μεγάλων ανησυχιών για την ενδεχόμενη επίδραση της χρήσης των αντιβιοτικών ως πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές στην αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών για θεραπευτική χρήση στους ανθρώπους. Η ανησυχία αυτή αντανακλάται στο γεγονός ότι το Βασίλειο της Σουηδίας έχει απαγορεύσει στην επικράτειά του τη χρήση όλων των αντιβιοτικών ως πρόσθετων υλών στα τρόφιμα, με βάση το άρθρο 11 της οδηγίας και τις γνώμες που έχει εκδώσει η μόνιμη επιστημονική επιτροπή για την αντιμικροβιακή αντοχή στις 28 Μαΐου 1999 και στις 10-11 Μαΐου 2001. Επιπλέον, η Επιτροπή εξετάζει το γενικότερο ζήτημα της χρήσης αντιβιοτικών ως πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές.

(6) Η παράταση της διάρκειας ισχύος των προσωρινών εγκρίσεων πρέπει να θεωρηθεί ως καθαρά διοικητικό μέτρο, που δεν αφορά νέα αξιολόγηση των εν λόγω προσθέτων υλών.

(7) Για λόγους συνοχής και προς διευκόλυνση των αναγνωστών, όλες οι προσωρινές εγκρίσεις των προσθέτων υλών στα τρόφιμα, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα ή πέντε έτη, πρέπει να ενοποιηθούν στον παρόντα κανονισμό.

(8) Ο παρών κανονισμός της Επιτροπής αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2697/2000 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις προσωρινές εγκρίσεις πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές [3]· συνεπώς, είναι αναγκαίο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2697/2000.

(9) Οι προσωρινές εγκρίσεις των περισσότερων προσθέτων υλών λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2001· για το λόγο αυτό, πρέπει να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός από την 1η Οκτωβρίου 2001.

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής ζωοτροφών,

[1] ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.
[2] ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 55.
[3] ΕΕ L 319 της 16.12.2000, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Αρθρο 1

Οι πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ υπό τους όρους που τίθενται στο παράρτημα αυτό.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2697/2000 καταργείται.

'Αρθρο 2

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2001.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2001.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος πρόσθετων υλών που συνδέονται με έναν υπεύθυνο κυκλοφορίας και οι οποίες εγκρίνονται προσωρινά για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα ή πέντε χρόνια για ύλες που αποτέλεσαν το αντικείμενο προσωρινής άδειας πριν από την 1η Απριλίου 1998

Αριθμός μητρώου των πρόσθετων υλών	Ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου του υπεύθυνου κυκλοφορίας πρόσθετων υλών	Πρόσθετες ύλες (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
						Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
Αντιβιοτικά									
33	Eli Lilly and Company Ltd	Αβιλαμυκίνη, 200 g/kg (Maxus G200 Maxus 200) Αβιλαμυκίνη, 100 g/kg (Maxus G100 Maxus 100)	**Πρόσθετη σύνθεση:** Αβιλαμυκίνη: δραστικότητα 200 g/kg Έλαιο σόγιας ή ορυκτό: 5-30 g/kg Προϊόντα ελαιουργείων σόγιας qs 1 kg Αβιλαμυκίνη: δραστικότητα 100 g/kg Έλαιο σόγιας ή ορυκτό: 5-30 g/kg Προϊόντα ελαιουργείων σόγιας qs 1 kg **Δραστική ουσία:** Αβιλαμυκίνη, $C_{57-62}H_{82-90}Cl_{1-2}O_{31-32}$, αριθμός CAS αβιλαμυκίνης A 69787-79-7, αριθμός CAS αβιλαμυκίνης B: 73240-30-9 μείγμα ολιγοσακχαριτών της ομάδας της ορθοσομυκίνης παραγόμενο από Streptomyces viridochromogenes (NRRL 2860), σε κοκκώδη μορφή Αναλογία παραγόντων: Αβιλαμυκίνη A: ≥ 60 % Αβιλαμυκίνη B: ≤ 18 % Αβιλαμυκίνη A + B: ≥ 70 % Λοιπές αβιλαμυκίνες, μόνες: ≤ 6 %	Γαλοπούλες	—	5	10	—	14.12.2002 [a]

Αριθμός μητρώου των πρόσθετων υλών	Ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου του υπεύθυνου κυκλοφορίας πρόσθετων υλών	Πρόσθετες ύλες (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
						Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
Κοκκιδοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες									
26	Intervet International bv	'Αλας σαλινομυκίνης με νάτριο 120 g/kg (Sacox 120 σε κοκκοποιημένη μορφή)	**Πρόσθετη σύνθεση:** 'Αλας σαλινομυκίνης με νάτριο ≥ 120 g/kg Διοξείδιο του πυριτίου 10-100 g/kg Ανθρακικό ασβέστιο 350-700 g/kg **Δραστική ουσία:** 'Αλας σαλινομυκίνης με νάτριο $C_{42}H_{69}O_{11}Na$ αριθμός CAS: 53003-10-4, άλας με νάτριο πολυαιθέρα μονοκαρβονικού οξέος παραγόμενο με ζύμωση Streptomyces albus (DSM 12217) Συγγενείς προσμείξεις: < 42 mg ελαιοφυλίνης/kg άλατος σαλινομυκίνης με νάτριο < 40 g 17-επί-20- δεσοξυ-σαλινομυκίνης/kg άλατος σαλινομυκίνης με νάτριο	Κότες εκτρεφόμενες για ωοτοκία	12 εβδομάδες	30	50	Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιέχουν τις ενδείξεις: «Επικίνδυνο για τα ιπποειδή» «Η τροφή αυτή περιέχει πρόσθετο της ομάδας των ιονοφόρων· η ταυτόχρονη χορήγησή της με ορισμένα φάρμακα (για παράδειγμα την τιαμουλίνη) μπορεί να αντενδείκνυται»	13.10.2001 [b]
27	Janssen Animal Health BVBA	Diclazuril 0,5 g/100g (Clinacox 0,5 % Premix) Diclazuril 0,2 g/100g (Clinacox 0,2 % Premix)	**Πρόσθετη σύνθεση:** Diclazuril: 0,5 g/100 g Σογιάλευρο: 99,25 g/100 g Πολυβιδόνη K 30: 0,2 g/100 g Υδροξείδιο του νατρίου: 0,0538 g/100 g Diclazuril: 0,2 g/100 g Σογιάλευρο: 39,7 g/100 g Πολυβιδόνη K 30: 0,08 g/100 g	Κότες εκτρεφόμενες για ωοτοκία	16 εβδομάδες	1	1	—	14.12.2002 [a]

Αριθμός μητρώου των πρόσθετων υλών	Ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου του υπεύθυνου κυκλοφορίας πρόσθετων υλών	Πρόσθετες ύλες (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
						Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Υδροξείδιο του νατρίου: 0,0215 g/100 g Πιτουράλευρα: 60 g/100 g **Δραστική ουσία:** Diclazuril $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$ (±)-4-χλωροφαινυλο[2,6-διχλωρο-4-2,3,4,5-τετραϋδρο-3,5-διοξυ-1,2,4-τριαζιν-2-υλ)φαινυλ]ακετονιτρίλιο, αριθμός CAS: 101831-37-2 Συγγενείς προσμείξεις: προϊόν διάσπασης (R064318): ≤ 0,2 % 'Αλλες συγγενείς προσμείξεις (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % μεμονωμένα Σύνολο προσμείξεων: ≤ 1,5 %						
28	Alpharma AS	Εναμμώνια μαδουραμικίνη α 1 g/100 g (Cygro 1 %)	**Πρόσθετη σύνθεση:** Εναμμώνια μαδουραμικίνη α: 1 g/100 g Βενζυλική αλκοόλη: 5 g/100 g Χονδραλεσμένα στάχυα qs 100 g **Δραστική ουσία:** Εναμμώνια μαδουραμικίνη α $C_{47}H_{83}O_{17}N$, αριθμός CAS: 84878-61-5, άλας με νάτριο πολυαιθέρα μονοκαρβονικού οξέος παραγόμενο από Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)	Γαλοπούλες	16 εβδομάδες	5	5	Απαγορεύεται η χρήση τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη σφαγή Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιέχουν τις ενδείξεις: «Επικίνδυνο για τα ιπποειδή» «Η τροφή αυτή περιέχει πρόσθετο της ομάδας των ιονοφόρων· η ταυτόχρονη χορήγησή της με ορισμένα φάρμακα (για παράδειγμα την τιαμυλίνη) μπορεί να αντενδείκνυται»	13.10.2001 (b)

Αριθμός μητρώου των πρόσθετων υλών	Ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου του υπεύθυνου κυκλοφορίας πρόσθετων υλών	Πρόσθετες ύλες (εμπορική ονομασία)	Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
						Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Συγγενείς προσμείξεις: Εναμμώνια μαδουραμικίνη β: < 10 %						
Αυξητικοί παράγοντες									
1	Norsk Hydro Ltd	Διμυρμηκικό κάλιο (Formi™ LHS)	**Πρόσθετη σύνθεση:** Διμυρμηκικό κάλιο, σε στέρεη μορφή 98 g/100 g Πυριτικό άλας 1,5 g/100 g, Ύδωρ 0,5 g/100 g **Δραστική ουσία:** Διμυρμηκικό κάλιο, σε στέρεη μορφή $KH(COOH)_2$ αριθ. CAS 20642-05-1	Χοιρίδια	2 μήνες	6 000	6 000	—	30.6.2005 (s)
				Χοίροι προς πάχυνση	—	6 000	6 000	—	30.6.2005 (s)

Κατάλογος πρόσθετων υλών που εγκρίνονται προσωρινά για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων ή πέντε χρόνων στην περίπτωση πρόσθετων υλών που εγκρίθηκαν προσωρινά πριν από την 1η Απριλίου 1998

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
Χρωστικές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των πιγμέντων								
1. *Καροτινοειδή και ξανθοφύλλες:*								
E160a	Β-καροτίνη	$C_{40}H_{56}$	Καναρίνια	—	—	—	—	14.12.2003 (c)
E 161g	Κανθαξανθίνη	$C_{40}H_{52}O_2$	Πτηνά συντροφιάς και διακοσμητικά	—	—	—	—	14.12.2003 (c)
12	Phaffia rhodozyma πλούσια σε ασταξανθίνη (ATCC 74219)	Συμπυκνωμένη βιομάζα μαγιάς Phaffia rhodozyma (ATCC 74219), νεκρής, η οποία περιέχει τουλάχιστον 4,0 g ασταξανθίνης ανά χιλιόγραμμο πρόσθετης ύλης, και μέγιστη περιεκτικότητα σε ethoxyquin (αιθοτοξυκίνη) 2 000 mg/kg	Σολομοί	—	—	100	Η μέγιστη περιεκτικότητα εκφράζεται όσον αφορά την ασταξανθίνη Επιτρέπεται η χρήση μόνο μετά την ηλικία των έξι μηνών Το μείγμα της πρόσθετης ύλης με την κανθαξανθίνη επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η συνολική ποσότητα της ασταξανθίνης και κανθαξανθίνης δεν υπερβαίνει τα 100 mg/kg πλήρους ζωοτροφής Δηλώνεται η περιεκτικότητα σε ethoxyquin (αιθοτοξυκίνη)	14.12.2003 (c)
			Πέστροφες	—	—	100	Η μέγιστη περιεκτικότητα εκφράζεται όσον αφορά την ασταξανθίνη Επιτρέπεται η χρήση μόνο μετά την ηλικία των έξι μηνών Το μείγμα της πρόσθετης ύλης με την κανθαξανθίνη επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι η συνολική ποσότητα της ασταξανθίνης και κανθαξανθίνης δεν υπερβαίνει τα 100 mg/kg πλήρους ζωοτροφής Δηλώνεται η περιεκτικότητα σε ethoxyquin (αιθοτοξυκίνη)	14.12.2003 (c)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
2. *Λοιπές χρωστικές ύλες:*								
E 102	Ταρζανίνη	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Σποροφάγα διακοσμητικά πτηνά	—	—	150	—	30.9.2004 (p)
			Μικρά τρωκτικά	—	—	150	—	30.9.2004 (p)
E 110	Κίτρινο πορτοκαλί FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Σποροφάγα διακοσμητικά πτηνά	—	—	150	—	30.9.2004 (p)
			Μικρά τρωκτικά	—	—	150	—	30.9.2004 (p)
E 131	Πρότυπο κυανούν V	'Αλας ασβεστίου του μ-υδροξυτετρααιθυλοδιαμινοτριφαινυλο-καρβινολο δισουλφονικού οξέος (ανυδρίτης)	Σποροφάγα διακοσμητικά πτηνά	—	—	150	—	30.9.2004 (p)
			Μικρά τρωκτικά	—	—	150	—	30.9.2004 (p)
E 141	Σύμπλοκο χαλκού χλωροφύλλης	—	Σποροφάγα διακοσμητικά πτηνά	—	—	150	—	30.9.2004 (p)
			Μικρά τρωκτικά	—	—	150	—	30.9.2004 (p)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Στοιχείο	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/kg πλήρους ζωοτροφής	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
Ιχνοστοιχεία						
E4	Χαλκός-Cu	Θειικό σύμπλοκο χαλκού-λυσίνης	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2.SO_4$	Χοίροι προς πάχυνση: — στα κράτη μέλη, όπου η μέση πυκνότητα του πληθυσμού χοίρων είναι ίση ή μεγαλύτερη από 175 χοίρους ανά 100 εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης: — έως 16 εβδομάδων: 175 (συνολικά) — στα κράτη μέλη, όπου η μέση πυκνότητα του πληθυσμού χοίρων είναι κατώτερη από 175 χοίρους ανά 100 εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης: — έως 16 εβδομάδων: 175 (συνολικά)	Το πολύ 50 mg/kg χαλκού στην πλήρη ζωοτροφή μπορούν να προέρχονται από θειικό σύμπλοκο χαλκού-λυσίνης	31.3.2004 (d)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Στοιχείο	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος	Μέγιστη περιεκτικότητα του στοιχείου σε mg/kg πλήρους ζωοτροφής	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
				Χοίροι προς πάχυνση: — στα κράτη μέλη, όπου η μέση πυκνότητα του πληθυσμού χοίρων είναι ίση ή μεγαλύτερη από 175 χοίρους ανά 100 εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης: — από τη 17η εβδομάδα έως τη σφαγή: 35 (συνολικά) — στα κράτη μέλη, όπου η μέση πυκνότητα του πληθυσμού χοίρων είναι κατώτερη από 175 χοίρους ανά 100 εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης: — από τη 17η εβδομάδα έως έξι μήνες: 100 (συνολικά) — άνω των έξι μηνών έως τη σφαγή: 35 (συνολικά) Χοίροι αναπαραγωγής: 35 (συνολικά) Άλλα είδη ή κατηγορίες ζώων, εκτός των μόσχων προ της έναρξης μηρυκασμού και των προβάτων: 35 (συνολικά)	Το πολύ 25 mg/kg χαλκού στην πλήρη ζωοτροφή μπορούν να προέρχονται από θειικό σύμπλοκο χαλκού-λυσίνης	31.3.2004 [d]

(Αριθ.) ή αριθ. ΕΚ	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα								
3	Κλινοπτιλόλιθος ηφαιστειακής προέλευσης	Ένυδρο αργιλοπυριτικό ασβέστιο ηφαιστειακής προέλευσης που περιέχει τουλάχιστον 85 % κλινοπτιλόλιθο και κατ' ανώτατο όριο 15 % αστρίου, μαρμαρυγία και αργίλου, ελεύθερο ινών και χαλαζίου Ανώτατη περιεκτικότητα σε μόλυβδο 80 mg/kg	Χοίροι	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	21.4.2004 [e]
			Κουνέλια	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	21.4.2004 [e]
			Πουλερικά	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	21.4.2004 [e]

(Αριθ.) ή αριθ. ΕΚ	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
4	Κλινοπτιλόλιθος ορυκτής προέλευσης	Ένυδρο αργιλοπυριτικό ασβέστιο ορυκτής προέλευσης που περιέχει 80 % κλινοπτιλόλιθο και κατ' ανώτατο όριο 20 % αργιλούχες ορυκτές ύλες απαλλαγμένο από ίνες και χαλαζία Μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξίνες [1]	Χοίροι προς πάχυνση	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	26.9.2004 [n]
			Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	26.9.2004 [n]
			Γάλοι προς πάχυνση	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	26.9.2004 [n]
			Βοοειδή	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	26.9.2004 [n]
			Σολομοί	—	—	20 000	Πάσης φύσεως ζωοτροφές	26.9.2004 [n]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
Ένζυμα								
1	3- φυτάση EC 3.1.3.8	Παρασκεύασμα 3-φυτάσης που παράγεται από τον Aspergillus niger (CBS 114.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα φυτάσης 5 000 FTU [2]/g για στερεά και υγρά παρασκευάσματα	Γαλοπούλες	—	125 FTU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 200-800 FTU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τουλάχιστον 0,3 % άλας φυτικού οξέος, π.χ. 20 % σίτου	14.12.2003 [c]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
2	3-φυτάση EC 3.1.3.8	Παρασκεύασμα 3-φυτάσης που παράγεται από τον Aspergillus oryzae (DSM 10289) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 2 500 FYT ([3])/g Υγρή μορφή: 5 000 FYT/g	Χοιρίδια	4 μήνες	250 FYT	1 000 FYT	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε άλατα φυτικού οξέος, π.χ. που περιέχουν πάνω από 40 % σιτηρά (καλαμπόκι, κριθή, βρώμη, σίτο, σίκαλη, τριτικάλε), ελαιούχους σπόρους και όσπρια	30.6.2004 ([f])
			Χοίροι προς πάχυνση	—	400 FYT	1 000 FYT	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε άλατα φυτικού οξέος, π.χ. που περιέχουν πάνω από 40 % σιτηρά (καλαμπόκι, κριθή, βρώμη, σίτο, σίκαλη, τριτικάλε), ελαιούχους σπόρους και όσπρια	30.6.2004 ([f])
			Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	200 FYT	1 000 FYT	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε άλατα φυτικού οξέος, π.χ. που περιέχουν πάνω από 40 % σιτηρά (καλαμπόκι, κριθή, βρώμη, σίτο, σίκαλη, τριτικάλε), ελαιούχους σπόρους και όσπρια	30.6.2004 ([f])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	500 FYT	1 000 FYT	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 750 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε άλατα φυτικού οξέος, π.χ. που περιέχουν πάνω από 40 % σιτηρά (καλαμπόκι, κριθή, βρώμη, σίτο, σίκαλη, τριτικάλε), ελαιούχους σπόρους και όσπρια	30.6.2004 (g)
3	Alpha-galactosidase EC 3.2.1.22	Παρασκεύασμα alpha-galactosidase που παράγεται από τον Aspergillus oryzae (DSM 10286) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Υγρή μορφή: 1 000 GALU (4)/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	300 GALU	1 000 GALU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 450 GALU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε ολιγοσακχαρίτες, π.χ. που περιέχουν πάνω από 25 % σιτηρά, ελαιούχους σπόρους και όσπρια	30.6.2004 (f)
4	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 50 FBG (5)/g Υγρή μορφή: 120 FBG/ml	Χοιρίδια	4 μήνες	25 FBG	40 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 25 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % αραβόσιτο ή κριθή	30.6.2004 (f)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	10 FBG	100 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 20 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % κριθή	1.4.2004 [f]
5	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάση που παράγεται από Aspergillus ή yzae (DSM 10287) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 1 000 FXU [6]/g Υγρή μορφή: 650 FXU/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	80 FXU	200 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 150 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % σίτο	30.6.2004 [f]
			Γάλοι προς πάχυνση	—	225 FXU	600 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 225-600 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % σίτο	30.6.2004 [f]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Χοιρίδια	4 μήνες	200 FXU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 200 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % σίτου	30.6.2004 [f]
6	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση ΕC 3.2.1.8 Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση ΕC 3.2.1.4	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης και ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Humicola insolens (DSM 10442) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 800 FXU [7]/g 75 FBG [5]/g Μικρόκοκκοι: 800 FXU/g 75 FBG/g Υγρή μορφή: 550 FXU/ml 50 FBG/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	200 FXU 19 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 400 FXU 38 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % κριθής ή/και βρώμης, σίτου	30.6.2004 [f]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Χοιρίδια	4 μήνες	240 FXU 22 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 400 FXU 38 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % κριθής ή/και βρώμης, σίτου	30.6.2004 [f]
			Χοίροι προς πάχυνση	—	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 400 FXU 38 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % κριθής ή/και βρώμης, σίτου	30.6.2004 [h]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
7	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης και ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 600.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 36 000 FXU ([8])/g 15 000 BGU ([9])/g Υγρή μορφή: 36 000 FXU/g 15 000 BGU/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 3 600-6 000 FXU 1 500-2 500 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35 % σίτο και 20 % κριθή	1.4.2004 ([l])
			Χοιρίδια	4 μήνες	6 000 FXU 2 500 BGU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 6 000 FXU 2 500 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο και 30 % κριθή	1.4.2004 ([l])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Γάλοι προς πάχυνση	—	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 6 000-12 000 FXU 2 500-5 000 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	1.4.2004 (1)
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	12 000 FXU 5 000 BGU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20 % σίτο και 10 % κριθή και 20 % ηλίανθου	1.4.2004 (1)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
		Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης και ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 600.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 36 000 FXU [8]/g 15 000 BGU [9]/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 3 600-6 000 FXU 1 500-2 500 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35 % σίτο και 20 % κριθή	30.9.2004 (P)
			Χοιρίδια	4 μήνες	6 000 FXU 2 500 BGU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 6 000 FXU 2 500 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο και 30 % κριθή	30.9.2004 (P)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Γάλοι προς πάχυνση	—	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 6 000-12 000 FXU 2 500-5 000 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	30.9.2004 (P)
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	12 000 FXU 5 000 BGU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20 % σίτο και 10 % κριθή και 20 % ηλίανθου	30.9.2004 (I)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
8	Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 600.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 10 000 BGU [9]/g 4 000 FXU [8]/g Υγρή μορφή: 20 000 BGU/g 8 000 FXU/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 3 000-10 000 BGU 1 200-4 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % κριθή	1.4.2004 [l]
			Χοιρίδια	4 μήνες	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 3 000-5 000 BGU 1 200-2 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % κριθή	1.4.2004 [l]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	5 000 BGU 2 000 FXU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % κριθή	1.4.2004 (l)
		Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 600.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 20 000 BGU (9)/g 8 000 FXU (8)/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 3 000-10 000 BGU 1 200-4 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % κριθή	30.9.2004 (p)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Χοιρίδια	4 μήνες	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 3 000-5 000 BGU 1 200-2 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % κριθή	30.9.2004 (P)
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	5 000 BGU 2 000 FXU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % κριθή	30.9.2004 (P)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
9	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 270.95) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 28 000 EXU [10]/g Υγρή μορφή: 14 000 EXU/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	1 400 EXU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 400 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % σίτο	30.6.2004 [f]
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	2 400 EXU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 2 400-7 400 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο και 30 % σίκαλη	1.4.2004 [f]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Γάλοι προς πάχυνση	—	2 400 EXU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 2 400-5 600 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο και 30 % σίκαλη	1.4.2004 (f)
10	Α- αμυλάση: EC 3.2.1.1	Παρασκεύασμα Α-αμυλάσης που παράγεται από τον Bacillus amyloliquefaciens (CBS 360.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 45 000 RAU (11)/g Υγρή μορφή: 20 000 RAU/ml	Χοιρίδια	4 μήνες	1 800 RAU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 800 RAU 3. Προς χρήση αποκλειστικά σε σύνθετες ζωοτροφές για συστήματα υγρής διατροφής που περιέχουν υλικά πλούσια σε άμυλο (δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35 % σίτο)	30.6.2004 (f)
			Χοίροι προς πάχυνση	—	1 800 RAU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 800 RAU 3. Προς χρήση αποκλειστικά σε σύνθετες ζωοτροφές για συστήματα υγρής διατροφής που περιέχουν υλικά πλούσια σε άμυλο (δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35 % σίτο)	30.6.2004 (f)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Θηλυκοί χοίροι	—	1 800 RAU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 800 RAU 3. Προς χρήση αποκλειστικά σε σύνθετες ζωοτροφές για συστήματα υγρής διατροφής που περιέχουν υλικά πλούσια σε άμυλο (δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35 % σίτο)	30.6.2004 (f)
11	Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης, ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Υγρή μορφή: Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 8 000 U ([12]) /ml Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 18 000 U ([13]) /ml Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 26 000 U ([14]) /ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-γλυκανάση: 400 U Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 900 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 1 300 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 400-1 600 U Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 900-3 600 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 1 300-5 200 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο ή κριθή και πάνω από 10 % σίκαλη	30.6.2004 (f)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
		Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης, ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: σε μορφή κόκκων: Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 8 000 U ([12])/g Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 18 000 U ([13])/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 26 000 U ([14])/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-γλυκανάση: 400 U Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 900 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 1 300 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 400-1 600 U Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 900-3 600 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 1 300-5 200 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο ή κριθή και 10 % σίκαλη	31.5.2005 ([r])
		Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης, ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: σε υγρή μορφή και σε μορφή κόκκων: Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 8 000 U ([12]) /ml ή g Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 18 000 U ([13]) /ml ή g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 26 000 U ([14]) /ml ή g	Γάλοι προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-γλυκανάση: 400 U Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 900 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 1 300 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 400-800 U Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 900-1 800 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 1 300-2 600 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	31.5.2005 ([r])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
12	Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης, ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma viride (FERM BP-4447) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 8 000 U ([12])/g Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 18 000 U ([13])/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 26 000 U ([14])/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-γλυκανάση: 200 U Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 450 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 650 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 800-1 200 U Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 800-2 700 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 2 600-3 900 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20 % σίτο και 20 % κριθή, ή/και 25 % σίκαλη	30.6.2004 ([f])
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	Ενδο–1,4-Β-γλυκανάση: 640 U Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 440 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 2 080 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 640 U Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 440-2 880 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 2 080-4 160 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20 % σίτο και 20 % κριθή ή/και 25 % σίκαλη	30.6.2004 ([f])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Γαλοπούλες προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-γλυκανάση: 800 U Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 800 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 2 600 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 800 U Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 800-2 700 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 2 600-3 900 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20 % σίτο και 20 % κριθή	30.6.2004 (f)
13	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Μορφή σκόνης: 8 000 BGU ([15])/g 11 000 EXU ([16])/g Μορφή κόκκων: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g Υγρή μορφή: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	100 BGU 130 EXU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 100 BGU 130 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο και 30 % κριθή, ή 20 % σίκαλη	30.6.2004 (f)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	600 BGU 800 EXU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 600 BGU 800 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο και 30 % κριθή	1.4.2004 (1)
			Γάλοι προς πάχυνση	—	600 BGU 800 EXU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 600 BGU 800 EXU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο ή κριθή και 30 % σίκαλη	1.4.2004 (1)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
14	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (CBS 520.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 600 U [17]/g Υγρή μορφή: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση 300 U/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 300 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 300-600 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % σίτο	30.6.2004 [f]
15	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma viride (CBS 517.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα Στερεή μορφή: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 650 U [18]/g Υγρή μορφή: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 325 U/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 325 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 325-650 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή	30.6.2004 [f]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
16	Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Υγρή μορφή: 2 000 CU [19] /ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	250 CU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 CU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	30.6.2004 [f]
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	250 CU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 CU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	30.6.2004 [f]
			Χοιρίδια	4 μήνες	250 CU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	30.6.2004 [f]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Χοίροι προς πάχυνση	—	250 CU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	30.6.2004 (f)
		Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 2 000 CU (19)/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	250 CU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	17.7.2004 (m)
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	250 CU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	17.7.2004 (m)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Χοιρίδια	4 μήνες	250 CU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	17.7.2004 [m]
			Χοίροι προς πάχυνση	—	250 CU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	17.7.2004 [m]
17	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Υγρή μορφή: 6 000 EPU [20] /ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	750 EPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	30.6.2004 [f]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	750 EPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	30.6.2004 (f)
			Χοιρίδια	4 μήνες	750 EPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	30.6.2004 (f)
			Χοίροι προς πάχυνση	—	750 EPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	30.6.2004 (f)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
		Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 6 000 EPU [20]/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	750 EPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	17.7.2004 [m]
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	750 EPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	17.7.2004 [m]
			Χοιρίδια	4 μήνες	750 EPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	17.7.2004 [m]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Χοίροι προς πάχυνση	—	750 EPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	17.7.2004 [m]
			Γάλοι προς πάχυνση	—	750 EPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 500-3 000 EPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35 % σίτο	17.7.2004 [m]
18	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (MUCL 39199) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 2 000 AGL [21]/g Υγρή μορφή: 500 AGL/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	100 AGL	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 100 AGL 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή και 20 % σίτο	30.6.2004 [f]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
19	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (MUCL 39199) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 1 500 AGL [21]/g Υγρή μορφή: 200 AGL/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	25 AGL	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 25-100 AGL 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή	30.6.2004 [f]
20	Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 2 000 AXC [22]/g Υγρή μορφή: 500 AXC/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	100 AXC	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 100 AXC 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο ή σίκαλη	30.6.2004 [f]
21	Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 1 500 AXC [22]/g Υγρή μορφή: 200 AXC/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	25 AXC	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 25-100 AXC 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % σίτο	30.6.2004 [f]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
22	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,3-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 70 000 BGN ([23])/g Υγρή μορφή: 14 000 BGN/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	1 050 BGN	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 2 800 BGN 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή	30.6.2004 ([f])
23	Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 70 000 IFP ([24])/g Υγρή μορφή: 7 000 IFP/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	1 050 IFP	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 400 IFP 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 56 % σίτο	30.6.2004 ([f])
			Γάλοι προς πάχυνση	—	700 IFP	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 1 400 IFP 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	28.2.2005 ([g])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	840 IFP	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 840 IFP 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	28.2.2005 (q)
24	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση ΕC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση ΕC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης και ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (CNCM I-1517) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: 28 000 QXU ([25])/g 140 000 QGU ([26])/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	420 QXU 1 120 QXU	2 100 QGU 5 600 QGU	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 560 QXU 2 800 QGU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο και 30 % κριθή	30.6.2004 (f)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
25	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από by Aspergillus niger (NRRL 25541) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 100 U ([27])/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 1 600 U ([28])/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 138 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 200 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 138 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 200 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή ή 30 % σίτο και 30 % αραβόσιτο	30.6.2004 ([f])
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 138 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 200 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 138 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 200 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή ή 30 % σίτο και 30 % αραβόσιτο	30.6.2004 ([f])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
26	Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 526.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 350 000 BU ([29])/g Υγρή μορφή: 50 000 BU/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	23 000 BU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 23 000-50 000 BU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20 % κριθή ή 30 % σίκαλη	30.6.2004 ([i])
			Χοιρίδια	4 μήνες	26 000 BU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 26 000-35 000 BU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % κριθή ή σίτο	30.6.2004 ([i])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
27	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 529.94) και ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 526.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 200 000 BXU ([30])/g 200 000 BU ([31])/g Υγρή μορφή: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	2 500 BXU 2 500 BU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 10 000 BXU 10 000 BU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο ή 30 % σίκαλη	30.6.2004 ([i])
			Χοιρίδια	2 μήνες	7 500 BXU 7 500 BU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 7 500-15 000 BXU 7 500-15 000 BU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή	28.2.2005 ([q])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
28	3-φυτάση EC 3.1.3.8	Παρασκεύασμα 3-φυτάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 528.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 5 000 PPUν ([32])/g Υγρή μορφή: 1 000 PPU/g	Χοιρίδια	4 μήνες	250 PPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-750 PPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε φυτικά άλατα, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % σιτηρά (καλαμπόκι, κριθή, σίτο), ταπιόκα, ελαιούχους σπόρους και όσπρια	30.6.2004 ([i])
			Χοίροι προς πάχυνση	—	500 PPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-750 PPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε φυτικά άλατα, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % σιτηρά (καλαμπόκι, κριθή, σίτο), ταπιόκα, ελαιούχους σπόρους και όσπρια	30.6.2004 ([i])
			Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	500 PPU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-750 PPU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 0,22 % φυτικά φωσφορικά άλατα	28.2.2005 ([q])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
29	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Geosmithia emersonii (IMI SD 133) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 5 500 U ([33])/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 250 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 250 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή	30.6.2004 (g)
30	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Penicillium funiculosum (IMI SD 101) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Μορφή σκόνης: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 2 000 U ([34])/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 1 400 U ([35])/g Υγρή μορφή: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση:500 U/ml Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 350 U/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 70 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 70 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή ή 60 % σίτο	30.6.2004 (g)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Γάλοι προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση:100 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 70 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 70 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή	28.2.2005 (9)
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 70 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 70 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % κριθή ή 30 % σίτο	28.2.2005 (9)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Χοίροι προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 70 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 70 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή ή 60 % σίτο	28.2.2005 (9)
31	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CBS 614.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: 300 EU (36)/g Υγρή μορφή: 1 000 EU/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	600 EU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 600 EU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % σίτο	30.6.2004 (8)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	300 EU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 600 EU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % σίτο	30.6.2004 (g)
32	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 200 U (18) /ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % κριθή	30.6.2004 (h)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
		Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 200 U [18] /ml	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 400 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 400 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 55 % κριθή	30.6.2004 [h]
			Χοίροι προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 500 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 500 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 70 % κριθή	30.6.2004 [h]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
33	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Μορφή σκόνης: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 2 000 U ([37])/g Υγρή μορφή: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 5 000 U/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 500 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 500-2 500 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 55 % σίτο ή 60 % σίκαλη	30.6.2004 ([h])
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 2 000 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 2 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35 % σίτο	30.6.2004 ([h])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
		Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Μορφή σκόνης: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U ([37])/g Υγρή μορφή: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 10 000 U/ml	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 5 000 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 5 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 45 % σίτο	30.6.2004 ([h])
		Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Μορφή σκόνης: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U ([37])/g Υγρή μορφή: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 8 000 U/ml	Χοίροι προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35 % σίτο	30.6.2004 ([h])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
34	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Α- αμυλάση: EC 3.2.1.1	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης και ενδο1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Aspergillus niger (NRRL 25541) και alpha-galactosidase που παράγεται από τον Aspergillus oryzae (ATCC 66222) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 275 U ([38])/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 400 U ([39])/g Α-αμυλάση: 3 100 U ([40])/g	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο–1(4)-Β-γλυκανάση: 165 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 240 U Α- αμυλάση: 1 860 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 165 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση:240 U Α-αμυλάση: 1 860 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε αμυλούχους και μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 45 % κριθή και 10 % σίτο ή 10 % αραβόσιτο	26.7.2004 (i)
35	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 80 U ([18])/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 180 U ([37])/g	Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση:80 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση:180 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 80 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 180 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % κριθή	26.7.2004 (i)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
36	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (IMI 135) και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 300 U [18]/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 300 U [37]/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 300 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 300 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 300 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 300 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	26.7.2004 (i)
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 300 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 300 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 300 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 300 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35 % κριθή	26.7.2004 (i)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
37	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Σουμπτιλισίνη: EC 3.4.21.62	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) και σουμπτιλισίνης που παράγεται από Bacillus subtilis (ATCC 2107) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 2 500 U ([37])/g Σουμπτιλισίνη 800 U ([41])/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 500 U Σουμπτιλισίνη: 160 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 500-2 500 U Σουμπτιλισίνη: 160-800 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 65 % σίτο	26.7.2004 (i)
			Γαλοπούλες	—	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 825 U Σουμπτιλισίνη: 265 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη. 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 825-2 500 U Σουμπτιλισίνη: 265-800 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 45 % σίτο	26.7.2004 (i)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
38	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Σουμπτιλισίνη EC 3.4.21.62	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) και σουμπτιλισίνης που παράγεται από Bacillus subtilis (ATCC 2107) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 5 000 U ([37])/g Σουμπτιλισίνη: 500 U ([41])/g	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 5 000 U Σουμπτιλισίνη: 500 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 5 000 U Σουμπτιλισίνη: 500 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	26.7.2004 (i)
39	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 400 U ([18])/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 400 U ([37])/g	Χοίροι προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση:400 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 400 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 400 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 400 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 65 % κριθάρι	26.7.2004 (i)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
40	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Σουμπτιλισίνη EC 3.4.21.62	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) και σουμπτιλισίνης που παράγεται από Bacillus subtilis (ATCC 2107) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U [18]/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 300 U [37]/g Σουμπτιλισίνη 800 U [41]/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 30 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 90 U Σουμπτιλισίνη: 240 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 30-100 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 90-300 U Σουμπτιλισίνη: 240-800 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % κριθή	26.7.2004 (i)
41	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Σουμπτιλισίνη EC 3.4.21.62	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) και σουμπτιλισίνης που παράγεται από Bacillus subtilis (ATCC 2107) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U [18]/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 2 500 U [37]/g Σουμπτιλισίνη 800 U [41]/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 25 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 625 U Σουμπτιλισίνη: 200 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 25-100 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 625-2 500 U Σουμπτιλισίνη: 200-800 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο και 10 % κριθή	26.7.2004 (i)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 2 500 U Σουμπτιλισίνη: 800 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 100 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 2 500 U Σουμπτιλισίνη: 800 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % σίτο και 25 % κριθή	26.7.2004 (i)
42	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση ΕC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Στερεή μορφή: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U (18)/g Χαρακτηριστικά του εγκεκριμένου παρασκευάσματος: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 1,99 % Σίτος: 97,7 % Προπιονικό άλας του ασβεστίου: 0,3 % Λεκιθίνη: 0,01 %	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % σίτο	26.7.2004 (i)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Χοίροι προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 60 % σίτο	17.7.2004 [m]
43	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση ΕC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση ΕC 3.2.1.6 Α-αμυλάση: ΕC 3.2.1.1	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) και α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 3 975 U [37]/g Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 125 U [18]/g Α-αμυλάση: 1 000 U [42]/g	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 3 975 U Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 125 U Α-αμυλάση: 1 000 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 3 975 U Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 125 U Α-αμυλάση: 1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε αμυλούχους και μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο και 20 % κριθή και 20 % σίκαλη	6.1.2004 [k]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
44	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Α-αμυλάση EC 3.2.1.1	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) και α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 250 U [18]/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 400 U [37]/g Α-αμυλάση: 1 000 U [42]/g	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 250 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 400 U Α-αμυλάση: 1 000 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 250 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 400 U Α-αμυλάση: 1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε αμυλούχους και μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή	6.1.2004 [k]
45	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Α-αμυλάση: EC 3.2.1.1	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) (IMI SD 135) και Α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 250 U [18]/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 400 U [37]/g Α-αμυλάση: 1 000 U [42]/g	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 250 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 400 U Α-αμυλάση: 1 000 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 250 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 400 U Α-αμυλάση: 1 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε αμυλούχους και μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35 % κριθή	6.1.2004 [k]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
46	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Πολυγαλακτουρονάση EC 3.2.1.15	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) και ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) και πολυγαλακτουρονάσης που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 400 U [18]/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 400 U [37]/g Πολυγαλακτουρονάση: 50 U [43]/g	Χοίροι προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 400 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 400 U Πολυγαλακτουρονάση: 50 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 400 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 400 U πολυγαλακτουρονάση: 50 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε αμυλούχους και μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 4 % κριθή	6.1.2004 [k]
47	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Α-αμυλάση: EC 3.2.1.1 Πολυγαλακτουρονάση EC 3.2.1.15	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) και Α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefacien και πολυγαλακτουρονάσης που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 150 U [18]/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U [37]/g Α-αμυλάση: 1 000 U [42]/g Πολυγαλακτουρονάση: 25 U [43]/g	Χοιρίδια	4 μήνες	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 150 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U Α-αμυλάση: 1 000 U πολυγαλακτουρονάση: 25 U	— — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 150 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 4 000 U Α-αμυλάση: 1 000 U πολυγαλακτουρονάση: 25 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε αμυλούχους και μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20 % κριθή και 35 % σίτο	6.1.2004 [k]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
48	Α-αμυλάση: EC 3.2.1.1 Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (DSM 9553) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: Α-αμυλάση: 200 KNU ([44])/g Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 350 FBG ([5])/g Υγρή μορφή: Α-αμυλάση: 130 KNU/ml Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 225 FBG/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	10 KNU 17 FBG	40 KNU 70 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 20 KNU 35 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	1.4.2004 ([1])
			Γάλοι προς πάχυνση	—	40 KNU 70 FBG	80 KNU 140 FBG	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 40 KNU 70 FBG 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή	1.4.2004 ([1])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
49	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση ΕC 3.2.1.6 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση ΕC 3.2.1.8 Α-αμυλάση: ΕC 3.2.1.1 Βακιλλολυσίνη ΕC 3.4.24.28 Πολυγαλακτουρονάση ΕC 3.2.1.15	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), Α-αμυλάση που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), Βακιλλολυσίνη που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) και πολυγαλακτουρονάση που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 150 U ([18])/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 1 500 U ([37])/g Α-αμυλάση: 500 U ([42])/g Βακιλλολυσίνη: 800 U ([41])/g Σουμπτιλισίνη: 50 U ([43])/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 150 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 1 500 U Α-αμυλάση: 500 U Βακιλλολυσίνη 800 U πολυγαλακτουρονάση: 50 U	— — — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 150 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 1 500 U Α-αμυλάση: 500 U Βακιλλολυσίνη: 800 U Πολυγαλακτουρονάση: 50 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο	17.7.2004 ([m])
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 150 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 1 500 U Α-αμυλάση: 500 U Βακιλλολυσίνη 800 U πολυγαλακτουρονάση: 50 U	— — — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 150 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 1 500 U Α-αμυλάση: 500 U Βακιλλολυσίνη: 800 U Πολυγαλακτουρονάση: 50 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % σίτο	17.7.2004 ([m])

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
50	6-φυτάση EC 3.1.3.26	Παρασκεύασμα 6-φυτάσης που παράγεται από τον Aspergillus niger (DSM 11857) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Επικαλυμμένη μορφή: 2 500 FYT [3]/g Υγρή μορφή: 5 000 FYT/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	250 FYT	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 0,25 % φυτικά φωσφορικά άλατα	17.7.2004 [m]
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	250 FYT	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 0,25 % φυτικά φωσφορικά άλατα	17.7.2004 [m]
			Γάλοι προς πάχυνση	—	250 FYT	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 0,25 % φυτικά φωσφορικά άλατα	17.7.2004 [m]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Χοιρίδια	2 μήνες	500 FYT	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 0,25 % φυτικά φωσφορικά άλατα	17.7.2004 [m]
			Χοίροι προς πάχυνση	—	500 FYT	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 500-1 000 FYT 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 0,25 % φυτικά φωσφορικά άλατα	17.7.2004 [m]
51	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάση που παράγεται από Bacillus subtilis (LMG 15136) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: 100 IU [45]/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	10 IU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 10 IU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	17.7.2004 [m]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Χοιρίδια	2 μήνες	10 IU	—	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: 10 IU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % σίτο	31.5.2005 [r]
52	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 Α-αμυλάση: EC 3.2.1.1	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) και Α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Υγρή μορφή: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 10 000 U [46] /ml Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση: 120 000 U [47] /ml Α-αμυλάση: 400 U [48] /ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 000 U Ενδο–1,4(4)-Β-γλυκανάση: 12 000 U Α-αμυλάση: 40 U	— — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 000-2 000 U Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 12 000-24 000 U Α-αμυλάση: 40-80 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20 % σίτο και 15 % σόργο, και 5 % αραβόσιτο	17.7.2004 [m]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
53	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 Α-αμυλάση: EC 3.2.1.1 Βακιλλολυσίνη EC 3.4.24.28 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) Α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), βακιλλολυσίνης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) και 1,4 Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 2 350 U ([46])/g Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση: 4 000 U ([47])/g Α-αμυλάση: 400 U ([49])/g Βακιλλολυσίνη: 450 U ([50])/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 20 000 U ([51])/g	Χοιρίδια	2 μήνες	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 2 350 U Ενδο–1,4(4)-Β-γλυκανάση: 4 000 U Α-αμυλάση: 400 U Βακιλλολυσίνη 450 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 20 000 U	— — — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 2 350 U Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 4 000 U Α-αμυλάση: 400 U Βακιλλολυσίνη: 450 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 20 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 25 % κριθή και 20 % αραβόσιτο	23.11.2004 (ο)
			Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 175 U Ενδο–1,4(4)-Β-γλυκανάση: 2 000 U Α-αμυλάση: 200 U Βακιλλολυσίνη 225 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 10 000 U	— — — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη. 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 175-2 350 U Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 2 000-4 000 U Α-αμυλάση: 200-400 U Βακιλλολυσίνη: 225 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 10 000-20 000 U	23.11.2004 (ο)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
							3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 45 % σίτο	
54	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 Α- αμυλάση: EC 3.2.1.1 Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) και Α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) και ενδο 1,4 Β ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 10 000 U ([46])/g Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση: 120 000 U ([47])/g Α-αμυλάση: 400 U ([49])/g Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 210 000 U ([51])/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 000 U Ενδο–1,4(4)-Β-γλυκανάση: 12 000 U Α- αμυλάση: 40 U Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 21 000 U	— — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 000-2 000 U Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 12 000-24 000 U Α-αμυλάση: 40 — 80 U Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 21 000-42 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 45 % σίτο	23.11.2004 (ο)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
55	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 Α- αμυλάση: EC 3.2.1.1 Βακιλλολυσίνη EC 3.4.24.28	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) και Α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) και βακιλλολυσίνης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 3 000 U ([46])/g Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 5 000 U ([47])/g Α-αμυλάση: 540 U ([49])/g Βακιλλολυσίνη: 450 U ([50])/g	Χοιρίδια	2 μήνες	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 500 U Ενδο–1,4(4)-Β-γλυκανάση: 2 500 U Α- αμυλάση: 270 U Βακιλλολυσίνη: 225 U	— — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 500-3 000 U Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 2 500-5 000 U Α-αμυλάση: 270-540 U Βακιλλολυσίνη: 225-450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 35 % σίτο και 15 % κριθή	23.11.2004 (ο)
			Χοίροι προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 500 U Ενδο–1,4(4)-Β-γλυκανάση: 2 500 U Α- αμυλάση: 270 U Βακιλλολυσίνη: 225 U	— — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 500-3 000 U Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 2 500-5 000 U Α-αμυλάση: 270-540 U Βακιλλολυσίνη: 225-450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % κριθή	23.11.2004 (ο)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
			Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 500 U Ενδο–1,4(4)-Β-γλυκανάση: 2 500 U Α- αμυλάση: 270 U Βακιλλολυσίνη: 225 U	— — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 500-3000 U Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 2 500-5 000 U Α-αμυλάση: 270-540 U Βακιλλολυσίνη: 225-450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 50 % αραβόσιτο ή 50 % σίτο	23.11.2004 (ο)
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 500 U Ενδο–1,4(4)-Β-γλυκανάση: 2 500 U Α- αμυλάση: 270 U Βακιλλολυσίνη: 225 U	— — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 1 500-3 000 U Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 2 500-5 000 U Α-αμυλάση: 270-540 U Βακιλλολυσίνη: 225-450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % αραβόσιτο και 10 % σίκαλη	23.11.2004 (ο)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
56	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 Α- αμυλάση EC 3.2.1.1 Βακιλλολυσίνη EC 3.4.24.28	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), Α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) και βακιλλολυσίνης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 6 000 U [46]/g Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 3 500 U [47]/g Α-αμυλάση: 1 400 U [49]/g Βακιλλολυσίνη: 450 U [50]/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 6 000 U Ενδο–1,4(4)-Β-γλυκανάση: 3 500 U Α- αμυλάση: 1 400 U Βακιλλολυσίνη: 450 U	— — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 6 000 U Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 3 500 U Α-αμυλάση: 1 400 U Βακιλλολυσίνη: 450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή.	23.11.2004 (ο)
57	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 Α- αμυλάση: EC 3.2.1.1 Βακιλλολυσίνη EC 3.4.24.28	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), Α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) και βακιλλολυσίνης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 3 000 U [46]/g Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση: 9 000 U [47]/g Α-αμυλάση: 540 U [49]/g Βακιλλολυσίνη: 450 U [50]/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 3 000 U Ενδο–1,4(4)-Β-γλυκανάση: 9 000 U Α- αμυλάση: 540 U Βακιλλολυσίνη: 450 U	— — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 3 000 U Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 9 000 U Α-αμυλάση: 540 U Βακιλλολυσίνη: 450 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε αμυλούχους και μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως κυτταρίνη και ημικυτταρίνη), π.χ. που περιέχουν πάνω από 20 % άλευρο ηλιάνθου και 10 % σογιάλευρο	23.11.2004 (ο)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
58	Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.4 Α- αμυλάση: EC 3.2.1.1 Βακιλλολυσίνη EC 3.4.24.28	Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), ενδο-1,4-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), α-αμυλάσης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) και βακιλλολυσίνης που παράγεται από Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 2 350 U ([46])/g Ενδο-1,4(4)-Β-γλυκανάση: 5 000 U ([47])/g Α-αμυλάση: 400 U ([49])/g Βακιλλολυσίνη: 5 000 U ([50])/g	Χοιρίδια	2 μήνες	Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 2 350 U Ενδο–1,4(4)-Β-γλυκανάση: 5 000 U Α- αμυλάση: 400 U Βακιλλολυσίνη: 5 000 U	— — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 2 350 U Ενδο-1,4-Β-γλυκανάση: 5 000 U Α-αμυλάση: 400 U Βακιλλολυσίνη: 5 000 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 30 % κριθή	23.11.2004 (ο)
59	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6 Σουμπτιλισίνη: EC 3.4.21.62 Α- αμυλάση: EC 3.2.1.1 Πολυγαλακτουρονάση EC 3.2.1.15	Preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glucanase and alpha-amylase produced by Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilisin produced by Bacillus subtilis (ATCC 2107), polygalacturonase produced by Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) having a mimimum activity of: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 300 U ([37])/g Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 150 U ([18])/g Σουμπτιλισίνη: 4 000 U ([41])/g Α-αμυλάση: 400 U ([42])/g Πολυγαλακτουρονάση: 25 U ([43])/g	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 300 U Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 150 U Σουμπτιλισίνη: 4 000 U Α- αμυλάση: 400 U πολυγαλακτουρονάση: 25 U	— — — — —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 300 U Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 150 U σουμπτιλισίνη: 4 000 U Α-αμυλάση: 400 U Πολυγαλακτουρονάση: 25 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % αραβόσιτο	28.02.2005 (q)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
60	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) και ενδο-1, 3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 5 000 U ([37]) /ml Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 50 U ([18]) /ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 500 U Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 5 U	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 500 — 2 500 U Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 5 — 25 U 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 20 % κριθή και 40 % σίτο	28.2.2005 (9)
61	Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση EC 3.2.1.8 Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση EC 3.2.1.6	Παρασκεύασμα ενδο-1,4-Β-ξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 529.94) και ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma reesei (CBS 526.94) που παρουσιάζει ελάχιστη δραστικότητα: Μορφή σκόνη: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 17 000 U ([30])/g Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 11 000 U ([29])/g Υγρή μορφή: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 22 000 BXU/ml Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 15 000 BU/ml	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	Ενδο–1,4-Β-ξυλανάση: 17 000 BXU Ενδο–1,3(4)-Β-γλυκανάση: 11 000 BU	— —	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη 2. Ενδεδειγμένη δόση ανά χλγρ. πλήρους ζωοτροφής: Ενδο-1,4-Β-ξυλανάση: 17 000 BXU Ενδο-1,3(4)-Β-γλυκανάση: 11 000 BU 3. Προς χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε πολυσακχαρίτες εκτός αμύλου (κυρίως αραβινοξυλάνες και Β-γλυκάνες), δηλαδή που περιέχουν πάνω από 40 % κριθή ή 55 % σίτο	28.2.2005 (9)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					CFU/kg πλήρους ζωοτροφής			
Μικροοργανισμοί								
1	Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112 CNCM I-1012	Παρασκεύασμα Bacillus cereus var. toyoi που περιέχει τουλάχιστον 1×10^{10} CFU/g πρόσθετες ύλες	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδοστατικά: monensin sodium, lasolacid sodium, salinomycin sodium, decoquinate, robenidine, narasin, halofuginone	1.3.2002 (h)
			Όρνιθες ωοπαραγωγής	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	1.3.2002 (h)
			Μόσχοι	6 μήνες	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	1.3.2002 (h)
			Βοοειδή προς πάχυνση	—	$0,2 \times 10^9$	$0,2 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Η ποσότητα του Bacillus cereus var. toyoi στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει $1,0 \times 10^9$ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται $0,2 \times 10^9$ CFU	1.3.2002 (h)
			Ελάφια εκτροφής	—	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδοστατικά: robenidine	1.3.2002 (h)
			Κουνέλια προς πάχυνση	—	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδοστατικά: robenidine, salinomycin sodium	1.3.2002 (h)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					CFU/kg πλήρους ζωτροφής			
3	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστον: 5×10^9 CFU/g πρόσθετης ύλης	Κουνέλια προς πάχυνση	—	$2,5 \times 10^9$	5×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδοστατικά: meticlorpindol	30.6.2004 (f)
			Θηλυκοί χοίροι	—	5×10^9	$2,5 \times 10^{10}$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (f)
			Χοιρίδια	4 μήνες	5×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (f)
			Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής	—	4×10^8	2×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη. Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $5,6 \times 10^9$ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται $8,75 \times 10^9$ CFU.	31.5.2005 (r)
5	*Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94	Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστον: 1×10^8 CFU/g πρόσθετης ύλης	Μόσχοι	6 μήνες	2×10^8	2×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (f)
			Βοοειδή προς πάχυνση	—	$1,7 \times 10^8$	$1,7 \times 10^8$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $7,5 \times 10^8$ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται 1×10^8 CFU	30.6.2004 (g)
			Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής	—	5×10^7	$3,5 \times 10^8$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $1,2 \times 10^9$ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται $1,7 \times 10^8$ CFU	31.5.2005 (r)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					CFU/kg πλήρους ζωτροφής			
6	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστον: 2×10^{10} CFU/g πρόσθετης ύλης	Θηλυκοί χοίροι	—	2×10^{9}	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (f)
			Χοιρίδια	4 μήνες	6×10^{9}	3×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (f)
7	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077	Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστον: 2×10^{10} CFU/g πρόσθετης ύλης	Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής	—	$5{,}5 \times 10^{8}$	$2{,}1 \times 10^{9}$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $8{,}4 \times 10^{9}$ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται $1{,}8 \times 10^{9}$ CFU	30.6.2004 (f)
			Βοοειδή προς πάχυνση	—	1×10^{9}	$1{,}5 \times 10^{9}$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $4{,}6 \times 10^{9}$ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται 2×10^{9} CFU	30.6.2004 (f)
8	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 [Σε αναλογία 1/1]	Μείγμα: ενθυλακωμένου Enterococcus faecium ATCC 53519 και ενθυλακωμένου Enterococcus faecium ATCC 55593 που περιέχει τουλάχιστον 2×10^{8} CFU/g της πρόσθετης ύλης (ήτοι. τουλάχιστον 1×10^{8} CFU/g κάθε βακτηρίου)	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	1×10^{8}	1×10^{8}	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδοστατικά: amprolium, decoquinate, halofuginone, lasalocid sodium, maduramicin ammonium, monensin sodium, narasin, nicarbazin, narasin/nicarbazin, salinomycin sodium	30.6.2004 (f)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					CFU/kg πλήρους ζωοτροφής			
9	Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/4R	Παρασκεύασμα Pediococcus acidilactici που περιέχει τουλάχιστον 1×10^{10} CFU/g πρόσθετης ύλης	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	1×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδοστατικά: amprolium, meticlorpindol, decoquinate, halofuginone, narasin, salinomycin sodium, nicarbazin, maduramicin ammonium, diclazuril	30.6.2004 (g)
			Χοιρίδια	4 μήνες	1×10^9	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (g)
			Χοίροι προς πάχυνση	—	1×10^9	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (g)
10	Enterococcus faecium NCIMB 10415	Παρασκεύασμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: Μικροενθυλακωμένη μορφή: $1{,}0 \times 10^{10}$ CFU/g πρόσθετης ύλης $1{,}75 \times 10^{10}$ CFU/g πρόσθετης ύλης	Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	$0{,}3 \times 10^9$	$2{,}8 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδοστατικά: amprolium, amprolium/ethopabate, diclazuril, halofuginone, maduramicin ammonium, meticlorpindol, meticlorpindol/methylbenzoquate, monensin sodium, robenidine, salinomycin sodium	30.6.2004 (g)
			Χοίροι προς πάχυνση	—	$0{,}35 \times 10^9$	$1{,}5 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (g)
			Θηλυκοί χοίροι	—	$0{,}2 \times 10^9$	$1{,}25 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (g)
			Βοοειδή προς πάχυνση	—	$0{,}25 \times 10^9$	$0{,}6 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Η ποσότητα του Enterococcus faecium στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1×10^9 CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται 1×10^9 CFU	30.6.2004 (g)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					CFU/kg πλήρους ζωοτροφής			
		Παρασκεύασμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: Μικροενθυλακωμένη μορφή: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g πρόσθετης ύλης $1,75 \times 10^{10}$ CFU/g πρόσθετης ύλης και σε μορφή κόκκων: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g πρόσθετης ύλης	Χοιρίδια	4 μήνες	$0,3 \times 10^9$	$1,4 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Σε μορφή κόκκων να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε υποκατάστατα γάλακτος	30.6.2004 (g)
			Μόσχοι	6 μήνες	$0,35 \times 10^9$	$6,6 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Σε μορφή κόκκων να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε υποκατάστατα γάλακτος	30.6.2004 (g)
11	Enterococcus faecium DSM 5464	Παρασκεύασμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: 5×10^{10} CFU/g πρόσθετης ύλης	Χοιρίδια	4 μήνες	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (g)
			Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδοστατικά: amprolium, halofuginone, meticlorpindol/methylbenzoquate, diclazuril, nifursol	1.4.2004 (l)
			Μόσχοι	4 μήνες	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	1.4.2004 (l)
12	Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R	Παρασκεύασμα Lactobacillus farciminis που περιέχει τουλάχιστον 1×10^9 CFU/g πρόσθετης ύλης	Χοιρίδια	4 μήνες	1×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (h)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					CFU/kg πλήρους ζωτροφής			
13	Enterococcus faecium DSM 10 663 NCIMB 10 415	Παρασκεύασμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: Σε μορφή σκόνης και κόκκων: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g πρόσθετης ύλης Επικαλυμμένη μορφή: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g πρόσθετης ύλης Υγρή μορφή: 1×10^{10} CFU/ml πρόσθετης ύλης	Χοιρίδια	4 μήνες	1×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (h)
			Μόσχοι	6 μήνες	1×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	26.7.2004 (i)
			Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	1×10^9	1×10^{10}	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδοστατικά: amprolium, amprolium-ethopabat, decoquinate, diclazuril, halofuginone, lasalocid sodium, maduramicin ammonium, meticlorpindol/ methylbenzoquate, monensin sodium, narasin, nicarbazin, robenidine, salinomycin sodium.	26.7.2004 (i)
14	Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885	Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστον: Σε μορφή σκόνης, σφαιρικών και ωοειδών κόκκων: 1×10^9 CFU/g πρόσθετης ύλης	Χοιρίδια	4 μήνες	3×10^9	3×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	30.6.2004 (h)
			Βοοειδή προς πάχυνση	—	9×10^9	9×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο ημερήσιο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα $1,6 \times 10^{10}$ CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Για κάθε επιπλέον 100 kg προστίθενται $3,2 \times 10^9$ CFU	30.6.2004 (h)
15	Enterococcus faecium NCIMB 11181	Παρασκεύασμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: Μορφή σκόνης: 4×10^{11} CFU/g πρόσθετης ύλης Επικαλυμμένη μορφή: 5×10^{10} CFU/g πρόσθετης ύλης	Μόσχοι	6 μήνες	5×10^8	2×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	6.1.2004 (k)
			Χοιρίδια	4 μήνες	5×10^8	2×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	6.1.2004 (k)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					CFU/kg πλήρους ζωοτροφής			
16	Enterococcus faecium DSM 7134 Lactobacillus rhamnosus DSM 7133	Μείγμα: Παρασκεύασμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: 7×10^9 CFU/g πρόσθετης ύλης και Lactobacillus rhamnosus που περιέχει τουλάχιστον: 3×10^9 CFU/g πρόσθετης ύλης	Μόσχοι	6 μήνες	1×10^9	6×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	6.1.2004 [k]
			Χοιρίδια	4 μήνες	1×10^9	5×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	6.1.2004 [k]
17	Lactobacillus casei NCIMB 30096 Enterococcus faecium NCIMB 30098	Μείγμα Lactobacillus casei και Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: Lactobacillus casei 2×10^9 CFU/g και Enterococcus faecium 6×10^9 CFU/g	Μόσχοι	6 μήνες	Lactobacillus casei $0{,}5 \times 10^9$ Enterococcus faecium $1{,}5 \times 10^9$	Lactobacillus casei 1×10^9 Enterococcus faecium 3×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	1.4.2004 [l]
18	Enterococcus faecium CECT 4515	Παρασκεύασμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον 1×10^{10} CFU/g πρόσθετες ύλες	Χοιρίδια	4 μήνες	1×10^9	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	1.4.2004 [l]
			Μόσχοι	6 μήνες	1×10^9	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	1.4.2004 [l]
19	Streptococcus-infantarius CNCM I-841 Lactobacillus plantarum CNCM I-840	Μείγμα: Streptococcus infantarius και Lactobacillus plantarum που περιέχει τουλάχιστον: Streptococcus-infantarius $0{,}5 \times 10^9$ CFU/g και Lactobacillus plantarum 2×10^9 CFU/g	Μόσχοι	6 μήνες	Streptococcus-infantarius 1×10^9 Lactobacillus plantarum $0{,}5 \times 10^9$	Streptococcus-infantarius 1×10^9 Lactobacillus plantarum $0{,}5 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	17.7.2004 [m]

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					CFU/kg πλήρους ζωτροφής			
20	Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750 [In a 1/1 ratio]	Μείγμα Bacillus licheniformis και Bacillus subtilis που περιλαβμάνει ελάχιστη ποσότητα $3,2 \times 10^9$ CFU/g πρόσθετης ύλης ($1,6 \times 10^9$ CFU/g από κάθε βακτήριο)	Θηλυκοί χοίροι	15 ημέρες προ του τοκετού και κατά την περίοδο γαλακτοφορίας	$0,96 \times 10^9$	$1,92 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	23.11.2004 (ο)
			Χοίροι προς πάχυνση	—	$0,48 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	23.11.2004 (ο)
			Κοτόπουλα προς πάχυνση	—	$3,2 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδοστατικά: amprolium/ethopabate, diclazuril, halofuginone, meticlorpindol/methylbenzoquate, monensin sodium, nicarbazin, robenidine and salinomycin sodium	23.11.2004 (ο)
			Γάλοι προς πάχυνση	—	$1,28 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη Δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα κοκκιδοστατικά: amprolium/ethopabate, diclazuril, halofuginone, meticlorpindol/methylbenzoquate, monensin sodium, nifursol and robenidine	23.11.2004 (ο)
			Μόσχοι	6 μήνες	$1,28 \times 10^9$	$1,6 \times 10^9$	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	28.2.2005 (q)
21	Enterococcus faecium DSM 3530	Παρασκεύασμα Enterococcus faecium που περιέχει τουλάχιστον: $2,5 \times 10^9$ CFU/g πρόσθετης ύλης	Μόσχοι	6 μήνες	1×10^9	1×10^9	Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη	28.2.2005 (q)

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)	Πρόσθετες ύλες	Χημικός τύπος, περιγραφή	Είδος ή κατηγορία ζώων	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιπές προϋποθέσεις	Λήξη της περιόδου έγκρισης
					Μονάδα δραστικότητας mg/kg πλήρους ζωοτροφής			
Συνδετικά ραδιονουκλεϊδίων								
1. *Συγκολλητικά ραδιενεργού καισίου (^{137}Cs και ^{134}Cs)*								
1.1	Σιδηροεξακυανιούχος (II) αμμωνιοσίδηρος (III)	$NH_4Fe(III)[Fe(II)(CN)_6)]$	Μηρυκαστικά (κατοικίδια και άγρια)	—	50	500	Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιέχουν τις ενδείξεις: «Η ποσότητα σιδηροεξακυανισούχου (II) αμμωνιοσιδήρου (III) στην ημερήσια μερίδα πρέπει να είναι μεταξύ 10 mg και 150 mg ανά 10 kg σωματικού βάρους»	13.10.2001 (b)
			Μόσχοι πριν από την έναρξη του μηρυκασμού	—	50	500	Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιέχουν τις ενδείξεις: «Η ποσότητα σιδηροεξακυανισούχου (II) αμμωνιοσιδήρου (III) στην ημερήσια μερίδα πρέπει να είναι μεταξύ 10 mg και 150 mg ανά 10 kg σωματικού βάρους»	13.10.2001 (b)
			Αρνιά πριν από την έναρξη του μηρυκασμού	—	50	500	Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιέχουν τις ενδείξεις: «Η ποσότητα σιδηροεξακυανισούχου (II) αμμωνιοσιδήρου (III) στην ημερήσια μερίδα πρέπει να είναι μεταξύ 10 mg και 150 mg ανά 10 kg σωματικού βάρους»	13.10.2001 (b)
			Ερίφια πριν από την έναρξη του μηρυκασμού	—	50	500	Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιέχουν τις ενδείξεις: «Η ποσότητα σιδηροεξακυανισούχου (II) αμμωνιοσιδήρου (III) στην ημερήσια μερίδα πρέπει να είναι μεταξύ 10 mg και 150 mg ανά 10 kg σωματικού βάρους»	13.10.2001 (b)
			Χοίροι (κατοικίδια και άγρια)	—	50	500	Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιέχουν τις ενδείξεις: «Η ποσότητα σιδηροεξακυανισούχου (II) αμμωνιοσιδήρου (III) στην ημερήσια μερίδα πρέπει να είναι μεταξύ 10 mg και 150 mg ανά 10 kg σωματικού βάρους»	13.10.2001 (b)

(a) Πρώτη έγκριση με την οδηγία 97/72/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 55).
(b) Πρώτη έγκριση με την οδηγία 96/66/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 32).
(c) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2316/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 289 της 28.10.1998, σ. 4).
(d) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 639/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 82 της 26.3.1999, σ. 6).
(e) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1245/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 150 της 17.6.1999, σ. 15.).
(f) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1436/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 15).
(g) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 866/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 108 της 27.4.1999, σ. 21).
(h) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1411/99 της Επιτροπής (ΕΕ L 164 της 30.6.1999, σ. 56).
(i) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2374/98 της Επιτροπής (ΕΕ L 295 της 4.11.1998, σ. 3).

(j) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1636/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 194 της 27.7.1999, σ. 17).
(k) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2690/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 326 της 18.12.1999, σ. 33).
(l) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 654/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 26).
(m) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1353/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 155 της 28.6.2000, σ. 15).
(n) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1887/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 227 της 7.9.2000, σ. 13).
(o) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2437/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 280 της 4.11.2000, σ. 28).
(p) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2697/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 319 της 16.12.2000, σ. 1).
(q) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 418/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 62 της 2.3.2001, σ. 3).
(r) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 937/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 130 της 12.5.2001, σ. 25).
(s) Πρώτη έγκριση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 180 της 3.7.2001, σ. 18).
(1) Εφόσον δεν έχει καθοριστεί, σε περίπτωση που απαιτείται, ειδικό μέγιστο όριο με βάση επαρκή στοιχεία σχετικά με την παρουσία διοξινών, θα ισχύσει, από 15 Αυγούστου 2000, το μέγιστο όριο των 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg.
(2) 1 FTU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο ανόργανου φωσφορικού άλατος από φυτικό νάτριο ανά λεπτό σε pH 5,5 και 37 °C.
(3) 1 FYT είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο ανόργανου φωσφορικού άλατος από φυτικό νάτριο ανά λεπτό σε pH 5,5 και 37 °C.
(4) 1 GALU είναι η ποσότητα ενζύμου που υδρολύει 1 μικρογραμμομόριο p-νιτροφαινυλο-α-γαλακτοπυρανοζίτη ανά λεπτό σε pH 5,5 και 37 °C.
(5) 1 FBG είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και 30 °C.
(6) 1 FXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 7,8 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από αζω-αραβοξυλάνη σιταριού ανά λεπτό σε pH 6,0 και 50 °C.
(7) 1 FXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 3,1 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από αζω-αραβοξυλάνη σιταριού ανά λεπτό σε pH 6,0 και 50 °C.
(8) 1 FXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,15 μικρογραμμομόρια ξυλόζης από ξυλάνη ενωμένη με σταυροδεσμούς με αζουρίνη ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40 °C.
(9) 1 BGU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,15 μικρογραμμόμορια γλυκόζης από Β-γλυκάνη ενωμένη με σταυροδεσμούς με αζουρίνη ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40 °C.
(10) 1 EXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από αραβινοξυλάνη ανά λεπτό σε pH 3,5 και 55 °C.
(11) 1 RAU είναι η ποσότητα του ενζύμου που μετατρέπει 1 μικρογραμμομόριο διαλυτού αμύλου σε προϊόν με απορρόφηση ίση με εκείνη μιας χρωστικής αναφοράς σε μήκος κύματος 620 nm μετά από αντίδραση με ιώδιο, ανά λεπτό σε pH 6μ6 και 30 °C.
(12) 1 U είναι η ποσότητα του ενζύμου που απελευθερώνει 0,1 μικρογραμμομόριο γλυκόζης από καρβοξυμεθυλο-κυτταρίνη ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40 °C.
(13) 1 U είναι η ποσότητα του ενζύμου που απελευθερώνει 0,1 μικρογραμμομόριο γλυκόζης από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40 °C.
(14) 1 U είναι η ποσότητα του ενζύμου που απελευθερώνει 0,1 μικρογραμμομόριο γλυκόζης από ξυλάνη βρώμης (oat spelt) ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40 °C.
(15) 1 BGU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,278 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 3,5 και 40 °C.
(16) 1 EXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από αραβινοξυλάνη σιταριού ανά λεπτό σε pH 3,5 και 55 °C.
(17) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο ξυλόζης από ξυλάνη ξύλου σημύδας ανά λεπτό σε pH 5,3 και 50 °C.
(18) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμόμοριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και 30 °C.
(19) 1 CU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,128 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,5 και 30 °C.
(20) 1 EPU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,0083 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,7 και 30 °C.
(21) 1 AGL είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 5,55 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων μαλτόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,6 και 30 °C.
(22) 1 AXC είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 17,2 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων μαλτόζης) από ξυλάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,7 και 30 °C.
(23) 1 BGN είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο ανάγοντος σακχάρου (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,8 και 50 °C.
(24) 1 IFP είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,8 και 50 °C.
(25) 1 QXU είναι η ποσότητα ενζύμου ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 5,1 και 50 °C.
(26) 1 QGU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,8 και 50 °C.
(27) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,0 και 30 °C.
(28) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,0 και 30 °C.
(29) 1 BU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,06 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,8 και 50 °C.
(30) 1 BXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,06 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη σημύδας ανά λεπτό σε pH 5,3 και 50 °C.
(31) 1 BU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,06 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,8 και 50 °C.
(32) 1 PPU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο ανόργανου φωσφορικού άλατος από φυτικό νάτριο ανά λεπτό σε pH 5 και 37 °C.
(33) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 2,78 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων μαλτόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και 50 °C.
(34) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 5,55 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων μαλτόζης) από Β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και 50 °C.
(35) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 4,00 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων μαλτόζης) από ξυλάνη σημύδας ανά λεπτό σε pH 5,5 και 50 °C.
(36) 1 EU είναι η ποσότητα ενζύμου ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,5 και 40 °C.
(37) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 5,3 και 50 °C.
(38) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,0 και 30 °C.
(39) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από ξυλάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,0 και 30 °C.
(40) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από άμυλο σίτου ανά λεπτό σε pH 4,0 και 30 °C.
(41) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμάριο φαινολικού σκευάσματος (ισοδύναμα τυροσίνης) από υπόστρωμα καζεΐνης ανά λεπτό σε pH 7,5 και 40 °C.
(42) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που υδρολύει 1 μικρογραμμομόριο γλυκοσιδικών δεσμών από αδιάλυτο στο νερό αμυλούχο σταυροπολυμερές ανά λεπτό σε pH 6,5 και 37 °C.
(43) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμόμοριο ανάγοντος υλικού (ισοδύναμες ενώσεις του γαλακτουρονικού οξέος) από πολυ-Δ-γαλακτουρονικό υπόστρωμα ανά λεπτό σε pH 5,0 και 40 °C.
(44) 1 KNU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 672 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από διαλυτό άμυλο ανά λεπτό σε pH 5,6 και 37 °C.

(45) 1 IU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη σημύδας ανά λεπτό σε pH 4,5 και 30 °C.
(46) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,0056 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από Β-γλυκάνη κριθής ανά λεπτό σε pH 7,5 και 30 °C.
(47) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,0056 μικρογραμμομόρια αναγόντων σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από καρβοξυμεθύλο-κυτταρίνη ανά λεπτό σε pH 4,8 και 50 °C.
(48) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που υδρολύει 1 μικρογραμμομόριο γλυκόζης από αμυλούχο σταυροπολυμερές ανά λεπτό σε pH 7,5 και 37 °C.
(49) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που υδρολύει 1 μικρογραμμομόριο γλυκοσιδικών δεσμών από αδιάλυτο στο νερό αμυλούχο σταυροπολυμερές ανά λεπτό σε pH 7,5 και 37 °C.
(50) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που καθιστά 1 μικρογραμμάριο αζωκαζεΐνης διαλυτό σε τριχλωροξεικό οξύ ανά λεπτό υπό pH 7,5 και σε θερμοκρασία 37 °C.
(51) 1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,0067 μικρογραμμομόρια αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη σημύδας ανά λεπτό υπό pH 5,3 και σε θερμοκρασία 50 °C.