32001R2200

15.11.2001 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* L 299/1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2200/2001

ze dne 17. října 2001

o dočasných povoleních pro doplňkové látky v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech ([1]), naposledy pozměněnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES ([2]), a zejména na články 3, 9e a 9i této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Čl. 9e odst. 1 a čl. 9i odst. 1 směrnice stanoví, že na určitou dobu lze udělit dočasné povolení pro novou doplňkovou látku nebo nové užití doplňkové látky.

(2) Článek 4 směrnice vymezuje podmínky takového povolení.

(3) U mnohých doplňkových látek končí platnost dočasných povolení dne 30. září 2001 a je třeba je prodloužit na dobu, kterou směrnice 70/524/EHS maximálně povoluje, totiž do čtvrtého roku od prvního dočasného povolení v případě látek dočasně povolených v souladu s čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS a do pátého roku v případě látek zapsaných v příloze II směrnice 70/524/EHS před 1. dubnem 1998.

(4) Dočasná povolení uvedená v tomto nařízení se udělují na dobu určitou, avšak aniž je dotčena možnost je kdykoliv odejmout v souladu s články 9m a 11 směrnice.

(5) Povolení pro používání antibiotik jako doplňkových látek v krmivech se v současné době přezkoumávají s ohledem na vážné obavy vyplývající z možného dopadu používání antibiotik jako doplňkových látek v krmivech na účinnost antibiotik jako léčiv v humánní medicíně, které dokládá skutečnost, že Švédské království zakázalo na svém území používání všech antibiotik jakožto doplňkových látek v krmivech na základě článku 11 směrnice a ve světle stanovisek Vědeckého řídícího výboru pro antimikrobiální rezistenci ze dne 28. května 1999 a ze dne 10. a 11. května 2001.

(6) Prodloužení doby dočasných povolení se musí považovat za výlučně správní opatření, které nepředpokládá žádné nové posuzování dotyčných doplňkových látek.

(7) Z důvodu srozumitelnosti a soudržnosti shrnuje toto nařízení všechna dočasná povolení doplňkových látek v krmivech, jejichž délka nesmí překročit čtyři nebo pět let.

(8) Toto nařízení Komise nahrazuje nařízení Komise (ES) č. 2697/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o dočasných povoleních pro doplňkové látky v krmivech ([3]), a je tedy nutné uvedené nařízení zrušit.

(9) Platnost dočasných povolení týkajících se většiny doplňkových látek končí dne 30. září 2001. Je tedy třeba používat toto nařízení od 1. října 2001.

(10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro krmiva,

([1]) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
([2]) Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 55.
([3]) Úř. věst. L 319, 16.12.2000, s. 1.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Doplňkové látky uvedené v příloze tohoto nařízení se dočasně povolují v souladu se směrnicí 70/524/EHS, za podmínek stanovených v této příloze.

Nařízení (ES) č. 2697/2000 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

Použije se ode dne 1. října 2001.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2001.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise

PŘÍLOHA

Seznam doplňkových látek vázaných na osobu odpovědnou za jejich uvedení do oběhu a dočasně povolených na dobu nepřekračující čtyři nebo pět let v případě doplňkových látek, které byly dočasně povoleny před 1. dubnem 1998

Registrační číslo doplňkové látky	Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky do oběhu	Doplňková látka (obchodní název)	Složení, chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg aktivní látky/kg kompletního krmiva			
Antibiotika									
33	Eli Lilly and Company Ltd	Avilamycin 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200) Avilamycin 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100)	**Složení doplňkové látky:** Avilamycin: 200 g aktivity/kg Sojový nebo minerální olej: 5-30 g/kg Sojové slupky ad 1 kg Avilamycin: 100 g aktivity/kg Sojový nebo minerální olej: 5-30 g/kg Sojové slupky ad 1 kg **Aktivní látka:** Avilamycin, $C_{57-62}H_{82-90}Cl_{1-2}O_{31-32}$, Číslo CAS avilamycinu A: 69787-79-7, číslo CAS avilamycinu B: 73240-30-9, Směs oligosacharidů ortosomycinové skupiny, produkovaná*Streptomyces viridochromogenes* (NRRL 2 860), v granulované formě Faktor složení: Avilamycin A: ³ 60 % Avilamycin B: £ 18 % Avilamycin A+B: ³ 70 %	Krůty	–	5	10	–	14. 12. 2002[a]

Registrační číslo doplňkové látky	Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky do oběhu	Doplňková látka (obchodní název)	Složení, chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg aktivní látky/kg kompletního krmiva			
Kokcidiostatika a jiné léčebné substance									
26	Intervet International bv	Salinomycin sodný 120g/kg (Sacox 120 mikrogranulát)	**Složení doplňkové látky:** Salinomycin sodný [3] 120 g/kg Oxid křemičitý 10-100 g/kg Uhličitan vápenatý 350-700 g/kg **Aktivní látka:** Salinomycin sodný, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, Číslo CAS: 53003-10-4, Sodná sůl polyeterické monokarboxylové kyseliny produkované *Streptomyces albus*(DSM 12 217) Přidružené nečistoty: < 42 mg elaiophylinu/kg salinomycinu sodného < 40 g 17-epi-20-desoxy-salinomycinu/kg salinomycinu sodného	Kuřice	12 týdnů	30	50	V návodu k použití musí být uvedeno: „Nebezpečné pro lichokopytníky“ „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku ze skupiny ionoforů; podávání této látky současně s některými léčebnými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikováno“	13. 10. 2001[b]
27	Janssen Animal Health BVBA	Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % premix) Diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % premix)	**Složení doplňkové látky:** Diclazuril: 0,5 g/100 g Sojová moučka: 99,25 g/100 g Polyvidon K 30: 0,2 g/100 g Hydroxid sodný: 0,0538 g/100 g Diclazuril: 0,2 g/100 g Sojová moučka: 39,7 g/100 g Polyvidon K 30: 0,08 g/100 g	Kuřice	16 týdnů	1	1	–	14. 12. 2002[a]

Registrační číslo doplňkové látky	Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky do oběhu	Doplňková látka (obchodní název)	Složení, chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg aktivní látky/kg kompletního krmiva			
			Hydroxid sodný: 0,0215 g/100 g Pšeničná krupice: 60 g/100 g **Aktivní látka:** Diclazuril, $C_{17}H_9C_{l3}N_4O_2$ (±)-4-chlorfenyl[2,6-dichlor-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)fenyl]acetonitril, Číslo CAS: 101831-37-2 Přidružené nečistoty: Sloučeniny z odbourávání (R064318): £ 0,2 % Další přidružené nečistoty (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): £ 0,5 % jednotlivě Nečistoty celkem: £ 1,5 %						
28	Alpharma AS	Maduramicin ammonium alfa 1 g/100 g (Cygro 1 %)	**Složení doplňkové látky:** Maduramicin amonný alfa: 1 g/100 g Benzylalkohol: 5 g/100 g Drť z kukuřičných palic ad 100 g **Aktivní látka:** Maduramicin amonný alfa, $C_{47}H_{83}O_{17}N$, Číslo CAS: 84878-61-5 Amonná sůl polyeterické monokarboxylové kyseliny produkované *Actinomadura yumaensis*(ATCC 31585) (NRRL 12515)	Krůty	16 týdnů	5	5	Podávání zakázáno nejméně pět dní před porážkou V návodu k použití musí být uvedeno: „Nebezpečné pro lichokopytníky“ „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku ze skupiny ionoforů; podávání této látky současně s některými léčebnými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikováno“	13. 10. 2001[b]

Registrační číslo doplňkové látky	Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky do oběhu	Doplňková látka (obchodní název)	Složení, chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg aktivní látky/kg kompletního krmiva			
			Přidružené nečistoty: Maduramicin amonný beta: < 10 %						
Stimulátory růstu									
1	Norsk Hydro Ltd	Hydrogen mravenčan draselný (Formi™ LHS)	**Složení doplňkové látky:** Kyselý mravenčan draselný, pevný 98 g/100 g Silikát 1,5 g/100 g, Voda 0,5 g/100 g **Aktivní látka:** Kyselý mravenčan draselný, pevný $KH(COOH)_2$, Číslo CAS: 20642-05-1	Selata	2 měsíce	6 000	6 000	–	30. 6. 2005[5]
				Výkrm prasat	–	6 000	6 000	–	30. 6. 2005[5]

Seznam ostatních doplňkových látek dočasně povolených na dobu nepřekračující čtyři nebo pět let v případě doplňkových látek,které byly dočasně povoleny před 1. dubnem 1998

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva			
Barviva, včetně pigmentů								
1. 1. Karotenoidy a xantofyly								
E 160a	Beta-karoten	C40H56	Kanáři	–	–	–	–	14. 12. 2003[c]
E 161g	Kanthaxanthin	C40H52O2	Okrasné ptactvo	–	–	–	–	14. 12. 2003[c]
12	*Phaffia rhodozyma* bohatá na astaxantin (ATCC 74219)	Koncentrovaná biomasa mrtvých kvasinek *Phaffia rhodozyma*(ATCC 74219), obsahující min. 4,0 g astaxantinu v 1 kg doplňkové látky a maximálně 2 000 mg ethoxychinu v 1 kg	Losos	–	–	100	Maximální obsah je vyjádřen jako astaxantin Podávání je povoleno pouze od stáří šesti měsíců Směs doplňkové látky s kanthaxanthinem je povolena za předpokladu, že celkový obsah astaxantinu a kanthaxanthinu nepřekročí 100 mg/kg kompletního krmiva Obsah etoxychinu musí být deklarován	14. 12. 2003[c]
			Pstruzi	–	–	100	Maximální obsah je vyjádřen jako astaxantin Podávání je povoleno pouze od stáří šesti měsíců Směs doplňkové látky s kanthaxanthinem je povolena za předpokladu, že celkový obsah astaxantinu a kanthaxanthinu nepřekročí 100 mg/kg kompletního krmiva Obsah etoxychinu musí být deklarován	14. 12. 2003[c]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva			
2. 2. Jiná barviva								
E 102	Tartrazin	C16H9N4O9S2Na3	Okrasné ptactvo živící se zrním	–	–	150	–	30. 9. 2004[p]
			Malí hlodavci	–	–	150	–	30. 9. 2004[p]
E 110	Žluť FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Okrasné ptactvo živící se zrním	–	–	150	–	30. 9. 2004[p]
			Malí hlodavci	–	–	150	–	30. 9. 2004[p]
E 131	Patentní modř V	Vápenná sůl kyseliny 5-hydroxy–4,4-bis-(dietylamino)-trifenyl-karbinol-2,4-disulfonové	Okrasné ptactvo živící se zrním	–	–	150	–	30. 9. 2004[p]
			Malí hlodavci	–	–	150	–	30. 9. 2004[p]
E 141	Cu-komplex chlorofylu	–	Okrasné ptactvo živící se zrním	–	–	150	–	30. 9. 2004[p]
			Malí hlodavci	–	–	150	–	30. 9. 2004[p]

Číslo (nebo č. ES)	Prvek	Doplňková látka	Chemický vzorec	Maximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmiva	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
Stopové prvky						
E4	Měď-Cu	Síran lyzino-měďnatý	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2SO_4$	Výkrm prasat: — - v členských státech, kde průměrná hustota vepřového dobytka na 100 hektarů využívané zemědělské půdy je rovna nebo vyšší než 175 prasat: — do 16 týdnů: 175 (celkem) — - v členských státech, kde průměrná hustota vepřového dobytka na 100 hektarů využívané zemědělské půdy je nižší než 175 prasat: — - do 16 týdnů: 175 (celkem)	Maximálně 50 mg/kg mědi v kompletním krmivu může pocházet ze síranu lyzino-měďnatého	31. 3. 2004[d]

Číslo (nebo č. ES)	Prvek	Doplňková látka	Chemický vzorec	Maximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmiva	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
				Výkrm prasat: — - v členských státech, kde průměrná hustota vepřového dobytka na 100 hektarů využívané zemědělské půdy je rovna nebo vyšší než 175 prasat: — od 17. týdne až do porážky: 35 (celkem) — - v členských státech, kde průměrná hustota vepřového dobytka na 100 hektarů využívané zemědělské půdy je nižší než 175 prasat: — - od 17. týdne do 6 měsíců: 100 (celkem) — - od 6 měsíců do porážky: 35 (celkem) Prasata chovná: 35 (celkem) Jiné druhy nebo kategorie zvířat, kromě telat do počátku přežvykování a ovcí: 35 (celkem)	Maximálně 25 mg/kg mědi v kompletním krmivu může pocházet ze síranu lyzinoměďnatého	31. 3. 2004[d]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva			
Pojiva, protispékavé látky a koagulanty								
3	Klinoptilotit sopečného původu	Hydrát hlinitokřemičitanu vápenatého sopečného původu obsahující nejméně 85 % klinoptilolitu a nejvýše 15 % živců, slíd a jílů, neobsahující vlákna a křemen Maximální obsah olova: 80 mg/kg	Prasata	–	–	20 000	Všechna krmiva	21. 4. 2004[c]
			Králíci	–	–	20 000	Všechna krmiva	21. 4. 2004[c]
			Drůbež	–	–	20 000	Všechna krmiva	21. 4. 2004[c]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva			
4	Klinoptilolit sedimentárního původu	Hydrát hlinitokřemičitanu vápenatého sedimentárního původu obsahující nejméně 80 % klinoptilolitu a maximálně 20 % jílů, neobsahující vlákna a křemen Maximální obsah dioxinů[1]	Výkrm prasat	–	–	20 000	Všechna krmiva	26. 9. 2004[n]
			Výkrm kuřat	–	–	20 000	Všechna krmiva	26. 9. 2004[n]
			Výkrm krůt	–	–	20 000	Všechna krmiva	26. 9. 2004[n]
			Skot	–	–	20 000	Všechna krmiva	26. 9. 2004[n]
			Losos	–	–	20 000	Všechna krmiva	26. 9. 2004[n]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
Enzymy								
1	3-fytáza EC 3.1.3.8	Přípravek 3-fytázy produkované *Aspergillus niger*(CBS 114.94), s minimem fytázové aktivity 5 000 FTU[2]/g pro pevné a kapalné přípravky	Krůty	–	125 FTU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 200 – 800 FTU	14. 12. 2003[c]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
2	3-fytáza EC 3.1.3.8	Přípravek 3-fytázy produkované *Aspergillus oryzae*(DSM 10289) s minimem aktivity: potahovaná forma: 2 500 FYT[3]/g kapalná forma: 5 000 FYT/g	Selata	4 měsíce	250 FYT	1 000 FYT	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500 FYT 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na fytáty, například obsahujících více než 40 % obilovin (kukuřice, ječmen, oves, pšenice, žito, tritikale), olejnin a luštěnin	30. 6. 2004[f]
			Výkrm prasat	–	400 FYT	1 000 FYT	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500 FYT 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na fytáty, například obsahujících více než 40 % obilovin (kukuřice, ječmen, oves, pšenice, žito, tritikale), olejnin a luštěnin	30. 6. 2004[f]
			Výkrm kuřat	–	200 FYT	1 000 FYT	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500 FYT 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na fytáty, například obsahujících více než 40 % obilovin (kukuřice, ječmen, oves, pšenice, žito, tritikale), olejnin a luštěnin	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Nosnice	–	500 FYT	1 000 FYT	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 750 FYT 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na fytáty, například obsahujících více než 40 % obilovin (kukuřice, ječmen, oves, pšenice, žito, tritikale), olejnin a luštěnin	30. 6. 2004[g]
3	Alfa-galaktosidáza EC 3.2.1.22	Přípravek alfa-galaktosidázy produkované *Aspergillus oryzae*(DSM 10286) s minimem aktivity: kapalná forma: 1 000 GALU[4]/g	Výkrm kuřat	–	300 GALU	1 000 GALU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 450 GALU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na oligosacharidy, například obsahujících více než 25 % sojové moučky, bavlníkových výlisků a hrachu	30. 6. 2004[f]
4	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), s minimem aktivity: potahovaná forma: 50 FBG[5]/g kapalná forma: 120 FBG/ml	Selata	4 měsíce	25 FBG	40 FBG	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 25 FBG 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), například obsahujících více než 50 % kukuřice nebo ječmene	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Výkrm kuřat	–	10 FBG	100 FBG	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 20 FBG 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), například obsahujících více než 60 % kukuřice	1. 4. 2004[f]
5	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Aspergillus oryzae*(DSM 10287), s minimem aktivity: potahovaná forma: 1 000 FXU[6]/g kapalná forma: 650 FXU/ml	Výkrm kuřat	–	80 FXU	200 FXU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 150 FXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 50 % pšenice	30. 6. 2004[f]
			Výkrm krůt	–	225 FXU	600 FXU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 225-600 FXU	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Selata	4 měsíce	200 FXU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 200 FXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 50 % pšenice	30. 6. 2004[f]
6	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy produkovaných *Humicola insolens*(DSM 10442) s minimem aktivity: potahovaná forma: 800 FXU[7]/g 75 FBG [5]/g mikrogranulovaná forma: 800 FXU/g 75 FBG/g kapalná forma: 550 FXU/ml 50 FBG/ml	Výkrm kuřat	–	200 FXU 19 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 400 FXU 38 FBG 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 30 % ječmene a/nebo ovsa, pšenice	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Selata	4 měsíce	240 FXU 22 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 400 FXU 38 FBG 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 30 % ječmene a/nebo ovsa, pšenice	30. 6. 2004[f]
			Výkrm prasat	–	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 400 FXU	30. 6. 2004[h]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
7	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy produkovaných *Aspergillus niger*(CBS 600.94) s minimem aktivity: potahovaná forma: 36 000 FXU[8]/g 15 000 BGU[9]/g kapalná forma: 36 000 FXU[8]/g 15 000 BGU[9]/g	Výkrm kuřat	–	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3 600-6 000 FXU 1 500-2 500 BGU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 35 % ječmene a 20 % pšenice	1. 4. 2004[l]
			Selata	4 měsíce	6 000 FXU 2 500 BGU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 6 000 FXU 2 500 BGU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 30 % pšenice a 30 % ječmene	1. 4. 2004[l]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Výkrm krůt	–	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 6 000 – 12 000 FXU 2 500 – 5 000 BGU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 40 % pšenice	1. 4. 2004[1]
			Nosnice	–	12 000 FXU 5 000 BGU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 20 % pšenice, 10 % ječmene a 20 % slunečnice	1. 4. 2004[1]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
		Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy produkovaných *Aspergillus niger*(CBS 600.94) s minimem aktivity: pevná forma: 36 000 FXU[8]/g 15 000 BGU[9]/g	Výkrm kuřat	–	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3 600-6 000 FXU 1 500-2 500 BGU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 35 % ječmene a 20 % pšenice	30. 9. 2004[P]
			Selata	4 měsíce	6 000 FXU 2 500 BGU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 6 000 FXU 2 500 BGU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 30 % pšenice a 30 % ječmene	30. 9. 2004[P]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Výkrm krůt	–	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 6 000 – 12 000 FXU 2 500 – 5 000 BGU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 40 % pšenice	30. 9. 2004[P]
			Nosnice	–	12 000 FXU 5 000 BGU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 20 % pšenice, 10 % ječmene a 20 % slunečnice	30. 9. 2004[I]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
8	Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Aspergillus niger*(CBS 600.94) s minimem aktivity: potahovaná forma: 10 000 BGU[9]/g 4 000 FXU[8]/g kapalná forma:	Výkrm kuřat	–	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3 000 – 10 000 BGU 1 200 – 4 000 FXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 60 % ječmene	1. 4. 2004[l]
			Selata	4 měsíce	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3 000 – 5 000 BGU 1 200 – 2 000 FXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 30 % ječmene	1. 4. 2004[l]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Nosnice	–	5 000 BGU 2 000 FXU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 60 % ječmene	1. 4. 2004[l]
		Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Aspergillus niger*(CBS 600.94) s minimem aktivity: pevná forma: 20 000 BGU[9]/g	Výkrm kuřat	–	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3 000 – 10 000 BGU 1 200 – 4 000 FXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 60 % ječmene	30. 9. 2004[p]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Selata	4 měsíce	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3 000 – 5 000 BGU 1 200 – 2 000 FXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 30 % ječmene	30. 9. 2004P
			Nosnice	–	5 000 BGU 2 000 FXU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 60 % ječmene	30. 9. 2004P

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
9	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Aspergillus niger* (CBS 270.95) s minimem aktivity: pevná forma: 28 000 EXU[10]/g kapalná forma: 14 000 EXU/ml	Výkrm kuřat	–	1 400 EXU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 400 EXU	30. 6. 2004[f]
			Nosnice	–	2 400 EXU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 2 400 – 7 400 EXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 30 % pšenice a 30 % žita	1. 4. 2004[l]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Výkrm krůt	–	2 400 EXU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 2 400 – 5 600 EXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 30 % pšenice a 30 % žita	1. 4. 2004[l]
10	Alfa-amyláza EC 3.2.1.1	Přípravek alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens* (CBS 360.94) s minimem aktivity: pevná forma: 45 000 RAU[11]/g kapalná forma: 20 000 RAU/ml	Selata	4 měsíce	1 800 RAU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 1 800 RAU 3. Pro použití výhradně do krmných směsí určených pro tekuté krmné systémy a obsahujících komponenty bohaté škrobem (například obsahujících více než 35 % pšenice)	30. 6. 2004[f]
			Výkrm prasat	–	1 800 RAU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 800 RAU	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Prasnice	–	1 800 RAU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 800 RAU	30. 6. 2004[f]
11	Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74252) s minimem aktivity: kapalná forma: Endo-1,4-beta-glukanáza: 8 000 U[12]/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 18 000[13]U/ml Endo-1,4-beta-xylanáza: 26 000 U[14]/ml	Výkrm kuřat	–	Endo-1,4-beta-glukanáza: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 900 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 1 300 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-glukanáza: 400 – 1 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 900 – 3 600 U endo-1,4-beta-xylanáza: 1 300 – 5 200 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 30 % pšenice nebo ječmene a 10 % žita	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
		Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 74252) s minimem aktivity: granulovaná forma: Endo-1,4-beta-glukanáza: 8 000 U[12]/g Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 18 000 U[13]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 26 000 U[14]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,4-beta-glukanáza: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 900 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 1 300 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-glukanáza: 400 – 1 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 900 – 3 600 U endo-1,4-beta-xylanáza: 1 300 – 5 200 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 30 % pšenice nebo ječmene a 10 % žita	31. 5. 2005[r]
		Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 74252) s minimem aktivity: kapalná a granulovaná forma: Endo-1,4-beta-glukanáza: 8 000 U[12]/ml nebo g Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 18 000 U[13]/ml nebo g Endo-1,4-beta-xylanáza: 26 000 U[14]/ml nebo g	Výkrm krůt	–	Endo-1,4-beta-glukanáza: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 900 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 1 300 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-glukanáza: 400 – 800 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 900 – 1 800 U endo-1,4-beta-xylanáza: 1 300 – 2 600 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 40 % pšenice	31. 5. 2005[r]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
12	Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Trichoderma viride*(FERM BP-4447) s minimem aktivity: Endo-1,4-beta-glukanáza. 8 000 U[12]/g Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 18 000 U[13]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 26 000 U[14]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,4-beta-glukanáza: 200 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 450 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 650 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-glukanáza: 800 – 1 200 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 800 – 2 700 U endo-1,4-beta-xylanáza: 2 600 – 3 900 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 20 % pšenice a 20 % ječmene a/nebo 25 % žita	30. 6. 2004[f]
			Nosnice	–	Endo-1,4-beta-glukanáza: 640 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 440 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 2 080 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-glukanáza: 640 – 1 280 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 440 – 2 880 U endo-1,4-beta-xylanáza: 2 080 – 4 160 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 20 % pšenice a 20 % ječmene a/nebo 25 % žita	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Výkrm krůt	–	Endo-1,4-beta-glukanáza: 800 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 800 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 2 600 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-glukanáza: 800 – 1 200 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 800 – 2 700 U endo-1,4-beta-xylanáza: 2 600 – 3 900 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 20 % pšenice a 20 % ječmene	30. 6. 2004[f]
13	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Trichoderma longibrachiatum*(CBS 357.94) s minimem aktivity: prášková forma: 8 000 BGU[15]/g 11 000 EXU[16]/g granulovaná forma: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g	Výkrm kuřat	–	100 BGU 130 EXU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 100 BGU 130 EXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 30 % pšenice a 30 % ječmene nebo 20 % žita	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Nosnice	–	600 BGU 800 EXU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 600 BGU 800 EXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 40 % pšenice a více než 30 % ječmene	1. 4. 2004[1]
			Výkrm krůt	–	600 BGU 800 EXU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 600 BGU 800 EXU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 30 % pšenice nebo více než 30 % žita	1. 4. 2004[1]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
14	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Aspergillus niger*(CBS 520.94) s minimem aktivity: pevná forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 600 U[17]/g kapalná forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U/ml	Výkrm kuřat	–	Endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 300 – 600 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 50 % pšenice	30. 6. 2004[f]
15	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma viride*(CBS 517.94) s minimem aktivity: pevná forma: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 650 U[18]/g kapalná forma: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 325 U/ml	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 325 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 325 - 650 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), například obsahujících více než 50 % ječmene	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
16	Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4	Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 142) s minimem aktivity: kapalná forma: 2 000 CU[19]/ml	Výkrm kuřat	–	250 CU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 1 000 CU	30. 6. 2004[f]
			Nosnice	–	250 CU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 1 000 CU	30. 6. 2004[f]
			Selata	4 měsíce	250 CU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 1 000 CU	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Výkrm prasat	–	250 CU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 1 000 CU	30. 6. 2004[f]
		Přípravek endo-1,4-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 142) s minimem aktivity: pevná forma: 2 000 CU[19]/g	Výkrm kuřat	–	250 CU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 1 000 CU	17. 7. 2004[m]
			Nosnice	–	250 CU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 1 000 CU	17. 7. 2004[m]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Selata	4 měsíce	250 CU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 1 000 CU	17. 7. 2004[m]
			Výkrm prasat	–	250 CU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 1 000 CU	17. 7. 2004[m]
17	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135) s minimem aktivity: kapalná forma: 6 000 EPU[20]/ml	Výkrm kuřat	–	750 EPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 500 – 3 000 EPU	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Nosnice	–	750 EPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 500 – 3 000 EPU	30. 6. 2004[f]
			Selata	4 měsíce	750 EPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 500 – 3 000 EPU	30. 6. 2004[f]
			Výkrm prasat	–	750 EPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 500 – 3 000 EPU	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
		Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) s minimem aktivity: pevná forma: 6 000 EPU[20]/g	Výkrm kuřat	–	750 EPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 500 – 3 000 EPU	17. 7. 2004[m]
			Nosnice	–	750 EPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 500 – 3 000 EPU	17. 7. 2004[m]
			Selata	4 měsíce	750 EPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 500 – 3 000 EPU	17. 7. 2004[m]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Výkrm prasat	–	750 EPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 500 – 3 000 EPU	17. 7. 2004[m]
			Výkrm krůt	–	750 EPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 500 – 3 000 EPU	17. 7. 2004[m]
18	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z *Aspergillus niger*(MUCL 39199) o minimální aktivitě: Pevná forma: 2 000 AGL[21]/g Kapalná forma: 500 AGL/ml	Výkrm kuřat	–	100 AGL	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 100 AGL 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), například obsahujících více než 40 % ječmene a 20 % pšenice	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
19	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Aspergillus niger*(MUCL 39199) s minimem aktivity: pevná forma: 1 500 AGL[21]/g kapalná forma: 200 AGL/g	Výkrm kuřat	–	25 AGL	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 25 – 100 AGL	30. 6. 2004[f]
20	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(MUCL 39203) s minimem aktivity: pevná forma: 2 000 AXC[22]/g kapalná forma: 500 AXC/ml	Výkrm kuřat	–	100 AXC	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 100 AXC 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 40 % pšenice nebo žita	30. 6. 2004[f]
21	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(MUCL 39203) s minimem aktivity: pevná forma: 1 500 AXC[22]/g kapalná forma: 200 AXC/g	Výkrm kuřat	–	25 AXC	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 25 – 100 AXC	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
22	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity: pevná forma: 70 000 BGN[23]/g kapalná forma: 14 000 BGN/ml	Výkrm kuřat	–	1 050 BGN	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 2 800 BGN	30. 6. 2004[f]
23	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity: pevná forma: 70 000 IFP[24]/g kapalná forma: 7 000 IFP/ml	Výkrm kuřat	–	1 050 IFP	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 1 400 IFP	30. 6. 2004[f]
			Výkrm krůt	–	700 IFP	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 1 400 IFP 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 40 % pšenice	28. 2. 2005[q]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Nosnice	–	840 IFP	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 840 IFP 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 40 % pšenice	28. 2. 2005[q]
24	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovaných *Aspergillus niger*(CNCM I-1517) s minimem aktivity: 28 000 QXU[25]/g 140 000 QGU[26]/g	Výkrm kuřat	–	420 QXU 2 100 QGU	1 120 QXU 5 600 QGU	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 560 QXU 2 800 QGU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 30 % pšenice a 30 % ječmene	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
25	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Aspergillus niger*(NRRL 25541) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 100 U[27]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 1 600 U[28]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 200 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 U endo-1,4-beta-xylanáza: 200 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 50 % ječmene nebo 30 % pšenice a 30 % kukuřice	30. 6. 2004[f]
			Nosnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 200 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 138 U endo-1,4-beta-xylanáza: 200 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 50 % ječmene nebo 30 % pšenice a 30 % kukuřice	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
26	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma reesei*(CBS 526.94) s minimem aktivity: pevná forma: 350 000 BU[29]/g kapalná forma: 50 000 BU/g	Výkrm kuřat	–	23 000 BU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 23 000 – 50 000 BU	30. 6. 2004[f]
			Selata	4 měsíce	26 000 BU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 26 000 – 35 000 BU	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
27	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma reesei*(CBS 529.94), a endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma reesei*(CBS 526.94) s minimem aktivity: pevná forma: 200 000 BXU[30]/g 200 000 BU[31]/g kapalná forma: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Výkrm kuřat	–	2 500 BXU 2 500 BU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 10 000 BXU 10 000 BU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a glukany), například obsahujících více než 40 % pšenice nebo 30 % žita	30. 6. 2004[f]
			Selata	2 měsíce	7 500 BXU 7 500 BU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 7 500 – 15 000 BXU 7 500 - 15 000 BU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 50 % pšenice	28. 2. 2005[q]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
28	3-fytáza EC 3.1.3.8	Přípravek 3-fytázy produkované *Trichoderma reesei*(CBS 528.94) s minimem aktivity: pevná forma: 5 000 PPU[32]/g kapalná forma: 1 000 PPU/g	Selata	4 měsíce	250 PPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 750 PPU	30. 6. 2004[f]
			Výkrm prasat	–	500 PPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 750 PPU	30. 6. 2004[f]
			Výkrm kuřat	–	500 PPU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 750 PPU	28. 2. 2005[q]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
29	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Geosmithia emersonii*(IMI SD 133) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 5 500 U[33]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), například obsahujících více než 50 % ječmene	30. 6. 2004[g]
30	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Penicillium funiculosum*(IMI SD 101) s minimem aktivity: prášková forma: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 000 U[34]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 1 400 U[35]/g kapalná forma: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 U/ml Endo-1,4-beta-xylanáza: 350 U/ml	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 50 % ječmene nebo 60 % pšenice	30. 6. 2004[g]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Výkrm krůt	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 50 % pšenice	28. 2. 2005[q]
			Nosnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 60 % ječmene nebo 30 % pšenice	28. 2. 2005[q]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Výkrm prasat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 50 % ječmene nebo 60 % pšenice	28. 2. 2005[q]
31	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(CBS 614.94) s minimem aktivity: pevná forma: 300 EU[36]/g kapalná forma: 1 000 EU/g	Výkrm kuřat	–	600 EU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 600 EU	30. 6. 2004[g]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Nosnice	–	300 EU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 600 EU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 60 % pšenice	30. 6. 2004[g]
32	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 200 U[18]/ml	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), například obsahujících více než 30 % ječmene	30. 6. 2004[h]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
		Přípravek endo-1,3-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 200 U[18]/ml	Selata	4 měsíce	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), například obsahujících více než 55 % ječmene	30. 6. 2004[h]
			Výkrm prasat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), například obsahujících více než 70 % ječmene	30. 6. 2004[h]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
33	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) s minimem aktivity: prášková forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 2 000 U[37]/g kapalná forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U/ml	Výkrm kuřat	–	Endo-1,4-beta-xylanáza: 500 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) endo-1,4-beta-xylanáza:	30. 6. 2004[h]
			Nosnice	–	Endo-1,4-beta-xylanáza: 2 000 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 2 000 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 35 % pšenice	30. 6. 2004[h]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
		Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) s minimem aktivity: prášková forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U[37]/g kapalná forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 10 000 U/ml	Selata	4 měsíce	Endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 45 % pšenice	30. 6. 2004[h]
		Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) s minimem aktivity: prášková forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U[37]/g kapalná forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 8 000 U/ml	Výkrm prasat	–	Endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) endo-1,4-beta-xylanáza:	30. 6. 2004[h]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
34	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy produkovaných *Aspergillus niger*(NRRL 25541) a alfa-amylázy produkované *Aspergillus oryzae*(ATCC 66222) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 275 U[38]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U[39]/g Alfa-amyláza: 3 100 U[40]/g	Selata	4 měsíce	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 165 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 240 U Alfa-amyláza: 1 860 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 165 U endo-1,4-beta-xylanáza: 240 U alfa-amyláza: 1 860 U 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících obiloviny, bohatých na škrobové i neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 45 % ječmene a 10 % pšenice nebo 10 % kukuřice	26. 7. 2004[j]
35	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 80 U[18]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 180 U[37]/g	Nosnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 80 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 180 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 80 U endo-1,4-beta-xylanáza: 180 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 60 % ječmene	26. 7. 2004[j]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
36	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U[18]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U[37]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 40 % ječmene	26. 7. 2004[j]
			Nosnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 300 U endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 35 % ječmene	26. 7. 2004[j]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
37	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) a subtilisinu produkovaného *Bacillus subtilis*(ATCC 2107) s minimem aktivity: Endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U[37]/g Subtilisin: 800 U[41]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,4-beta-xylanáza: 500 U Subtilisin: 160 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 500 – 2 500 U subtilisin: 160 – 800 U 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících například více než 65 % pšenice	26. 7. 2004[j]
			Krůty	–	Endo-1,4-beta-xylanáza: 825 U Subtilisin: 265 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 825 – 2 500 U subtilisin: 265 – 800 U 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících například více než 45 % pšenice	26. 7. 2004[j]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
38	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) a subtilisinu produkovaného *Bacillus subtilis*(ATCC 2107) s minimem aktivity: Endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U[37]/g Subtilisin: 500 U[41]/g	Selata	4 měsíce	Endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U Subtilisin: 500 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U subtilisin: 500 U 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících například více než 40 % pšenice	26. 7. 2004[j]
39	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U[18]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U[37]/g	Výkrm prasat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 65 % ječmene	26. 7. 2004[j]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
40	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) a subtilisinu produkovaného *Bacillus subtilis*(ATCC 2107) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U[18]/g Endo-1,4-beta xylanáza: 400 U[37]/g Subtilisin: 800 U[41]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta glukanáza: 30 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 90 U Subtilisin: 240 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 30–100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 90–300 U 3) subtilisin: 240 – 800 U	26. 7. 2004[j]
41	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) a subtilisinu produkovaného *Bacillus subtilis*(ATCC 2107) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U[18]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U[37]/g Subtilisin: 800 U[41]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 25 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 625 U Subtilisin: 200 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 25 – 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 625 – 2 500 U 3) subtilisin: 200 – 800 U	26. 7. 2004[j]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Nosnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U Subtilisin: 800 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 2 500 U 3) subtilisin: 800 U	26. 7. 2004[j]
42	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135) s minimem aktivity: pevná forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U[37]/g Charakteristika povoleného přípravku: Endo-1,4-beta-xylanáza: 1,99 % Pšenice: 97,7 % Propionan vápenatý: 0,3 % Lecitin: 0,01 %	Selata	4 měsíce	Endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 60 % pšenice	26. 7. 2004[j]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Výkrm prasat	–	Endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 60 % pšenice	17. 7. 2004[m]
43	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135), endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) a alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) s minimem aktivity: Endo-1,4-beta-xylanáza: 3 975 U[37]/g Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 125 U[18]/g Alfa-amyláza: 1 000 U[42]/g	Selata	4 měsíce	Endo-1,4-beta-xylanáza: 3 975 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 125 U Alfa-amyláza: 1 000 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 3 975 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 125 U 3) alfa-amyláza: 1 000 U	6. 1. 2004[k]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
44	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) a alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U^{18}/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U^{37}/g Alfa-amyláza: 1 000 U^{42}/g	Selata	4 měsíce	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U Alfa-amyláza: 1 000 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U alfa-amyláza: 1 000 U 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících obiloviny, bohatých na škrobové i neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 50 % ječmene	6. 1. 2004[k]
45	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135) a alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U^{18}/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U^{37}/g Alfa-amyláza: 1 000 U^{42}/g	Selata	4 měsíce	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U Alfa-amyláza: 1 000 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 250 U endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U alfa-amyláza: 1 000 U 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících obiloviny, bohatých na škrobové i neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 35 % ječmene	6. 1. 2004[k]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
46	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Polygalakturonáza EC 3.2.1.15	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135) a polygalakturonázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U[18]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U[37]/g Polygalakturonáza: 50 U[43]/g	Výkrm prasat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U Polygalakturonáza: 50 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 400 U endo-1,4-beta-xylanáza: 400 U polygalakturonáza: 50 U 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících obiloviny, bohatých na škrobové i neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 40 % ječmene	6. 1. 2004[k]
47	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Polygalakturonáza EC 3.2.1.15	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135), alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) a polygalakturonázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U[18]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U[37]/g Alfa-amyláza: 1 000 U[42]/g Polygalakturonáza: 25 U[43]/g	Selata	4 měsíce	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U Alfa-amyláza: 1 000 U Polygalakturonáza: 25 U	– – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U endo-1,4-beta-xylanáza: 4 000 U alfa-amyláza: 1 000 U polygalakturonáza: 25 U 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících obiloviny, bohatých na škrobové i neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 20 % ječmene a 35 % pšenice	6. 1. 2004[k]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
48	Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek alfa-amylázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkovaných *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) s minimem aktivity: potahovaná forma: Alfa-amyláza: 200 KNU[44]/g Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 350 FBG[5]/g kapalná forma: Alfa-amyláza: 130 KNU/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 225 FBG/ml	Výkrm kuřat	–	10 KNU 17 FBG	40 KNU 70 FBG	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 20 KNU 35 FBG 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 40 % ječmene	1. 4. 2004[I]
			Výkrm krůt	–	40 KNU 70 FBG	80 KNU 140 FBG	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 40 KNU 70 FBG 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 40 % ječmene	1. 4. 2004[I]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
49	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Bacillolyzin EC 3.4.24.28 Polygalakturonáza EC 3.2.1.15	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135), alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553), bacillolyzinu produkovaného *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9554) a polygalakturonázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U[18]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 1 500 U[37]/g Alfa-amyláza: 500 U[42]/g Bacillolyzin: 800 U[41]/g Polygalakturonáza: 50 U[43]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 1 500 U Alfa-amyláza: 500 U Bacillolyzin: 800 U Polygalakturonáza: 50 U	– – – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U endo-1,4-beta-xylanáza: 1 500 U alfa-amyláza: 500 U bacillolyzin: 800 U polygalakturonáza: 50 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 30 % pšenice	17. 7. 2004[m]
			Nosnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 1 500 U Alfa-amyláza: 500 U Bacillolyzin: 800 U Polygalakturonáza: 50 U	– – – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U endo-1,4-beta-xylanáza: 1 500 U alfa-amyláza: 500 U bacillolyzin: 800 U polygalakturonáza: 50 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 30 % pšenice	17. 7. 2004[m]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
50	6-fytáza EC 3.1.3.26	Přípravek 6-fytázy produkované *Aspergillus oryzae*(DSM 11857) s minimem aktivity: potahovaná forma: 2 500 FYT[3]/g kapalná forma: 5 000 FYT/g	Výkrm kuřat	–	250 FYT	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 3) 500 – 1 000 FYT	17. 7. 2004[m]
			Nosnice	–	250 FYT	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500 – 1 000 FYT 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin	17. 7. 2004[m]
			Výkrm krůt	–	250 FYT	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500 – 1 000 FYT 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin	17. 7. 2004[m]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Selata	2 měsíce	500 FYT	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500 – 1 000 FYT 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin	17. 7. 2004[m]
			Výkrm prasat	–	500 FYT	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 500 – 1 000 FYT 3. Pro použití do krmných směsí obsahujících více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin	17. 7. 2004[m]
51	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Bacillus subtilis*(LMG-S 15136) s minimem aktivity: 100 IU[45]/g	Výkrm kuřat	–	10 IU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 10 IU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), například obsahujících více než 40 % pšenice	17. 7. 2004[m]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Selata	2 měsíce	10 IU	–	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 10 IU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na arabinoxylany, například obsahujících více než 40 % pšenice	31. 5. 2005[r]
52	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(CBS 592.94) a alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) s minimem aktivity: kapalná forma: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 10 000 U[46]/ml Endo-1,4-beta-glukanáza: 120 000 U[47]/ml Alfa-amyláza: 400 U[48]/ml	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 000 U Endo-1,4-beta-glukanáza: 12 000 U Alfa-amyláza: 40 U	– – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 000 – 2 000 U endo-1,4-beta-glukanáza: 12 000 – 24 000 U alfa-amyláza: 40 – 80 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 20 % pšenice a 15 % čiroku a 5 % kukuřice	17. 7. 2004[m]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
53	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Bacillolyzin EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(CBS 592.94), alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacillolyzinu produkovaného *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9554) a endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma viride*(-NIBH FERM BP 4842) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 350 U[46]/g Endo-1,4-beta-glukanáza: 4 000 U[47]/g Alfa-amyláza: 400 U[49]/g Bacillolyzin: 450 U[50]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 20 000 U[51]/g	Selata	2 měsíce	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 350 U Endo-1,4-beta-glukanáza: 4 000 U Alfa-amyláza: 400 U Bacillolyzin: 450 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 20 000 U	– – – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 350 U endo-1,4-beta-glukanáza: 4 000 U alfa-amyláza: 400 U bacillolyzin: 450 U endo-1,4-beta-xylanáza: 20 000 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 25 % ječmene a 20 % kukuřice	23. 11. 2004[o]
			Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 175 U Endo-1,4-beta-glukanáza: 2 000 U Alfa-amyláza: 200 U Bacillolyzin: 225 U	– – – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 175 – 2 350 U endo-1,4-beta-glukanáza: 2 000 – 4 000 U alfa-amyláza: 200 - 400 U bacillolyzin: 225 - 450 U endo-1,4-beta-xylanáza: 10 000 – 20 000 U	23. 11. 2004[o]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
							3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 45 % pšenice	
54	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(CBS 592.94), alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) a endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma viride*(-NIBH FERM BP 4842) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 10 000 U[46]/g Endo-1,4-beta-glukanáza: 120 000 U[47]/g Alfa-amyláza: 400 U[49]/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 210 000 U[51]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 000 U Endo-1,4-beta-glukanáza: 12 000 U Alfa-amyláza: 40 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 21 000 U	– – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 000 – 2 000 U endo-1,4-beta-glukanáza: 12 000 – 24 000 U alfa-amyláza: 40 - 80 U endo-1,4-beta-xylanáza: 21 000 – 42 000 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 45 % pšenice	23. 11. 2004[o]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
55	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Bacillolyzin EC 3.4.24.28	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(CBS 592.94), alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) a bacillolyzinu produkovaného *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9554) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 3 000 U[46]/g Endo-1,4-beta-glukanáza: 5 000 U[47]/g Alfa-amyláza: 540 U[49]/g Bacillolyzin: 450 U[50]/g	Selata	2 měsíce	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 500 U Endo-1,4-beta-glukanáza: 2 500 U Alfa-amyláza: 270 U Bacillolyzin: 225 U	– – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 500 – 3 000 U endo-1,4-beta-glukanáza: 2 500 – 5 000 U alfa-amyláza: 270 - 540 U bacillolyzin: 225 - 450 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na škrobové i neškrobové polysacharidy, například obsahujících více než 35 % pšenice a 15 % ječmene	23. 11. 2004[o]
			Výkrm prasat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 500 U Endo-1,4-beta-glukanáza: 2 500 U Alfa-amyláza: 270 U Bacillolyzin. 225 U	– – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 500 – 3 000 U endo-1,4-beta-glukanáza: 2 500–5 000 U alfa-amyláza: 270–540 U bacillolyzin: 225–450 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na škrobové i neškrobové polysacharidy, například obsahujících více než 50 % ječmene	23. 11. 2004[o]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
			Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 500 U Endo-1,4-beta-glukanáza: 2 500 U Alfa-amyláza: 270 U Bacillolyzin: 225 U	– – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 500 – 3 000 U endo-1,4-beta-glukanáza: 2 500–5 000 U alfa-amyláza: 270–540 U bacillolyzin: 225–450 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na škrobové i neškrobové polysacharidy, například obsahujících více než 50 % kukuřice nebo 50 % pšenice	23. 11. 2004[o]
			Nosnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 500 U Endo-1,4-beta-glukanáza: 2 500 U Alfa-amyláza: 270 U Bacillolyzin: 225 U	– – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 500–3 000 U endo-1,4-beta-glukanáza: 2 500–5 000 U alfa-amyláza: 270–540 U bacillolyzin: 225–450 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na škrobové i neškrobové polysacharidy, například obsahujících více než 40 % kukuřice nebo 10 % žita	23. 11. 2004[o]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
56	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Bacillolyzin EC 3.4.24.28	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(CBS 592.94), alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) a bacillolyzinu produkovaného *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9554) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 6 000 U[46]/g Endo-1,4-beta-glukanáza: 3 500 U[47]/g Alfa-amyláza: 1 400 U[49]/g Bacillolyzin: 450 U[50]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 6 000 U Endo-1,4-beta-glukanáza: 3 500 U Alfa-amyláza: 1 400 U Bacillolyzin: 450 U	– – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 6 000 U endo-1,4-beta-glukanáza: 3 500 U alfa-amyláza: 1 400 U bacillolyzin: 450 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), například obsahujících více než 40 % ječmene	23. 11. 2004[o]
57	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Bacillolyzin EC 3.4.24.28	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(CBS 592.94), alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) a bacillolyzinu produkovaného *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9554) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 3 000 U[46]/g Endo-1,4-beta-glukanáza: 9 000 U[47]/g Alfa-amyláza: 540 U[49]/g Bacillolyzin: 450 U[50]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 3 000 U Endo-1,4-beta-glukanáza: 9 000 U Alfa-amyláza: 540 U Bacillolyzin. 450 U	– – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 3 000 U endo-1,4-beta-glukanáza: 9 000 U alfa-amyláza: 540 U bacillolyzin: 450 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na škrobové i neškrobové polysacharidy (hlavně celulózu a hemicelulózu), například obsahujících více než 20 % slunečnicové moučky a 10 % sojové moučky	23. 11. 2004[o]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
58	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Bacillolyzin EC 3.4.24.28	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(CBS 592.94), alfa-amylázy produkované *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) a bacillolyzinu produkovaného *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9554) s minimem aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 350 U[46]/g Endo-1,4-beta-glukanáza: 5 000 U[47]/g Alfa-amyláza: 400 U[49]/g Bacillolyzin: 5 000 U[50]/g	Selata	2 měsíce	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 350 U Endo-1,4-beta-glukanáza: 5 000 U Alfa-amyláza: 400 U Bacillolyzin. 5 000 U	– – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 350 U endo-1,4-beta-glukanáza: 5 000 U alfa-amyláza: 400 U bacillolyzin: 5 000 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 30 % ječmene	23. 11. 2004[o]
59	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Subtilisin EC 3.4.21.62 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Polygalakturonáza EC 3.2.1.15	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy produkovaných *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553), subtilisinu produkovaného *Bacillus subtilis*(ATCC 2107), polygalakturonázy produkované *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) s minimem aktivity: Endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U[37]/g Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U[18]/g Subtilisin: 4 000 U[41]/g Alfa-amyláza: 400 U[42]/g Polygalakturonáza: 25 U[43]/g	Výkrm kuřat	–	Endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U Subtilisin: 4 000 U Alfa-amyláza: 400 U Polygalakturonáza: 25 U	– – – – –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 150 U subtilisin: 4 000 U alfa-amyláza: 400 U polygalakturonáza: 25 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na škrobové i neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 40 % kukuřice	28. 2. 2005[q]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
60	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) s minimem aktivity: Endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U[37]/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 50 U[18]/ml	Výkrm kuřat	–	Endo-1,4-beta-xylanáza: 500 U Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 5 U	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 500–2 500 U 3) endo-1,3(4)-beta-glukanáza:	28. 2. 2005[q]
61	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Trichoderma reesei*(CBS 529.94), endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Trichoderma reesei*(CBS 526.94) s minimem aktivity: prášková forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 17 000 BXU[30]/g Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 11 000 BU[29]/g kapalná forma: Endo-1,4-beta-xylanáza: 22 000 BXU/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 15 000 BU/ml	Výkrm kuřat	–	Endo-1,4-beta-xylanáza: 17 000 BXU Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 11 000 BU	– –	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 17 000 BXU endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 11 000 BU 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), například obsahujících více než 40 % ječmene nebo 55 % pšenice	28. 2. 2005[q]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
Mikroorganismy								
1	*Bacillus cereus*var. *Toyoi* NCIMB 40112/ CNCM I-1012	Přípravek *Bacillus cereus*var. *toyoi*, obsahující minimálně 1 x 10^{10}CFU/g doplňkové látky	Výkrm kuřat	–	0,2 x 10^9	1 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování. Může být použito do krmných směsí obsahujících povolená kokcidiostatika: monensin sodný, lasalocid sodný, salinomycin sodný, dekoquinát, robenidin, narasin, halofuginon	1. 3. 2002[h]
			Nosnice	–	0,2 x 10^9	1 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	1. 3. 2002[h]
			Telata	6 měsíců	0,5 x 10^9	1 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	1. 3. 2002[h]
			Výkrm skotu	–	0,2 x 10^9	0,2 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Množství mikroorganismu *Bacillus cereus* var. *toyoi* v denní dávce nesmí překročit 1,0 x 10^9 CFU na 100 kg živé hmotnosti a 0,2 x 10^9CFU na každých dalších 100 kg živé hmotnosti	1. 3. 2002[h]
			Chovní králíci	–	0,1 x 10^9	5 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Může být použito do krmných směsí obsahujících povolené kokcidiostatikum: robenidin	1. 3. 2002[h]
			Výkrm králíků	–	0,1 x 10^9	5 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Může být použito do krmných směsí obsahujících povolená kokcidiostatika: robenidin, salinomycin sodný	1. 3. 2002[h]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
3	Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47	Přípravek *Saccharomyces cerevisiae*obsahující nejméně: 5 x 10^9 CFU/g doplňkové látky	Výkrm králíků	–	2,5 x 10^9	5 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Může být použito do krmných směsí obsahujících povolené kokcidiostatikum: meticlorpindol	30. 6. 2004[f]
			Prasnice	–	5 x 10^9	2,5 x 10^{10}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[f]
			Selata	4 měsíce	5 x 10^9	1 x 10^{10}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[f]
			Dojnice	–	4 x 10^8	2 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Množství *Saccharomyces cerevisiae* v denní dávce nesmí překročit 5,6 x 10^9 CFU na 100 kg živé hmotnosti a 8,75 x 10^9 CFU na každých dalších 100 kg živé hmotnosti	31. 5. 2005[r]
5	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Přípravek *Saccharomyces cerevisiae*obsahující nejméně 1 x 10^8 CFU/g doplňkové látky	Telata	6 měsíců	2 x 10^8	2 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[f]
			Výkrm skotu	–	1,7 x 10^8	1,7 x 10^8	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Množství *Saccharomyces cerevisiae*v denní dávce nesmí překročit 7,5 x 10^8 CFU na 100 kg živé hmotnosti a 1 x 10^8 CFU na každých dalších 100 kg živé hmotnosti	30. 6. 2004[g]
			Dojnice	–	5 x 10^7	3,5 x 10^8	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Množství *Saccharomyces cerevisiae*v denní dávce nesmí překročit 1,2 x 10^8 CFU na 100 kg živé hmotnosti a 1,7 x 10^8 CFU na každých dalších 100 kg živé hmotnosti	31. 5. 2005[r]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
6	Saccharomyces cerevisiae CNCM I–1079	Přípravek *Saccharomyces cerevisiae*obsahující nejméně:	Prasnice	–	2×10^9	1×10^{10}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[f]
			Selata	4 měsíce	6×10^9	3×10^{10}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[f]
7	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077	Přípravek *Saccharomyces cerevisiae*obsahující nejméně: 2×10^{10}CFU/g doplňkové látky	Dojnice	–	$5{,}5 \times 10^8$	$2{,}1 \times 10^9$	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Množství *Saccharomyces cerevisiae*v denní dávce nesmí překročit $8{,}4 \times 10^9$ CFU na 100 kg živé hmotnosti a $1{,}8 \times 10^9$ CFU na každých dalších 100 kg živé hmotnosti	30. 6. 2004[f]
			Výkrm skotu	–	1×10^9	$1{,}5 \times 10^9$	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Množství *Saccharomyces cerevisiae*v denní dávce nesmí překročit $4{,}6 \times 10^9$ CFU na 100 kg živé hmotnosti a 2×10^9 CFU na každých dalších 100 kg živé hmotnosti	30. 6. 2004[f]
8	Enterococcus faecium ATCC 53519 Enterococcus faecium ATCC 55593 (v poměru 1:1)	Směs: *Enterococcus faecium*v kapslích (ATCC 53519) a *Enterococcus faecium*v kapslích (ATCC 55593) obsahující nejméně: 2×10^8CFU/g doplňkové látky (tj. minimálně 1×10^8 CFU/g každé bakterie)	Výkrm kuřat	–	1×10^8	1×10^8	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Může být použito do krmných směsí obsahujících povolená kokcidiostatika: amprolium, dekoquinát, halofuginon, lasalocid sodný, maduramicin amonný, monensin sodný, narasin, nikarbazin, narasin/nikarbazin, salinomycin sodný	30. 6. 2004[f]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
9	Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M	Přípravek *Pedicoccus acidilactici*obsahující nejméně 1 x 10^{10}CFU/g doplňkové látky	Výkrm kuřat	–	1 x 10^{9}	1 x 10^{10}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Může být použito do krmných směsí obsahujících povolená kokcidiostatika: amprolium, meticlorpindol, dekoquinát, halofuginon, narasin, salinomycin sodný, nikarbazin, maduramicin amonný, diclazuril	30. 6. 2004[g]
			Selata	4 měsíce	1 x 10^{9}	1 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[g]
			Výkrm prasat	–	1 x 10^{9}	1 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[g]
10	Enterococcus faecium NCIMB 10415	Přípravek *Enterococcus faecium*obsahující nejméně: forma mikrokapslí: 1,0 x 10^{10}CFU/g doplňkové látky 1,75 x 10^{10}CFU/g doplňkové látky	Výkrm kuřat	–	0,3 x 10^{9}	2,8 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Může být použito do krmných směsí obsahujících povolená kokcidiostatika: amprolium, amprolium/ethopabát, diclazuril, halofuginon, maduramicin amonný, meticlorpindol, meticlorpindol/methylbenzochát, monensin sodný, robenidin, salinomycin sodný	30. 6. 2004[g]
			Výkrm prasat	–	0,35 x 10^{9}	1,5 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[g]
			Prasnice	–	0,2 x 10^{9}	1,25 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[g]
			Výkrm skotu	–	0,25 x 10^{9}	0,6 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Množství *Enterococcus faecium*v denní dávce nesmí překročit 1 x 10^{9} CFU na 100 kg živé hmotnosti a 1 x 10^{9} CFU na každých dalších 100 kg živé hmotnosti	30. 6. 2004[g]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
		Přípravek *Enterococcus faecium*obsahující nejméně: forma mikrokapslí: 1,0 x 10^{10}CFU/g doplňkové látky 1,75 x 10^{10}CFU/g doplňkové látky a granulovaná forma:	Selata	4 měsíce	0,3 x 10^{9}	1,4 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Granulovaná forma se používá výhradně do mléčných krmných směsí	30. 6. 2004[g]
			Telata	6 měsíců	0,35 x 10^{9}	6,6 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Granulovaná forma se používá výhradně do mléčných krmných směsí	30. 6. 2004[g]
11	Enterococcus faecium DSM 5464	Přípravek *Enterococcus faecium*obsahující nejméně:	Selata	4 měsíce	0,5 x 10^{9}	1 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[g]
			Výkrm kuřat	–	0,5 x 10^{9}	1 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Může být použito do krmných směsí obsahujících povolená kokcidiostatika: amprolium, diclazuril, halofuginon, monensin sodný, meticlorpindol/methylbenzochát, nikarbazin	1. 4. 2004[l]
			Telata	4 měsíce	0,5 x 10^{9}	1 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	1. 4. 2004[l]
12	Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R	Přípravek *Lactobacillus farciminis*obsahující nejméně 1 x 10^{9}CFU/g doplňkové látky	Selata	4 měsíce	1 x 10^{9}	1 x 10^{10}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[h]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
13	Enterococcus faecium DSM 10 663/ NCIMB	Přípravek *Enterococcus faecium*obsahující nejméně: prášková a granulovaná forma. 3,5 x 10^{10}CFU/g doplňkové látky potahovaná forma: 2,0 x 10^{10}CFU/g doplňkové látky kapalná forma: 1 x 10^{10}CFU/ml doplňkové látky	Selata	4 měsíce	1 x 10^{9}	1 x 10^{10}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[h]
			Telata	6 měsíců	1 x 10^{9}	1 x 10^{10}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	26. 7. 2004[j]
			Výkrm kuřat	–	1 x 10^{9}	1 x 10^{10}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Může být použito do krmných směsí obsahujících povolená kokcidiostatika: amprolium, amprolium-ethopabát, dekoquinát, diclazuril, halofuginon, lasalocid sodný, maduramicin amonný, meticlorpindol/methylbenzochát, monensin sodný, narasin, nikarbazin, robenidin, salinomycin sodný	26. 7. 2004[j]
14	Saccharomyces cerevisiae MUCL 39 885	Přípravek *Saccharomyces cerevisiae*obsahující nejméně: prášková forma, kulová a oválná granulovaná forma: 1 x 10^{9} CFU/g doplňkové látky	Selata	4 měsíce	3 x 10^{9}	3 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	30. 6. 2004[h]
			Výkrm skotu	–	9 x 10^{9}	9 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Množství *Saccharomyces cerevisiae*v denní dávce nesmí překročit 1,6 x 10^{10}CFU na 100 kg živé hmotnosti a 3,2 x 10^{9} CFU na každých dalších 100 kg živé hmotnosti	30. 6. 2004[h]
15	Enterococcus faecium NCIMB 11181	Přípravek *Enterococcus faecium*obsahující nejméně: prášková forma: 4 x 10^{11} CFU/g doplňkové látky potahovaná forma: 5 x 10^{10}CFU/g doplňkové látky	Telata	6 měsíců	5 x 10^{8}	2 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	6. 1. 2004[k]
			Selata	4 měsíce	5 x 10^{8}	2 x 10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	6. 1. 2004[k]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
16	Enterococcus faecium DSM 7134 Lactobacillus rhamnosus DSM 7133	Směs: *Enterococcus faecium*obsahující nejméně 7 x 10^9 CFU/g a *Lactobacillus rhamnosus*obsahující nejméně 3 x 10^9 CFU/g	Telata	6 měsíců	1 x 10^9	6 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	6. 1. 2004[k]
			Selata	4 měsíce	1 x 10^9	5 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	6. 1. 2004[k]
17	Lactobacillus casei NCIMB 30096 Enterococcus faecium NCIMB 30098	Směs *Lactobacillus casei*a *Enterococcus faecium*obsahující nejméně: *Lactobacillus casei*2 x 10^9 CFU/g a: *Enterococcus faecium*6 x 10^9 CFU/g	Telata	6 měsíců	Lactobacillus casei *0,5* x 10^9	Lactobacillus casei 1 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	1. 4. 2004[l]
18	Enterococcus faecium CECT 4515	Přípravek *Enterococcus faecium*obsahující nejméně 1 x 10^{10} CFU/g doplňkové látky	Selata	4 měsíce	1 x 10^9	1 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	1. 4. 2004[l]
			Telata	6 měsíců	1 x 10^9	1 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	1. 4. 2004[l]
19	Streptococcus infantarius CNCM I-841 Lactobacillus plantarum CNCM I-840	Směs *Streptococcus infantarius* a *Lactobacillus plantarum* obsahující nejméně: *Streptococcus infantarius* 0,5 x 10^9 CFU/g a: *Lactobacillus plantarum*2 x 10^9 CFU/g	Telata	6 měsíců	Streptococcus infantarius 1 x 10^9	Streptococcus infantarius 1 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	17. 7. 2004[m]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
20	Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilit DSM 5750	Směs *Bacillus licheniformis*a *Bacillus subtilis*obsahující nejméně: 3,2 x 10^9 CFU/g doplňkové látky (1,6 x 10^9 CFU/g každé bakterie)	Prasnice	15 dní před porodem a během laktace	0,96 x 10^9	1,92 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	23. 11. 2004[o]
			Výkrm prasat	–	0,48 x 10^9	1,28 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	23. 11. 2004[o]
			Výkrm kuřat	–	3,2 x 10^9	3,2 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Může být použito do krmných směsí obsahujících povolená kokcidiostatika: amprolium-ethopabát, diclazuril, halofuginon, meticlorpindol/methylbenzochát, monensin sodný, nikarbazin, robenidin a salinomycin sodný	23. 11. 2004[o]
			Výkrm krůt	–	1,28 x 10^9	3,2 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování Může být použito do krmných směsí obsahujících povolená kokcidiostatika: amprolium-ethopabát, diclazuril, halofuginon, meticlorpindol/methylbenzochát, monensin sodný, nifursol a robenidin	23. 11. 2004[o]
			Telata	6 měsíců	1,28 x 10^9	1,6 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	28. 2. 2005[q]
21	Enterococcus faecium DSM 3530	Přípravek *Enterococcus faecium*obsahující nejméně: 2,5 x 10^9 CFU/g	Telata	6 měsíců	1 x 10^9	1 x 10^9	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování	28. 2. 2005[q]

Číslo (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva			
Radionuklidní pojiva								
1. 1. Radioaktivní pojiva cesia(^{137}Cs a ^{134}Cs)								
1.1	Hexakyanoželeznatan (II) železitoamonný (III)	$NH_4Fe(III)[Fe(II)(CN)6)]$	Přežvýkavci (domácí i volně žijící)	–	50	500	V návodu pro použití uvádějte: „Množství hexakyanoželeznatanu železitoamonného v denní dávce musí být od 10 mg do 150 mg na 10 kg živé hmotnosti.“	13. 10. 2001[b]
			Telata do počátku přežvykování	–	50	500	V návodu pro použití uvádějte: „Množství hexakyanoželeznatanu železitoamonného v denní dávce musí být od 10 mg do 150 mg na 10 kg živé hmotnosti.“	13. 10. 2001[b]
			Jehňata do počátku přežvykování	–	50	500	V návodu pro použití uvádějte: „Množství hexakyanoželeznatanu železitoamonného v denní dávce musí být od 10 mg do 150 mg na 10 kg živé hmotnosti.“	13. 10. 2001[b]
			Kůzlata do počátku přežvykování	–	50	500	V návodu pro použití uvádějte: „Množství hexakyanoželeznatanu železitoamonného v denní dávce musí být od 10 mg do 150 mg na 10 kg živé hmotnosti.“	13. 10. 2001[b]
			Prasata (domácí i divoká)	–	50	500	V návodu pro použití uvádějte: „Množství hexakyanoželeznatanu železitoamonného v denní dávce musí být od 10 mg do 150 mg na 10 kg živé hmotnosti.“	13. 10. 2001[b]

([a]) První povolení: směrnice Komise 97/72/ES (Úř. věst. L 351 23.12.1997, s. 55).
([b]) První povolení: směrnice Komise 96/66/ES (Úř. věst. L 272, 25.10.1996, s. 32).
([c]) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 2316/98 (Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 4).
([d]) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 639/1999 (Úř. věst. L 82, 26.3.1999, s. 6).
([e]) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 1245/1999 (Úř. věst. L 150, 17.6.1999, s. 15).
([f]) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 1436/98 (Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15).
([g]) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 866/1999 (Úř. věst. L 108, 27.4.1999, s. 21).
([h]) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 1411/1999 (Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 56).
([i]) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 2374/98 (Úř. věst. L 295, 4.11.1998, s. 3).

(j) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 1636/1999 (Úř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 17).
(k) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 2690/1999 (Úř. věst. L 326, 18.12.1999, s. 33).
(l) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 654/2000 (Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 26).
(m) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 1353/2000 (Úř. věst. L 155, 28.6.2000, s. 15).
(n) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 1887/2000 (Úř. věst. L 227, 7.9.2000, s. 13).
(o) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 2437/2000 (Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 28).
(p) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 2697/2000 (Úř. věst. L 319, 16.12.2000, s. 1).
(q) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 418/2001 (Úř. věst. L 62, 2.3.2001, s. 3).
(r) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 937/2001 (Úř. věst. L 130, 12.5.2001, s. 25).
(s) První povolení: nařízení Komise (ES) č. 1334/2001 (Úř. věst. L 180, 3.7.2001, s. 18).
(1) Nebude-li případně stanoven zvláštní maximální limit založený na dostatečných údajích o přítomnosti dioxinů, použije se od 15. října 2000 maximální limit 500 pg TEQ-PCCD/F-OMS/kg.
(2) 1 FTU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za minutu z fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37 °C.
(3) 1 FYT je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za minutu z fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37 °C.
(4) 1 GALU je množství enzymu, které hydrolyzuje 1 mikromol p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranozidu za minutu při pH 5,5 a teplotě 37 °C.
(5) 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 30 °C.
(6) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 7,8 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z azo-arabinoxylanu pšenice při pH 6,0 a teplotě 50 °C.
(7) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 3,1 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z azo-arabinoxylanu pšenice při pH 6,0 a teplotě 50 °C.
(8) 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu xylózy za minutu z azurin-xylanu při pH 5,0 a teplotě 40 °C.
(9) 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu glukózy za minutu z azurin-beta-glukanu při pH 5,0 a teplotě 40 °C.
(10) 1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z arabinoxylanu pšenice při pH 3,5 a teplotě 55 °C.
(11) 1 RAU je množství enzymu, které konvertuje 1 mg rozpuštěného škrobu na produkt, který má shodnou absorpci pro referenční barvivo při 620 nm po reakci s jódem, za minutu při pH 6,6 a teplotě 30 °C.
(12) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy za minutu z karboxymethyl-celulózy při pH 5,0 a teplotě 40 °C.
(13) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 40 °C.
(14) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy za minutu z xylanu ovesných slupek při pH 5,0 a teplotě 40 °C.
(15) 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,278 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 3,5 a teplotě 40 °C.
(16) 1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z arabinoxylanu pšenice při pH 3,5 a teplotě 55 °C.
(17) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol xylózy za minutu z xylanu březového dřeva při pH 5,3 a teplotě 50 °C.
(18) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 30 °C.
(19) 1 CU je množství enzymu, které uvolní 0,128 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 4,5 a teplotě 30 °C.
(20) 1 EPU je množství enzymu, které uvolní 0,0083 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovesných slupek při pH 4,7 a teplotě 30 °C.
(21) 1 AGL je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 4,6 a teplotě 30 °C.
(22) 1 AXC je množství enzymu, které uvolní 17,2 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z xylanu ovsa při pH 4,7 a teplotě 30 °C.
(23) 1 BGN je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 4,8 a teplotě 50 °C.
(24) 1 IFP je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovsa při pH 4,8 a teplotě 50 °C.
(25) 1 QXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovsa při pH 5,1 a teplotě 50 °C.
(26) 1 QGU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 4,8 a teplotě 50 °C.
(27) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ovsa při pH 4,0 a teplotě 30 °C.
(28) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovsa při pH 4,0 a teplotě 30 °C.
(29) 1 BU je množství enzymu, které uvolní 0,06 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 4,8 a teplotě 50 °C.
(30) 1 BXU je množství enzymu, které uvolní 0,06 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu březového dřeva při pH 5,3 a teplotě 50 °C.
(31) 1 BU je množství enzymu, které uvolní 0,06 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 4,8 a teplotě 50 °C.
(32) 1 PPU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za minutu z fytátu sodného při pH 5 a teplotě 37 °C.
(33) 1 U je množství enzymu, které uvolní 2,78 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 50 °C.
(34) 1 U je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 50 °C.
(35) 1 U je množství enzymu, které uvolní 4,00 mikromoly redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z xylanu březového dřeva při pH 5,5 a teplotě 50 °C.
(36) 1 EU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovsa při pH 4,5 a teplotě 40 °C.
(37) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovesných slupek při pH 5,3 a teplotě 50 °C.
(38) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ovsa při pH 4,0 a teplotě 30 °C.
(39) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z xylanu ovsa při pH 4,0 a teplotě 30 °C.
(40) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z pšeničného škrobu při pH 4,0 a teplotě 30 °C.
(41) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolových sloučenin (ekvivalenty tyrozinu) za minutu z kaseinového substrátu při pH 7,5 a teplotě 40 °C.
(42) 1 U je množství enzymu, které zhydrolyzuje 1 mikromol glukosidických vazeb za minutu z vodou nerozpustného škrobového polymeru při pH 6,5 a teplotě 37 °C.
(43) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího materiálu (ekvivalenty kyseliny galakturonové) za minutu z poly-D-galakturonového substrátu při pH 5,0 a teplotě 40 °C.
(44) 1 KNU je množství enzymu, které uvolní 672 mikromolů redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z rozpustného škrobu při pH 5,6 a teplotě 37 °C.

([45]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu březového dřeva při pH 4,5 a teplotě 30 °C.
([46]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 7,5 a teplotě 30 °C.
([47]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z karboxymethyl-celulózy při pH 4,8 a teplotě 50 °C.
([48]) 1 U je množství enzymu, které zhydrolyzuje 1 mikromol glukózy za minutu z příčně vázaného škrobového polymeru při pH 7,5 a teplotě 37 °C.
([49]) 1 U je množství enzymu, které zhydrolyzuje 1 mikromol glukosidických vazeb za minutu z vodou nerozpustného škrobového polymeru při pH 7,5 a teplotě 37 °C.
([50]) 1 U je množství enzymu, které vytvoří 1 mikrogram azo-kaseinu rozpustného v kyselině trichloroctové za minutu při pH 7,5 a teplotě 37 °C.
([51]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0067 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu březového dřeva při pH 5,3 a teplotě 50 °C.