32001R2200

15.11.2001 *EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA* L 299/1

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2200/2001,

17. oktoober 2001,

teatavate söödalisandite ajutise lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse söödalisandeid käsitlevat nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ, ([1]) viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/46/EÜ, ([2]) eriti selle artikleid 3, 9e ja 9i,

ning arvestades järgmist:

(1) Kõnealuse direktiivi artikli 9e lõikega 1 ja artikli 9i lõikega 1 nähakse ette, et uut söödalisandit või söödalisandi uut kasutusviisi võib ajutiselt lubada kindlaks ajavahemikuks.

(2) Kõnealuse direktiivi artikliga 4 kehtestatakse kõnealuse loa saamise kord.

(3) Paljude söödalisandite praeguste ajutiste lubade kehtivus lõpeb 30. septembril 2001 ning seda oleks asjakohane pikendada direktiivi 70/524/EMÜ alusel lubatud maksimaalsel määral, st neljanda aasta lõpuni alates esimese ajutise loa kehtivusaja algusest direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9e lõike 1 alusel ajutiselt lubatud ainete puhul ja viienda aasta lõpuni direktiivi 70/524/EMÜ II lisasse enne 1. aprilli 1998 lisatud ainete puhul.

(4) Käesoleva määruse kohased ajutised load on antud kindlaks ajavahemikuks, kuid vastavalt kõnealuse direktiivi artiklitele 9m ja 11 võib kõnealused load igal ajal kehtetuks tunnistada.

(5) Lisaks sellele vaadatakse praegu uuesti läbi load antibiootikumide kasutamiseks söödalisanditena, pidades silmas levinud muret seoses söödalisanditena kasutatavate antibiootikumide võimaliku mõjuga antibiootikumide tõhususele inimeste ravil ja sellest tulenevat asjaolu, et Rootsi Kuningriik on kõnealuse direktiivi artikli 11 alusel keelanud oma territooriumil kõigi antibiootikumide kasutamise söödalisanditena, ning juhtiva teaduskomitee 28. mail 1999 esitatud arvamust, mis käsitleb resistentsust mikroobivastaste ravimite suhtes.

(6) Ajutise loa kehtivusaja pikendamist tuleb käsitada üksnes haldusmeetmena, mis ei hõlma asjaomaste söödalisandite ümberhindamist.

(7) Loetavuse ja ühtsuse huvides koondatakse käesolevasse määrusesse kõikide söödalisandite ajutised load, mille kehtivus ei ületa nelja või viit aastat.

(8) Käesoleva komisjoni määrusega asendatakse komisjoni 27. novembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 2697/2000 söödalisandite ajutise lubamise kohta. ([3]) Seepärast on määrus (EÜ) nr 2697/2000 vaja tunnistada kehtetuks.

(9) Enamiku söödalisandite ajutine lubamine kaotab kehtivuse 30. septembril 2001. Seetõttu on käesolevat määrust vaja kohaldada alates 1. oktoobrist 2001.

(10) Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise söödakomitee arvamusega,

([1]) EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.
([2]) EÜT L 234, 1.9.2001, lk 55.
([3]) EÜT L 319, 16.12.2000, lk 1.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ lubatakse käesoleva määruse lisas märgitud lisandeid ajutiselt kasutada selles lisas ettenähtud tingimustel.

Määrus (EÜ) nr 2697/2000 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Ühenduste Teatajas* avaldamisele järgneval päeval.

Määrust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2001.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. oktoober 2001

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE

LISA

Loetelu söödalisanditest, mis on seotud nende ringlusse laskmise eest vastutava isikuga ja mille puhul on antud ajutine luba kuni neljaks aastaks või juhul, kui tegemist on söödalisandiga, mille puhul on ajutine luba antud enne 1. aprilli 1998, kuni viieks aastaks

Söödalisandi registreerimisnumber	Söödalisandi ringlusse laskmise eest vastutava isiku nimi ja registreerimisnumber	Söödalisand (kaubanimi)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
						Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta	Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta		
Antibiootikumid									
33	Eli Lilly and Company Ltd	Avilamütsiin: 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200) Avilamütsiin: 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100)	**Söödalisandi koostis:** Avilamütsiin: toimeaine sisaldus 200 g/kg Sojaõli või mineraalõli: 5–30 g/kg Sojaoakestad qs 1 kg Avilamütsiin: toimeaine sisaldus 100 g/kg Sojaõli või mineraalõli: 5–30 g/kg Sojaoakestad qs 1 kg **Toimeaine:** Avilamütsiin, $C_{57-62}H_{82-90}Cl_{1-2}O_{31-32}$ Avilamütsiin A CASi nr: 69787-79-7, Avilamütsiin B CASi nr: 73240-30-9, *Streptomyces viridochromogenes*'ist (NRRL 2860) toodetud ortosomütsiinide grupi oligosahhariidide segu graanulitena Toimeaine koostis: Avilamütsiin A: ≥ 60 % Avilamütsiin B: ≤ 18 % Avilamütsiin A + B: ≥ 70 % Muud üksikud avilamütsiinid: ≤ 6 %	Kalkunid	–	5	10	–	14.12.2002 [a]

Söödalisandi registreerimisnumber	Söödalisandi ringlusse laskmise eest vastutava isiku nimi ja registreerimisnumber	Söödalisand (kaubanimi)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
						Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta	Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta		
Koktsidiostaatikumid ja muud raviained									
26	Intervet International bv	Salinomütsiinnaatriumi 120 g/kg (Sacox 120 mikrograanulitena)	**Söödalisandi koostis:** Salinomütsiinnaatrium: ≥ 120 g/kg Ränidioksiid: 10–100 g/kg Kaltsiumkarbonaat: 350–700 g/kg **Toimeaine:** Salinomütsiinnaatrium, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, CASi nr: 53003-10-4, *Streptomyces albus*'e fermentiseerimisest (DSM 12217) saadud polüeetermonokarboksüülhappe naatriumsool Seotud lisandid: < 42 mg elaiofüliin/kg salinomütsiinnaatrium < 40 g 17-epi-20-desoksüsalinomütsiin/kg salinomütsiinnaatrium	Munakanad (noorlinnud)	12 nädalat	30	50	Kasutamisjuhendisse märgitakse: "Ohtlik hobuslastele." "See sööt sisaldab ionofoori: teatavate raviainetega (nt. tiamuliin) üheaegne kasutamine võib olla vastunäidustatud."	13.10.2001 [b]
27	Janssen Animal Health BVBA	Diklasuriil: 0,5 g/100g (Clinacox 0,5 % Premix) Diklasuriil: 0,2 g/100g (Clinacox 0,2 % Premix)	**Söödalisandi koostis:** Diklasuriil: 0,5g/100g Sojajahu: 99,25 g/100 g Polüvinüülpürrolidoon K 30: 0,2 g/100 g Naatriumhüdroksiid: 0,0538 g/100 g Diklasuriil: 0,2 g/100 g Sojajahu: 39,7 g/100 g Polüvinüülpürrolidoon K 30: 0,08 g/100 g	Munakanad (noorlinnud)	16 nädalat	1	1	–	14.12.2002 [a]

Sööda-lisandi registree-rimis-number	Söödalisandi ringlusse laskmise eest vastutava isiku nimi ja registree-rimis-number	Söödalisand (kaubanimi)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülem-piir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
						Toimeaine kogus mg-des täissööda kilo-grammi kohta	Toimeaine kogus mg-des täissööda kilo-grammi kohta		
			Naatriumhüdroksiid: 0,0215 g/100 g Nisu peenkliid: 60 g/100 g **Toimeaine:** Diklasuriil, $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-klorofenüül[2,6-dikloro-4-(2,3,4,5-tetrahüdro-3,5-diokso-l,2,4-triasiin-2-yl)fe-nüül]atsetonitriil, CASi nr: 101831-37-2, Seotud lisandid: Laguprodukt (R064318): ≤ 0,2 % Muud lisandid: (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): 0,5 % ükshaaval Lisandeid kokku: ≤ 1,5 %						
28	Alpharma AS	Maduramütsiin-ammoonium alfa: 1 g/100 g (Cygro 1 %)	**Söödalisandi koostis:** Maduramütsiinammoonium alfa: 1 g/100 g Bensüülalkohol: 5 g/100 g Maisitõlviku jahu qs 100 g **Toimeaine:** Maduramütsiinammoonium alfa, $C_{47}H_{83}O_{17}N$, CASi nr: 84878-61-5, *Actinomadura yumaensis*' est (ATCC 315 85) (NRRL 12515) saadud polüeetermo-nokarboksüülhappe ammoniumsool	Kalkunid	16 nädalat	5	5	Keelatud on kasutada vähemalt 5 päeva jooksul enne tapmist. Kasutamisjuhendisse märgi-takse: “Ohtlik hobuslastele.” “See sööt sisaldab ionofoori: teatavate raviainetega (nt. tiamuliin) üheaegne kasuta-mine võib olla vastunäidus-tatud.”	13.10.2001 [b]

Söödalisandi registreerimisnumber	Söödalisandi ringlusse laskmise eest vastutava isiku nimi ja registreerimisnumber	Söödalisand (kaubanimi)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
						Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta	Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta		
			Seotud lisandid: Maduramütsiinammoonium beeta: < 10 %						
Kasvustimulaatorid									
1	Norsk Hydro Ltd	Kaaliumdiformiaat (Formi ™ LHS)	**Söödalisandi koostis:** Tahke kaaliumdiformiaat 98 g/100 g Silikaat 1,5 g/100 g Vesi 0,5 g/100 g **Toimeaine:** Tahke kaaliumdiformiaat $KH(COOH)_2$ CASi nr: 20642-05-1	Põrsad	2 kuud	6 000	6 000	–	30.6.2005 [a]
				Nuumsead	–	6 000	6 000	–	30.6.2005 [a]

Loetelu teistest söödalisanditest, mida lubatakse ajutiselt kasutada kuni neli aastat või selliste söödalisandite puhul, mille kohta on ajutine luba antud enne 1. aprilli 1998, kuni viis aastat

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus täissöödas (mg/kg)	Maksimumsisaldus täissöödas (mg/kg)	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
Värvained, sealhulgas pigmendid								
1. Karotinoidid ja ksantofüllid:								
E160a	Beetakaroteen	$C_{40}H_{56}$	Kanaarilinnud	–	–	–	–	14.12.2003 (c)
E 161g	Kantaksantiin	$C_{40}H_{52}O_2$	Lemmik- ja ilulinnud	–	–	–	–	14.12.2003 (c)
12	Astaksantiinirikas *Phaffia rhodozyma* (ATCC 74219)	Inaktiveeritud pärmseene *Phaffia rhodozyma* (ATCC 74219) kontsentreeritud biomass, mis sisaldab vähemalt 4,0 g astaksantiini kilogrammi söödalisandi kohta ja mille maksimaalne etoksüriinisisaldus on 2 000 mg/kg	Lõhe	–	–	100	Maksimaalne sisaldus on väljendatud astaksantiinina. Lubatud kasutada ainult alates 6. kuust. Söödalisandi ja kantaksantiini segu on lubatud, kui astaksantiini ja kantaksantiini kogusisaldus täissöödas ei ületa 100 mg/kg. Etoksikviinisisaldus tuleb deklareerida	14.12.2003 (c)
			Forell	–	–	100	Maksimaalne sisaldus on väljendatud astaksantiinina. Lubatud kasutada ainult alates 6. kuust. Söödalisandi ja kantaksantiini segu on lubatud, kui astaksantiini ja kantaksantiini kogusisaldus täissöödas ei ületa 100 mg/kg. Etoksikviinisisaldus tuleb deklareerida	14.12.2003 (c)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus täissöödas (mg/kg)	Maksimumsisaldus täissöödas (mg/kg)	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
2. Muud värvained:								
E 102	Tartrasiin	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Terasööjad ilulinnud	–	–	150	–	30.9.2004 (P)
			Pisinärilised	–	–	150	–	30.9.2004 (P)
E 110	Päikeseloojangu-kollane FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Terasööjad ilulinnud	–	–	150	–	30.9.2004 (P)
			Pisinärilised	–	–	150	–	30.9.2004 (P)
E 131	Patentsinine V	m-hüdroksütetraetüüldiamiino trifenüülkarbinooli anhüdriidi disulfoonhappe kaltsiumisool	Terasööjad ilulinnud	–	–	150	–	30.9.2004 (P)
			Pisinärilised	–	–	150	–	30.9.2004 (P)
E 141	Klorofülli ja klorofülliini vaskkompleksid	–	Terasööjad ilulinnud	–	–	150	–	30.9.2004 (P)
			Pisinärilised	–	–	150	–	30.9.2004 (P)

Nr (või EÜ nr)	Element	Söödalisand	Keemiline valem	Elemendi maksimaalne sisaldus täissöödas mg/kg	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
			Mikroelemendid			
E4	Vask-Cu	Vasklüsiinsulfaat	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2SO_4$	Nuumsead: — liikmesriikides, kus sigade keskmine arv 100 ha kasutatava põllumajandusmaa kohta on 175 või rohkem: — kuni 16. nädalani: 175 (kokku) — liikmesriikides, kus sigade keskmine arv 100 ha kasutatava põllumajandusmaa kohta on alla 175: — kuni 16. nädalani: 175 (kokku)	Täissöödas sisalduvast vasest võib kuni 50 mg/kg olla pärit vasklüsiinsulfaadist	31.3.2004 (d)

Nr (või EÜ nr)	Element	Söödalisand	Keemiline valem	Elemendi maksimaalne sisaldus täissöödas mg/kg	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
				Nuumsead: — liikmesriikides, kus sigade keskmine arv 100 ha kasutatava põllumajandusmaa kohta on 175 või rohkem: — 17. nädalast tapmiseni: 35 (kokku) — liikmesriikides, kus sigade keskmine arv 100 ha kasutatava põllumajandusmaa kohta on alla 175: — 17. nädalast tapmiseni: 100 (kokku) — 6. kuust tapmiseni: 35 (kokku) Aretussead: 35 (kokku) Muud loomaliigid või kategooriad, v.a vasikad enne mäletsemise algust ja lambad: 35 (kokku)	Täissöödas sisalduvast vasest võib kuni 25 mg/kg olla pärit vasklüsiinsulfaadist	31.3.2004 [d]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus täissöödas (mg/kg)	Maksimumsisaldus täissöödas (mg/kg)	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
Sideained, paakumisvastased ained ja koagulandid								
3	Vulkaaniline klinoptiloliit	Vulkaaniline hüdraatunud kaltsiumalumosilikaat, mis sisaldab vähemalt 85 % klinoptiloliiti ja kuni 15 % päevakivi, vilke ning kiu- ja kvartsivabu savisid Maksimaalne pliisisaldus: 80 mg/kg	Sead	–	–	20 000	Kõik söödad	21.4.2004 [e]
			Küülikud	–	–	20 000	Kõik söödad	21.4.2004 [e]
			Kodulinnud	–	–	20 000	Kõik söödad	21.4.2004 [e]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus täissöödas (mg/kg)	Maksimumsisaldus täissöödas (mg/kg)	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
4	Setteline klinoptiloliit	Setteline kiu- ja kvartsivaba kaltsiumhüdraat-alumosilikaat, mis sisaldab vähemalt 80 % klinoptiloliiti ja kuni 20 % savimineraale Maksimaalne dioksiinisisaldus (1)	Nuumsead	–	–	20 000	Kõik söödad	26.9.2004 (n)
			Broilerkanad	–	–	20 000	Kõik söödad	26.9.2004 (n)
			Broilerkalkunid	–	–	20 000	Kõik söödad	26.9.2004 (n)
			Veised	–	–	20 000	Kõik söödad	26.9.2004 (n)
			Lõhe	–	–	20 000	Kõik söödad	26.9.2004 (n)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Maksimumsisaldus Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
Ensüümid								
1	3-fütaas EC 3.1.3.8	*Aspergillus niger*'ist (CBS 114.94) toodetud 3-fütaasi valmistis minimaalse fütaasi aktiivsusega 5 000 FTU (2)/g tahkete ja vedelate valmististe puhul	Kalkunid	–	125 FTU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 200–800 FTU 3. Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab vähemalt 0,3 % fütaati, nt 20 % nisu	14.12.2003 (c)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
2	3-fütaas EC 3.1.3.8	*Aspergillus oryzae*'st (DSM 10289) toodetud 3-fütaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Kaetud: 2 500 FYT ([3])/g Vedelal kujul: 5 000 FYT/g	Põrsad	4 kuud	250 FYT	1 000 FYT	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500 FYT 3. Kasutamiseks fütaatiderikkas jõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % teravilju (mais, oder, kaer, nisu, rukis, tritikale), õliseemneid ja kaunvilju	30.6.2004 ([f])
			Nuumsead	–	400 FYT	1 000 FYT	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500 FYT 3. Kasutamiseks fütaatiderikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % teravilju (mais, oder, kaer, nisu, rukis, tritikale), õliseemneid ja kaunvilju	30.6.2004 ([f])
			Broilerkanad	–	200 FYT	1 000 FYT	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500 FYT 3. Kasutamiseks fütaasiderikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % teravilju (mais, oder, kaer, nisu, rukis, tritikale), õliseemneid ja kaunvilju	30.6.2004 ([f])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Munakanad	–	500 FYT	1 000 FYT	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 750 FYT 3. Kasutamiseks fütaatiderikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % teravilju (mais, oder, kaer, nisu, rukis, tritikale), õliseemneid ja kaunvilju	30.6.2004 ([g])
3	Alfa-galaktosidaas EC 3.2.1.22	*Aspergillus oryzae*'st (DSM 10286) toodetud alfa-galaktosidaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Vedelal kujul: 1 000 GALU ([4])/g	Broilerkanad	–	300 GALU	1 000 GALU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 450 GALU 3. Kasutamiseks oligosahhariididerikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 25 % sojajahu, puuvillasrotti, herneid	30.6.2004 ([f])
4	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Aspergillus niger*'ist (CBS 589.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Kaetud: 50 FBG ([5])/g Vedelal kujul: 120 FBG/ml	Põrsad	4 kuud	25 FBG	40 FBG	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 25 FBG 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % maisi või otra	30.6.2004 ([f])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Broilerkanad	–	10 FBG	100 FBG	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 20 FBG 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % maisi	1.4.2004 (f)
5	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Aspergillus oryzae*'st (DSM 10287) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Kaetud: 1 000 FXU (6)/g Vedelal kujul: 650 FXU/ml	Broilerkanad	–	80 FXU	200 FXU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 150 FXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu	30.6.2004 (f)
			Broilerkalkunid	–	225 FXU	600 FXU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 225–600 FXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu	30.6.2004 (f)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Põrsad	4 kuud	200 FXU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 200 FXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu	30.6.2004 (6)
6	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4	*Humicola insolens*'ist (DSM 10442) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja endo-1,4-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Kaetud: 800 FXU (7)/g 75 FBG (5)/g Mikrograanulitena: 800 FXU/g 75 FBG/g Vedelal kujul: 550 FXU/ml 50 FBG/ml	Broilerkanad	–	200 FXU 19 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 400 FXU 38 FBG 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % otra ja/või kaera, nisu	30.6.2004 (6)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Põrsad	4 kuud	240 FXU 94 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 400 FXU 38 FBG 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % otra ja/või kaera, nisu	30.6.2004 [f]
			Nuumsead	–	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 3. 400 FXU	30.6.2004 [h]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
7	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4	*Aspergillus niger*'ist (CBS 600.94) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja endo-1,4 beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Kaetud: 36 000 FXU ([8])/g 15 000 BG ([9])/g Vedelal kujul: 36 000 FXU/g 15 000 BG/g	Broilerkanad	–	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 3 600–6 000 FXU 1 500–2 500 BGU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 35 % otra ja 20 % nisu	1.4.2004 ([1])
			Põrsad	4 kuud	6 000 FXU 2 500 BGU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 6 000 FXU 2 500 BGU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu ja 30 % otra	1.4.2004 ([1])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Broilerkalkunid	–	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 6 000–12 000 FXU 2 500–5 000 BGU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	1.4.2004 (1)
			Munakanad	–	12 000 FXU 5 000 BGU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 20 % nisu, üle 10 % otra ja üle 20 % päevalille	1.4.2004 (1)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
		Aspergillus niger'ist (CBS 600.94) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja endo-1,4 beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 36 000 FXU ([8])/g 15 000 BGU ([9])/g	Broilerkanad	–	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 3 600–6 000 FXU 1 500–2 500 BGU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 35 % otra ja 20 % nisu	30.9.2004 ([P])
			Põrsad	4 kuud	6 000 FXU 2 500 BGU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 6 000 FXU 2 500 BGU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu ja 30 % otra	30.9.2004 ([P])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Broilerkalkunid	–	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 6 000–12 000 FXU 2 500–5 000 BGU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	30.9.2004 (P)
			Munakanad	–	12 000 FXU 5 000 BGU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 20 % nisu, üle 10 % otra ja üle 20 % päevalille	30.9.2004 (P)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
8	Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beeta-ksülanaas: EC 3.2.1.8	*Aspergillus niger*'ist (CBS 600.94) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Kaetud: 10 000 BGU ([9])/g 4 000 FXU ([8])/g Vedelal kujul: 20 000 BGU/g 8 000 FXU/g	Broilerkanad	–	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 3 000–10 000 BGU 1 200–4 000 FXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % otra	1.4.2004 ([1])
			Põrsad	4 kuud	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 3 000–5 000 BGU 1 200–2 000 FXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % otra	1.4.2004 ([1])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Munakanad	–	5 000 BGU 2 000 FXU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % otra	1.4.2004 (l)
		Aspergillus niger'ist (CBS 600.94) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 20 000 BGU (9)/g 8 000 FXU (8)/g	Broilerkanad	–	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 3 000–10 000 BGU 1 200–4 000 FXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % otra	30.9.2004 (p)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Põrsad	4 kuud	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 3 000–5 000 BGU 1 200–2 000 FXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beetaglükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % otra	30.9.2004 (P)
			Munakanad	–	5 000 BGU 2 000 FXU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiino-ksülaanid ja beetaglükaanid) jõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % otra	30.9.2004 (P)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
9	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Aspergillus niger*'ist (CBS 270.95) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 28 000 EXU [10]/g Vedelal kujul: 14 000 EXU/ml	Broilerkanad	–	1 400 EXU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 400 EXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu	30.6.2004 [f]
			Munakanad	–	2 400 EXU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 2 400–7 400 EXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu või rukist	1.4.2004 [f]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Broilerkalkunid	–	2 400 EXU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 2 400–5 600 EXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu või rukist	1.4.2004 (f)
10	Alfa-amülaas EC 3.2.1.1	*Bacillus amyloliquefaciens*'ist (CBS 360.94) toodetud alfa-amülaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 45 000 RAU (11)/g Vedelal kujul: 20 000 RAU/ml	Põrsad	4 kuud	1 800 RAU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 800 RAU 3. Kasutamiseks üksnes vedelsöödajaoturis kasutamiseks ettenähtud tärkliserikast söödatoorainet sisaldavas segajõusöödas (nt sellises, mis sisaldab üle 35 % nisu)	30.6.2004 (f)
			Nuumsead	–	1 800 RAU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 800 RAU 3. Kasutamiseks üksnes vedelsöödajaoturis kasutamiseks ettenähtud tärkliserikast söödatoorainet sisaldavas segajõusöödas (nt sellises, mis sisaldab üle 35 % nisu)	30.6.2004 (f)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Emised	–	1 800 RAU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 800 RAU 3. Kasutamiseks üksnes vedelsöödajaoturis kasutamiseks ettenähtud tärkliserikast söödatoorainet sisaldavas segajõusöödas (nt sellises, mis sisaldab üle 35 % nisu)	30.6.2004 ([f])
11	Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 74 252) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Vedelal kujul: Endo-1,4-beeta-glükanaas: 8 000 U ([12])/ml Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 18 000 U ([13])/ml Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 26 000 U ([14])/ml	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-glükanaas: 400 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-glükanaas: 400–1 600 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900–3 600 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300–5 200 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu või otra ja üle 10 % rukist	30.6.2004 ([f])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
		Trichoderma longibrachiatum'ist (ATCC 74 252) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Graanulitena: Endo-1,4-beeta-glükanaas: 8 000 U [12]/g Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 18 000 [13]/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 26 000 U [14]/g	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-glükanaas: 400 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-glükanaas: 400–1 600 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900–3 600 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300–5 200 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) jõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu või otra ja üle 10 % rukist	31.5.2005 [f]
		Trichoderma longibrachiatum'ist (ATCC 74 252) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Vedelal kujul ja graanulitena: Endo-1,4-beeta-glükanaas: 8 000 U [12]/ml või g Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 18 000 U [13]/ml või g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 26 000 U [14]/ml või g	Broilerkalkunid	–	Endo-1,4-beeta-glükanaas: 400 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-glükanaas: 400–800 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900–1 800 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300–2 600 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	31.5.2005 [f]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
12	Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma viride*'st (FERM BP-4447) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,4-beeta-glükanaas: 8 000 U [12]/g Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 18 000 U [13]/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 26 000 U [14]/g	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-glükanaas: 200 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 450 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 650 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-glükanaas: 800–1 200 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 800–2 700 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 600–3 900 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 20 % nisu ja 20 % otra ja/või 20 % rukist	30.6.2004 [f]
			Munakanad	–	Endo-1,4-beeta-glükanaas: 640 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 440 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 080 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-glükanaas: 640–1 280 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 440–2 880 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 080–4 160 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 20 % nisu ja 20 % otra ja/või 20 % rukist	30.6.2004 [f]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Broilerkalkunid	–	Endo-1,4-beeta-glükanaas: 800 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 800 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 600 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-glükanaas: 800–1 200 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 800–2 700 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 600–3 900 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 20 % nisu ja 20 % otra	30.6.2004 (f)
13	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (CBS 357.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Pulbrina: 8 000 BGU (15)/g 11 000 EXU (16)/g Graanulitena: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g Vedelal kujul: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Broilerkanad	–	100 BGU 130 EXU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 100 BGU 130 EXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu ja 30 % otra või 20 % rukist	30.6.2004 (f)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Munakanad	–	600 BGU 800 EXU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 600 BGU 800 EXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu ja üle 30 % otra	1.4.2004 (1)
			Broilerkalkunid	–	600 BGU 800 EXU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 600 BGU 800 EXU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu või üle 30 % rukist	1.4.2004 (1)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
14	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Aspergillus niger*'ist (CBS 520.94) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 600 U ([17])/g Vedelal kujul: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U/ml	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas:	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300–600 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu	30.6.2004 ([f])
15	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Trichoderma viride*'est (CBS 517.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 650 U ([18])/g Vedelal kujul: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 325 U/ml	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 325 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 325–650 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % otra	30.6.2004 ([f])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
16	Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (IMI SD 142) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Vedelal kujul: 2 000 CU ([19])/ml	Broilerkanad	–	250 CU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 CU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	30.6.2004 ([f])
			Munakanad	–	250 CU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 CU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	30.6.2004 ([f])
			Põrsad	4 kuud	250 CU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 CU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	30.6.2004 ([f])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Nuumsead	–	250 CU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 CU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	30.6.2004 (f)
		Trichoderma longibrachiatum'ist (IMI SD 142) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 2 000 CU (19)/g	Broilerkanad	–	250 CU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 CU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	17.7.2004 (m)
			Munakanad	–	250 CU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 CU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	17.7.2004 (m)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Põrsad	4 kuud	250 CU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 CU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	17.7.2004 ([m])
			Nuumsead	–	250 CU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 CU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	17.7.2004 ([m])
17	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (IMI SD 135) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Vedelal kujul: 6 000 EPU ([19])/g	Broilerkanad	–	750 EPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 500–3 000 EPU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	30.6.2004 ([l])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Munakanad	–	750 EPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 500–3 000 EPU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	30.6.2004 (f)
			Põrsad	4 kuud	750 EPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 500–3 000 EPU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	30.6.2004 (f)
			Nuumsead	–	750 EPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 500–3 000 EPU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	30.6.2004 (f)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
		Trichoderma longibrachiatum'ist (IMI SD 135) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 6 000 EPU ([20])/g	Broilerkanad	–	750 EPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 500–3 000 EPU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	17.7.2004 ([f])
			Munakanad	–	750 EPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 500–3 000 EPU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	17.7.2004 ([m])
			Põrsad	4 kuud	750 EPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 500–3 000 EPU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	17.7.2004 ([m])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Nuumsead	–	750 EPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 500–3 000 EPU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	17.7.2004 [m]
			Broilerkalkunid	–	750 EPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 500–3 000 EPU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 35 % nisu	17.7.2004 [m]
18	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Aspergillus niger*'ist (MUCL 39199) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 2 000 AGL [21]/g Vedelal kujul: 500 AGL/ml	Broilerkanad	–	100 AGL	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 100 AGL 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra ja 20 % nisu	30.6.2004 [f]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
19	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Aspergillus niger*'ist (MUCL 39199) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 1 500 AGL ([21])/g Vedelal kujul: 200 AGL/g	Broilerkanad	–	25 AGL	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 25–100 AGL 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % otra	30.6.2004 ([f])
20	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (MUCL 39203) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 2 000 AXC ([22])/g Vedelal kujul: 500 AXC/g	Broilerkanad	–	100 AXC	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 100 AXC 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu või rukist	30.6.2004 ([f])
21	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (MUCL 39203) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 1 500 AXC ([22])/g Vedelal kujul: 200 AXC/g	Broilerkanad	–	25 AXC	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 25–100 AXC 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu	30.6.2004 ([f])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
22	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (CNCM MA 6-10 W) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 70 000 BGN ([23])/g Vedelal kujul: 14 000 BGN/ml	Broilerkanad	–	1 050 BGN	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 3) 2 800 BGN.	30.6.2004 ([f])
23	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (CNCM MA 6-10 W) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 70 000 IFP ([24])/g Vedelal kujul: 7 000 IFP/ml	Broilerkanad	–	1 050 IFP	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 400 IFP 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 56 % nisu	30.6.2004 ([f])
			Broilerkalkunid	–	700 IFP	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 1 400 IFP 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	28.2.2005 ([q])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Munakanad	–	840 IFP	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 840 IFP 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	28.2.2005 (q)
24	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Aspergillus niger*'ist (CBS 1-1517) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: 28 000 QXU ([25])/g 140 000 QGU ([26])/g	Broilerkanad	–	420 QXU 2 100 QGU	1 120 QXU 5 600 QGU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 560 QXU 2 800 QGU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise pärit-olu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu ja 30 % otra	30.6.2004 (f)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
25	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Aspergillus niger*'ist (NRRL 25541) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 11 000 U [27]/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 600 U [28]/g	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 138 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 200 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 138 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 200 U 3. Kasutamiseks mittetärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid), segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % otra või 30 % nisu ja 30 % maisi	30.6.2004 [f]
			Munakanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 138 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 200 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 138 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 200 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % otra või 30 % nisu ja 30 % maisi	30.6.2004 [f]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
26	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Trichoderma reesei*'ist (CBS 526.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul:350 000 BU ([29])/g Vedelal kujul: 50 000 BU/g	Broilerkanad	–	23 000 BU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 23 000–50 000 BU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 20 % otra või 30 % rukist	30.6.2004 ([l])
			Põrsad	4 kuud	26 000 BU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 26 000–35 000 BU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % otra või nisu	30.6.2004 ([l])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
27	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Trichoderma reesei*'st (CBS 529.94) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis ja *Trichoderma reesei*'st (CBS 526.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 200 000 BXU ([30])/g 200 000 BU ([31])/g Vedelal kujul: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Broilerkanad	–	2 500 BXU 2 500 BU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 10 000 BXU 10 000 BU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu või 30 % rukist	30.6.2004 ([l])
			Põrsad	2 kuud	7 500 BXU 7 500 BU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 7 500–15 000 BXU 7 500–15 000 BU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise pärit-olu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu	28.2.2005 ([q])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
28	3-fütaas EC 3.1.3.8	*Trichoderma reesei*'st (CBS 528.94) toodetud 3-fütaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 5 000 PPU [32]/g Vedelal kujul: 1 000 PPU/g	Põrsad	4 kuud	250 PPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–750 PPU 3. Kasutamiseks fütaasiderikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % teravilju (mais, oder, kaer, nisu), tapiokki, õliseemneid ja kaunvilju	30.6.2004 [l]
			Nuumsead	–	500 PPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–750 PPU 3. Kasutamiseks fütaasiderikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % teravilju (mais, oder, kaer, nisu), tapiokki, õliseemneid ja kaunvilju	30.6.2004 [l]
			Broilerkanad	–	500 PPU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–750 PPU 3. Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,22 % fütiiniga seotud fosforit	28.2.2005 [q]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
29	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Geosmithia emersonii*'ist (IMI SD 133) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 5 500 U [33]/g	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 250 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 250 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % otra	30.6.2004 [g]
30	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Penicillium funiculosum*'ist (IMI SD 101) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Pulbrina: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 2 000 U [34]/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 400 U [35]/g Vedelal kujul: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 500 U/ml Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 350 U/ml	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % otra või 60 % nisu	30.6.2004 [g]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Broilerkalkunid	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu	28.2.2005 (q)
			Munakanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % otra või 30 % nisu	28.2.2005 (q)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Nuumsead	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % otra või 60 % nisu	28.2.2005 (q)
31	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (CBS 614.94) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: 300 EU (36)/g Vedelal kujul: 1 000 EU/g	Broilerkanad	–	600 EU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 600 EU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % nisu	30.6.2004 (g)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Munakanad	–	300 EU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 600 EU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % nisu	30.6.2004 (g)
32	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 200 U (18)/ml	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % otra	30.6.2004 (h)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
		Trichoderma longibrachiatum'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 200 U ([18])/ml	Põrsad	4 kuud	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 400 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 400 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 55 % otra	30.6.2004 ([h])
			Nuumsead	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 500 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 500 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 70 % otra	30.6.2004 ([h])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
33	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Pulbrina: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 000 U [37]/g Vedelal kujul: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 5 000 U/ml	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 500 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 3. 500–2 500 U	30.6.2004 [h]
			Munakanad	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 000 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 000 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 35 % nisu	30.6.2004 [h]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
		Trichoderma longibrachiatum'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Pulbrina: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 4 000 U ([37])/g Vedelal kujul: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 10 000 U/ml	Põrsad	4 kuud	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 5 000 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 5 000 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 45 % nisu	30.6.2004 ([h])
		Trichoderma longibrachiatum'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Pulbrina: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 4 000 U ([37])/g Vedelal kujul: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 8 000 U/ml	Nuumsead	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 4 000 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 3) 4 000 U	30.6.2004 ([h])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
34	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1	*Aspergillus niger*'ist (NRRL 25541) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi ning *Aspergillus oryzae*'st (ATCC 66222) toodetud alfa-amülaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 275 U ([38])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U ([39])/g Alfa-amülaas: 3 000 U ([39])/g	Põrsad	4 kuud	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 165 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 240 U Alfa-amülaas 1 860 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 165 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 240 U alfa-amülaas: 1 860 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mittetärklise päritolu polüsahhariiderikkaid (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) teravilju sisaldavas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 45 % otra ja 10 % nisu või 10 % maisi	26.7.2004 (i)
35	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 80 U ([18])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 180 U ([37])/g	Munakanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 80 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 180 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 80 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 180 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiino-ksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % otra	26.7.2004 (i)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
36	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja *Trichoderma longibrachiatum*'ist (IMI SD 135) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 300 U ([18]) g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U ([37])/g	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 300 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 300 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	26.7.2004 ([i])
			Munakanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 300 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 300 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 35 % otra	26.7.2004 ([i])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
37	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Subtilisiin EC 3.4.21.62	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus subtilis*'est (ATCC 2107) toodetud subtilisiini valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 500 U ([37])/g Subtilisiin: 800 U ([41])/g	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 500 U Subtilisiin: 160 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 500–2 500 U, subtilisiin: 160–800 U 3. Kasutamiseks segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 65 % nisu	26.7.2004 ([i])
			Kalkunid	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 825 U Subtilisiin: 265 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 825–2 500 U, subtilisiin: 265–800 U 3. Kasutamiseks segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 45 % nisu	26.7.2004 ([i])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
38	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Subtilisiin EC 3.4.21.62	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus subtilis*'est (ATCC 2107) toodetud subtilisiini valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,4-beeta-ksülanaas 5 000 U ([37])/g Subtilisiin: 500 U ([41])/g	Põrsad	4 kuud	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 5 000 U Subtilisiin: 500 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 5 000 U Subtilisiin: 500 U 3. Kasutamiseks segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 45 % nisu	26.7.2004 (i)
39	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas 400 U ([18])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U ([37])/g	Nuumsead	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 400 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 400 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 65 % otra	26.7.2004 (i)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
40	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Subtilisiin EC 3.4.21.62	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus subtilis*'est (ATCC 2107) toodetud subtilisiini valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U ([18])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U ([37])/g Subtilisiin: 800 U ([41])/g	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 30 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 90 U Subtilisiin: 240 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 30–100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 90–300 U subtilisiin: 240–800 U 3. Kasutamiseks segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % otra	26.7.2004 ([i])
41	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Subtilisiin EC 3.4.21.62	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus subtilis*'est (ATCC 2107) toodetud subtilisiini valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U ([18])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 500 U ([37])/g Subtilisiin: 800 U ([41])/g	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 25 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 625 U Subtilisiin: 200 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 25–100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 625–2 500 U, subtilisiin: 200–800 U 3. Kasutamiseks segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu ja 10 % otra	26.7.2004 ([i])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Munakanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 500 U Subtilisiin: 800 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 500 U subtilisiin: 800 U 3. Kasutamiseks segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % nisu ja 25 % otra	26.7.2004 (i)
42	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (IMI SD 135) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Tahkel kujul: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 4 000 U [37]/g Lubatud valmistise omadused: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1,99 % Nisu: 97,7 % Kaltsiumpropionaat: 0,3 % Letsitiin: 0,01 %	Põrsad	4 kuud	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 4 000 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 4 000 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % nisu	26.7.2004 (i)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Nuumsead	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 4 000 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 4 000 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % nisu	17.7.2004 [m]
43	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (IMI SD 135) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 3 975 U [37]/g Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 125 U [18]/g Alfa-amülaas: 1 000 U [42]/g	Põrsad	4 kuud	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 3 975 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 125 U Alfa-amülaas 1 000 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 3 975 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 125 U alfa-amülaas: 1 000 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mitte-tärklise päritolu polüsahhariiderikkaid (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) teravilju sisaldavas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu ja 20 % otra ja 20 % rukist	6.1.2004 [k]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
44	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 250 U ([18])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U ([37])/g Alfa-amülaas: 1 000 U ([42])/g	Põrsad	4 kuud	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 250 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U Alfa-amülaas 1 000 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 250 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U alfa-amülaas: 1 000 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mittetärklise päritolu polüsahhariiderikkaid (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) teravilju sisaldavas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % otra	6.1.2004 ([k])
45	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (IMI SD 135) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 250 U ([18])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U ([37])/g Alfa-amülaas: 1 000 U ([42])/g	Põrsad	4 kuud	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 250 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U Alfa-amülaas 1 000 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 250 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U alfa-amülaas: 1 000 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mittetärklise päritolu polüsahhariiderikkaid (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) teravilju sisaldavas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 35 % otra	6.1.2004 ([k])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
46	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Polügalakturonaas EC 3.2.1.15	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (IMI SD 135) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud polügalakturonaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 400 U ([18])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U ([37])/g Polügalakturonaas: 50 U ([37])/g	Nuumsead	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 400 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U Polügalakturonaas: 50 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 400 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 400 U polügalakturonaas: 50 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mittetärklise päritolu polüsahhariiderikkaid (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) teravilju sisaldavas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	6.1.2004 ([k])
47	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Polügalakturonaas EC 3.2.1.15	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (IMI SD 135) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi ja *Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud polügalakturonaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U ([18])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 4 000 U ([37])/g Alfa-amülaas: 1 000 U ([42])/g Polügalakturonaas: 25 U ([43])/g	Põrsad	4 kuud	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 4 000 U Alfa-amülaas 1 000 U Polügalakturonaas: 25 U	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 4 000 U alfa-amülaas: 1 000 U polügalakturonaas: 25 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mittetärklise päritolu polüsahhariiderikaid (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) teravilju sisaldavas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 20 % otra ja 35 % nisu	6.1.2004 ([k])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
48	Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Bacillus amyloliquefaciens*'isest (CBS 9553) toodetud alfa-amülaasi ja endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Kaetud: Alfa-amülaas: 200 KNU ([44])/g Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 350 FBG ([5])/g Vedelal kujul: Alfa-amülaas: 130 KNU/ml Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 225 FBG/ml	Broilerkanad	–	10 KNU 17 FBG	40 KNU 70 FBG	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 20 KNU 35 FBG 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	1.4.2004 ([1])
			Broilerkalkunid	–	40 KNU 70 FBG	80 KNU 140 FBG	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 40 KNU 70 FBG 3. Kasutamiseks mitte-tärklise pärit-olu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	1.4.2004 ([1])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
49	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Batsillolüsiin EC 3.4.24.28 Polügalakturonaas: EC 3.2.1.15	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (IMI SD 135) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9554) toodetud batsillolüsiini ja *Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud polügalakturonaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U [18]/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 500 U [37]/g Alfa-amülaas 500 U [42]/g Batsillolüsiin: 800 U [43]/g Polügalakturonaas: 50 U[43]/g	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 500 U Alfa-amülaas: 500 U Batsillolüsiin: 800 U Polügalakturonaas: 50 U	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 500 U alfa-amülaas: 500 U batsillolüsiin: 800 U polügalakturonaas: 50 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu	17.7.2004 [m]
			Munakanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 500 U Alfa-amülaas: 500 U Batsillolüsiin: 800 U Polügalakturonaas: 50 U	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 500 U alfa-amülaas: 500 U batsillolüsiin: 800 U polügalakturonaas: 50 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu	17.7.2004 [m]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
50	6-fütaas EC 3.1.3.26	*Aspergillus oryzae*'st (DSM 11857) toodetud 6-fütaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Kaetud: 2 500 FYT ([43])/g Vedelal kujul: 5 000 FYT/g	Broilerkanad	–	250 FYT	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 FYT 3. Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit	17.7.2004 ([m])
			Munakanad	–	250 FYT	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 FYT 3. Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit	17.7.2004 ([m])
			Broilerkalkunid	–	250 FYT	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 FYT 3. Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit	17.7.2004 ([m])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Põrsad	2 kuud	500 FYT	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 FYT 3. Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit	17.7.2004 (m)
			Nuumsead	–	500 FYT	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 500–1 000 FYT 3. Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit	17.7.2004 (m)
51	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Bacillus subtilis*'est (LMG-S 15136) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: 100 IU (45)/g	Broilerkanad	–	10 IU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 10 IU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	17.7.2004 (m)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Põrsad	2 kuud	10 IU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 10 IU 3. Kasutamiseks arabiinoksülaaniderikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % nisu	31.5.2005 (f)
52	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1	*Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (CBS 592.94) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi ja *Bacillus amyloliquefaciens*'i-sest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Vedelal kujul: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 10 000 U (46)/ml Endo-1,4-beeta-glükanaas: 120 000 U (47)/ml Alfa-amülaas: 400 U (48)/ml	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 000 U Endo-1,4-beeta-glükanaas: 12 000 U Alfa-amülaas 40 U	– – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 000–2 000 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 12 000–24 000 U alfa-amülaas: 40–80 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 20 % nisu ja 15 % sorgot ja 5 % maisi	17.7.2004 (f)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
53	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Batsillolüsiin EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (CBS 592.94) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9554) toodetud batsillolüsiini ja *Trichoderma viride*'st (NIBH FERM BP 4842) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glüka-naas: 2 350 U ([46])/g Endo-1,4-beeta-glükanaas: 4 000 U ([47])/g Alfa-amülaas: 400 U ([49])/g Batsillolüsiin: 450 U ([50])/g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 20 000 U ([51])/g	Põrsad	2 kuud	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 2 350 U Endo-1,4-beeta-glükanaas: 4 000 U Alfa-amülaas: 400 U Batsillolüsiin: 450 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas:	– – – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 2 350 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 4 000 U alfa-amülaas: 400 U batsillolüsiin: 450 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 20 000 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 25 % otra ja 20 % maisi	23.11.2004 ([o])
			Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 175 U Endo-1,4-beeta-glükanaas: 2 000 U Alfa-amülaas: 200 U Batsillolüsiin: 225 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas:	– – – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 11 175–2 350 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 2 000–4 000 U alfa-amülaas: 200–400 U batsillolüsiin: 225-450 U endo-1,4-beeta-ksülanaas:	23.11.2004 ([o])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
							3. 10 000–20 000 U	
54	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8	*Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (CBS 592.94) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi ja *Trichoderma viride*'st (NIBH FERM BP 4842) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 10 000 U ([46])/g Endo-1,4-beeta-glükanaas: 120 000 U ([47])/g Alfa-amülaas: 400 U ([49]) g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 210 000 U ([51])/g	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 000 U Endo-1,4-beeta-glükanaas: 12 000 U Alfa-amülaas 40 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas:	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 000–2 000 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 12 000–24 000 U alfa-amülaas: 40–80 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 21 000–42 000 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 45 % nisu	23.11.2004 ([o])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
55	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Batsillolüsiin EC 3.4.24.28	*Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (CBS 592.94) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi ja *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9554) toodetud batsillolüsiini valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 3 000 U ([46])/g Endo-1,4-beeta-glükanaas: 5 000 U ([47])/g Alfa-amülaas: 540 U ([49])/g Batsillolüsiin: 450 U ([50])/g	Põrsad	2 kuud	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 500 U Endo-1,4-beeta-glükanaas: 2 500 U Alfa-amülaas: 270 U Batsillolüsiin: 225 U	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 500–3 000 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 2 500–5 000 U alfa-amülaas: 270–540 U batsillolüsiin: 225–450 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mittetärklise päritolu polüsahhariididerikkas, segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 35 % nisu ja 15 % otra	23.11.2004 ([o])
			Nuumsead	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 500 U Endo-1,4-beeta-glükanaas: 2 500 U Alfa-amülaas: 270 U Batsillolüsiin: 225 U	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 500–3 000 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 2 500–5 000 U alfa-amülaas: 270–540 U batsillolüsiin: 225–450 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mittetärklise päritolu polüsahhariididerikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % otra	23.11.2004 ([o])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
			Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 500 U Endo-1,4-beeta-glükanaas: 2 500 U Alfa-amülaas: 270 U Batsillolüsiin: 225 U	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 500–3 000 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 2 500–5 000 U alfa-amülaas: 270–540 U batsillolüsiin: 225–450 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mittetärklise päritolu polüsahhariididerikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % maisi või 50 % nisu	23.11.2004 (o)
			Munakanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 500 U Endo-1,4-beeta-glükanaas: 2 500 U Alfa-amülaas: 270 U Batsillolüsiin: 225 U	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 1 500–3 000 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 2 500–5 000 U alfa-amülaas: 270–540 U batsillolüsiin: 225–450 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mittetärklise päritolu polüsahhariididerikkas segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % maisi ja 10 % rukist	23.11.2004 (o)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
56	Endo-1,3(4)-beeta- glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Batsillolüsiin EC 3.4.24.28	*Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (CBS 592.94) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi ja *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9554) toodetud batsillolüsiini valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 6 000 U ([46])/g Endo-1,4-beeta-glükanaas: 3 500 U ([47])/g Alfa-amülaas: 1 400 U ([49])/g Batsillolüsiin: 450 U ([50])/g	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 6 000 U Endo-1,4-beeta-glükanaas: 3 500 U Alfa-amülaas: 1 400 U Batsillolüsiin: 450 U	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 6 000 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 3 500 U alfa-amülaas: 1 400 U batsillolüsiin: 450 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra	23.11.2004 ([o])
57	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Batsillolüsiin EC 3.4.24.28	*Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (CBS 592.94) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi ja *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9554) toodetud batsillolüsiini valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 3 000 U ([46])/g Endo-1,4-beeta-glükanaas: 9 000 U ([47])/g Alfa-amülaas: 540 U ([47])</g Batsillolüsiin: 450 U ([50])/g	Broilerkanad	–	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 3 000 U Endo-1,4-beeta-glükanaas: 9 000 U Alfa-amülaas: 540 U Batsillolüsiin: 450 U	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 3 000 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 9 000 U alfa-amülaas: 540 U batsillolüsiin: 450 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mitte-tärklise päritolu polüsahhariiderikkas (peamiselt tselluloos ja hemitselluloos) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 20 % päevalilleseemnejahu ja 10 % sojajahu	23.11.2004 ([o])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
58	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Batsillolüsiin EC 3.4.24.28	*Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (CBS 592.94) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9553) toodetud alfa-amülaasi ja *Bacillus amyloliquefaciens*'isest (DSM 9554) toodetud batsillolüsiini valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 2 350 U ([46])/g Endo-1,4-beeta-glükanaas: 5 000 U ([47])/g Alfa-amülaas: 400 U ([49])/g Batsillolüsiin: 5 000 U ([50])/g	Põrsad	2 kuud	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 2 350 U Endo-1,4-beeta-glükanaas: 5 000 U Alfa-amülaas: 400 U Batsillolüsiin: 5 000 U	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 2 350 U endo-1,4-beeta-glükanaas: 5 000 U alfa-amülaas: 400 U batsillolüsiin: 5 000 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiino-ksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % otra	23.11.2004 ([o])
59	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Subtilisiin EC 3.4.21.62 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Polügalakturonaas EC 3.2.1.15	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'isest(DSM 9553) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja alfa-amülaasi, *Bacillus subtilis*'est (ATCC 2107) toodetud subtilisiini ja *Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) toodetud polügalakturonaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U ([37])/g Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U ([18])/g Subtilisiin: 4 000 U ([41])/g Alfa-amülaas: 400 U ([42])/g Polügalakturonaas: 25 U ([43])/g	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U Subtilisiin: 4 000 U Alfa-amülaas: 400 U Polügalakturonaas: 25 U	– – – –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U subtilisiin: 4 000 U alfa-amülaas: 400 U polügalakturonaas: 25 U 3. Kasutamiseks tärklise ja mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % maisi	28.2.2005 ([q])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta	Aktiivsuse ühikuid täissööda kilogrammi kohta		
60	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 5 000 U ([37]) ml Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 50 U ([18])/ml	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 500 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 5 U	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 500–2 500 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 5–25 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 20 % otra ja 40 % nisu	28.2.2005 ([q])
61	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6	*Trichoderma reesei*'st (CBS 529.94) toodetud endo-1-4-beeta-ksülanaasi ja *Trichoderma reesei*'st (CBS 526.94) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega: Pulbrina: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 17 000 BXU ([30])/g Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 11 000 BU ([29])/g Vedelal kujul: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 22 000 BXU/ml Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 15 000 BU/ml	Broilerkanad	–	Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 17 000 BXU Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 11 000 BU	– –	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 17 000 BXU endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 11 000 BU 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra või 55 % nisu	28.2.2005 ([q])

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					CFU/kg täissöödas	CFU/kg täissöödas		
Mikroorganismid								
1	*Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/ CNCM I-1012	*Bacillus cereus* var. *toyoi* valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^{10} CFU/g söödalisandit	Broilerkanad	–	$0{,}2 \times 10^9$	1×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: monensiinnaatrium, lasolasiidnaatrium, salinomütsiinnaatrium, dekokinaat, robenidiin, narasiin, halofuginoon	1.3.2002 (h)
			Munakanad	–	$0{,}2 \times 10^9$	1×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	1.3.2002 (h)
			Vasikad	6 kuud	$0{,}5 \times 10^9$	1×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	1.3.2002 (h)
			Nuumveised	–	$0{,}2 \times 10^9$	$0{,}2 \times 10^9$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus *Bacillus cereus*var. *toyoi*kogus päevaratsioonis ei tohi ületada $1{,}0 \times 10^9$ CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse $0{,}2 \times 10^9$ CFU	1.3.2002 (h)
			Emased aretus-küülikud	–	$0{,}1 \times 10^9$	5×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikumi: robenidiin	1.3.2002 (h)
			Broilerküülikud	–	$0{,}1 \times 10^9$	5×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: robenidiin, salinomütsiinnaatrium	1.3.2002 (h)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					CFU/kg täis-söödas	CFU/kg täis-söödas		
3	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	*Saccharomyces cerevisiae* valmistis, mis sisaldab vähemalt 5×10^9 CFU/g söödalisandit	Broilerküülikud	–	$2,5 \times 10^9$	5×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikumi: metikloorpindool	30.6.2004 (f)
			Emised	–	5×10^9	$2,5 \times 10^{10}$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 (f)
			Põrsad	4 kuud	5×10^9	1×10^{10}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 (f)
			Lüpsilehmad	–	4×10^8	2×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus *Saccharomyces cerevisiae* kogus päevaratsioonis ei tohi ületada $5,6 \times 10^9$ CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse $8,75 \times 10^9$ CFU	31.5.2005 (r)
5	*Soccharomyces cerevisiae* CBS 493.94	*Saccharomyces cerevisiae* valmistis, mis sisaldab vähemalt: 1×10^8 CFU/g söödalisandit	Vasikad	6 kuud	2×10^8	2×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 (f)
			Nuumveised	–	$1,7 \times 10^8$	$1,7 \times 10^8$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus *Saccharomyces cerevisiae* kogus päevaratsioonis ei tohi ületada $7,5 \times 10^8$ CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse 1×10^8 CFU	30.6.2004 (g)
			Lüpsilehmad	–	5×10^7	$3,5 \times 10^8$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus *Saccharomyces cerevisiae* kogus päevaratsioonis ei tohi ületada $1,2 \times 10^9$ CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse $1,7 \times 10^8$ CFU	31.5.2005 (r)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					CFU/kg täissöödas	CFU/kg täissöödas		
6	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	*Saccharomyces cerevisiae* valmistis, mis sisaldab vähemalt: 2×10^{10} CFU/g söödalisandit	Emised	–	2×10^{9}	1×10^{10}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 (f)
			Põrsad	4 kuud	6×10^{9}	3×10^{10}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 (f)
7	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077	*Saccharomyces cerevisiae* valmistis, mis sisaldab vähemalt: 2×10^{10} CFU/g söödalisandit	Lüpsilehmad	–	$5{,}5 \times 10^{8}$	$2{,}1 \times 10^{9}$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus *Saccharomyces cerevisiae* kogus päevaratsioonis ei tohi ületada $8{,}4 \times 10^{9}$ CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse $1{,}8 \times 10^{9}$ CFU	30.6.2004 (f)
			Nuumveised	–	1×10^{9}	$1{,}5 \times 10^{9}$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus *Saccharomyces cerevisiae* kogus päevaratsioonis ei tohi ületada $4{,}6 \times 10^{9}$ CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse 2×10^{9} CFU	30.6.2004 (f)
8	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (suhtes 1/1)	Kapslita *Enterococcus faecium* 'i (ATCC 53519) ja kapslitena *Enterococcus faecium* 'i (ATCC 55593) segu, mis sisaldab vähemalt: 2×10^{8} CFU/g söödalisandi bakterit (vähemalt 1×10^{8} CFU/g iga söödalisandi bakterit)	Broilerkanad	–	1×10^{8}	1×10^{8}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: amproolium, dekokinaat, halofuginoon, lasalosiidnaatrium, maduramitsiinammoonium, monensiinnaatrium, narasiin, nikarbasiin, narasiin/nikarbisiin, salinomütsiinnaatrium	30.6.2004 (f)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					CFU/kg täissöödas	CFU/kg täissöödas		
9	*Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M	*Pediococcus acidilactici* valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^{10} CFU/g söödalisandit	Broilerkanad	–	1×10^{9}	1×10^{10}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: amproolium, metikloorpindool, dekokinaat, halofuginoon, narasiin, salinomütsiinnaatrium, nikarbasiin, maduramütsiinammoonium, diklasuriil	30.6.2004 (g)
			Põrsad	4 kuud	1×10^{9}	1×10^{9}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 (g)
			Nuumsead	–	1×10^{9}	1×10^{9}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 (g)
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	*Enterococcus faecium* 'i valmistis, mis sisaldab vähemalt: Mikrokapslitena: $1{,}0 \times 10^{10}$ CFU/g söödalisandit $1{,}75 \times 10^{10}$ CFU/g söödalisandit	Broilerkanad	–	$0{,}3 \times 10^{9}$	$2{,}8 \times 10^{9}$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: amproolium, amproolium/etopabaat, diklasuriil, halofuginoon, maduramütsiinammoonium, metikloorpindool, metikloorpindool/metüülbensokaat, monensiinnaatrium, robenidiin, salinomütsiinnaatrium	30.6.2004 (g)
			Nuumsead	–	$0{,}35 \times 10^{9}$	$1{,}5 \times 10^{9}$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 (g)
			Emised	–	$0{,}2 \times 10^{9}$	$1{,}25 \times 10^{9}$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 (g)
			Nuumveised	–	$0{,}25 \times 10^{9}$	$0{,}6 \times 10^{9}$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus *Enterococcus faecium*'i kogus päevaratsioonis ei tohi ületada 1×10^{9} CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse 1×10^{9} CFU	30.6.2004 (g)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					CFU/kg täissöödas	CFU/kg täissöödas		
		Enterococcus faecium'i valmistis, mis sisaldab vähemalt: Mikrokapslitena: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g söödalisandit $1,75 \times 10^{10}$ CFU/g söödalisandit Graanulitena: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g söödalisandit	Põrsad	4 kuud	$0,3 \times 10^{9}$	$1,4 \times 10^{9}$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Granuleerituna kasutatakse ainult piimaasendajates	30.6.2004 (g)
			Vasikad	6 kuud	$0,35 \times 10^{9}$	$6,6 \times 10^{9}$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Granuleerituna kasutatakse ainult piimaasendajates	30.6.2004 (g)
11	*Enterococcus faecium* DSM 5464	*Enterococcus faecium*'i valmistis, mis sisaldab vähemalt: 5×10^{10} CFU/g söödalisandit	Põrsad	4 kuud	$0,5 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 (g)
			Broilerkanad	–	$0,5 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: amproolium, diklasuriil, halofuginoon, monensiinnaatrium, metikloorpindool/metüülbensokaat, nikarbasiin	1.4.2004 (l)
			Vasikad	4 kuud	$0,5 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	1.4.2004 (l)
12	*Lactobacillus farciminis* CNCM MA 67/4R	*Lactobacillus farciminis*'e valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^{9} CFU/g söödalisandit	Põrsad	4 kuud	1×10^{9}	1×10^{10}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 (h)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					CFU/kg täis-söödas	CFU/kg täis-söödas		
13	*Enterococcus faecium* DSM 10663/ NCIMB 10415	*Enterococcus faecium*'i valmistis, mis sisaldab vähemalt: Pulbrina ja graanulitena: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g söödalisandit Kaetud: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g söödalisandit Vedelal kujul: 1×10^{10} CFU/ml söödalisandit	Põrsad	4 kuud	1×10^{9}	1×10^{10}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 [h]
			Vasikad	6 kuud	1×10^{9}	1×10^{10}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	26.7.2004 [l]
			Broilerkanad	–	1×10^{9}	1×10^{10}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: amproolium, amproolium-etopaat, dekokinaat, diklasuriil, halofuginoon, lasolasiidnaatrium, maduramütsiinammoonium, metikloorpindool/metüülbensokaat, monensiinnaatrium, narasiin, nikarbasiin, robenidiin, salinomütsiinnaatrium	26.7.2004 [l]
14	*Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885	*Saccharomyces cerevisiae* valmistis, mis sisaldab vähemalt: Pulbrina, ümmarguste ja ovaalsete graanulitena: 1×10^{9} CFU/g söödalisandit	Põrsad	4 kuud	3×10^{9}	3×10^{9}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	30.6.2004 [h]
			Nuumveised	–	9×10^{9}	9×10^{9}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus *Saccharomyces cerevisiae* kogus päevaratsioonis ei tohi ületada $1,6 \times 10^{10}$ CFU 100 kg kehakaalu kohta. Iga täiendava 100 kg kehakaalu kohta lisatakse $3,2 \times 10^{9}$ CFU	30.6.2004 [h]
15	*Enterococcus faecium* NCIMB 11181	*Enterococcus faecium*'i valmistis, mis sisaldab vähemalt: Pulbrina: 4×10^{11} CFU/g söödalisandit Kaetud: 5×10^{10} CFU/g söödalisandit	Vasikad	6 kuud	5×10^{8}	2×10^{9}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	6.1.2004 [k]
			Põrsad	4 kuud	5×10^{8}	2×10^{9}	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	6.1.2004 [k]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					CFU/kg täissöödas	CFU/kg täissöödas		
16	*Enterococcus faecium* DSM 7134, *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	*Enterococcus faecium*'i ja *Lactobacillus rhamnosus*'e segu, mis sisaldab vähemalt *Enterococcus faecium*'i 7×10^9 CFU/g ja:	Vasikad	6 kuud	1×10^9	6×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	6.1.2004 [k]
			Põrsad	4 kuud	1×10^9	5×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	6.1.2004 [r]
17	*Lactobacillus casei* NCIMB 30096 *Enterococcus faecium* NCIMB 30098	*Lactobacillus casei* ja *Enterococcus faecium*'i segu, mis sisaldab vähemalt: *Lactobacillus casei*'d 2×10^9 CFU/g ja: *Enterococcus faecium*'i 6×10^9CFU/g	Vasikad	6 kuud	*Lactobacillus casei* $0{,}5 \times 10^9$	*Lactobacillus casei* 1×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	1.4.2004 [l]
18	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Enterococcus faecium*'i valmistis, mis sisaldab vähemalt 1×10^{10} CFU/g söödalisandit	Põrsad	4 kuud	1×10^9	1×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	1.4.2004 [l]
			Vasikad	6 kuud	1×10^9	1×10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	1.4.2004 [l]
19	*Streptococcus infantarius* CNCM I-841 *Lacto bacillus plantarum* CNCM I-840	*Streptococcus infantarius*'e ja *Lactobacillus plantarum*'i segu, mis sisaldab vähemalt: *Streptococcus infantarius*'st $0{,}5 \times 10^9$CFU/g ja: *Lactobacillus plantarum*'i 2×10^9CFU/g	Vasikad	6 kuud	*Streptococcus infantarius*: 1×10^9	*Streptococcus infantarius*: 1×10^9 *Lactobacillus plantarum*: $0{,}5 \times 10^9$	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	17.7.2004 [m]

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
					CFU/kg täissöödas	CFU/kg täissöödas		
20	*Bacillus licheniformis* DSM 5749 *Bacillus subtilis* DSM 5750	*Bacillus licheniformis*'e ja *Bacillus subtilis*'e segu, mis sisaldab vähemalt: 3,2 × 10^9 CFU/g söödalisandit (vähemalt 1,6 × 10^9 CFU/g iga bakterit)	Emised	15 päeva enne poegimist ja imetamise ajal	0,96 × 10^9	1,92 × 10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	23.11.2004 (o)
			Nuumsead	–	0,48 × 10^9	1,28 × 10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	23.11.2004 (o)
			Broilerkanad	–	3,2 × 10^9	3,2 × 10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: amproolium/etopabaat, diklasuriil, halofuginoon, metikloorpindool/metüülbensokaat, monensiinnaatrium, nikarbasiin, robenidiin, ja salinomütsiinnaatrium	23.11.2004 (o)
			Broilerkalkunid	–	1,28 × 10^9	3,2 × 10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: amproolium/etopabaat, diklasuriil, halofuginoon, metikloorpindool/metüülbensokaat, monensiinnaatrium, nifursool ja robenidiin	23.11.2004 (o)
			Vasikad	6 kuud	1,28 × 10^9	1,6 × 10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	28.2.2005 (q)
21	*Enterococcus faecium* DSM 3530	*Enterococcus faecium*'i valmistis, mis sisaldab vähemalt: 2,5 × 10^9 CFU/g	Vasikad	6 kuud	1 × 10^9	1 × 10^9	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus	28.2.2005 (q)

Nr (või EÜ nr)	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus mg/kg täis-söödas	Maksimum-sisaldus mg/kg täis-söödas	Muud sätted	Lubamise tähtaeg
Radionukliide siduvad ained								
1. Radioaktiivset tseesiumi (^{137}Cs ja ^{134}Cs) siduvad ained								
1.1	Raud(III)ammooniumheksatsüanoferraat (II)	$NH_4Fe(III)[Fe(II)(CN)_6]$	Mäletsejalised (kodustatud ja looduslikud)	–	50	500	Kasutamisjuhendisse märgitakse: “Raud(III)ammooniumheksatsüanoferraadi (II) kogus päevaratsioonis peab olema vahemikus 10 mg–150 mg 10 kg kehakaalu kohta.”	13.10.2001 [b]
			Vasikad enne mäletsema hakkamist	–	50	500	Kasutamisjuhendisse märgitakse: “Raud(III)ammooniumheksatsüanoferraadi (II) kogus päevaratsioonis peab olema vahemikus 10 mg–150 mg 10 kg kehakaalu kohta.”	13.10.2001 [b]
			Lambatalled enne mäletsema hakkamist	–	50	500	Kasutamisjuhendisse märgitakse: “Raud(III)ammooniumheksatsüanoferraadi (II) kogus päevaratsioonis peab olema vahemikus 10 mg–150 mg 10 kg kehakaalu kohta.”	13.10.2001 [b]
			Kitsetalled enne mäletsema hakkamist	–	50	500	Kasutamisjuhendisse märgitakse: “Raud(III)ammooniumheksatsüanoferraadi (II) kogus päevaratsioonis peab olema vahemikus 10 mg–150 mg 10 kg kehakaalu kohta.”	13.10.2001 [b]
			Sead (kodustatud ja looduslikud)	–	50	500	Kasutamisjuhendisse märgitakse: “Raud(III)ammooniumheksatsüanoferraadi (II) kogus päevaratsioonis peab olema vahemikus 10 mg–150 mg 10 kg kehakaalu kohta.”	13.10.2001 [b]

[a] Esmakordselt lubatud komisjoni direktiiviga 97/72/EÜ (EÜT L 351, 23.12.1997, lk 55).
[b] Esmakordselt lubatud komisjoni direktiiviga 96/66/EÜ (EÜT L 272, 25.10.1996, lk. 32).
[c] Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2316/98 (EÜT L 289, 28.10.1998, lk. 4).
[d] Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 639/1999 (EÜT L 82, 26.3.1999, lk. 6).
[e] Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1245/1999 (EÜT L 150, 17.6.1999, lk. 15).
[f] Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1436/98 (EÜT L 191, 7.7.1998, lk. 15).
[g] Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 866/1999 (EÜT L 108, 27.4.1999, lk. 21).
[h] Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1411/99 (EÜT L 164, 30.6.1999, lk. 56).
[i] Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2374/98 (EÜT L 295, 4.11.1998, lk. 3).

(j) Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1636/1999 (EÜT L 194, 27.7.1999, lk. 17).
(k) Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2690/1999 (EÜT L 326, 18.12.1999, lk. 33).
(l) Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 654/2000 (EÜT L 79, 30.3.2000, lk. 26).
(m) Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1353/2000 (EÜT L 155, 28.6.2000, lk. 15).
(n) Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1887/2000 (EÜT L 227, 7.9.2000, lk. 13).
(o) Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2437/2000 (EÜT L 280, 4.11.2000, lk. 28).
(p) Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2697/2000 (EÜT L 319, 16.12.2000, lk. 1).
(q) Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 418/2001 (EÜT L 62, 2.3.2001, lk. 3).
(r) Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 937/2001 (EÜT L 130, 12.5.2001, lk. 25).
(s) Esmakordselt lubatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1334/2001 (EÜT L 180, 3.7.2001, lk. 18).
(1) Juhul, kui ei ole kehtestatud dioksiinide sisaldust käsitlevatel andmetel põhinevat spetsiifilist maksimumsisaldust, kui see on nõutav, kohaldatakse alates 15. oktoobrist 2000 maksimumsisaldust 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg.
(2) Üks FTU on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati naatriumfütaadist minutis pH taseme 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.
(3) Üks FYT on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati naatriumfütaadist minutis pH taseme 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.
(4) Üks GALU on ensüümi hulk, mis hüdrolüüsib ühe mikromooli p-nitrofenüül-alfa-galaktopüranosiidi minutis pH taseme 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.
(5) Üks FBG on ensüümi hulk, mis vabastab 1 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 30 °C juures.
(6) Üks FXU on ensüümi hulk, mis vabastab 7,8 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) nisu arabiinoksülaani asoühenditest minutis pH taseme 6,0 ja temperatuuri 50 °C juures.
(7) Üks FXU on ensüümi hulk, mis vabastab 3,1 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) nisu arabiinoksülaani asoühenditest minutis pH taseme 6,0 ja temperatuuri 50 °C juures.
(8) Üks FXU on ensüümi hulk, mis vabastab 0,15 mikromooli ksüloosi asuriini ristsidemetega seotud ksülaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures.
(9) Üks BGU on ensüümi hulk, mis vabastab 0,15 mikromooli glükoosi asuriini ristsidemetega seotud beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures.
(10) Üks EXU on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) arabiinoksülaanist minutis pH taseme 3,5 ja temperatuuri 55 °C juures.
(11) Üks RAU on ensüümi hulk, mis muundab ühes minutis pH taseme 6,6 ja temperatuuri 30 °C juures 1 mg lahustuvat tärklist saaduseks, millel on pärast joodiga reageerimist sama neeldumine kui võrdlusvärvusel 620 nm.
(12) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 0,1 mikromooli glükoosi karboksümetüültselluloosist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures.
(13) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 0,1 mikromooli glükoosi odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures.
(14) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 0,1 mikromooli glükoosi kaera/speltanisu ksülaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures.
(15) Üks BGU on ensüümi hulk, mis vabastab 0,278 mikromooli suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 3,5 ja temperatuuri 40 °C juures.
(16) Üks EXU on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) nisuarabiinoksülaanist minutis pH taseme 3,5 ja temperatuuri 55 °C juures.
(17) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli ksüloosi kasepuidu ksülaanist minutis pH taseme 5,3 ja temperatuuri 50 °C juures.
(18) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 30 °C juures.
(19) Üks CU on ensüümi hulk, mis vabastab 0,128 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 4,5 ja temperatuuri 30 °C juures.
(20) Üks EPU on ensüümi hulk, mis vabastab 0,0083 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kaera/speltanisu ksülaanist minutis pH taseme 4,7 ja temperatuuri 30 °C juures.
(21) Üks AGL on ensüümi hulk, mis vabastab 5,55 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 4,6 ja temperatuuri 30 °C juures.
(22) Üks AXC on ensüümi hulk, mis vabastab 17,2 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosi ekvivalendid) kaeraksülaanist minutis pH taseme 4,7 ja temperatuuri 30 °C juures.
(23) Üks BGN on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures.
(24) Üks IFP on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kaera ksülaanist minutis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures.
(25) Üks QXU on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kaera ksülaanist minutis pH taseme 5,1 ja temperatuuri 50 °C juures.
(26) Üks QGU on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures.
(27) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) kaera beeta-glükaanist minutis pH taseme 4,0 ja temperatuuri 30 °C juures.
(28) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kaera ksülaanist minutis pH taseme 4,0 ja temperatuuri 30 °C juures.
(29) Üks BU on ensüümi hulk, mis vabastab 0,06 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra glükaanist minutis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures.
(30) Üks BXU on ensüümi hulk, mis vabastab 0,06 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kasepuu ksülaanist minutis pH taseme 5,3 ja temperatuuri 50 °C juures.
(31) Üks BU on ensüümi hulk, mis vabastab 0,06 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra glükaanist minutis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures.
(32) Üks PPU on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati naatriumfütaadist minutis pH taseme 5 ja temperatuuri 37 °C juures.
(33) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 2,78 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 50 °C juures.
(34) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 5,55 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 50 °C juures.
(35) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 4,00 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosi ekvivalendid) kasepuu ksülaanist minutis pH taseme 5,5 ja temperatuuri 50 °C juures.
(36) Üks EU on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kaera ksülaanist minutis pH taseme 4,5 ja temperatuuri 40 °C juures.
(37) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kaera/speltanisu ksülaanist minutis pH taseme 5,3 ja temperatuuri 50 °C juures.
(38) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) kaera beeta-glükaanist minutis pH taseme 4,0 ja temperatuuri 30 °C juures.
(39) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) kaera ksülaanist minutis pH taseme 4,0 ja temperatuuri 30 °C juures.
(40) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) nisutärklisest minutis pH taseme 4,0 ja temperatuuri 30 °C juures.
(41) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikrogrammi fenoole (türosiini ekvivalendid) kaseiini substraadist minutis pH taseme 7,5 ja temperatuuri 40 °C juures.
(42) Üks U on ensüümi hulk, mis hüdrolüüsib ühe mikromooli glükoosiidsidemeid vees mittelahustavast võrkstruktuuriga tärklisepolümeeri substraadist minutis pH taseme 6,5 ja temperatuuri 37 °C juures.
(43) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli pidurdusaineid (galakturoonhappe ekvivalendid) polü-D-galakturooni substraadist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures.
(44) Üks KNU on ensüümi hulk, mis vabastab 672 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) lahustuvast tärklisest minutis pH taseme 5,6 ja temperatuuri 37 °C juures.

(45) Üks IU on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kasepuidu ksülaanist minutis pH taseme 4,5 ja temperatuuri 30 °C juures.
(46) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 0,0056 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 7,5 ja temperatuuri 30 °C juures.
(47) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 0,0056 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) karboksümetüültselluloosist minutis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures.
(48) Üks U on ensüümi hulk, mis hüdrolüüsib ühe mikromooli glükoosi võrkstruktuuriga tärklisepolümeerist minutis pH taseme 7,5 ja temperatuuri 37 °C juures.
(49) Üks U on ensüümi hulk, mis hüdrolüüsib ühe mikromooli glükoosiidsidemeid vees mittelahustavast võrkstruktuuriga tärklisepolümeeri substraadist minutis pH taseme 7,5 ja temperatuuri 37 °C juures.
(50) Üks U on ensüümi hulk, mis muudab trikloroäädikhappes lahustuvaks ühe mikromooli asokaseiini minutis pH tasemel 7,5 ja temperatuuril 37 °C.
(51) Üks U on ensüümi hulk, mis vabastab 0,0067 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) kasepuidu ksülaanist minutis pH tasemel 5,3 ja temperatuuril 50 °C.