32001R2200

15.11.2001. *EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS* L 299/1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2200/2001

(2001. gada 17. oktobris)

par pagaidu atļaujām izmantot barības piedevas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/46/EK [2], un jo īpaši tās 3., 9.e un 9.i pantu,

tā kā:

(1) Direktīvas 9.e panta 1. punktā un 9.i panta 1. punktā noteikts, ka pagaidu atļaujas jaunai piedevai vai piedevas jaunam lietojumam var piešķirt uz noteiktu laiku.

(2) Direktīvas 4. pantā noteikta šādu atļauju piešķiršanas procedūra.

(3) Daudzām piedevām pašlaik spēkā esošo atļauju derīguma termiņš beidzas 2001. gada 30. septembrī, un ir ieteicams to pagarināt līdz Direktīvā 70/524/EEK noteiktajam maksimālajam termiņam, kas ir līdz pilniem četriem gadiem kopš pagaidu atļaujas sākotnējās izsniegšanas vielām, par kurām pagaidu atļaujas izdotas saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 9.e panta 1. punktu, un līdz pilniem pieciem gadiem vielām, kuras līdz 1998. gada 1. aprīlim iekļautas Direktīvas 70/524/EEK II pielikumā.

(4) Saskaņā ar šo regulu pagaidu atļaujas piešķir uz noteiktu laiku, neierobežojot iespējas tās jebkurā laikā atcelt saskaņā ar Direktīvas 9.m un 11. pantu.

(5) Turklāt atļaujas antibiotiku izmantošanai par barības piedevām pašlaik tiek pārskatītas, ņemot vērā sekas, kādas var būt antibiotiku izmantošanai barības piedevās saistībā ar šo vielu terapeitisko iedarbību uz cilvēku organismu, kā arī faktu, ka Zviedrijas Karaliste savā teritorijā aizliegusi visu antibiotiku lietošanu par barības piedevām, pamatojoties uz direktīvas 11. pantu un Zinātniskās vadības komitejas mikrobu rezistences jautājumos 1999. gada 28. maijā, 2001. gada 10. un 11. maijā pieņemtajiem atzinumiem.

(6) Pagaidu atļauju derīguma termiņa pagarinājums jāuzskata par tīri administratīvu pasākumu, kurā neietilpst attiecīgo piedevu atkārtota izvērtēšana.

(7) Saprotamības un saskaņotības labad uz visām tām barības piedevu pagaidu atļaujām kopā, kuru termiņš nedrīkst pārsniegt četrus vai piecus gadus, attiecina šo regulu.

(8) Ar šo Komisijas regulu aizstāj Komisijas 2000. gada 27. novembra Regulu (EK) Nr. 2697/2000 par pagaidu atļaujām izmantot barības piedevas [3]; tāpēc ir jāatceļ Regula (EK) Nr. 2697/2000.

(9) Tā kā pagaidu atļauju termiņš piedevām beidzies 2001. gada 30. septembrī; tāpēc šī regula ir jāpiemēro no 2001. gada 1. oktobra.

(10) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

[1] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.
[2] OV L 234, 1.9.2001., 55. lpp.
[3] OV L 319, 16.12.2000., 1. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minētās piedevas pagaidām atļauts izmantot saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK, ievērojot šajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2697/2000 atceļ.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.*

To piemēro no 2001. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 17. oktobrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE

PIELIKUMS

Piedevu uzskaitījums, kuras saistītas ar personu, kas ir atbildīga par to laišanu apritē, un kurām ir pagaidu atļauja ne ilgāk par četriem gadiem vai pieciem gadiem attiecībā uz piedevām, kurām piešķirta pagaidu atļauja līdz 1998. gada 1. aprīlim

Piedevas reģistrācijas numurs	Par piedevas laišanu apgrozībā atbildīgās personas nosaukums un reģistrācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
						mg aktīvās vielas/kg kompleksās barības			
Antibiotikas									
33	Eli Lilly and Company Ltd	Avilamicīns 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200) Avilamicīns 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100)	**Piedevas sastāvs:** Avilamicīns: 200 g aktīvās vielas/kg Sojas eļļa vai minerāleļļa: 5-30 g/kg Sojas pupu pākstis, līdz 1 kg Avilamicīns: 100 g aktīvās vielas/kg Sojas eļļa vai minerāleļļa: 5-30 g/kg Sojas pākstis, līdz 1 kg **Aktīvā viela:** Avilamicīns, $C_{57-62}H_{82-90}Cl_{1-2}O_{31-32}$, Avilamicīna A *CAS* Nr.: 69787-79-7; Avilamicīns B *CAS* Nr.: 73240-30-9, Ortosomicīnu grupas oligosaharīdu maisījums, ko iegūst ar *Streptomyces viridochromogenes* (NRRL 2860), granulās Sastāva attiecības: Avilamicīns A:≥ 60 % Avilamicīns B: ≤ 18 % Avilamicīni A + B: ≥ 70 % Citi vienkāršie avilamicīni: ≤ 6 %	Tītari	—	5	10	—	14.12.2002 [a]

Piedevas reģistrācijas numurs	Par piedevas laišanu apgrozībā atbildīgās personas nosaukums un reģistrācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
						mg aktīvās vielas/kg kompleksās barības			
Kokcidiostatiskās vielas un citi zāļu līdzekļi									
26	Intervet International bv	Salinomicīnnātrijs 120 g/kg (Sacox 120 microgranulate)	**Piedevas sastāvs:** Salinomicīnnātrijs: ≥ 120 g/kg Silīcija dioksīds: 10-100 g/kg Kalcija karbonāts: 350-700 g/kg **Aktīvā viela:** Salinomicīnnātrijs, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, *CAS* Nr.: 53003-10-4, poliētera monokarbonskābes nātrija sāls, ko iegūst *Streptomyces albus* (DSM 12217) fermentēšanā Saistītie piemaisījumi: < 42 mg eleofilīna/kg salinomicīnnātrija < 40 g 17-epi-20-dezoksisalinomicīna/kg salinomicīnnātrija	Cāļi dējējvistu audzēšanai	12 nedēļas	30	50	Lietošanas pamācībā jānorāda: "Bīstams zirgu dzimtas dzīvniekiem" "Šī barība satur jonoforu: vienlaicīga lietošana ar dažiem zāļu līdzekļiem (piem., tiamulīnu) var būt kontrindicēta"	13.10.2001 [b]
27	Janssen Animal	Diklazurils 0,5 g/100 g (0,5 % klinakoksa maisījums) Diklazurils 0,2 g/100 g (0,2 % klinakoksa maisījums)	**Piedevas sastāvs:** Diklazurils: 0,5 g/100 g Sojas rupja maluma milti: 99,25 g/100 g Polividons K 30: 0,2 g/100 g Nātrija hidroksīds: 0,0538 g/100 g Diklazurils: 0,2 g/100 g Sojas rupja maluma milti: 39,7 g/100 g Polividons K 30: 0,08 g/100 g	Cāļi dējējvistu audzēšanai	16 nedēļas	1	1	—	14.12.2002 [a]

Piedevas reģistrācijas numurs	Par piedevas laišanu apgrozībā atbildīgās personas nosaukums un reģistrācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
						mg aktīvās vielas/kg kompleksās barības			
			Nātrija hidroksīds: 0,0215 g/100 g Kviešu atsijas: 60 g/100 g **Aktīvā viela:** Diklazurils, $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-hlorfenil [2,6-dihlor-4-(2,3,4,5-tetrahidro-3,5-diokso-l,2,4-triazīn-2-il) fenil]acetonitrils, *CAS* Nr.: 101831-37-2, Saistītie piemaisījumi: Noārdīšanās savienojums (R064318): = 0,2 % Citi saistītie piemaisījumi (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % katrs						
28	Alpharma AS	Alfa-maduramicīnamonijs, 1 g/100 g (Cygro 1 %)	**Piedevas sastāvs:** Alfa-maduramicīnamonijs: 1 g/100 g Benzilspirts 5 g/100 g Kukurūzas vālītes smiltis līdz 100 g **Aktīvā viela:** Alfa-maduramicīnamonijs: $C_{47}H_{83}O_{17}N$, *CAS* Nr.: 84878-61-5, poliētera monokarbonskābes amonija sāls, ko iegūst ar *Actinomadura yumaensis* (*ATCC* 31585) (*NRRL* 12515).	Tītari	16 nedēļas	5	5	Aizliegts izmantot vismaz piecas dienas pirms kaušanas Lietošanas pamācībā jānorāda: “Bīstams zirgu dzimtas dzīvniekiem” “Šī barība satur jonoforu: vienlaicīga lietošana ar dažiem zāļu līdzekļiem (piem., tiamulīnu) var būt kontrindicēta”	13.10.2001 [b]

Piedevas reģistrācijas numurs	Par piedevas laišanu apgrozībā atbildīgās personas nosaukums un reģistrācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
						mg aktīvās vielas/kg kompleksās barības			
			Saistītie piemaisījumi: Beta-maduramicīnamonijs: < 10 %						
Augšanas veicinātāji									
1	Norsk Hydro Ltd	Kālija diformiāts (Formi™ LHS)	**Piedevas sastāvs:** Kālija diformiāts, ciets, 98 g/100 g, Silikāts 1,5 g/100 g, Ūdens 0,5 g/100 g **Aktīvā viela:** Kālija diformiāts, ciets, $KH(COOH)_2$ *CAS* Nr.: 20642-05-1	Sivēni	2 mēneši	6 000	6 000	—	30.6.2005 (s)
				Nobarojamās cūkas	—	6 000	6 000	—	30.6.2005 (s)

Pārējo piedevu uzskaitījums, kurām ir pagaidu atļauja ne ilgāk par četriem gadiem vai pieciem gadiem attiecībā uz piedevām, kurām piešķirta pagaidu atļauja līdz 1998. gada 1. aprīlim

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg aktīvās vielas/kg kompleksās barības			
Krāsvielas, iekļaujot pigmentus								
1. Karotinoīdi un ksantofilīni								
E 160a	Beta-karotīns	$C_{40}H_{56}$	Kanārijputniņi	—	—	—	—	14.12.2003 (c)
E 161g	Kantaksantīns	$C_{40}H_{52}O_2$	Lolojumputni un dekoratīvie putni	—	—	—	—	14.12.2003 (c)
12	Ar astaksantīnu bagāts *Phaffia rhodozyma* (ATCC 74219)	Nedzīva rauga *Phaffia rhodozyma* (ATCC 74219) koncentrēta biomasa, kas satur vismaz 4,0 g astaksantīna uz kilogramu piedevas un ne vairāk kā 2 000 mg/kg etoksihīna	Lasis	—	—	100	Maksimālo saturu izsaka astaksantīna veidā Atļauts lietot tikai no sešu mēnešu vecuma Piedevas maisījums ar kantaksantīnu ir atļauts, ja kopējā astaksantīna un kantaksantīna koncentrācija nepārsniedz 100 mg/kg kompleksās barības Jānorāda etoksihīna saturs	14.12.2003 (c)
			Forele	—	—	100	Maksimālo saturu izsaka astaksantīna veidā Atļauts lietot tikai no sešu mēnešu vecuma Piedevas maisījums ar kantaksantīnu ir atļauts, ja kopējā astaksantīna un kantaksantīna koncentrācija nepārsniedz 100 mg/kg kompleksās barības Jānorāda etoksihīna saturs	14.12.2003 (c)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg aktīvās vielas/kg kompleksās barības			
2. Citas krāsvielas								
E 102	Tartrazīns	$C_{16}H_9O_9S_2Na_3$	Dekoratīvie graudēdāji putni	—	—	150	—	30.9.2004 (P)
			Sīkie grauzēji	—	—	150	—	30.9.2004 (P)
E 110	Saulrieta dzeltenā FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Dekoratīvie graudēdāji putni	—	—	150	—	30.9.2004 (P)
			Sīkie grauzēji	—	—	150	—	30.9.2004 (P)
E 131	Patentzilā V	m-hidroksitetraetildiamino trifenilkarbinolanhidrīda disulfoskābes kalcija sāls	Dekoratīvie graudēdāji putni	—	—	150	—	30.9.2004 (P)
			Sīkie grauzēji	—	—	150	—	30.9.2004 (P)
E 141	Hlorofila - vara komplekss	—	Dekoratīvie graudēdāji putni	—	—	150	—	30.9.2004 (P)
			Sīkie grauzēji	—	—	150	—	30.9.2004 (P)

Nr. (vai EK Nr.)	Elements	Piedeva	Ķīmiskā formula	Maksimālais elementa saturs mg/kg kompleksās barības	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
				Mikroelementi		
E4	Varš (Cu)	Vara lizīna sulfāts	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2.SO_4$	Nobarojamās cūkas: – dalībvalstīs, kurās cūku populācijas vidējais blīvums ir vienāds vai liekāks par 175 cūkām uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes: – līdz 16 nedēļām: 175 (kopā) – dalībvalstīs, kurās cūku populācijas vidējais blīvums ir mazāks par 175 cūkām uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes: – līdz 16 nedēļām: 175 (kopā)	Kompleksajā barībā vara daudzums vara lizīna sulfāta veidā nedrīkst būt lielāks par 50 mg/kg	31.3.2004 (d)

Nr. (vai EK Nr.)	Elements	Piedeva	Ķīmiskā formula	Maksimālais elementa saturs mg/kg kompleksās barības	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
				Nobarojamās cūkas: – dalībvalstīs, kurās cūku populācijas vidējais blīvums ir vienāds vai lielāks par 175 cūkām uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes: – no 17. nedēļas līdz kaušanai: 35 (kopā) – dalībvalstīs, kurās cūku populācijas vidējais blīvums ir mazāks par 175 cūkām uz 100 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes: – no 17. nedēļas līdz sešiem mēnešiem: 100 (kopā) – no sešiem mēnešiem līdz kaušanai: 35 (kopā) Vaislas cūkas: 35 (kopā) Citas dzīvnieku sugas vai kategorijas, izņemot teļus, līdz tie sāk atgremot, un aitas: 35 (kopā)	Kompleksajā barībā vara daudzums vara lizīna sulfāta veidā nedrīkst būt lielāks par 25 mg/kg	31.3.2004 [d]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
Saistvielas, pretsalipes vielas un koagulanti								
3	Vulkāniskas izcelsmes klinoptilolīts	Vulkāniskas izcelsmes kalcija alumosilikāta hidrāts, kas satur vismaz 85 % klinoptilolīta un ne vairāk kā 5 % laukšpata, vizlas un mālu un nesatur šķiedras un kvarcu. Maksimālais svina saturs: 80 mg/kg	Cūkas	—	—	20 000	Visa barība	21.4.2004 [e]
			Truši	—	—	20 000	Visa barība	21.4.2004 [e]
			Mājputni	—	—	20 000	Visa barība	21.4.2004 [e]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
4	Nogulumizcelsmes klinoptilolīts	Nogulumizcelsmes kalcija alumosilikāta hidrāts, kas satur vismaz 80 % klinoptilolīta un ne vairāk kā 20 % mālu minerālu, bet nesatur šķiedras un kvarcu Maksimālais dioksīnu saturs [1]	Nobarojamās cūkas	—	—	20 000	Visa barība	26.9.2004 (n)
			Gaļas cāļi	—	—	20 000	Visa barība	26.9.2004 (n)
			Nobarojamie tītari	—	—	20 000	Visa barība	26.9.2004 (n)
			Govis	—	—	20 000	Visa barība	26.9.2004 (n)
			Lasis	—	—	20 000	Visa barība	26.9.2004 (n)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
		Fermenti						
1	3-fitāze EC 3.1.3.8	Ar*Aspergillus niger*(CBS 114.94) iegūts 3-fitāzes preparāts, kam – attiecībā uz cietiem un šķidriem preparātiem – fitāzes aktivitāte nav mazāka par 5 000 FTU (l)/g	Tītari	–	125 FTU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 200-800 FTU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur ne mazāk kā 0,3 % fitāta, piemēram, 20 % kviešu	14.12.2003 (c)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
2	3- fitāze EC 3.1.3.8	Ar *Aspergillus oryzae*(DSM 10289) iegūts 3-fitāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pārklātā veidā: 2 500 FYT ([2])/g; šķidrā veidā: 5 000 FYT/g	Sivēni	4 mēneši	250 FYT	1 000 FYT	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500 FYT 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar fitātiem, piemēram, kas satur vairāk par 40 % graudaugu (kukurūzas, miežu, auzu, kviešu, rudzu, tritikāles) eļļas augu sēklu un pākšaugu	30.6.2004 ([f])
			Nobarojamās cūkas	–	400 FYT	1 000 FYT	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500 FYT 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar fitātiem, piemēram, kas satur vairāk par 40 % graudaugu (kukurūzu, miežus, auzas, kviešus, rudzus, tritikāli), eļļas augu sēklu un pākšaugu	30.6.2004 ([f])
			Gaļas cāļi	–	200 FYT	1 000 FYT	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500 FYT 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar fitātiem, piemēram, kas satur vairāk par 40 % graudaugu (kukurūzu, miežus, auzas, kviešus, rudzus, tritikāli), eļļas augu sēklu un pākšaugu	30.6.2004 ([f])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Dējējvistas	–	500 FYT	1 000 FYT	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 750 FYT 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar fitātiem, piemēram, kas satur vairāk par 40 % graudaugu (kukurūzas, miežu, auzu, kviešu, rudzu, tritikāles) eļļas augu sēklu un pākšaugu	30.6.2004 ([g])
3	Alfa-galaktozidāze EC 3.2.1.22	Ar *Aspergillus oryzae* (DSM 10286) iegūts preparāts alfa-galaktozidāzes ar minimālo aktivitāti: šķidrā veidā: 1 000 GALU ([3])/g	Gaļas cāļi	–	300 GALU	1 000 GALU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 450 GALU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar oligosaharīdiem, piemēram, kas satur vairāk par 25 % sojas rupja maluma miltu, kokvilnas sēklu raušu, sējas zirņu	30.6.2004 ([f])
4	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūts preparāts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes ar minimālo aktivitāti: pārklātā veidā: 5O FBG ([4])/g; šķidrā veidā: 120 FBG/ml	Sivēni	4 mēneši	25 FBG	40 FBG	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 25 FBG 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % kukurūzas vai miežu	30.6.2004 ([f])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Gaļas cāļi	–	10 FBG	100 FBG	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 20 FBG 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 60 % kukurūzas	1.4.2004 (f)
5	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Aspergillus oryzae*(DSM 10287) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pārklātā veidā: 1 000 FXU (5)/g; šķidrā veidā: 650 FXU/ml	Gaļas cāļi	–	80 FXU	200 FXU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 150 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % kviešu	30.6.2004 (f)
			Nobarojamie tītari	–	225 FXU	600 FXU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 225-600 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % kviešu	30.6.2004 (f)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Sivēni	4 mēneši	200 FXU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 200 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % kviešu	30.6.2004 ([1])
6	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4	Ar *Humicola insolens* (DSM 10 442) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,4-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pārklātā veidā: 800 FXU ([6])/g 75 FBG ([4])/g; mikrogranulās: 800 FXU/g 75 FBG/g;	Gaļas cāļi	–	200 FXU 19 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 400 FXU 38 FBG 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % miežu un/vai auzu, kviešu	30.6.2004 ([1])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Sivēni	4 mēneši	240 FXU	1 000 FXU 94 FBG	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 400 FXU 38 FBG 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % miežu un/vai auzu, kviešu	30.6.2004 ([f])
			Nobarojamās cūkas	–	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas ilgumu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 400 FXU 38 FBG 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % miežu un/vai auzu, kviešu	30.6.2004 ([h])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
7	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4	Ar *Aspergillus niger* (DSM 600.94) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,4-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pārklātā veidā: 36 000 FXU (7)/g 15 000 BGU (8)/g; šķidrā veidā:	Gaļas cāļi	–	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 3 600-6 000 FXU 1 500-2 500 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 35 % miežu un 20 % kviešu	1.4.2004 (1)
			Sivēni	4 mēneši	6 000 FXU 2 500 BGU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 6000 FXU 2 500 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un 30 % miežu	1.4.2004 (1)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Nobarojamie tītari	–	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 6 000-12 000 FXU 2 500-5 000 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	1.4.2004 (1)
			Dējējvistas	–	12 000 FXU 5 000 BGU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 20 % kviešu, 10 % miežu un 20 % saulespuķu	1.4.2004 (1)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
		Ar *Aspergillus niger* (DSM 600.94) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,4-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 36 000 FXU (7)/g	Gaļas cāļi	–	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FX 5 000 BGU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 3 600-6 000 FXU 1 500-2 500 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 35 % miežu un 20 % kviešu	30.9.2004 (P)
			Sivēni	4 mēneši	6 000 FXU 2 500 BGU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 6 000 FXU 2 500 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un 30 % miežu	30.9.2004 (P)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Nobarojamie tītari	–	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 6 000-12 000 FXU 2 500-5 000 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	30.9.2004 (P)
			Dējējvistas	–	12 000 FXU 5 000 BGU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 20 % kviešu, 10 % miežu un 20 % saulespuķu	30.9.2004 (P)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
8	Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Aspergillus niger* (CBS 600.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pārklātā veidā: 10 000 BGU [8]/g 4 000 FXU [7]/g šķidrā veidā:	Gaļas cāļi	–	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 3 000-10 000 BGU 1200-4000 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 60 % miežu	1.4.2004 [1]
			Sivēni	4 mēneši	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 3 000-5 000 BGU 1 200-2 000 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % miežu	1.4.2004 [1]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Dējējvistas	–	5 000 BGU 2 000 FXU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 60 % miežu	1.4.2004 (l)
		Ar *Aspergillus niger* (CBS 600.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 20 000 BGU (8)/g	Gaļas cāļi	–	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 3 000-10 000 BGU 1 200-4 000 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk 60 % miežu	30.9.2004 (p)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Sivēni	4 mēneši	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 3 000-5 000 BGU 1 200-2 000 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % miežu	30.9.2004 (P)
			Dējējvistas	–	5 000 BGU 2 000 FXU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 60 % miežu	30.9.2004 (P)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
9	Endo-1,4-betak-silanāze EC 3.2.1.8	Ar *Aspergillus niger*(CBS 270.95) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 28 000 EXU ([9])/g; šķidrā veidā: 14 000 EXU/ml	Gaļas cāļi	–	1 400 EXU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1400 EXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % kviešu	30.6.2004 ([f])
			Dējējvistas	–	2 400 EXU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 2 400-7 400 EXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un 30 % rudzu	1.4.2004 ([l])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Nobarojamie tītari	–	2 400 EXU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 2400-5600 EXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un 30 % rudzu	1.4.2004 ([l])
10	Alfa-amilāze EC 3.2.1.1	Ar *Bacillus amyloliquefaciens* (CBS 360.94) iegūts alfa-amilāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 45 000 RAU ([10])/g; šķidrā veidā: 20 000 RAU/ml	Sivēni	4 mēneši	1 800 RAU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1800 RAU 3. Izmantošanai tikai barības maisījumā, kas paredzēts šķidrās barības sistēmām un kas satur ar cieti bagātas barības vielas (piemēram, kas satur vairāk par 35 % kviešu)	30.6.2004 ([f])
			Nobarojamās cūkas	–	1 800 RAU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1800 RAU 3. Izmantošanai tikai barības maisījumā, kas paredzēts šķidrās barības sistēmām un kas satur ar cieti bagātas barības vielas (piemēram, kas satur vairāk par 35 % kviešu)	30.6.2004 ([f])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Sivēnmātes	–	1 800 RAU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 800 RAU 3. Izmantošanai tikai barības maisījumā, kas paredzēts šķidrās barības sistēmām un kas satur ar cieti bagātas barības vielas (piemēram, kas satur vairāk par 35 % kviešu)	30.6.2004 ([f])
11	Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: šķidrā veidā: Endo- 1,4-beta- glikanāze: 8000 U ([11])/ml Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 18 000 U ([12])/ml Endo-1,4-beta-ksilanāze: 26 000 U ([13])/ml	Gaļas cāļi	–	Endo-1(4)-beta-glikanāze: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1300 U	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-glikanāze: 400-1600 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900-3600 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 1300-5200 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu vai miežu un vairāk par 10 % rudzu	30.6.2004 ([f])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
		Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: granulu veidā: Endo-1,4-beta-glikanāze 8000 U ([11])/g Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 18 000 U ([12])/g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 26 000 U ([13])/g	Gaļas cāļi	–	Endo-1,4-beta-glikanāze: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1300 U	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-glikanāze: 400-1600 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900-3600 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 1300-5200 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu vai miežu un vairāk par 10 % rudzu	31.5.2005 ([f])
		Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: šķidrā un granulu veidā: Endo-1,4-beta-glikanāze: 8000 U ([11])/ml vai g Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 18 000 U ([12])/ml vai g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 26 000 U ([13])/ml vai g	Nobarojamie tītari	–	Endo-1,4-beta-glikanāze: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 300 U	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-glikanāze: 400-800 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900-1800 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 300-2 600 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	31.5.2005 ([f])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
12	Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma viride*(FERM BP-4447) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,4-beta-glikanāze: 8000 U [11]/g Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 18 000 U [12]/g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 26 000 U [13]/g	Gaļas cāļi	–	Endo-1,4-beta-glikanāze: 200 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 450 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 650 U	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-glikanāze: 800-1 200 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 800-2 700 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 600-3 900 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 20 % kviešu un 20 % miežu, un/vai 25 % rudzu	30.6.2004 [f]
			Dējējvistas	–	Endo-1,4-beta-glikanāze: 640 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1440 U Endo-1,4-beta-ksilanāze:	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-glikanāze: 640-1 280 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 440-2 880 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 2080-4160 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 20 % kviešu un 20 % miežu, un/vai 25 % rudzu	30.6.2004 [f]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Nobarojamie tītari	–	Endo-1,4-beta-glikanāze 800 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 800 U	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-glikanāze: 800-1 200 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 800-2 700 U endo-1,4-betaksilanāze: 2 600-3 900 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 20 % kviešu un 20 % miežu	30.6.2004 ([f])
13	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pulverveidā: 8 000 BGU ([14])/g 11 000 EXU ([15])/g; granulu veidā: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g;	Gaļas cāļi	–	100 BGU 130 EXU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 100 BGU 130 EXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un 30 % miežu, vai 20 % rudzu	30.6.2004 ([f])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Dējējvistas	–	600 BGU 800 EXU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 600 BGU 800 EXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu un vairāk par 30 % miežu	1.4.2004 (1)
			Tītari nobarošanai	–	600 BGU 800 EXU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 600 BGU 800 EXU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un vairāk par 30 % rudzu	1.4.2004 (1)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
14	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Aspergillus niger*(CBS 520.94) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 600 U ([16])/g; šķidrā veidā: Endo-1,4-beta-ksilanāze:	Gaļas cāļi	–	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 300-600 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % kviešu	30.6.2004 ([f])
15	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Trichoderma viride* (CBS 517.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 650 U ([17])/g; šķidrā veidā: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze:	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 325 U	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 325-650 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu	30.6.2004 ([f])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
16	Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 142) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: šķidrā veidā: 2 000 CU [18]/ml	Gaļas cāļi	–	250 CU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 CU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	30.6.2004 [f]
			Dējējvistas	–	250 CU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 CU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	30.6.2004 [f]
			Sivēni	4 mēneši	250 CU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 CU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	30.6.2004 [f]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Nobarojamās cūkas	–	250 CU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 CU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	30.6.2004 ([f])
		Ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 142) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 2 000 CU ([18])/g	Gaļas cāļi	–	250 CU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 CU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	17.7.2004 ([m])
			Dējējvistas	–	250 CU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 CU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	17.7.2004 ([m])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Sivēni	4 mēneši	250 CU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 CU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	17.7.2004 ([m])
			Nobarojamās cūkas	–	250 CU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 CU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	17.7.2004 ([m])
17	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: šķidrā veidā: 6 000 EPU ([19])/ml	Gaļas cāļi	–	750 EPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 500-3 000 EPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	30.6.2004 ([l])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Dējējvistas	–	750 EPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 500-3 000 EPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	30.6.2004 (f)
			Sivēni	4 mēneši	750 EPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 500-3 000 EPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	30.6.2004 (f)
			Nobarojamās cūkas	–	750 EPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 500-3 000 EPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	30.6.2004 (f)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
		Ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 6 000 EPU [19]/g	Gaļas cāļi	–	750 EPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 500-3 000 EPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	17.7.2004 [m]
			Dējējvistas	–	750 EPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 500-3 000 EPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	17.7.2004 [m]
			Sivēni	4 mēneši	750 EPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 500-3 000 EPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	17.7.2004 [m]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Nobarojamās cūkas	–	750 EPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 500-3 000 EPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	17.7.2004 ([m])
			Nobarojamie tītari	–	750 EPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 500-3 000 EPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 35 % kviešu	17.7.2004 ([m])
18	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Aspergillus niger* (MUCL 39199) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 200 2000 AGL ([20])/g; šķidrā veidā:	Gaļas cāļi	–	100AGL	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 100 AGL 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu un 20 % kviešu	30.6.2004 ([f])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
19	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Aspergillus niger* (MUCL 39199) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 1500 AGL ([20])/g; šķidrā veidā: 200 AGL/g	Gaļas cāļi	–	25AGL	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 25-100 AGL 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu	30.6.2004 ([f])
20	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 39203) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 2000 AXC ([21])/g; šķidrā veidā: 500 AXC/ml	Gaļas cāļi	–	100AXC	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 100 AXC 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu vai rudzu	30.6.2004 ([f])
21	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 39203) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 1500 AXC ([21])/g; šķidrā veidā: 200 AXC/g	Gaļas cāļi	–	25 AXC	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 25-100 AXC 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % kviešu	30.6.2004 ([f])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
22	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 70 000 BGN ([22])/g; šķidrā veidā: 14 000 BGN/ml	Gaļas cāļi	–	1 050 BGN	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 2 800 BGN 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu	30.6.2004 ([f])
23	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 70 000 IFP ([23])/g; šķidrā veidā: 7000 IFP/ml	Gaļas cāļi	–	1 050 IFP	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1400 IFP 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 56 % kviešu	30.6.2004 ([f])
			Nobarojamie tītari	–	700 IFP	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 1 400 IFP 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	28.2.2005 ([q])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Dējējvistas	–	840 IFP	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 840 IFP 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	28.2.2005 (q)
24	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Aspergillus niger* (CNCM 1-1517) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: 28 000 QXU (24)/g 140 000 QGU (25)/g	Gaļas cāļi	–	420 QXU 2 100 QGU	1 120 QXU 5 600 QGU	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 560 QXU 2 800 QGU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un 30 % miežu	30.6.2004 (t)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
25	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Aspergillus niger* (NRRL 25541) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1100 U [26]/g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1600 U [27]/g	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 138 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 200 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 138 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 200 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu vai 30 % kviešu un 30 % kukurūzas	30.6.2004 [f]
			Dējējvistas	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 138 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 200 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāte pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 138 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 200 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu vai 30 % kviešu un 30 % kukurūzas	30.6.2004 [f]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
26	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Trichoderma reesei* (CBS 526.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 350 000 BU [28]/g; šķidrā veidā: 50 000 BU/g	Gaļas cāļi	–	23 000 BU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāte pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 23 000-50 000 BU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 20 % miežu vai 30 % rudzu	30.6.2004 [f]
			Sivēni	4 mēneši	26 000 BU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 26 000-35 000 BU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 60 % miežu vai kviešu	30.6.2004 [f]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
27	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Trichoderma reesei* (CBS 526.94) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 200 000 BXU ([29])/g 200 000 BU ([30])/g; šķidrā veidā: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Gaļas cāļi	–	2 500 BXU 2 500 BU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 10 000 BXU 10 000 BU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu vai 30 % rudzu	30.6.2004 ([f])
			Sivēni	2 mēneši	7 500 BXU 7 500 BU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 7 500-15 000 BXU 7 500-15 000 BU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % kviešu	28.2.2005 ([q])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
28	3-fitāze EC 3.1.3.8	No *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) iegūts 3-fitāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 5 000 PPU ([31])/g; šķidrā veidā: 1 000 PPU/g	Sivēni	4 mēneši	250 PPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-750 PPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar fitātiem, piemēram, kas satur vairāk par 50 % graudaugu (kukurūzas, miežu, kviešu), tapioku, eļļas augu sēklu un pākšaugu	30.6.2004 ([f])
			Nobarojamās cūkas	–	500 PPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-750 PPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar fitātiem, piemēram, kas satur vairāk par 50 % graudaugu (kukurūzas, miežu, kviešu), tapioku, eļļas augu sēklu un pākšaugu	30.6.2004 ([i])
			Gaļas cāļi	–	500 PPU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-750 PPU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,22 % fosfora fitīna savienojumu	28.2.2005 ([q])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
29	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Geosmithia emersonii* (IMI SD 133) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 5 500 U ([32])/g	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 250 U	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 250 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu	30.6.2004 ([g])
30	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Penidllium funiculosum* (IMI SD 101) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pulverveidā: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2000 U ([33])/g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 400 U ([34])/g; šķidrā veidā: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 U/ml Endo-1,4-beta-ksilanāze: 350 U/ml	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu vai 60 % kviešu	30.6.2004 ([g])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Nobarojamie tītari	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U Endo-1,4-betaksilanāze: 70 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % kviešu	28.2.2005 (q)
			Dējējvistas	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 60 % miežu vai 30 % kviešu	28.2.2005 (s)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Nobarojamās cūkas	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U Endo-1,4-betaksilanāze: 70 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu vai 60 % kviešu	28.2.2005 (q)
31	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 614.94) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: 300 EU ([35])/g;	Gaļas cāļi	–	600 EU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 600 EU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 60 % kviešu	30.6.2004 (g)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Dējējvistas	–	300 EU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 600 EU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 60 % kviešu	30.6.2004 (g)
32	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze:	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % miežu	30.6.2004 (h)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
		Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze:	Sivēni	4 mēneši	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 400 U	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 400 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 55 % miežu	30.6.2004 [h]
			Nobarojamās cūkas	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 U	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 70 % miežu	30.6.2004 [h]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
33	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pulverveidā: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 2000 U ([36])/g; šķidrā veidā: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 5 000 U/ml	Gaļas cāļi	–	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 500 U	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 3. 500-2 500 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 55 % kviešu vai 60 % rudzu	30.6.2004 ([h])
			Dējējvistas	–	Endo-1,4-beta-ksilanāze:	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 35 % kviešu	30.6.2004 ([h])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
		Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pulverveidā: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 4000 U ([36])/g; šķidrā veidā: Endo-1,4-beta-ksilanāze:	Sivēni	4 mēneši	Endo-1,4-beta-ksilanāze:	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 5 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 45 % kviešu	30.6.2004 ([h])
		Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pulverveidā: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 4 000 U ([36])/g; šķidrā veidā: Endo-1,4-beta-ksilanāze:	Nobarojamās cūkas	–	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 4 000 U	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 4 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagā ts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 35 % kviešu	30.6.2004 ([h])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
34	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1	Ar *Aspergillus niger* (NRRL 25541) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts un ar*Aspergillus oryzae* (ATCC 66222) iegūts alfa-amilāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 275 U ([37])/g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U ([38])/g	Sivēni	4 mēneši	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 165 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 240 U Alfa-amilāze:	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 165 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 240 U alfa-amilāze: 1860 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur graudaugus un kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 45 % miežu un 10 % kviešu vai 10 % kukurūzas	26.7.2004 (i)
35	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 80 U ([17])/g	Dējējvistas	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 80 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 180 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 80 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 180 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 60 % miežu	26.7.2004 (i)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
36	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 300 U ([17])/g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U ([36])/g	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 300 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 300 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	26.7.2004 (i)
			Dējējvistas	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 300 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 300 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 35 % miežu	26.7.2004 (i)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
37	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Subtilizīns EC 3.4.21.62	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) iegūts subtilizīna preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 2500 U ([36])/g	Gaļas cāļi	–	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 500 U Subtilizīns: 160 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 500-2 500 U subtilizīns: 160-800 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, piemēram, kas satur vairāk par 65 % kviešu	26.7.2004 (i)
			Tītari	–	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 825 U Subtilizīns: 265 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 825-2 500 U subtilizīns: 265-800 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, piemēram, kas satur vairāk par 45 % kviešu	26.7.2004 (i)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
38	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Subtilizīns EC 3.4.21.62	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) iegūts subtilizīna preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 5 000 U ([36])/g	Sivēni	4 mēneši	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 5 000 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 5 000 U subtilizīns: 500 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	26.7.2004 ([i])
39	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 400 U ([17])/g	Nobarojamās cūkas	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 400 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 400 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 65 % miežu	26.7.2004 ([i])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
40	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Subtilizīns EC 3.4.21.62	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) iegūts subtilizīna preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U [17]/g Endo-1,4-beta-ksilanāze:	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 30 Endo-1, 4-beta-ksilanāze: 90 U Subtilizīns: 240 U	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 30-100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 90-300 U subtilizīns: 240-800 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, piemēram, kas satur vairāk par 60 % miežu	26.7.2004 (i)
41	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Subtilizīns EC 3.4.21.62	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) iegūts subtilizīna preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U [17]/g Endo-1,4-beta-ksilanāze:	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 25 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 625 U Subtilizīns: 200 U	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 25-100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 625-2 500 U subtilizīns: 240-800 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un 10 % miežu	26.7.2004 (i)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Dējējvistas	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 2500 U	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 2 500 U subtilizīns: 800 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, piemēram, kas satur vairāk par 50 % kviešu un 25 % miežu	26.7.2004 (i)
42	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: cietā veidā: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 4 000 U [36]/g; atļautā preparāta sastāvs: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1,99 % Kvieši: 97,7 % Kalcija propionāts: 0,3 % Lecitīns: 0,01 %	Sivēni	4 mēneši	Endo-1,4-beta-ksilanāze:	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 4 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 60 % kviešu	26.7.2004 (i)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Nobarojamās cūkas	–	Endo-1,4-beta-ksilanāze:	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 4 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 60 % kviešu	17.7.2004 [m]
43	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 3 975 U [36]/g Endo-1,3(4)-beta-glikanāze:	Sivēni	4 mēneši	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 3 975 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze:	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 3 975 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 125 U alfa-amilāze: 1 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu un 20 % miežu, un 20 % rudzu	6.1.2004 [k]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
44	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 250 U [17]/g Endo-1,4-beta-ksilanāze:	Sivēni	4 mēneši	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 250 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U Alfa-amilāze:	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 250 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U alfa-amilāze: 1 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur graudaugus un kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu	6.1.2004 [k]
45	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 250 U [17]/g Endo-1,4-beta-ksilanāze:	Sivēni	4 mēneši	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 250 U Endo-1,4-beta-ksilanāze:	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 250 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U alfa-amilāze: 1000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur graudaugus un kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 35 % miežu	6.1.2004 [k]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
46	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Poligalakturonāze EC 3.2.1.15	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes, un ar *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) iegūts poligalakturonāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 400 U [17]/g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U [36]/g Poligalakturonāze: 50 U [36]/g	Nobarojamās cūkas	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 400 U Endo-1,4-beta-ksilanāze:	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 400 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U poligalakturonāze: 50 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur graudaugus un kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	6.1.2004 [k]
47	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Poligalakturonāze EC 3.2.1.15	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes un ar *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) iegūts poligalakturonāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U [17]/g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 4000 U [36]/g	Sivēni	4 mēneši	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 4 000 U	– – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 4 000 U alfa-amilāze: 1 000 U poligalakturonāze: 25 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur graudaugus un kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 20 % miežu un 35 % kviešu	6.1.2004 [k]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
48	Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes un endo-l,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pārklātā veidā: Alfa-amilāze: 200 KNU ([43])/g Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 350 FBG ([4])/g; šķidrā veidā: Alfa-amilāze: 130 KNU/ml Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 225 FBG/ml	Gaļas cāļi	–	10 KNU 17 FBG	40 KNU 70 FBG	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 20 KNU 35 FBG 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	1.4.2004 ([l])
			Nobarojamie tītari	–	40 KNU 70 FBG	80 KNU 140 FBG	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 40 KNU 70 FBG 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	1.4.2004 ([l])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
49	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Bacilolizīns EC 3.4.24.28 Poligalakturonāze EC 3.2.1.15	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9554) iegūts bacilolizīna un ar *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) iegūts poligalakturonāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U ([17])/g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 500 U ([36])/g Alfa-amilāze: 500 U ([41])/g	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 500 U Alfa-amilāze: 500 U Bacilolizīns: 800 U Poligalakturonāze: 50 U	– – – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 500 U alfa-amilāze: 500 U bacilolizīns: 800 U poligalakturonāze: 50 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu	17.7.2004 ([m])
			Dējējvistas	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 500 U Alfa-amilāze: 500 U	– – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 500 U alfa-amilāze: 500 U bacilolizīns: 800 U poligalakturonāze: 50 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu	17.7.2004 ([m])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
50	6-fitāze EC 3.1.3.26	Ar *Aspergillus oryzae*(DSM 11857) iegūts 6-fitāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pārklātā veidā: 2500 FYT [2]/g; šķidrā veidā: 5000 FYT/g	Gaļas cāļi	–	250 FYT	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 FYT 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu	17.7.2004 [m]
			Dējējvistas	–	250 FYT	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 FYT 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu	17.7.2004 [m]
			Nobarojamie tītari	–	250 FYT	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 FYT 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu	17.7.2004 [m]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Sivēni	2 mēneši	500 FYT	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 FYT 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu	17.7.2004 (m)
			Nobarojamās cūkas	–	500 FYT	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500-1 000 FYT 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur vairāk par 0,25 % fosfora fitīna savienojumu	17.7.2004 (m)
51	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Bacillus subtilis*(LMG-S 15136) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: 100 IU (44)/g	Gaļas cāļi	–	10 IU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 10 IU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	17.7.2004 (m)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Sivēni	2 mēneši	10 IU	–	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 10 IU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar arabinoksilāniem, piemēram, kas satur vairāk par 40 % kviešu	31.5.2005 (r)
52	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1	Ar *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes un ar *Bacillus amyloliauefaciens* (DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: šķidrā veidā: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 10 000 U (45)/ml Endo-1,4-beta-glikanāze: 120 000 U (46)/ml	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 000 U Endo-1,4-beta-glikanāze:12 000 U	– – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 000-2 000 U endo-1,4-beta-glikanāze: 12 000-24 000 U alfa-amilāze: 40-80 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharījdiem, kuri nav cietes polisaharījdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 20 % kviešu un 15 % sorgo, un 5 % kukurūzas	17.7.2004 (m)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
53	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Bacilolizīns EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9554) iegūts bacilolizīna un ar *Trichoderma viride*(NIBH PERM BP 4842) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 350 U ([45])/g Endo-1,4-beta-glikanāze: 4 000 U ([46])/g Alfa-amilāze: 400 U ([48])/g	Sivēni	2 mēneši	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 350 U Endo-1,4-beta-glikanāze: 4 000 U Alfa-amilāze:	– – – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 350 U endo-1,4-beta-glikanāze: 4 000 U alfa-amilāze: 400 U bacilolizīns: 450 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 20 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 25 % miežu un 20 % kukurūzas	23.11.2004 ([o])
			Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 175 U Endo-1,4-beta-glikanāze: 2 000 U Alfa-amilāze:	– – – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 175-2 350 U endo-1,4-beta-glikanāze: 2 000-4 000 U alfa-amilāze: 200-400 U bacilolizīns: 225-450 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 10 000-20 000 U	23.11.2004 ([o])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
							3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 45 % kviešu	
54	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	Ar *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes un ar *Trichoderma viride*(NIBH PERM BP 4842) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 10 000 U ([45])/g Endo-1,4-beta-glikanāze: 120 000 U ([46])/g	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 000 U Endo-1,4-beta-glikanāze 12 000 U	– – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 000-2 000 U endo-1,4-beta-glikanāze: 12 000-24 000 U 3) alfa-amilāze: 40-80 U	23.11.2004 ([o])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
55	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Bacilolizīns EC 3.4.24.28	Ar *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) iegūts endo-1-beta-glikanāzes, ar *Bacillus amyloliauefaciens* (DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes un ar *Bacillus amyloliauefaciens* (DSM 9554) iegūts bacilolizīna preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 3 000 U ([45])/g Endo-1,4-beta-glikanāze: 5 000 U ([46])/g	Sivēni	2 mēneši	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 500 U Endo-1,4-beta-glikanāze: 2 500 U	– – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 500-3 000 U endo-1,4-beta-glikanāze: 2 500-5 000 U alfa-amilāze: 270-540 U bacilolizīns: 225-450 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar cieti un polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi, piemēram, kas satur vairāk par 35 % kviešu un 15 % miežu	23.11.2004 ([o])
			Nobarojamās cūkas	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 500 U Endo-1,4-beta-glikanāze: 2 500 U	– – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 500-3 000 U endo-1,4-beta-glikanāze: 2 500-5 000 U alfa-amilāze: 270-540 U bacilolizīns: 225-450 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 20 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar cieti un polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi, piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu	23.11.2004 ([o])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
			Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 500 U Endo-1,4-beta-glikanāze 2 500 U	– – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 500-3 000 U endo-1,4-beta-glikanāze: 2 500-5 000 U alfa-amilāze: 270-540 U bacilolizīns: 225-450 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar cieti un polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi, piemēram, kas satur vairāk par 50 % kukurūzas vai 50 % kviešu	23.11.2004 (o)
			Dējējvistas	–	Endo-1,3(4)-beta glikanāze: 1 500 U Endo-1,4-beta-glikanāze: 2 500 U	– – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500-3 000 U endo-1,4-beta-glikanāze: 2 500-5 000 U alfa-amilāze: 270-540 U bacilolizīns: 225-450 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar cieti un polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	23. 11. 2004 (o)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
56	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Bacilolizīns EC 3.4.24.28	Ar *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes un ar *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9554) iegūts bacilolizīna preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 6 000 U ([45])/g Endo-1,4-beta-glikanāze: 3 500 U ([46])/g	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 6 000 U Endo-1,4-beta-glikanāze: 3 500 U	– – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 6 000 U endo-1,4-beta-glikanāze: 3 500 U alfa-amilāze: 1 400 U bacilolizīns: 450 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu	23.11.2004 ([o])
57	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Bacilolizīns EC 3.4.24.28	Ar *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes un ar *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9554) iegūts bacilolizīna preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 3000 U ([45])/g Endo-1,4-beta-glikanāze: 9 000 U ([46])/g	Gaļas cāļi	–	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 6 000 U Endo-1,4-beta-glikanāze: 3 500 U	– – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 3 000 U endo-1,4-beta-glikanāze: 9 000 U alfa-amilāze: 540 U bacilolizīns: 450 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar cieti un polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt celulozi un hemicelulozi), piemēram, kas satur vairāk par 20 % saulespuķu rupja maluma miltu un 10 % sojas rupja maluma miltu	23.11.2004 ([o])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
58	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Bacilolizīns EC 3.4.24.28	Ar *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, ar *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) iegūts endo-1,4-beta-glikanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) iegūts alfa-amilāzes un ar *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) iegūts bacilolizīna preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 350 U ([45])/g Endo-1,4-beta-glikanāze: 5 000 U ([46])/g	Sivēni	2 mēneši	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 350 U Endo-1,4-beta-glikanāze: 5 000 U	– – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāte pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 350 U endo-1,4-beta-glikanāze: 5 000 U alfa-amilāze: 400 U bacilolizīns: 5 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % miežu	23.11.2004 ([o])
59	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Subtilizīns EC 3.4.21.62 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Poligalakturonāze EC 3.2.1.15	Ar *Trichodenna longibrachiatum*(ATCC 2105) iegūts endo-l,4-beta-ksilanāzes, ar *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553) iegūts endo-l,3(4)-beta-glikanāzes un alfa-amilāzes, ar *Bacillus subtilis*(ATCC 2107) iegūts subtilizīna, ar*Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94) iegūts poligalakturonāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U ([36])/g Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U ([17])/g Subtilizīns: 4000 U ([40])/g	Gaļas cāļi	–	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U Subtilizīns: 4 000 U	– – – –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 150 U subtilizīns: 4 000 U alfa-amilāze: 400 U poligalakturonāze: 25 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar cieti un polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % kukurūzas	28.2.2005 ([q])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
60	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 5 000 U ([36])/ml	Gaļas cāļi	–	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 500 U Endo-1,3(4)-beta-glikanāze:	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 500-2 500 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 5-25 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 20 % miežu un 40 % kviešu	28.2.2005 ([q])
61	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	Ar *Trichoderma reesei* (CBS 526.94) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Trichoderma reesei*(CBS 526.94) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: pulverveidā: Endo-1,4-beta-ksilanāze: 17 000 BXU ([29])/g Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 11 000 BU ([28])/g; šķidrā veidā:	Gaļas cāļi	–	Endo-1,4-beta-ksilanāze: 17 000 BX Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 11 000 BU	– –	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,4-beta-ksilanāze: 17 000 BXU endo-1,3(4)-beta-glikanāze:11 000 BU 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu vai 55 % kviešu	28.2.2005 ([q])

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					KVV/kg kompleksās barības			
Mikroorganismi								
1	*Bacillus cereus toyoi* NCIMB 40112/ CNCMI-1012	*Bacillus cereus* var. *toyoi* preparāts, kas satur ne vairāk kā 1×10^{10} KVV/g piedevas	Gaļas cāļi	—	$0{,}2 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: monenzīnnātriju, lazalocīdnātriju, salinomicīnnātriju, dekokvinātu, robenidīnu, narazīnu, halofuginonu	1.3.2002 (h)
			Dējējvistas	—	$0{,}2 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	1.3.2002 (h)
			Teļi	6 mēneši	$0{,}5 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	1.3.2002 (h)
			Liellopi nobarošanai	—	$0{,}2 \times 10^{9}$	$0{,}2 \times 10^{9}$	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas *Bacillus cereus*var. *toyoi*daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt $1{,}0 \times 10^{9}$ KVV uz 100 kg ķermeņa svara. Pievienot $0{,}2 \times 10^{9}$ KVV uz katriem papildu 100 kg ķermeņa svara	1.3.2002 (h)
			Vaislas trušu mātītes	—	$0{,}1 \times 10^{9}$	5×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļauto kokcidiostatu: robenidīnu	1.3.2002 (h)
			Truši nobarošanai	—	$0{,}1 \times 10^{9}$	5×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: robenidīnu, salinomicīnnātriju	1.3.2002 (h)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					KVV/kg kompleksās barības			
3	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	*Saccharomyces cerevisiae* preparāts, kas satur ne vairāk kā 5×10^9 KVV/g piedevas	Truši nobarošanai	—	$2,5 \times 10^9$	5×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļauto kokcidiostatu: metiklorpindolu	30.6.2004 (f)
			Sivēnmātes	—	$5 \times l0^9$	$2,5 \times 10^{10}$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 (f)
			Sivēni	4 mēneši	$5 \times l0^9$	1×10^{10}	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 (f)
			Piena govis	—	4×10^8	2×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas *Saccharomyces cerevisiae*daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt $5,6 \times 10^9$ KVV uz 100 kg ķermeņa svara. Pievienot $8,75 \times 10^9$ KVV uz katriem papildu 100 kg ķermeņa svara	31.5.2005 (r)
5	*Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94	*Saccharomyces cerevisiae*preparāts, kas satur ne vairāk kā 1×10^8 KVV/g piedevas	Teļi	6 mēneši	2×10^8	2×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 (f)
			Nobarojamie liellopi	—	$1,7 \times 10^8$	$1,7 \times 10^8$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos nosaka glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas *Saccharomyces cerevisae*daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt $7,5 \times 10^8$ KVV uz 100 kg ķermeņa svara. Pievienot 1×10^8 KVV uz katriem papildu 100 kg ķermeņa svara	30.6.2004 (g)
			Piena govis	—	5×10^7	$3,5 \times 10^8$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas *Saccharomyces cerevisae*daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt $1,2 \times 10^9$ KVV uz 100 kg ķermeņa svara. Pievienot $1,7 \times 10^8$ KVV uz katriem papildu 100 kg ķermeņa svara	31.5.2005 (r)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					KVV/kg kompleksās barības			
6	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM 1-1079	*Saccharomyces cerevisiae*preparāts, kas satur ne vairāk kā 2×10^9 KVV/g piedevas	Sivēnmātes	—	2×10^9	1×10^{10}	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 (f)
			Sivēni	4 mēneši	6×10^9	3×10^{10}	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 (f)
7	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM 1-1077	*Saccharomyces cerevisiae*preparāts, kas satur ne vairāk kā 2×10^{10}KVV/g piedevas	Piena govis	—	$5{,}5 \times 10^8$	$2{,}1 \times 10^9$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas *Saccharomyces cerevisiae*daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt $8{,}4 \times 10^9$ KVV uz 100 kg ķermeņa svara. Pievienot $1{,}8 \times 10^9$ KVV uz katriem papildu 100 kg ķermeņa svara	30.6.2004 (f)
			Nobarojamie liellopi	—	1×10^9	$1{,}5 \times 10^9$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas *Saccharomyces cerevisiae*daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt 4,6 x 10^9 KVV uz 100 kg ķermeņa svara. Pievienot 2×10^9 KVV uz katriem papildu 100 kg ķermeņa svara	30.6.2004 (f)
8	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (attiecībā 1 pret 1)	Iekapsulēts *Enterococcus faecium*(ATCC 53519) un iekapsulēts *Enterococcus faecium*(ATCC 55593) maisījums, kas satur ne vairāk kā 2×10^8 KVV/g piedevas (t.i., attiecībā uz katra veida baktēriju ne vairāk kā 1×10^8 KVV/g)	Gaļas cāļi	—	1×10^8	1×10^8	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāte pēc granulēšanas Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: amproliju, dekokvinātu, halofuginonu, lazalocīdnātriju, maduramicīnamoniju, monenzīnnātriju, narazīnu, nikarbazīnu, narazīnu/nikarbazīnu, salinomicīnnātriju	30.6.2004 (f)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					KVV/kg kompleksās barības			
9	*Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M	*Pediococcus acidilactici* preparāts, kas satur ne vairāk kā 1×10^{10} KVV/g piedevas	Gaļas cāļi	—	1×10^{9}	1×10^{10}	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: amproliju, metiklorpindolu, dekokvinātu, halofuginonu, narazīnu, salinomicīnnātriju, nikarbazīnu, maduramicīnamoniju, diklazurilu	30.6.2004 (g)
			Sivēni	4 mēneši	1×10^{9}	1×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 (g)
			Nobarojamās cūkas	—	1×10^{9}	1×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 (g)
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	*Enterococcus faecium* preparāts, kas satur ne vairāk kā: mikroinkapsulētā formā: $1{,}0 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas $1{,}75 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas	Gaļas cāļi	—	$0{,}3 \times 10^{9}$	$2{,}8 \times 10^{9}$	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: amproliju, amproliju/etopabātu, diklazurilu, halofuginonu, maduramicīnamoniju, metiklorpindolu, metiklorpindolu/metilbenzokvātu, monenzīnnātriju, robenidīnu, salinomicīnnātriju	30.6.2004 (g)
			Nobarojamās cūkas	—	$0{,}35 \times 10^{9}$	$1{,}5 \times 10^{9}$	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 (g)
			Sivēnmātes	—	$0{,}2 \times 10^{9}$	$1{,}25 \times 10^{9}$	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 (g)
			Nobarojamie liellopi	—	$0{,}25 \times 10^{9}$	$0{,}6 \times 10^{9}$	Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. *Enterococcus faecium* daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt 1×10^{9} KVV uz 100 kg ķermeņa svara. Pievienot 1×10^{8} KVV uz katriem papildu 100 kg ķermeņa svara	30.6.2004 (g)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					KVV/kg kompleksās barības			
		Enterococcus faecium mikroinkapsulētā formā: 1,0 × 10 KVV/g piedevas 1,75 × 10 KVV/g piedevas un granulās: 3,5 × 10 KVV/g piedevas	Sivēni	4 mēneši	$0,3 \times 10^9$	$1,4 \times 10^9$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas Granulas izmantot tikai piena aizstājējbarībās	30.6.2004 (g)
			Teļi	6 mēneši	$0,35 \times 10^9$	$6,6 \times 10^9$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas Granulas izmantot tikai piena aizstājējbarībās	30.6.2004 (g)
11	*Enterococcus faecium* DSM 5464	*Enterococcus faecium* preparāts, kas satur ne mazāk kā 5×10^{10} KVV/g piedevas	Sivēni	4 mēneši	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 (g)
			Gaļas cāļi	—	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: amproliju, diklazurilu, halofuginonu, monensīnnātriju, metiklorpindolu/metilbenzokvātu, nikarbazīnu	1.4.2004 (l)
			Teļi	4 mēneši	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	1.4.2004 (l)
12	*Lactobacillus farciminis* CNCM MA 67/4R	*Lactobacillus farciminis* preparāts, kas satur ne vairāk kā 1×10^9 KVV/g piedevas	Sivēni	4 mēneši	1×10^9	1×10^{10}	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 (h)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					KVV/kg kompleksās barības			
13	*Enterococcus faecium* DSM 10663/ NCIMB 10415	*Enterococcus faecium* preparāts, kas satur ne mazāk kā: pulverveidā un granulās: $3,5 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas; pārklātā veidā: $2,0 \times 10^{10}$ KVV/g piedevas; šķidrā veidā: 1×10^{10} KVV/g piedevas	Sivēni	4 mēneši	1×10^{9}	1×10^{10}	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 [h]
			Teļi	6 mēneši	1×10^{9}	1×10^{10}	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	26.7.2004 [i]
			Gaļas cāļi	—	1×10^{9}	1×10^{10}	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: amproliju, amprolijuetopabātu, dekokvinātu, diklazurilu, halofuginonu, lazalocīdnātriju, maduramicīnamoniju, metiklorpindolu/metilbenzokvātu, monenzīnnātriju, narazīnu, nikarbazīnu, robenidīnu, salinomicīnnātriju	26.7.2004 [i]
14	*Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885	*Saccharomyces cerevisiae*preparāts, kas satur ne mazāk kā: pulverveidā, sfēriskās un ovālās granulās: 1×10^{9} KVV/g piedevas	Sivēni	4 mēneši	3×10^{9}	3×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	30.6.2004 [h]
			Nobarojamie liellopi	—	9×10^{9}	9×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas *Saccharomyces cerevisiae*daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt $1,6 \times 10^{10}$ KVV uz 100 kg ķermeņa svara. Pievienot $3,2 \times 10^{9}$ KVV uz katriem papildu 100 kg ķermeņa svara	30.6.2004 [h]
15	*Enterococcus faecium* NCIMB 11181	*Enterococcus faecium* preparāts, kas satur ne mazāk kā: pulverveidā: 4×10^{11} KVV/g piedevas; pārklātā veidā: 5×10^{10} KVV/g piedevas	Teļi	6 mēneši	5×10^{8}	2×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	6.1.2004 [k]
			Sivēni	4 mēneši	5×10^{8}	2×10^{9}	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	6.1.2004 [k]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					KVV/kg kompleksās barības			
16	*Enterococcus faecium* DSM7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	*Enterococcus faecium* 7×10^9 KVV/g piedevas un *Lactobacillus rhamnosus* 3×10^9 KVV/g piedevas	Teļi	6 mēneši	1×10^9	6×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	6.1.2004 [k]
			Sivēni	4 mēneši	1×10^9	5×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	6.1.2004 [k]
17	*Lactobacillus casei* NCIMB 30096 *Enterococcus faecium* NCIMB 30098	*Lactobacillus casei Enterococcus faecium* *Lactobacillus casei* 2×10^9 KVV/g piedevas un *Enterococcus faecium* 6×10^9 KVV/g piedevas	Teļi	6 mēneši	*Lactoba cillus casei* $0,5 \times 10^9$ *Entero-coccus faecium* $1,5 \times 10^9$	*Lactoba cillus casei* 1×10^9 *Entero-coccus faecium* 3×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	1.4.2004 [l]
18	*Enterococcus faecium* CECT 4515	*Saccharomyces cerevisiae* preparāts, kas satur ne mazāk kā 1×10^{10} KVV/g piedevas	Sivēni	4 mēneši	1×10^9	1×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	1.4.2004 [l]
			Teļi	6 mēneši	1×10^9	1×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	1.4.2004 [l]
19	*Streptococcus infantarius* CNCM I-841 *Lacto bacillus plantarum* CNCM I-840	*Streptococcus infantarius*un *Lactoba-cillus plantarum*maisījums,kas satur ne mazāk kā *Streptococcus infantarius* $0,5 \times 10^9$ KVV/g piedevas un *Lactobacillus plantarum*2×10^9 KVV/g piedevas	Teļi	6 mēneši	*Strepto-coccus infanta-rius*: 1×10^9 *Lactoba-cillus plantarum*: $0,5 \times 10^9$	*Streptoco-ccus infanta-rius*: 1×10^9 *Lactoba-cillus plantarum*: $0,5 \times 10^9$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas	17.7.2004 [m]

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					KVV/kg kompleksās barības			
20	*Bacillus licheniformis* DSM 5749 *Bacillus subtilis* DSM 5750 (attiecībā 1 pret 1)	*Bacillus licheniformis* un *Bacillus subtilis* maisījums, kas satur ne vairāk kā $3,2 \times 10^9$ KVV/g piedevas (attiecībā uz katru baktēriju veidu ne vairāk kā $1,6 \times 10^9$ KVV/g)	Sivēnmātes	15 dienas pirms atnešanās un laktācijas periodā	$0,96 \times 10^9$	$1,92 \times 10^9$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	23.11.2004 (o)
			Nobarojamās cūkas	—	$0,48 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	23.11.2004 (o)
			Gaļas cāļi	—	$3,2 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: amproliju/etopabātu, diklazurilu, halofuginonu, metiklorpindolu/metilbenzokvātu, monenzīnnātriju, nikarbazīnu, robenidīnu un salinomicīnnātriju	23.11.2004 (o)
			Tītari nobarošanai	—	$1,28 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: amproliju/etopabātu, diklazurilu, halofuginonu, metiklorpindolu/metilbenzokvātu, monenzīnnātriju, nifursolu un robenidīnu	23.11.2004 (o)
			Teļi	6 mēneši	$1,28 \times 10^9$	$1,6 \times 10^9$	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	28.2.2005 (q)
21	*Enterococcus faecium* DSM 3530	*Enterococcus faecium* preparāts, kas satur ne mazāk kā $2,5 \times 10^9$ KVV/g piedevas	Teļi	6 mēneši	1×10^9	1×10^9	Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas	28.2.2005 (q)

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas perioda beigas
					mg/kg kompleksās barības			
Radionuklīdu saistvielas								
1. Vielas radioaktīvā cēzija izotopu (^{137}Cs un ^{134}Cs) saistīšanai								
1.1	Dzelzs (III) amonija heksacianoferāts (II)	$NH_4Fe(III)[Fe(II)(CN)_6)]$	Atgremotāji (mājdzīvnieki un savvaļas dzīvnieki)	—	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: "Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam barības dienas devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara"	13.10.2001 [b]
			Teļi, pirms tiem sākusi darboties atgremošanas funkcija	—	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: "Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam barības dienas devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara"	13.10.2001 [b]
			Jēri, pirms tiem sākusi darboties atgremošanas funkcija	—	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: "Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam barības dienas devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara"	13.10.2001 [b]
			Kazlēni, pirms tiem sākusi darboties atgremošanas funkcija	—	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: "Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam barības dienas devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara"	13.10.2001 [b]
			Cūkas (mājdzīvnieki un mežacūkas)	—	50	500	Lietošanas pamācībā jānorāda: "Dzelzs (III) amonija heksacianoferāta (II) daudzumam barības dienas devā jābūt no 10 līdz 150 mg uz 10 kg ķermeņa svara"	13.10.2001 [b]

[a] Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Direktīvu 97/72/EK (OV L 351, 23.12.1997., 55. lpp.).
[b] Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Direktīvu 96/66/EK (OV L 272, 25.10.1996., 32. lpp.).
[c] Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2316/98 (OV L 289, 28.10.1998., 4. lpp.).
[d] Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 639/1999 (OV L 82, 26.3.1999., 6. lpp.).
[e] Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1245/1999 (OV L 150, 17.6.1999., 15. lpp.).
[f] Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1436/98 (OV L 191, 7.7.1998., 15. lpp.).
[g] Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 866/1999 (OV L 108, 27.4.1999., 21. lpp.).
[h] Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1411/99 (OV L 164, 30.6.1999., 56. lpp.).
[i] Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2374/98 (OV L 295, 4.11.1998., 3. lpp.).

(j) Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1636/1999 (OV L 194, 27.7.1999., 17. lpp.).
(k) Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2690/1999 (OV L 326, 18.12.1999., 33. lpp.).
(l) Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 654/2000 (OV L 79, 30.3.2000., 26. lpp.).
(m) Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1353/2000 (OV L 155, 28.6.2000., 15. lpp.).
(n) Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1887/2000 (OV L 227, 7.9.2000., 13. lpp.).
(o) Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2437/2000 (OV L 280, 4.11.2000., 28. lpp.).
(p) Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2697/2000 (OV L 319, 16.12.2000., 1. lpp.).
(q) Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 418/2001 (OV L 62, 2.3.2001., 3. lpp.).
(r) Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 937/2001 (OV L 130, 12.5.2001., 25. lpp.).
(s) Pirmoreiz atļauts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1334/2001 (OV L 180, 3.7.2001., 18. lpp.).
(1) Ja ir vajadzīgs, bet nav noteikts īpašs maksimālais līmenis, kura pamatā ir pietiekami dati par dioksīnu klātbūtni, tad no 2000. gada 15. oktobra piemēro maksimālo līmeni 500 pg PVO-PCDD/F-TEQ [koncentrācija, izteikta toksiskuma ekvivalentos]/kg.
(2) 1 FTU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,5 un temperatūra 37 °C, minūtē no nātrija fitāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiska fosfāta.
(3) 1 FYT ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,5 un temperatūra 37 °C, minūtē no nātrija fitāta atbrīvo 1 mikromolu neorganiska fosfāta.
(4) 1 GALU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,5 un temperatūra 37 °C, minūtē hidrolizē 1 mikromolu p-nitrofenil-alfa-galaktopiranosīda.
(5) 1 FBG ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(6) 1 FXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 6,0 un temperatūra 50 °C, minūtē no kviešu azo-arabinoksilāna atbrīvo 7,8 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(7) 1 FXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 6,0 un temperatūra 50 °C, minūtē no kviešu azo-arabinoksilāna atbrīvo 3,1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(8) 1 FXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,0 un temperatūra 40 °C, minūtē no ksilāna, kurš piesaistīts ar azurīnu, atbrīvo 0,15 mikromolus ksilozes.
(9) 1 BGU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,0 un temperatūra 40 °C, minūtē no beta-glikāna, kurš piesaistīts ar azurīnu, atbrīvo 0,15 mikromolus glikozes.
(10) 1 EXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 3,5 un temperatūra 55 °C, minūtē no arabinoksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(11) 1 RAU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 6,6 un temperatūra 30 °C, minūtē pārvērš 1 mg šķīstošās cietes produktā, kuram pie 620 nm pēc reakcijas ar jodu ir tāda pati absorbcija kā standartkrāsai.
(12) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,0 un temperatūra 40 °C, minūtē no karboksimetilcelulozes atbrīvo 0,1 mikromolu glikozes.
(13) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,0 un temperatūra 40 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,1 mikromolu glikozes.
(14) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,0 un temperatūra 40 °C, minūtē no auzu pelavu ksilāna atbrīvo 0,1 mikromolu glikozes.
(15) 1 BGU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 3,5 un temperatūra 40 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,278 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(16) 1 EXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 3,5 un temperatūra 55 °C, minūtē no kviešu arabinoksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(17) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,3 un temperatūra 50 °C, minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 1 mikromolu ksilozes.
(18) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(19) 1 CU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,5 un temperatūra 30 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,128 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(20) 1 EPU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,7 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu pelavu ksilāna atbrīvo 0,0083 mikromolus reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(21) 1 AGL ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,6 un temperatūra 30 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 5,55 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalentus).
(22) 1 AXC ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,7 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu ksilāna atbrīvo 17,2 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalentus).
(23) 1 BGN ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,8 un temperatūra 50 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(24) 1 IFP ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,8 un temperatūra 50 °C, minūtē no auzu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(25) 1 QXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,1 un temperatūra 50 °C, minūtē no auzu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(26) 1 QGU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,8 un temperatūra 50 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(27) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(28) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(29) 1 BU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,8 un temperatūra 50 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,06 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(30) 1 BXU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,3 un temperatūra 50 °C, minūtē no bērza ksilāna izdala 0,06 mikromolus reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(31) 1 BU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,8 un temperatūra 50 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,06 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(32) 1 PPU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5 un temperatūra 37 °C, minūtē no nātrija fitāta izdala 1 mikromolu neorganiskā fosfāta.
(33) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,0 un temperatūra 50 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 2,78 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalentus).
(34) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,0 un temperatūra 50 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 5,55 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalentus).
(35) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,5 un temperatūra 50 °C, minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 4,00 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalentus).
(36) 1 EU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,5 un temperatūra 40 °C, minūtē no auzu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(37) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,3 un temperatūra 50 °C, minūtē no auzu pelavu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(38) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(39) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no auzu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(40) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,0 un temperatūra 30 °C, minūtē no kviešu cietes atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
(41) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 7,5 un temperatūra 40 °C, minūtē no kazeīna substrāta atbrīvo 1 mikrogramu fenola savienojuma (tirozīna ekvivalentus).
(42) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 6,5 un temperatūra 37 °C, minūtē no ūdenī nešķīstoša piesaistīta cietes polimēra substrāta hidrolizē 1 mikromolu glikozīdu savienojumu.
(43) 1 U ir fermanta daudzums, kas tad, ja pH 5,0 un temperatūra 40 °C, minūtē no poli D-galakturonsubstrāta izdala 1 mikromolu reducējošu vielu (galakturonskābes ekvivalentus).
(44) 1 KNU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,6 un temperatūra 37 °C, minūtē no šķīstošās cietes atbrīvo 672 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).

([45]) 1 IU ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,5 un temperatūra 30 °C, minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
([46]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 7,5 un temperatūra 30 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,0056 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
([47]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 4,8 un temeperatūra 50 °C, minūtē no karboksimetilcelulozes atbrīvo 0,0056 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus).
([48]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 7,5 un temperatūra 37 °C, minūtē no ūdenī nešķīstoša piesaistīta cietes polimēra substrāta hidrolizē 1 mikromolu glikozes.
([49]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 7,5 un temperatūra 37 °C, minūtē no ūdenī nešķīstoša piesaistīta cietes polimēra substrāta izdala 1 mikromolu glikozīdu savienojumu.
([50]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 7,5 un temperatūra 37 °C, minūtē izdala 1 mikrogramu trihloretiķsābē šķīstoša azokazeīna.
([51]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH 5,3 un temperatūra 50 °C, minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 0,0067 mikromolus reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).