32001R2200

15.11.2001 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 299/1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2200/2001
z dne 17. oktobra 2001
o začasnih dovoljenjih za dodatke v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/46/ES [2], in zlasti členov 3, 9e in 9i Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člena 9e(1) in 9i(1) Direktive določata, da se začasno dovoljenje za novi dodatek ali novo uporabo dodatka lahko izda za točno določen čas.

(2) Člen 4 Direktive določa postopek za takšno dovoljenje.

(3) Trenutno veljavna začasna dovoljenja za številne dodatke potečejo 30. septembra 2001, in primerno je, da se podaljšajo na najdaljše dovoljeno obdobje po Direktivi 70/524/EGS, ki je za dodatke z začasnim dovoljenem na podlagi člena 9e(1) Direktive 70/524/EGS štiri leta ter za dodatke, ki so se pred 1. aprilom 1998 vključili v Prilogo II k Direktivi 70/524/EGS, pet let po prvem začasnem dovoljenju.

(4) Začasna dovoljenja po tej uredbi se dodelijo za točno določen čas, ne glede na možnost, da jih je mogoče kadar koli preklicati skladno s členoma 9m in 11 Direktive.

(5) Dovoljenja za uporabo antibiotikov kot dodatkov v krmi se trenutno preverjajo glede na skrb v zvezi z možnimi učinki uporabe antibiotikov kot dodatkov v krmi na učinkovitost antibiotikov za terapevtsko uporabo pri ljudeh, skrb zaradi katere je Kraljevina Švedska na svojem ozemlju prepovedala uporabo vseh antibiotikov kot dodatkov v krmi na podlagi člena 11 Direktive, in glede na mnenja, ki jih je 28. maja 1999 ter 10. in 11. maja 2001 sprejel Znanstveni pripravljalni odbor za protimikrobno rezistenco.

(6) Podaljšanje časa veljavnosti začasnih dovoljenj je treba šteti kot zgolj upravni ukrep, ki ne vključuje novega ocenjevanja zadevnih dodatkov.

(7) Zaradi čitljivosti in skladnosti se za vsa začasna dovoljenja za dodatke v krmi, katerih čas veljavnost ne sme preseči štirih ali petih let, pripravi prečiščeno besedilo v tej uredbi.

(8) Ta uredba Komisije nadomešča Uredbo Komisije (ES) št. 2697/2000 z dne 27. novembra 2000 o začasnih dovoljenjih za dodatke v krmi [3]; zato je treba Uredbo (ES) št. 2697/2000 razveljaviti.

(9) Začasna dovoljenja za večino dodatkov potečejo 30. septembra 2001; to uredbo je treba zato uporabljati od 1. oktobra 2001.

(10) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za krmo –

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1.
[2] UL L 234, 1.9.2001, str. 55.
[3] UL L 319, 16.12.2000, str. 1.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodatki iz Priloge k tej uredbi so začasno dovoljeni skladno z Direktivo 70/524/EGS, pod pogoji, določenimi v tej prilogi.

Uredba (ES) št. 2697/2000 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropskih skupnosti*.

Uporablja se od 1. oktobra 2001.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2001

Za Komisijo
David BYRNE
Član Komisije

PRILOGA

Seznam dodatkov, povezanih z osebo, odgovorno za dajanje teh snovi v promet, ter začasno dovoljenih za ne več kot štiri leta ali pet let v primeru dodatkov, za katere je bilo izdano začasno dovoljenje pred 1. aprilom 1998

Registracijska številka dodatka	Ime in registracijska številka odgovorne osebe za dajanje dodatka v promet	Dodatek (trgovsko ime)	Sestava, kemijska formula in opis dodatka	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
						mg aktivne snovi/kg popolne krme mešanice			
Antibiotiki									
33	Eli Lilly and Company Ltd	Avilamicin 200g/kg (Maxus G200, Maxus 200) Avilamicin 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100)	**Sestava dodatka:** Avilamicin: 200 g aktivnosti/kg Sojino olje ali mineralno olje: 5–30 g/kg Sojine luščine: do1 kg Avilamicin: 100 g aktivnosti/kg Sojino olje ali mineralno olje: 5–30 g/kg Sojine luščine: do 1 kg **Aktivna snov:** Avilamicin, C57-62H82-90Cl1-2O31-32, CAS št. avilamicina A: 69787-79-7, CAS št. avilamicina B: 73240-30-9, mešanica oligosaharidov iz skupine orto-somicinov, ki jih proizvaja *Streptomyces viridochromogenes*(NRRL 2860), v obliki granul Sestava faktorja: Avilamicin A: ≥ 60 % Avilamicin B: ≤ 18 % Avilamicina A + B: ≥ 70 % Drugi avilamicini: ≤ 6 %	Purani	–	5	10	–	14.12.2002 [a]

Registracijska številka dodatka	Ime in registracijska številka odgovorne osebe za dajanje dodatka v promet	Dodatek (trgovsko ime)	Sestava, kemijska formula in opis dodatka	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
						mg aktivne snovi/kg popolne krme mešanice			
Kokcidiostatiki in druge zdravilne snovi									
26	Intervet International bv	Natrijev salinomicin 120 g/kg (Sacox 120 v obliki mikrogranul)	**Sestava dodatka:** Natrijev salinomicin: [3] 120 g/kg Silicijev dioksid: 10-100 g/kg Kalcijev karbonat: 350-700 g/kg **Aktivna snov:** Natrijev salinomicin $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, CAS št.: 53003-10-4, natrijeva sol polietra monokarboksilne kisline, produkt fermentacije *Streptomyces albus* (DSM 12217) Nečistoče: Vsebnost elaiofilina: < 42 mg/kg natrijevega salinomicina < 40 g 17-epi-20-dezoksi-salinomicina/kg natrijevega salinomicina	Piščanci rejeni za znesenje jajc	12 tednov	30	50	V navodilu za uporabo mora biti navedeno: „Nevarno za kopitarje“ „Ta krma vsebuje dodatek iz skupine ionoforov; istočasna uporaba z nekaterimi zdravilnimi snovmi (npr. tiamulin) je lahko kontraindicirana“.	13.10.2001 [b]
27	Janssen Animal Health BVBA	Diklazuril 0,5g/100g (Clinacox 0,5 % Premix) Diklazuril 0,2g/100g (Clinacox 0,2 % Premix)	**Sestava dodatka:** Diklazuril: 0,5 g/100 g Sojina moka: 99,25 g/100 g Polividon K 30: 0,2 g/100 g Natrijev hidroksid: 0,0538 g/100 g Diklazuril: 0,2 g/100 g Sojina moka: 39,7 g/100 g Polividon K 30: 0,08 g/100 g	Piščanci rejeni za znesenje jajc	16 tednov	1	1	–	14.12.2002 [a]

Registracijska številka dodatka	Ime in registracijska številka odgovorne osebe za dajanje dodatka v promet	Dodatek (trgovsko ime)	Sestava, kemijska formula in opis dodatka	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
						mg aktivne snovi/kg popolne krme mešanice			
			Natrijev hidroksid: 0,0215 g/100 g Pšenična moka: 60g/100g **Aktivna snov:** Diklazuril, $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-klorofenil [2,6-dikloro-4-(2,3,4,5-tetrahidro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2-il)fenil]acetonitril, CAS št.: 101831-37-2, Nečistoče: Razkrojni produkti(R064318): £ 0,2 % Ostale nečistoče (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): £ 0,5 % posamezno Skupna vsebost nečistoč: £ 1,5 %						
28	Alpharma AS	Alfa amonijev maduramicin 1g/100g (Cygro 1 %)	**Sestava dodatka:** Alfa amonijev maduramicin: 1 g/100 g Benzilni alkohol: 5 g/100 g Zdrob iz koruznih storžev do 100 g **Aktivna snov:** Alfa amonijev maduramicin, $C_{47}H_{83}O_{17}N$ CAS št.: 84878-61-5, amonijeva sol polietra monokarboksilne kisline, produkt *Actinomadura yumaensis*(ATCC 31585) (NRRL 12515)	Purani	16 tednov	5	5	Prepovedana uporaba najmanj 5 dni pred zakolom V navodilu za uporabo mora biti navedeno: „Nevarno za kopitarje“ „Ta krma vsebuje dodatek iz skupine ionoforov; istočasna uporaba nekaterih zdravilnih snovi (npr. tiamulin) je lahko kontraindicirana“	13.10.2001 [b]

Registracijska številka dodatka	Ime in registracijska številka odgovorne osebe za dajanje dodatka v promet	Dodatek (trgovsko ime)	Sestava, kemijska formula in opis dodatka	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
						mg aktivne snovi/kg popolne krme mešanice			
			Nečistoče: Beta amonijev maduramicin: < 10 %						
				Pospeševalci rasti					
1	Norsk Hydro Ltd.	Kalijev diformiat (Formi™ LHS)	**Sestava dodatka:** Kalijev diformiat, trden: 98 g/100 g, Silikat: 1,5 g/100 g, Voda: 0,5 g/100 g **Aktivna snov:** Kalijev diformiat, trden $KH(COOH)_2$ CAS št. 20642-05-1	Prašički	2 meseca	6 000	6 000	–	30.6.2005 [s]
				Prašiči za pitanje	–	6 000	6 000	–	30.6.2005 [s]

Seznam drugih dodatkov, začasno dovoljenih za ne več kot štiri leta ali pet let v primeru dodatkov, za katere se je izdalo začasno dovoljenje pred 1. aprilom 1998

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					mg/kg popolne krme mešanice			
Barvila, vključno s pigmenti								
1. 1. Karotenoidi in ksantofili:								
E 160a	Beta-karoten	$C_{40}H_{56}$	Kanarčki	–	–	–	–	14.12.2003 [c]
E 161g	Kantaksantin	$C_{40}H_{52}O_2$	Hišne in okrasne ptice	–	–	–	–	14.12.2003 [c]
12	*Phaffia rhodozyma*, bogata z astaksantinom (ATTC 74219)	Koncentrirana bio-masa kvasovke *Phaffia rhodozyma* (ATTC 74219), mrtve, ki vsebuje vsaj 4,0 g astaksantina na kg dodatka in najvišjo vsebnostjo etoksikvina 2 000 mg/kg	Losos	–	–	100	Največja vsebnost je izražena kot astaksantin Uporaba je dovoljena le od starosti šestih mesecev Mešanica dodatka s kantaksantinom je dovoljena pod pogojem, da celotna koncentracija astaksantina in kantaksantina v popolni krmni mešanici ne presega 100 mg/kg Deklarirati je treba vsebnost etoksikvina	14.12.2003 [c]
			Postrv	–	–	100	Največja vsebnost je izražena kot astaksantin Uporaba je dovoljena le od starosti šestih mesecev Mešanica dodatka s kantaksantinom je dovoljena pod pogojem, da celotna koncentracija kantaksantina v popolni krmni mešanici ne presega 100 mg/kg Deklarirati je treba vsebnost etoksikvina	14.12.2003 [c]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					mg/kg popolne krme mešanice			
2. 2. Druga barvila								
E 102	Tartrazin	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Okrasne ptice, ki se prehranjujejo z zrnjem	–	–	150	–	30.9.2004 p
			Mali glodalci	–	–	150	–	30.9.2004 p
E110	Sunset Yellow FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Okrasne ptice, ki se prehranjujejo z zrnjem	–	–	150	–	30.9.2004 p
			Mali glodalci	–	–	150	–	30.9.2004 p
E131	Patent blue V	Kalcijeva sol disulfonske kisline m-hidroksi tetra etildiamino tri-fenil-karbinol anhidrida	Okrasne ptice, ki se prehranjujejo z zrnjem	–	–	150	–	30.9.2004 p
			Mali glodalci	–	–	150	–	30.9.2004 p
E141	Klorofil bakrov kompleks	–	Okrasne ptice, ki se prehranjujejo z zrnjem	–	–	150	–	30.9.2004 p
			Mali glodalci	–	–	150	–	30.9.2004 p

Št. (ali ES registracijska številka)	Element	Dodatek	Kemijska formula	Največja vsebnost elementa v mg/kg popolne krmne mešanice	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
			Elementi v sledovih			
E4	Baker-Cu	Bakrov-lizin sulfat	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2SO_4$	Prašiči za pitanje: — v državah članicah, kjer je povprečna gostota populacije prašičev enaka ali večja od 175 prašičev na 100 ha uporabnega kmetijskega zemljišča: — do 16 tednov: 175 (skupno) — v državah članicah, kjer je povprečna gostota populacije prašičev nižja od 175 prašičev na 100 ha uporabnega kmetijskega zemljišča: — do 16 tednov: 175 (skupno)	Ne več kakor 50 mg/kg bakra v popolni krmni mešanici sme izvirati iz bakrovega bakrovega-lizin sulfata	31.3.2004 d

Št. (ali ES registracijska številka)	Element	Dodatek	Kemijska formula	Največja vsebnost elementa v mg/kg popolne krmne mešanice	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
				Prašiči za pitanje: — v državah članicah, kjer je povprečna gostota populacije prašičev enaka ali večja od 175 prašičev na 100 ha uporabnega kmetijskega zemljišča: — od 17. tedna do zakola: 35 (skupno) — v državah članicah, kjer je povprečna gostota populacije prašičev nižja od 175 prašičev na 100 ha uporabnega kmetijskega zemljišča: — od 17. tedna do šestih mesecev: 100 (skupno) — nad šest mesecev do zakola: 35 (skupno) Plemenski prašiči: 35 (skupno) Druge vrste ali kategorije živali, razen telet pred začetkom ruminacije in ovce: 35 (skupno)	Ne več kakor 25 mg/kg bakra v popolni krmni mešanici sme izvirati iz bakrovega-lizin sulfata	31.3.2004 [d]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					mg/kg popolne krme mešanice			
Vezalci, sredstva proti strjevanju in koagulanti								
3	Klinoptilolit vulkanskega izvora	Kalcijev hidrirani alumo-silikat vulkanskega izvora, ki vsebuje najmanj 85 % klinoptilolita in največ 15 % ortoklaza, raznih vrst sljude in gline, brez vlaken in kremenjaka Največja vsebnost svinca: 80 mg/kg	Prašiči	–	–	20 000	Vsa krma	21.4.2004 [e]
			Kunci	–	–	20 000	Vsa krma	21.4.2004[e]
			Perutnina	–	–	20 000	Vsa krma	21.4.2004[e]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					mg/kg popolne krme mešanice			
4	Klinoptilolit usedlinskega izvora	Kalcijev hidrirani alumo-silikat usedlinskega izvora, ki vsebuje najmanj 80 % klinoptilolita in največ 20 % mineralov gline, brez vlaken in kremenjaka Največja vsebnost dioksinov [1]	Prašiči za pitanje	–	–	20 000	Vsa krma	26.9.2004 [n]
			Piščanci za pitanje	–	–	20 000	Vsa krma	26.9.2004 [n]
			Purani za pitanje	–	–	20 000	Vsa krma	26.9.2004 [n]
			Govedo	–	–	20 000	Vsa krma	26.9.2004 [n]
			Losos	–	–	20 000	Vsa krma	26.9.2004 [n]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Encimi					
1	3-fitaza ES 3.1.3.8	Pripravek iz 3-fitaze, ki jo proizvaja *Aspergillus niger* (CBS 114.94) z najmanjšo aktivnostjo fitaze 5 000 FTU [2]/g za pripravke v obliki trdnih in tekočih pripravkov	Purani	–	125 FTU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 200-800 FTU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah z najmanjšo vsebnostjo 0,3 % fitata, npr. 20 % pšenice	14.12.2003 [c]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
2	3-fitaza ES 3.1.3.8	Pripravek iz 3-fitaze, ki jo proizvaja *Aspergillus oryzae*(DSM 10289), z najmanjšo aktivnostjo: Zaščitena oblika - prevlečena: 2 500 FYT [3]/g	Prašički	4 mesece	250 FYT	1 000 FYT	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate s fitati, ki npr. vsebujejo več kakor 40 % žit (koruza, ječmen, oves, pšenica, rž, tritikala), oljnic in zrn stročnic	30.6.2004 [f]
			Prašiči za pitanje	–	400 FYT	1 000 FYT	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate s fitati, ki npr. vsebujejo več kakor 40 % žit (koruza, ječmen, oves, pšenica, rž, tritikala), oljnic in zrn stročnic	30.6.2004 [f]
			Piščanci za pitanje	–	200 FYT	1 000 FYT	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate s fitati, ki npr. vsebujejo več kakor 40 % žit (koruza, ječmen, oves, pšenica, rž, tritikala), oljnic in zrn stročnic	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Kokoši nesnice	–	500 FYT	1 000 FYT	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 750 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s fitati, ki npr. vsebujejo več kakor 40 % žitaric (koruza, ječmen, oves, pšenica, rž, tritikala), oljčnic in zrn stročnic	30.6.2004 [g]
3	Alfa-galaktosidaza ES 3.2.1.22	Pripravek alfa-galaktosidaze, ki jo proizvaja *Aspergillus oryzae*(DSM 10286), z najmanjšo aktivnostjo: Tekoča oblika: 1 000 GALU [4]/g	Piščanci za pitanje	–	300 GALU	1 000 GALU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 450 GALU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z oligosaharidi, ki npr. vsebujejo več kakor 25 % sojinih tropin, bombaževih pogač, graha	30.6.2004 [f]
4	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), z najmanjšo aktivnostjo: Zaščitena oblika – prevlečena: 50 FBG [5]/g Tekoča oblika: 120 FBG/ml	Prašički	4 mesece	25 FBG	40 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 25 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % koruze ali ječmena	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Piščanci za pitanje	–	10 FBG	100 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 20 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 60 % koruze	1.4.2004 [1]
5	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus oryzae*(DSM 10287), z najmanjšo aktivnostjo: Zaščitena oblika - prevlečena: 1 000 FXU [6]/g Tekoča oblika: 650 FXU/ml	Piščanci za pitanje	–	80 FXU	200 FXU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 150 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % pšenice	30.6.2004 [f]
			Purani za pitanje	–	225 FXU	600 FXU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 225–600 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % pšenice	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašički	4 mesece	200 FXU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 200 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % pšenicel	30.6.2004 [f]
6	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze in endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Humicola insolens*(DSM 10442), z najmanjšo aktivnostjo: Zaščitena oblika – prevlečena: 800 FXU [7]/g 75 FBG [5]/g Mikrogranulirana oblika: 800 FXU/g 75 FBG/g	Piščanci za pitanje	–	200 FXU 19 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 400 FXU 38 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % ječmena in/ali ovsa, pšenice	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašički	4 mesece	240 FXU 94 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 400 FXU 38 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % ječmena in/ali ovsa, pšenice	30.6.2004 [f]
			Prašiči za pitanje	–	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3) 400 FXU	30.6.2004 [h]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
7	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze in endo-1,4-beta-glukanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger*(CBS 600.94), z najmanjšo aktivnostjo: Zaščitena oblika - prevlečena: 36 000 FXU [8]/g 15 000 BGU [9]/g Tekoča oblika:	Piščanci za pitanje	–	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3 600-6 000 FXU 1 500-2 500 BGU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 35 % ječmena in 20 % pšenice	1.4.2004 [1]
			Prašički	4 mesece	6 000 FXU 2 500 BGU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 6 000 FXU 2 500 BGU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % pšenice in 30 % ječmena	1.4.2004 [1]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Purani za pitanje	–	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 6 000 –12 000 FXU 2 500 –5 000 BGU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	1.4.2004 [1]
			Kokoši nesnice	–	12 000 FXU 5 000 BGU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 20 % pšenice, 10 % ječmena in 20 % sončničnih semen	1.4.2004 [1]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
		Pripravek endo-1,4-beta- ksilanaze in endo-1,4-beta-glukanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger*(CBS 600.94), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 36 000 FXU [8]/g	Piščanci za pitanje	–	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3 600- 6 000 FXU 1 500-2 500 BGU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani) in npr. vsebujejo več kakor 35 % ječmena in 20 % pšenice	30.9.2004 [P]
			Prašički	4 mesece	6 000 FXU 2 500 BGU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 6 000 FXU 2 500 BGU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani) in npr. vsebujejo več kakor 30 % pšenice in 30 % ječmena	30.9.2004 [P]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Purani za pitanje	–	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 6 000-12 000 FXU 2 500-5 000 BGU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani) in npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	30.9.2004 P
			Kokoši nesnice	–	12 000 FXU 5 000 BGU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani) in npr. vsebujejo več kakor 20 % pšenice, 10 % ječmena in 20 % sončničnih semen	30.9.2004 P

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
8	Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze in endo-1,4-beta- ksilanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger*(CBS 600.94), z najmanjšo aktivnostjo: Zaščitena oblika - prevlečena: 10 000 BGU [9]/g 4 000 FXU [8]/g Tekoča oblika:	Piščanci za pitanje	–	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3 000-10 000 BGU 1 200-4 000 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani) in npr. vsebujejo več kakor 60 % ječmena	1.4.2004 [1]
			Prašički	4 mesece	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3 000 do 5 000 BGU 1 200 do 2 000 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % ječmena	1.4.2004 [1]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Kokoši nesnice	–	5 000 BGU 2 000 FXU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 60 % ječmena	1.4.2004 [1]
		Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger*(CBS 600.94), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 20 000 BGU [9]/g	Piščanci za pitanje	–	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3 000-10 000 BGU 1 200-4 000 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 60 % ječmena	30.9.2004 [P]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašički	4 mesece	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3 000-5 000 BGU 1 200-2 000 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % ječmena	30.9.2004 P
			Kokoši nesnice	–	5 000 BGU 2 000 FXU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 60 % ječmena	30.9.2004 P

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
9	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus niger*(CBS 270.95), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 28 000 EXU [10]/g Tekoča oblika: 14 000 EXU/ml	Piščanci za pitanje	–	1 400 EXU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 400 EXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % pšenice	30.6.2004 [f]
			Kokoši nesnice	–	2 400 EXU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 2 400-7 400 EXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % pšenice in 30 % rži	1.4.2004 [l]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Purani za pitanje	–	2 400 EXU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 2 400-5 600 EXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % pšenice in 30 % rži	1.4.2004 [l]
10	Alfa-amilaza ES 3.2.1.1	Pripravek alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens*(CBS 360.94), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 45 000 RAU [11]/g Tekoča oblika: 20 000 RAU/ml	Prašički	4 mesece	1 800 RAU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 800 RAU 3. Za uporabo zgolj v krmnih mešanicah, namenjenih za sisteme hranjenja v tekoči obliki, ki vsebujejo s škrobom bogato krmo (npr. več kakor 35 % pšenice)	30.6.2004 [f]
			Prašiči za pitanje	–	1 800 RAU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 800 RAU 3. Za uporabo zgolj v krmnih mešanicah, namenjenih za sisteme hranjenja v tekoči obliki, ki vsebujejo s škrobom bogato krmo (npr. več kakor 35 % pšenice)	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Svinje	–	1 800 RAU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 800 RAU 3. Za uporabo zgolj v krmnih mešanicah, namenjenih za sisteme hranjenja v tekoči obliki, ki vsebujejo s škrobom bogato krmo (npr. več kakor 35 % pšenice)	30.6.2004 [f]
11	Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze, endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jih proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 74 252), z najmanjšo aktivnostjo: Tekoča oblika: Endo-1,4-beta-glukanaza: 8 000 U [12]/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18 000 U [13]/ml Endo-1,4-beta-ksilanaza: 26 000 U [14]/ml	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 300 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-glukanaza: 400-1 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900-3 600 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 300-5 200 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % pšenice ali ječmena in več kakor 10 % rži	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
		Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze, endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 74 252), z najmanjšo aktivnostjo: Granulirana oblika: Endo-1,4-beta-glukanaza: 8 000 U [12]/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18 000 U [13]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 26 000 U [14]/g	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 300 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-glukanaza: 400- 1 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900-3 600 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 300-5 200 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % pšenice ali ječmena in več kakor 10 % ržи	31.5.2005 [r]
		Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze, endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jih proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 74 252), z najmanjšo aktivnostjo: Tekoča in granulirana oblika: Endo-1,4-beta-glukanaza: 8 000 U [12]/ml ali g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18 000 U [13]/ml ali g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 26 000 U [14]/ml ali g	Purani za pitanje	–	Endo-1,4-beta-glukanaza: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900 U Endo-1,4-beta-ksilanaza:1 300 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-glukanaza: 400-800 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 900-1 800 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 300-2 600 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	31.5.2005 [r]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
12	Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze, endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jih proizvaja *Trichoderma viride*(FERM BP-4447), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,4-beta-glukanaza: 8 000 U [12]/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 18 000 U [13]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 26 000 U [14]/g	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,4-beta-glukanaza: 200 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 450 U Endo-1,4-beta-ksilanaza:650 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-glukanaza: 800-1 200 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 800-2 700 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 600-3 900 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 20 % pšenice in 20 % ječmena in/ali 25 % ržI	30.6.2004 [f]
			Kokoši nesnice	–	Endo-1,4-beta-glukanaza: 640 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 440 U Endo-1,4-beta-ksilanaza:2 080 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-glukanaza: 640-1 280 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 440-2 880 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 080-4 160 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 20 % pšenice in 20 % ječmena in/ali 25 % ržI	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Purani za pitanje	–	Endo-1,4-beta-glukanaza: 800 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 800 U Endo-1,4-beta-ksilanaza:2 600 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-glukanaza: 800 – 1 200 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 800 – 2 700 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 600 – 3 900 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 20 % pšenice in 20 % ječmena	30.6.2004 [f]
13	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(CBS 357.94), z najmanjšo aktivnostjo: Praškasta oblika: 8 000 BGU [15]/g 11 000 EXU [16]/g Granulirana oblika: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g	Piščanci za pitanje	–	100 BGU 130 EXU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 100 BGU 130 EXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % pšenice in 30 % ječmena ali 20 % ržI	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Kokoši nesnice	–	600 BGU 800 FXU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 600 BGU 800 EXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice in več kakor 30 % ječmena	1 4.2004 [1]
			Purani za pitanje	–	600 BGU 800 EXU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 600 BGU 800 EXU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % pšenice ali več kakor 30 % rži	1.4.2004 [1]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
14	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus niger*(CBS 520.94), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: Endo-1,4-beta-ksilanaza 600 U [17]/g Tekoča oblika:	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,4-beta-ksilanaza:300 U	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 300-600 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % pšenice	30.6.2004 [f]
15	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma viridae*(CBS 517.94), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza 650 U [18]/g Tekoča oblika:	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 325 U	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 3) 325-650 U	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
16	Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4	Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 142), z najmanjšo aktivnostjo: Tekoča oblika: 2 000 CU [19]/ml	Piščanci za pitanje	–	250 CU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena	30.6.2004 [f]
			Kokoši nesnice	–	250 CU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena	30.6.2004 [f]
			Prašički	4 mesece	250 CU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašiči za pitanje	–	250 CU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena	30.6.2004 [f]
		Pripravek endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 142), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 2 000 CU [19]/g	Piščanci za pitanje	–	250 CU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena	17.7.2004 [m]
			Kokoši nesnice	–	250 CU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena	17.7.2004 [m]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašički	4 mesece	250 CU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena	17.7.2004 [m]
			Prašiči za pitanje	–	250 CU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–1 000 CU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena	17.7.2004 [m]
17	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), z najmanjšo aktivnostjo: Tekoča oblika: 6 000 EPU [20]/ml	Piščanci za pitanje	–	750 EPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500–3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Kokoši nesnice	–	750 EPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500–3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice.	30.6.2004 [f]
			Prašički	4 mesece	750 EPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500–3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	30.6.2004 [f]
			Prašiči za pitanje	–	750 EPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500–3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
		Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 6 000 EPU [20]/g	Piščanci za pitanje	–	750 EPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500–3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	17.7.2004 [m]
			Kokoši nesnice	–	750 EPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500–3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	17.7.2004 [m]
			Prašički	4 mesece	750 EPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500– 3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	17.7.2004 [m]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašiči za pitanje	–	750 EPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500–3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	17.7.2004 [m]
			Purani za pitanje	–	750 EPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 500–3 000 EPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki so bogate z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani) in ki npr. vsebujejo več kakor 35 % pšenice	17.7.2004 [m]
18	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus niger* (MUCL 39199), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 2 000 AGL [21]/g Tekoča oblika: 500 AGL/ml	Piščanci za pitanje	–	100 AGL	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 100 AGL 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena in 20 % pšenice	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
19	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus niger* (MUCL 39199), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 1 500 AGL [21]/g Tekoča oblika: 200 AGL/g	Piščanci za pitanje	–	25 AGL	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 25–100 AGL 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % ječmena	30.6.2004 [f]
20	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 39203), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 2 000 AXC [22]/g Tekoča oblika: 500 AXC/ml	Piščanci za pitanje	–	100 AXC	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 100 AXC 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice ali rži	30.6.2004 [f]
21	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 39203), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 1 500 AXC [22]/g Tekoča oblika: 200 AXC/g	Piščanci za pitanje	–	25 AXC	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 25–100 AXC 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % pšenice	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
22	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 70 000 BGN [23]/g Tekoča oblika: 14 000 BGN/ml	Piščanci za pitanje	–	1 050 BGN	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 2 800 BGN 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % ječmena	30.6.2004 [f]
23	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 70 000 IFP [24]/g Tekoča oblika: 7 000 IFP/ml	Piščanci za pitanje	–	1 050 IFP	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 400 IFP 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 56 % pšenice	30.6.2004 [f]
			Purani za pitanje	–	700 IFP	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 1 400 IFP 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	28.2.2005 [q]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Kokoši nesnice	–	840 IFP	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 840 IFP 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	28.2.2005 [q]
24	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger* (CNCM I-1517), z najmanjšo aktivnostjo: 28 000 QXU [25]/g 140 000 QGU [26]/g	Piščanci za pitanje	–	420 QXU 2 100 QGU	1 120 QXU 5 600 QGU	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 560 QXU 2 800 QGU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % pšenice in 30 % ječmena	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
25	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger*(NRRL 25541), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 100 U [27]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 600 U [28]/g	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U Endo-1,4-beta-ksilanaza:200 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 200 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % ječmena ali 30 % pšenice in 30 % koruze	30.6.2004 [f]
			Kokoši nesnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 200 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 138 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 200 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % ječmena ali 30 % pšenice in 30 % koruze	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
26	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 526.94), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 350 000 BU [29]/g Tekoča oblika: 50 000 BU/g	Piščanci za pitanje	–	23 000 BU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksaje treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 23 000–50 000 BU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 20 % ječmena ali 30 % ržI	30.6.2004 [i]
			Prašički	4 mesece	26 000 BU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 26 000–35 000 BU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 60 % ječmena ali pšenice	30.6.2004 [i]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
27	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Endo-1,3(4) beta-glukanaza	Pripravek endo-1,4-beta-ksilamaze, ki jo proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 529.94) in endo-1,3(4)beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 526.94), obe z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 200 000 BXU [30]/g 200 000 BU [31]/g Tekoča oblika: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Piščanci za pitanje	–	2 500 BXU 2 500 BU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 10 000 BXU 10 000 BU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice ali 30 % rži	30.6.2004 [i]
			Prašički	2 meseca	7 500 BXU 7 500 BU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 7 500-15 000 BXU 7 500-15 000 BU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % pšenice	28.2.2005 [q]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
28	3-fitaza EC 3.1.3.8	Pripravek 3-fitaze, ki jo proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 5 000 PPU [32]/g	Prašički	4 mesece	250 PPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–750 PPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s fitati, ki npr. vsebujejo več kakor 50 % žit (koruze, ječmena, pšenice), tapioke, oljnic in zrn stročnic	30.6.2004 [i]
			Prašiči za pitanje	–	500 PPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–750 PPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih s fitati, ki npr. vsebujejo več kakor 50 % žit (koruze, ječmena, pšenice), tapioke, oljnic in zrn stročnic	30.6.2004 [i]
			Piščanci za pitanje	–	500 PPU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500–750 PPU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,22 % fitinsko vezanega fosforja	28.2.2005 [q]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
29	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Geosmithia emersonii*(IMI SD 133), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 5 500 U [33]/g	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % ječmena	30.6.2004 [g]
30	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Penicillium funiculosum*(IMI SD 101), z najmanjšo aktivnostjo: Praškasta oblika: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 000 U [34]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 400 U [35]/g Tekoča oblika: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U/ml Endo-1,4-beta-ksilanaza: 350 U/ml	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % ječmena ali 60 % pšenice	30.6.2004 [g]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Purani za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % pšenice	28.2.2005 [q]
			Kokoši nesnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 60 % ječmena ali 30 % pšenice	28.2.2005 [q]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašiči za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 70 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % ječmena ali 60 % pšenice	28.2.2005 [q]
31	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(CBS 614.94), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: 300 EU [36]/g	Piščanci za pitanje	–	600 EU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 600 EU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 60 % pšenice	30.6.2004 [g]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Kokoši nesnice	–	300 EU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:600 EU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 60 % pšenice	30.6.2004 [g]
32	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 200 U [18]/ml	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % ječmena	30.6.2004 [h]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
		Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza:	Prašički	4 mesece	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 3) 400 U	30.6.2004 [h]
			Prašiči za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 70 % ječmena	30.6.2004 [h]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
33	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105), z najmanjšo aktivnostjo: Praškasta oblika: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 000 U [37]/g Tekoča oblika: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U/ml	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 500 U	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3) endo-1,4-beta-ksilanaza:	30.6.2004 [h]
			Kokoši nesnice	–	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 000 U	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 35 % pšenice	30.6.2004 [h]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
		Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105), z najmanjšo aktivnostjo: Praškasta oblika: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 4 000 U [37]/g Tekoča oblika:	Prašički	4 mesece	Endo-1,4-beta-ksilanaza:5 000 U	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 3) 5 000 U	30.6.2004 [h]
		Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105), z najmanjšo aktivnostjo: Praškasta oblika: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 4 000 U [37]/g Tekoča oblika:	Prašiči za pitanje	–	Endo-1,4-beta-ksilanaza:	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3) endo-1,4-beta-ksilanaza:	30.6.2004 [h]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
34	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja *Aspergillus niger*(NRRL 25541) in alfa-amilaze, ki jo proizvaja*Aspergillus oryzae*(ATCC 66222), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 275 U[3 8]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U [39]/g Alfa-amilaza:	Prašički	4 mesece	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 165 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 240 U Alfa-amilaza: 1 860 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 165 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 240 U alfa-amilaza: 1 860 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo žita, bogata s škrobom in z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani) z npr. več kakor 45 % ječmena in 10 % pšenice ali 10 % koruze	26.7.2004 [j]
35	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*, (ATCC 2105), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 80 U [18]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 180 U [37]/g	Kokoši nesnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 80 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 180 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 80 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 3) 180 U	26.7.2004 [j]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
36	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U [18]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U [37]/g	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki vsebujejo npr. več kakor 40 % ječmena	26.7.2004 [j]
			Kokoši nesnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 300 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 3) 300 U	26.7.2004 [j]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
37	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Subtilizin ES 3.4.21.62	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) in subtilizina, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis*(ATCC 2107), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 500 U [37]/g Subtilizin: 800 U [41]/g:	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 500 U Subtilizin: 160 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 500-2 500 U subtilizin: 160-800 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki npr. vsebujejo več kakor 65 % pšenice	26.7.2004 [j]
			Purani	–	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 825 U Subtilizin: 265 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 825-2 500 U subtilizin: 265-800 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki npr. vsebujejo več kakor 45 % pšenice	26.7.2004 [j]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
38	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Subtilizin ES 3.4.21.62	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) in subtilizina, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis*(ATCC 2107), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U [37]/g Subtilizin: 500 U [41]/g	Prašički	4 mesece	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U Subtilizin: 500 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U subtilizin: 500 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice	26.7.2004 [j]
39	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U [18]/g	Prašiči za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U Endo-1,4-beta-ksilanaza:400 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti beta-glukani in arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 65 % ječmena	26.7.2004 [j]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
40	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Subtilizin ES 3.4.21.62	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) in subtilizina, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis*(ATCC 2107), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U [18]/g, Endo-1,4-beta-ksilanaza:	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 90 U Subtilizin: 240 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 30-100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 90-300 U subtilizin: 240-800 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki npr. vsebujejo več kakor 60 % ječmena	26.7.2004 [j]
41	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Subtilizin ES 3.4.21.62	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) in subtilizina, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis*(ATCC 2107), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U [18]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza:	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 625 U Subtilizin: 200 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 25-100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 3) 625-2 500 U	26.7.2004 [j]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Kokoši nesnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 2 500 U Subtilizin: 800 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 100 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 3) 2 500 U	26.7.2004 [j]
42	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135), z najmanjšo aktivnostjo: Trdna oblika: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 4 000 U [37]/g Karakteristike dovoljenega pripravka: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1,99 % Pšenica: 97,7 % Kalcijev propionat: 0,3 %	Prašički	4 mesece	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 4 000 U	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 3) 4 000 U	26.7.2004 [j]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašiči za pitanje	–	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 4 000 U	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 4 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 60 % pšenice	17.7.2004 [m]
43	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135), endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) in alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 3 975 U [37]/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza	Prašički	4 mesece	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 3 975 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 125 U Alfa-amilaza: 1 000 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 3 975 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 125 U alfa-amilaza: 1 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah z žiti, bogatih s škrobom in neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % pšenice in 20 % ječmena in 20 % rži	6.1.2004 [k]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
44	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105) in alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 250 U [18]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza:	Prašički	4 mesece	Endo-1,3,(4)-beta-glukanaza: 250 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U Alfa-amilaza: 1 000 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U alfa-amilaza:1 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah z žiti, bogatih s škrobom in neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % ječmena	6.1.2004 [k]
45	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135) in alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 250 U [18]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U [37]/g	Prašički	4 mesece	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U Alfa-amilaza: 1 000 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 250 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U alfa-amilaza: 1 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah z žiti, bogatih s škrobom in z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 35 % ječmena	6.1.2004 [k]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
46	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Poligalakturonaza ES 3.2.1.15	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106) in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135) in poligalakturonaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94),z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 400 U [18]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza:	Prašiči za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U Poligalakturonaza: 50 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 400 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 400 U poligalakturonaza: 50 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah z žiti, bogatih s škrobom in z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena.	6.1.2004 [k]
47	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 Poligalakturonaza ES 3.2.1.15	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135), alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553), polgalakturonaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94),z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 150 U [18]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 4 000 U [37]/g	Prašički	4 mesece	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 4 000 U Alfa-amilaza: 1 000 U Poligalakturonaza: 25 U	– – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 4 000 U alfa-amilaza: 1 000 U poligalakturonaza: 25 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah z žiti, bogatih s škrobom in z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 20 % ječmena in 35 % pšenice	6.1.2004 [k]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
48	Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek alfa-amilaze in endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553), z najmanjšo aktivnostjo: Zaščitena oblika - prevlečena: Alfa-amilaza: 200 KNU [44]/g Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 350 FBG [5]/g Tekoča oblika: Alfa-amilaza: 130 KNU/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 225 FBG/ml	Piščanci za pitanje	–	10 KNU 17 FBG	40 KNU 70 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 20 KNU 35 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena	1.4.2004 [1]
			Purani za pitanje	–	40 KNU 70 FBG	80 KNU 140 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek/kg popolne krmne mešanice: 40 KNU 70 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % ječmena	1.4.2004 [1]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
49	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 Bacilolizin ES 3.4.24.28 Poligalakturonaza ES 3.2.1.15	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(IMI SD 135), alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9553), bacilolizina, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens*(DSM 9554) in polgalakturonaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94),z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 150 U [18]/g Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 500 U [37]/g Alfa-amilaza:	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 500 U Alfa-amilaza: 500 U Bacilolizin: 800 U Poligalakturonaza: 50 U	– – – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 500 U alfa-amilaza: 500 U bacilolizin: 800 U poligalakturonaza: 50 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 30 % pšenice	17.7.2004 [m]
			Kokoši nesnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 500 U Alfa-amilaza: 500 U Bacilolizin: 800 U Poligalakturonaza: 50 U	– – – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U endo-1,4-beta-ksilanaza: 1 500 U alfa-amilaza: 500 U bacilolizin: 800 U 3) poligalakturonaza: 50 U	17.7.2004 [m]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
50	6-fitaza ES 3.1.3.26	Pripravek 6-fitaze, ki jo proizvaja *Aspergillus oryzae* (DSM 11857) z najmanjšo aktivnostjo: Zaščitena oblika - prevlečena: 2 500 FYT [3]/g Tekoča oblika:	Piščanci za pitanje	–	250 FYT	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 3) 500-1 000 FYT	17.7.2004 [m]
			Kokoši nesnice	–	250 FYT	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500-1 000 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,25 % fitinsko vezanega fosforja	17.7.2004 [m]
			Purani za pitanje	–	250 FYT	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500-1 000 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,25 % fitinsko vezanega fosforja	17.7.2004 [m]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašički	2 meseca	500 FYT	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500-1 000 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,25 % fitinsko vezanega fosforja	17.7.2004 [m]
			Prašiči za pitanje	–	500 FYT	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500-1 000 FYT 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, ki vsebujejo več kakor 0,25 % fitinsko vezanega fosforja	17.7.2004 [m]
51	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) z najmanjšo aktivnostjo: 100 IU [45]/g	Piščanci za pitanje	–	10 IU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 10 IU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice.	17.7.2004 [m]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašički	2 meseca	10 IU	–	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 10 IU 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z arabinoksilani, ki npr. vsebujejo več kakor 40 % pšenice.	31.5.2005 [r]
52	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) in alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553),z najmanjšo aktivnostjo: Tekoča oblika: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 10 000 U [46]/ml Endo-1,4-beta-glukanaza:	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 000 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 12 000 U Alfa-amilaza: 40 U	– – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 000-2 000 U endo-1,4-beta-glukanaza: 12 000-24 000 U alfa-amilaza: 40-80 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani in beta-glukani), ki npr. vsebujejo več kakor 20 % pšenice in 15 % sirka in 5 % koruze	17.7.2004 [m]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
53	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 Bacilolizin ES 3.4.24.28 Endo-1(4)-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizina, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) in endo-1,4–beta–ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842),z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 2 350 U [46]/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U [47]/g Alfa-amilaza:	Prašički	2 meseca	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350U Endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U Alfa-amilaza: 400 U Bacilolizin: 450 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 20 000 U	– – – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U alfa-amilaza: 400 U 3) bacilolizin: 450 U	23.11.2004 o
			Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 175 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 2 000 U Alfa-amilaza: 200 U Bacilolizin: 225 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 10 000 U	– – – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 175-2 350 U endo-1,4-beta-glukanaza: 2 000-4 000 U alfa-amilaza: 200-400 U bacilolizin: 225-450 U endo-1,4-beta-ksilanaza:	23.11.2004 o

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
							3) 10 000- 20 000 U	
54	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) in endo-1,4–beta–ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842),z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 10 000 U [46]/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 120 000 U [47]/g	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 000 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 12 000 U Alfa-amilaza: 40 U Endo-1,4-beta-ksilanaza: 21 000 U	– – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 000-2 000 U endo-1,4-beta-glukanaza: 12 000-24 000 U 3) alfa-amilaza: 40-80 U	23.11.2004 o

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
55	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 Bacilolizin ES 3.4.24.28	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) in bacilolizina, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554),z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 3 000 U [46]/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 5 000 U [47]/g Alfa-amilaza:	Prašički	2 meseca	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 500 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 2 500 U Alfa-amilaza: 270 U Bacilolizin: 225 U	– – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 500-3 000 U endo-1,4-beta-glukanaza: 2 500-5 000 U 3) alfa-amilaza: 270-540 U	23.11.2004 °
			Prašiči za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 500 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 2 500 U Alfa-amilaza: 270 U Bacilolizin: 225 U	– – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 500-3 000 U endo-1,4-beta-glukanaza: 2 500-5 000 U alfa-amilaza: 270-540 U 3) bacilolizin: 225-450 U	23.11.2004 °

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 500U Endo-1,4-beta-glukanaza: 2 500 U Alfa-amilaza: 270 U Bacilolizin: 225 U	– – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 500-3 000 U endo-1,4-beta-glukanaza: 2 500-5 000 U alfa-amilaza: 270-540 U 3) bacilolizin: 225-450 U	23.11.2004 o
			Kokoši nesnice	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 500 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 2 500 U Alfa-amilaza: 270 U Bacilolizin: 225 U	– – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 500-3 000 U endo-1,4-beta-glukanaza: 2 500-5 000 U 3) alfa-amilaza: 270-540 U	23.11.2004 o

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
56	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 Bacilolizin ES 3.4.24.28	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) in bacilolizina, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554),z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 6 000 U [46]/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 3 500 U [47]/g	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 6 000U Endo-1,4-beta-glukanaza: 3 500 U Alfa-amilaza: 1 400 U Bacilolizin: 450 U	– – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 6 000 U endo-1,4-beta-glukanaza: 3 500 U 3) alfa-amilaza: 1 400 U	23.11.2004
57	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 Bacilolizin ES 3.4.24.28	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) in bacilolizina, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554),z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 3000 U[46]/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 9000 U[47]/g	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 3 000 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 9 000 U Alfa-amilaza: 540 U Bacilolizin: 450 U	– – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 3 000 U endo-1,4-beta-glukanaza: 9 000 U 3) alfa-amilaza: 540 U	23.11.2004

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
58	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanaza ES 3.2.1.4 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 Bacilolizin ES 3.4.24.28	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus*(CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) in bacilolizina, ki ga proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554),z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 2 350 U [46]/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 5 000 U [47]/g	Prašički	2 meseca	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U Endo-1,4-beta-glukanaza: 5 000 U Alfa-amilaza: 400 U Bacilolizin: 5 000 U	– – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U endo-1,4-beta-glukanaza: 5 000 U 3) alfa-amilaza: 400 U	23.11.2004 [o]
59	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6 Subtilizin ES 3.4.21.62 Alfa-amilaza ES 3.2.1.1 Poligalakturonaza ES 3.2.1.15	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanaze in alfa-amilaze, ki jo proizvaja *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), subtilizina, ki ga proizvaja *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), poligalakturonaze, ki jo proizvaja *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U [37]/g Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 150 U [18]/g Subtilizin:	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U Subtilizin: 4 000 U Alfa-amilaza: 400 U Poligalakturonaza: 25 U	– – – –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 300 U endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 150 U subtilizin: 4 000 U 3) alfa-amilaza: 400 U	28.2.2005 [q]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
60	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), z najmanjšo aktivnostjo: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U [37]/ml	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 500 U Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 5 U	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 500-2 500 U 3) endo-1,3(4)-beta-glukanaza:	28.2.2005 [q]
61	Endo-1,4-beta-ksilanaza ES 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanaza ES 3.2.1.6	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 529.94), endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma reesei* (CBS 526.94), z najmanjšo aktivnostjo: Uprašena oblika: Endo-1,4-beta-ksilanaza: 17 000 BXU [30]/g Endo-1,3(4)–beta-glukanaza: 11 000 BU [29]/g Tekoča oblika:	Piščanci za pitanje	–	Endo-1,4-beta-ksilanaza: 17 000 BXU Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 11 000 BU	– –	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: endo-1,4-beta-ksilanaza: 17 000 BXU 3) endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 11 000 BU	28.2.2005 [q]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
Mikroorganizmi								
1	*Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/ CNCM I-1012	Priprava *Bacillus cereus* var. *toyoi*, ki vsebuje najmanj:	Piščanci za pitanje	–	$0{,}2 \times 10^9$	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Uporaba je dovoljena v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: natrijev monenzin, natrijev lasolacid, natrijev salominicin, dekokvinat, robenidin, narasin, halofuginon	1.3.2002 [h]
			Kokoši nesnice	–	$0{,}2 \times 10^9$	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	1.3.2002 [h]
			Teleta	6 mesecev	$0{,}5 \times 10^9$	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	1.3.2002 [h]
			Govedo za pitanje	–	$0{,}2 \times 10^9$	$0{,}2 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Količina *Bacillus cereus* var. *toyoi* v dnevnem obroku ne sme presegati 1×10^9 CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih nadaljnjih 100 kg telesne teže dodajte $0{,}2 \times 10^9$ CFU	1.3.2002 [h]
			Samice jelenjadi	–	$0{,}1 \times 10^9$	5×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Uporaba je dovoljena v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljen kokcidiostatik: robenidin	1.3.2002 [h]
			Kunci za pitanje	–	$0{,}1 \times 10^9$	5×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Uporaba je dovoljena v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljen kokcidiostatik: robenidin, natrijev salinomicin	1.3.2002 [h]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
3	Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47	Pripravek iz *Saccharomyces cerevisiae* ki vsebuje najmanj: 5×10^9 CFU/g dodatka	Kunci za pitanje	–	$2{,}5 \times 10^9$	5×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Uporaba je dovoljena v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljen kokcidiostatik: metiklorpindol	30.6.2004 [f]
			Svinje	–	5×10^9	$2{,}5 \times 10^{10}$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 [f]
			Prašički	4 mesece	5×10^9	1×10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 [f]
			Krave molznice	–	4×10^8	2×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Količina *Saccharomyces cerevisiae* v dnevnem obroku ne sme presegati $5{,}6 \times 10^9$ CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih nadaljnjih 100 kg telesne teže dodajte $8{,}75 \times 10^9$ CFU	31.5.2005 [r]
5	Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94	Pripravek iz *Saccharomyces cerevisiae* ki vsebuje najmanj: 1×10^8 CFU/g dodatka	Teleta	6 mesecev	2×10^8	2×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 [f]
			Govedo za pitanje	–	$1{,}7 \times 10^8$	$1{,}7 \times 10^8$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Količina *Saccharomyces cerevisiae* v dnevnem obroku ne sme presegati $7{,}5 \times 10^8$ CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih nadaljnjih 100 kg telesne teže dodajte 1×10^8 CFU	30.6.2004 [g]
			Krave molznice	–	$5x\ 10^7$	$3{,}5 \times 10^8$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Količina *Saccharomyces cerevisiae* v dnevnem obroku ne sme presegati $1{,}2 \times 10^9$ CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih nadaljnjih 100 kg telesne teže dodajte $1{,}7 \times 10^8$ CFU	31.5.2005 [r]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
6	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079	Pripravek iz *Saccharomyces cerevisiae* ki vsebuje najmanj: 2×10^{10} CFU/g dodatka	Svinje	–	2×10^{9}	1×10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 [f]
			Prašički	4 mesece	6×10^{9}	3×10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 [f]
7	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077	Pripravek iz *Saccharomyces cerevisiae* ki vsebuje najmanj: 2×10^{10} CFU/g dodatka	Krave molznice	–	$5{,}5 \times 10^{8}$	$2{,}1 \times 10^{9}$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Količina *Saccharomyces cerevisiae* v dnevnem obroku ne sme presegati $8{,}4 \times 10^{9}$ CFU za 100 kg telesne teže. Za vsakih nadaljnjih 100 kg telesne teže dodajte $1{,}8 \times 10^{9}$ CFU	30.6.2004 [f]
			Govedo za pitanje	–	1×10^{9}	$1{,}5 \times 10^{9}$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Količina *Saccharomyces cerevisiae* v dnevnem obroku ne sme presegati $4{,}6 \times 10^{9}$ CFU za 100 kg telesne teže. Za vsakih nadaljnjih 100 kg telesne teže dodajte 2×10^{9} CFU	30.6.2004 [f]
8	Enterococcus faecium ATCC 53519 Enterococcus faecium ATCC 55593 (v razmerju 1/1)	Mešanica: inkapsuliranega*Enterococcus faecium*(ATCC 53519) in inkapsuliranega*Enterococcus faecium*,(ATCC 55593), ki vsebuje najmanj: 2×10^{8} CFU/g dodatka (tj. najmanj 1×10^{8} CFU/g vsake bakterije)	Piščanci za pitanje	–	1×10^{8}	1×10^{8}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Uporaba je dovoljena v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolij, dekokvinat, halofuginon, natrijev lasalocid, amonijev maduramicin, natrijev monenzin, narazin, nikarbazin, narazin/nikarbazin, natrijev salinomicin	30.6.2004 [f]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
9	Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M	Pripravek *Pediococcus acidilactici*, ki vsebuje najmanj: 1×10^{10} CFU/g dodatka	Piščanci za pitanje	–	1×10^{9}	1×10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Uporaba je dovoljena v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolij, metiklorpindol, dekokvinat, halofuginon, narazin, natrijev salinomicin, nikarbazin, amonijev maduramicin, diklazuril	30.6.2004 g
			Prašički	4 mesece	1×10^{9}	1×10^{9}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 g
			Prašiči za pitanje	–	1×10^{9}	1×10^{9}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 g
10	Enterococcus faecium NCIMB 10415	Pripravek *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj: V mikroinkapsulirani obliki: $1{,}0 \times 10^{10}$ CFU/g dodatka $1{,}75 \times 10^{10}$ CFU/g dodatka	Piščanci za pitanje	–	$0{,}3 \times 10^{9}$	$2{,}8 \times 10^{9}$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Uporaba je dovoljena v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolij, amprolij/etopabat, diklazuril, halofuginon, amonijev maduramicin, metiklorpindol, metiklorpindol/metilbenzokva, natrijev monenzin, robenidin, natrijev salinomicin	30.6.2004 g
			Prašiči za pitanje	–	$0{,}35 \times 10^{9}$	$1{,}5 \times 10^{9}$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 g
			Svinje	–	$0{,}2 \times 10^{9}$	$1{,}25 \times 10^{9}$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 g
			Govedo za pitanje	–	$0{,}25 \times 10^{9}$	$0{,}6 \times 10^{9}$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Količina *Enterococcus faecium* v dnevnem obroku ne sme presegati 1×10^{9} CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih nadaljnjih 100 kg telesne teže dodajte 1×10^{9} CFU	30.6.2004 g

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
		Pripravek *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj: V mikroinkapsulirani obliki: 1,0 x 10^{10} CFU/g dodatka 1,75 x 10^{10} CFU/g dodatka in Granulirana oblika:	Prašički	4 mesece	0,3 x 10^9	1,4 x 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Granulirana oblika se lahko uporablja samo v mlečnih nadomestkih	30.6.2004 [g]
			Teleta	6 mesecev	0,35 x 10^9	6,6 x 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Granulirana oblika se lahko uporablja samo v mlečnih nadomestkih	30.6.2004 [g]
11	Enterococcus faecium DSM 5464	Pripravek*Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj:	Prašički	4 mesece	0,5 x 10^9	1 x 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 [g]
			Piščanci za pitanje	–	0,5 x 10^9	1 x 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Uporaba je dovoljena v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolij, diklazuril, halofuginon, natrijev monenzin, metiklorpindol/metilbenzokva, nikarbazin	1.4.2004 [l]
			Teleta	4 mesece	0,5 x 10^9	1 x 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	1.4.2004 [l]
12	Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R	Pripravek *Lactobacillus farciminis*, ki vsebuje najmanj:	Prašički	4 mesece	1 x 10^9	1 x 10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 [h]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
13	Enterococcus faecium DSM 10663/ NCIMB 10415	Pripravek *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj: Prah in granulat: 3,5 x 10^{10} CFU/g dodatka Zaščitena oblika – prevlečena: 2,0 x 10^{10} CFU/g dodatka Tekoča oblika: 1 x 10^{10} CFU/ml dodatka	Prašički	4 mesece	1 x 10^{9}	1 x 10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 [h]
			Teleta	6 mesecev	1 x 10^{9}	1 x 10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	26.7.2004 [j]
			Piščanci za pitanje	–	1 x 10^{9}	1 x 10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, dobo skladiščenja in obstojnost pri peletiranju Uporaba je dovoljena v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: amprolij, amprolij/etopabat, dekokvinat, diklazuril, halofuginon, natrijev lasalocid, amonijev maduramicin, metiklorpindol/metilbenzokva, natrijev monenzin, narazin, nikarbazin, robenidin, natrijev salinomicin	26.7.2004 [j]
14	Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885	Pripravek *Saccharomyces cerevisiae*, ki vsebuje najmanj: Prah, okrogle in ovalne granulirane oblike: 1 x 10^{9}CFU/g dodatka	Prašički	4 mesece	3 x 10^{9}	3 x 10^{9}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.6.2004 [h]
			Govedo za pitanje	–	9 x 10^{9}	9 x 10^{9}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Količina *Saccharomyces cerevisiae*v dnevnem obroku ne sme presegati 1,6 x 10^{10} CFU na 100 kg telesne teže. Za vsakih nadaljnjih 100 kg telesne teže dodajte 3,2 x 10^{9} CFU	30.6.2004 [h]
15	Enterococcus faecium NCIMB 11181	Priprava *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj: Prah: 4 x 10^{11}CFU/g dodatka Zaščitena oblika – prevlečena: 5 x 10^{10}CFU/g dodatka	Teleta	6 mesecev	5 x 10^{8}	2 x 10^{9}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	6.1.2004 [k]
			Prašički	4 mesece	5 x 10^{8}	2 x 10^{9}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	6.1.2004 [k]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
16	*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	Mešanica *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj: 7 x 10^9 CFU/g in: *Lactobacillus rhamnosu*, ki vsebuje najmanj:	Teleta	6 mesecev	1 x 10^9	6 x 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	6.1.2004 [k]
			Prašički	4 mesece	1 x 10^9	5x 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	6.1.2004 [k]
17	*Lactobacillus casei* NCIMB 30096 *Enterococcus faecium* NCIMB 30098	Mešanica: *Lactobacillus casei*in *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj: *Lactobacillus casei*: 20 x 10^9 CFU/g	Teleta	6 mesecev	Lactobacillus casei 0,5 x 109 Enterococcus faecium 1,5 x 109	Lactobacillus casei 1 x 109 *Enterococcus faecium 3 x 109*	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	1.4.2004 [l]
18	Enterococcus faecium CECT 4515	Pripravek iz *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj	Prašički	4 mesece	1 x 10^9	1x 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, dobo skladiščenja in obstojnost pri peletiranju	1.4.2004 [l]
			Teleta	6 mesecev	1 x 10^9	1 x 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	1.4.2004 [l]
19	Streptococcus infantarius CNCM I-841 Lactobacillus plantarum CNCM I-840	Mešanica: *Streptococcus infantarius* in *Lactobacillus plantarum*, ki vsebuje najmanj: Streptococcus infantarius 0,5 x 10^9 CFU/g, in: Lactobacillus plantarum	Teleta	6 mesecev	Streptococcus infantarius: 1 x 109 *Lactobacillus plantarum: 0,5 x 109*	Streptococcus infantarius: 1 x 109 *Lactobacillus plantarum: 0,5 x 109*	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	17.7.2004 [m]

Št. (ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
20	Bacillus licheniformis DSM 5749 Bacillus subtilis DSM 5750	Mešanica: *Bacillus licheniformis* in *Bacillus subtilis*, ki vsebuje najmanj: $3{,}2 \times 10^9$ CFU/g dodatka	Svinje	15 dni pred porodom in med dojenjem	$0{,}96 \times 10^9$	$1{,}92 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	23.11.2004 [o]
			Prašiči za pitanje	–	$0{,}48 \times 10^9$	$1{,}28 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	23.11.2004 [o]
			Piščanci za pitanje	–	$3{,}2 \times 10^9$	$3{,}2 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Uporaba je dovoljena v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: aprolij/etopabat, diklazuril, halofuginon, metiklorpindol/metilbenzokvat, natrijev monenzin, nikarbazin, robenidin in natrijev salinomicin	23.11.2004 [o]
			Purani za pitanje	–	$1{,}28 \times 10^9$	$3{,}2 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Uporaba je dovoljena v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: aprolij/etopabat, diklazuril, halofuginon, metiklorpindol/metilbenzokvat, natrijev monenzin, nifursol in robenidin	23.11.2004 [o]
			Teleta	6 mesecev	$1{,}28 \times 10^9$	$1{,}6 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, dobo skladiščenja in obstojnost pri peletiranju	28.2.2005 [q]
21	Enterococcus faecium DSM 3530	Pripravek iz *Enterococcus faecium*, ki vsebuje najmanj $2{,}5 \times 10^9$ CFU/g	Teleta	6 mesecev	1×10^9	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	28.2.2005 [q]

Št.(ali ES registracijska številka)	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					mg/kg popolne krmne mešanice			
Vezalci radionuklidov								
1. 1. Vezivna sredstva za radioaktivni cezij (^{137}Cs in ^{134}Cs)								
1.1	Železov (III) amonijev heksacianoferat (II)	$NH_4Fe(III)[(Fe(II)(CN)_6)]$	Prežvekovalci (domači in divji)	–	50	500	V navodilih za uporabo navedite: „Količina železovega (III) amonijevega heksacianoferata (II) v dnevnem obroku mora biti med 10 in 150 mg na 10 kg telesne teže“	13.10.2001 [b]
			Teleta pred začetkom dobe prežvekovanja	–	50	500	V navodilih za uporabo navedite: „Količina železovega (III) amonijevega heksacianoferata (II) v dnevnem obroku mora biti med 10 in 150 mg na 10 kg telesne teže“	13.10.2001 [b]
			Jagnjeta pred začetkom dobe prežvekovanja	–	50	500	V navodilih za uporabo navedite: „Količina železovega (III) amonijevega heksacianoferata (II) v dnevnem obroku mora biti med 10 in 150 mg na 10 kg telesne teže“	13.10.2001 [b]
			Kozlički pred začetkom dobe prežvekovanja	–	50	500	V navodilih za uporabo navedite: „Količina železovega (III) amonijevega heksacianoferata (II) v dnevnem obroku mora biti med 10 in 150 mg na 10 kg telesne teže“	13.10.2001 [b]
			Prašiči (domači in divji)	–	50	500	V navodilih za uporabo navedite: „Količina železovega (III) amonijevega heksacianoferata (II) v dnevnem obroku mora biti med 10 in 150 mg na 10 kg telesne teže“	13.10.2001 [b]

([a]) [a] Prvo dovoljenje Direktiva Komisije 97/72/ES (UL L 351, 23.12.1997, str. 55).
([b]) [b] Prvo dovoljenje Direktiva Komisije 96/66/ES (UL L 272, 25.10.1996, str. 32).
([c]) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 2316/98 (UL L 289, 28.10.1998, str. 4).
([d]) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 639/1999 (UL L 82, 26.3.1999, str. 6).
([e]) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 1245/1999 (UL L 150, 17.6.1999, str. 15).
([f]) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 1436/98 (UL L 191, 7.7.1998, str. 15).
([g]) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 866/1999 (UL L 108, 27.4.1999, str. 21).
([h]) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 1411/99 (UL L 164, 30.6.1999, str. 56).
([i]) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 2374/98 (UL L 295, 4.11.1998, str. 3).

(j) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 1636/1999 (UL L 194, 27.7.1999, str. 17).
(k) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 2690/1999 (UL L 326, 18.12.1999, str. 33).
(l) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 654/2000 (UL L 79, 30.3.2000, str. 26).
(m) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 1353/2000 (UL L 155, 28.6.2000, str. 15).
(n) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 1887/2000 (UL L 227, 7.9.2000, str. 13).
(o) ° Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 2437/2000 (UL L 280, 4.11.2000, str. 28).
(p) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 2697/2000 (UL L 319, 16.12.2000, str. 1).
(q) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 418/2001 (UL L 62, 2.3.2001, str. 3).
(r) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 937/2001 (UL L 130, 12.5.2001, str. 25).
(s) Prvo dovoljenje Uredba Komisije (ES) št. 1334/2001 (UL L 180, 3.7.2001, str. 18).
(2) Zaradi nedoločitve, če je potrebna, zgornje meje, ki temelji na zadostnih podatkih o prisotnosti dioksinov, se bo zgornja meja 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg uporabljala od 15. oktobra 2000.
(3) 1 FTU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata na minuto iz natrijevega fitata pri pH 5,5 in 37 °C.
(4) 1 FYT je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata na minuto iz natrijevega fitata pri pH 5,5 in 37 °C.
(5) 1 GALU je količina encima, ki hidrolizira 1 mikromol p-nitrofenil-alfa-galaktopiranozida na minuto pri pH 5,5 in 37 °C.
(6) 1 FBG je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.
(7) 1 FXU je količina encima, ki sprosti 7,8 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana iz azo-pšenice na minuto pri pH 6,0 in 50 °C.
(8) 1 FXU je količina encima, ki sprosti 3,1 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana iz azo-pšenice na minuto pri pH 6,0 in 50 °C.
(9) 1 FXU je količina encima, ki sprosti 0,15 mikromola ksiloze iz ksilana, navzkrižno vezanega z azurinom, na minuto pri pH 5,0 in 40 °C.
(10) 1 BGU je količina encima, ki sprosti 0,15 mikromola glukoze iz beta-glukana, navzkrižno vezanega z azurinom, na minuto pri pH 5,0 in 40°C.
(11) 1 EXU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana na minuto pri pH 3,5 in 55 °C.
(12) 1 RAU je količina encima, ki spremeni 1 mg topnega škroba v produkt z enako absorpcijo na referenčno barvo pri 620 nm po reakciji z jodom na minuto pri pH 6,6 in 30 °C.
(13) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz karboksimetilceluloze na minuto pri pH 5,0 in 40 °C.
(14) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 40 °C.
(15) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,1 mikromola glukoze iz ksilana, pridobljenega iz ovsenih lusk, na minuto pri pH 5,0 in 40 °C.
(16) 1 BGU je količina encima, ki sprosti 0,278 mikromola ekvivalentov sladkorja glukoze iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 3,5 in 40 °C.
(17) 1 EXU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana iz pšenice na minuto pri pH 3,5 in 55 °C.
(18) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol ksiloze iz ksilana iz brezovega lesa na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.
(19) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.
(20) 1 CU je količina encima, ki sprosti 0,128 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 4,5 in 30 °C.
(21) 1 EPU je količina encima, ki sprosti 0,0083 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana, pridobljenega iz ovsenih lusk, na minuto pri pH 4,7 in 30 °C.
(22) 1 AGL je količina encima, ki sprosti 5,55 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 4,6 in 30 °C.
(23) 1 AXC je količina encima, ki sprosti 17,2 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz ksilana iz ovsa na minuto pri pH 4,7 in 30 °C.
(24) 1 BGN je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnega sladkorja (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.
(25) 1 IFP je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz ovsa na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.
(26) 1 QXU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz ovsa na minuto pri pH 5,1 in 50 °C.
(27) 1 QGU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.
(28) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ovsa na minuto pri pH 4,0 in 30 °C.
(29) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz ovsa na minuto pri pH 4,0 in 30 °C.
(30) 1 BU je količina encima, ki sprosti 0,06 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.
(31) 1 BXU je količina encima, ki sprosti 0,06 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz breze na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.
(32) 1 BU je količina encima, ki sprosti 0,06 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.
(33) 1 PPU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata iz natrijevega fitata na minuto pri pH 5 in 37 °C.
(34) 1 U je količina encima, ki sprosti 2,78 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 50 °C.
(35) 1 U je količina encima, ki sprosti 5,55 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 50 °C.
(36) 1 U je količina encima, ki sprosti 4,00 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov maltoze) iz ksilan iz brezovega lesa na minuto pri pH 5,5 in 50 °C.
(37) 1 EU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz ovsa na minuto pri pH 4,5 in 40 °C.
(38) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz ovsenih lusk na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.
(39) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ovsa na minuto pri pH 4,0 in 30 °C.
(40) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ksilana iz ovsa na minuto pri pH 4,0 in 30 °C.
(41) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz pšeničnega škroba na minuto pri pH 4,0 in 30 °C.
(42) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikrogram fenolnih spojin (ekvivalentov tirozina) iz substrata iz kazeina na minuto pri pH 7,5 in 40 °C.
(43) 1 U je količina encima, ki hidrolizira 1 mikromol glukozidnih vezi iz v vodi netopnega navzkrižno vezanega polimernega substrata iz škroba na minuto pri pH 6,5 in 37 °C.
(44) 1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih snovi (ekvivalentov galakturonske kisline) iz poli D-galakturonskega substrata na minuto pri pH 5,0 in 40 °C.

([45]) 1 KNU je količina encima, ki sprosti 672 mikromolov reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz topnega škroba na minuto pri pH 5,6 in 37 °C.
([46]) 1 IU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz brezovega lesa na minuto pri pH 4,5 in 30 °C.
([47]) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,0056 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 7,5 in 30 °C.
([48]) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,0056 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz karboksimetilceluloze na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.
([49]) 1 U je količina encima, ki hidrolizira 1 mikromol glukoze iz navzkrižno vezanega škrobnega polimera na minuto pri pH 7,5 in 37 °C.
([50]) 1 U je količina encima, ki hidrolizira 1 mikromol glukozidnih vezi iz v vodi netopnega navzkrižno vezanega polimera škroba na minuto pri pH 7,5 in 37 °C.
([51]) 1 U je količina encima, ki tvori 1 mikrogram azo-kazeina, topnega v triklorocetni kislini, na minuto pri pH 7,5 in 37 °C.
([52]) 1 U je količina encima, ki sprosti 0,0067 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz brezovega lesa na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.