ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2025/221

z dnia 6 lutego 2025 r.

udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Neporex 2SG" zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych ([1]), w szczególności jego art. 44 ust. 5 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 13 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwo Elanco Animal Health Inc. złożyło, zgodnie z art. 43 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, wniosek do Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja") o udzielenie pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy o nazwie „Neporex 2SG", należący do grupy produktowej 18 zgodnie z opisem w załączniku V do tego rozporządzenia, z pisemnym potwierdzeniem, że właściwy organ Niemiec zgodził się dokonać oceny wniosku. Wniosek został zarejestrowany w rejestrze produktów biobójczych pod numerem BC-NA035887-38.

(2) „Neporex 2SG" zawiera cyromazynę jako substancję czynną, która figuruje w unijnym wykazie zatwierdzonych substancji czynnych, o którym mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, do stosowania w grupie produktowej 18.

(3) W dniu 25 września 2023 r. właściwy organ oceniający przedłożył Agencji, zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 528/2012, sprawozdanie z oceny i wnioski ze swojej oceny.

(4) W dniu 20 marca 2024 r. Agencja przedłożyła Komisji swoją opinię ([2]), projekt charakterystyki produktu biobójczego dotyczącej „Neporex 2SG", a także ostateczne sprawozdanie z oceny dotyczące pojedynczego produktu biobójczego zgodnie z art. 44 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(5) W opinii stwierdzono, że „Neporex 2SG" jest pojedynczym produktem biobójczym w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. r) rozporządzenia (UE) nr 528/2012, że kwalifikuje się on do pozwolenia unijnego zgodnie z art. 42 ust. 1 tego rozporządzenia i że, z zastrzeżeniem zgodności z projektem charakterystyki produktu biobójczego, spełnia on warunki określone w art. 19 ust. 1 tego rozporządzenia.

(6) W dniu 5 kwietnia 2024 r. Agencja przekazała Komisji projekt charakterystyki produktu biobójczego we wszystkich językach urzędowych Unii zgodnie z art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(7) Komisja zgadza się z opinią Agencji i uważa, że w związku z tym należy udzielić pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Neporex 2SG".

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

([1]) Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Opinia ECHA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie pozwolenia unijnego na „Neporex 2SG" (ECHA/BPC/418/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym udziela się przedsiębiorstwu Elanco Animal Health Inc. pozwolenia unijnego o numerze EU-0032480-0000 na udostępnianie na rynku i stosowanie pojedynczego produktu biobójczego „Neporex 2SG" zgodnie z charakterystyką produktu biobójczego określoną w załączniku.

Pozwolenie unijne jest ważne od dnia 27 lutego 2025 r. do dnia 31 stycznia 2035 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2025 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO

Neporex 2SG

Grupa produktowa

PT18: Insektycydy, akarycydy i produkty do zwalczania innych stawonogów

Numer zezwolenia: EU-0032480-0000

Numer zasobu w R4BP: EU-0032480-0000

Rozdział 1.**INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

1.1. **Nazwa(-y) handlowa(-e) produktu**

Nazwa handlowa	Neporex 2SG MS Madendood Plus Larvokill LarvEx Raxon Rae

1.2. **Posiadacz pozwolenia**

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	Elanco Animal Health Inc.
	Adres	Mattenstrasse 24 A 4058 Basel CH
Numer zezwolenia	EU-0032480-0000	
Numer zasobu w R4BP	EU-0032480-0000	
Data udzielenia zezwolenia	27 lutego 2025 r.	
Data ważności zezwolenia	31 stycznia 2035 r.	

1.3. **Producent(-ci) produktu**

Nazwa producenta	Schirm GmbH
Adres producenta	Dieselstrasse 8 85107 Baar-Ebenhausen Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Schirm GmbH site 1 Dieselstr. 8 85107 Baar-Ebenhausen Niemcy

Nazwa producenta	Ipanema Industria de Produtos Veterinários Ltda
Adres producenta	Rodovia Raposo Tavares KM 113 – Araçoiaba da Serra – SP Brazylia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Ipanema Industria de Produtos Veterinários Ltda site 1 Rodovia Raposo Tavares KM 113 – Barreiro 18190-000 Araçoiaba da Serra SP Brazylia

Nazwa producenta	Chemical Process Technologies (Pty) Ltd.
Adres producenta	Unit 21, Second Floor, 1 Melrose Boulevard – Melrose Arch Republika Południowej Afryki
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Chemical Process Technologies (Pty) Ltd. site 1 45 Battery St 0184 Waltloo, Ext1 Republika Południowej Afryki

1.4. **Producent(-ci) substancji czynnych**

Substancja czynna	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (Cyromazine)
Nazwa producenta	Elanco (Shanghai) Animal Health Co., Ltd.
Adres producenta	1 Changzhong Road, Wusi Farm, Fengxian County 201423 Shanghai Chiny
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Elanco (Shanghai) Animal Health Co., Ltd. site 1 1 Changzhong Road, Wusi Farm, Fengxian County 201423 Shanghai Chiny

Substancja czynna	N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (Cyromazine)
Nazwa producenta	Shandong Guobang Pharmaceutical Co., LTD
Adres producenta	F12th, Trendyway Building, No.3688, Jiangnan Road, Binjiang District – Hangzhou, Zhejiang Province Chiny
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Shandong Guobang Pharmaceutical Co., LTD site 1 NO.02131 Xiangjiangxiyi Street, Advanced Manufacturing Industrial Park, Binhai Economic Development Zone – Weifang City, Shandong Province Chiny

Rozdział 2.**SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA PRODUKTU**

2.1. **Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu produktu**

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (Cyromazine)		substancja czynna	66215-27-8	266-257-8	2 % (w/w)

2.2. **Rodzaj(e) postaci użytkowej**

SG Granulki rozpuszczalne w wodzie

Rozdział 3.**ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P501: Zawartość usuwać do zgodnie z przepisami krajowymi. P501: pojemnik usuwać do zgodnie z przepisami krajowymi.

Rozdział 4.**ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM**

4.1. **Opis zastosowań**

Tabela 1

Polewanie konewką

Grupa produktowa	PT18: Insektycydy, akarycydy i produkty do zwalczania innych stawonogów
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	Nieistotne
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: *Musca domestica* Nazwa zwyczajowa: mucha domowa Etap rozwoju: Larwy
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie w pomieszczeniach Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich.
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Wylewanie Szczegółowy opis: Polewanie rozcieńczonym produktem za pomocą konewki.
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Nanieść 25 g produktu biobójczego/m^2 = 0,5 g substancji czynnej/m^2; oznacza to 1 l roztworu roboczego na m^2. 2,5 % (wag.). Aby przygotować roztwór roboczy, należy rozcieńczyć 25 g produktu biobójczego w 1 l wody na 1 m^2. Liczba i harmonogram aplikacji: Obory dla krów mlecznych i małych przeżuwaczy: maksymalnie (maks). 5-krotne zastosowanie w ciągu roku. Obory dla bydła mięsnego: maks. 5-krotne zastosowanie w ciągu roku. Chlewnie dla trzody: maks. 1-razowe zastosowanie w ciągu roku. Kurniki dla kurcząt: maks. 1-razowe zastosowanie w ciągu roku. Kurniki dla pozostałego drobiu (indyków, kaczek, gęsi): maks. 5-krotne zastosowanie w ciągu roku. Pomieszczenia hodowlane dla królików: maks. 5-krotne zastosowanie w ciągu roku. W razie konieczności częstszego zastosowania produktu w danej kategorii zwierząt, ze względu na ponowną infestację, należy zastosować inne produkty zawierające inną substancję czynną. W przypadku kilkakrotnego stosowania: między zastosowaniami należy zachować odstęp co najmniej 6 tygodni do maksymalnie kilku miesięcy.

Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Produkt ma bezpośredni kontakt z polietylenem (PE) niezależnie od pojemnika. — Pojemnik (PE): 100 g – 20 kg — Zamknięcie: PE z folią zgrzewaną indukcyjnie (aluminium) — Saszetka (wielowarstwowa folia aluminiowa z PE jako opakowanie bezpośrednie): 20 g – 100 g — Zamknięta przez zgrzewanie termiczne — Elastyczne opakowanie (materiał wielowarstwowy (politereftalan etylenu (PET) i PE)): 3 kg – 5 kg — Zamknięta przez zgrzewanie termiczne — Wiadro (opakowanie bezpośrednie: materiał wielowarstwowy (PET i PE)): 4 kg – 20 kg — Opakowanie zamykane polipropylenową (PP) opaską zaciskową — Opakowanie zewnętrzne: sztywny pojemnik (włókno / karton / PE / PP / inny podobny polimer z pokrywką u góry)

4.1.1. *Instrukcja stosowania dla danego zastosowania*

Patrz ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.1.2. *Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania*

Patrz ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.1.3. *Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach*

Patrz ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.1.4. *Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania*

Patrz ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

4.1.5. *Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania*

Patrz ogólne wskazówki dotyczące stosowania.

Rozdział 5.**OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA**([1])

5.1. **Instrukcje stosowania**

Informacje ogólne

Produkt niedopuszczony do stosowania w pomieszczeniach dla cieląt.

Rozpuścić granulat w wodzie (25 g produktu biobójczego w 1 litrze wody do oczyszczenia 1 m^2). Dozwolone jest wyłącznie stosowanie za pomocą konewki.

Zmniejszenie populacji much staje się widoczne po 2 tygodniach od zastosowania produktu.

W przypadku oporności należy stosować następujące ogólne zasady postępowania:

— W razie podejrzenia rozwoju oporności konieczna jest zmiana na inny produkt z substancją czynną o odmiennym sposobie działania.

— W celu uniknięcia wystąpienia oporności na którąkolwiek z substancji czynnych należy naprzemiennie stosować produkty o różnych sposobach działania i unikać częstego wielokrotnego stosowania tej samej substancji czynnej.

— Zaleca się uzupełnienie leczenia w pomieszczeniach hodowlanych produktem zabijającym osobniki dorosłe.

— Stosowanie produktów biobójczych można łączyć z innymi metodami sanitarnymi (np. częstym usuwaniem obornika) lub nie-chemicznymi środkami zwalczania szkodników (np. z wykorzystaniem parazytoidów, jeśli jest to wykonalne), w ramach zintegrowanego programu zwalczania much.

Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę lub ulotkę i postępować zgodnie ze wszystkimi podanymi instrukcjami.

Pomieszczenia hodowlane dla bydła i małych przeżuwaczy (np. owiec i kóz)

Głęboka ściółka: zabieg należy przeprowadzić w ciągu pierwszych kilku dni (do 3 dni) od rozpoczęcia cyklu hodowlanego lub w ciągu pierwszych 3 dni po usunięciu obornika i rozpoczęciu gromadzenia jego nowej warstwy. Produkt należy stosować wzdłuż ścian, obrzeży i stref zalewania wokół karmideł, poideł i miejsc gromadzenia się obornika. Miejsca lęgowe much znajdują się prawdopodobnie tam, gdzie obornik nie jest ubity, zwłaszcza wzdłuż ścian lub ogrodzeń, ponieważ rozwój larw much w ubitej ściółce jest ograniczony.

Podłoga rusztowa: przeprowadzić zabieg na całej powierzchni podłogi w ciągu pierwszych kilku dni (do 3 dni) po usunięciu obornika, ale dopiero gdy zacznie się gromadzić jego nowa warstwa.

W hodowlach małych przeżuwaczy (np. owiec i kóz) trzymanych na miękkiej ściółce: larwy mogą znajdować się na całej powierzchni boksu/kojca, dlatego należy zastosować produkt na całej powierzchni. Produkt należy stosować w razie potrzeby w narożnikach lub wokół poideł i karmideł.

Pomieszczenia hodowlane dla trzody chlewnej

Hodowla w systemie „all-in, all-out" (pełnej rotacji): zabieg należy przeprowadzić w ciągu pierwszych kilku dni (do 3 dni) po usunięciu obornika, ale dopiero gdy zacznie się gromadzić jego nowa warstwa.

Podłoga rusztowa: przeprowadzić zabieg na całej powierzchni podłogi w ciągu pierwszych kilku dni (do 3 dni) po usunięciu obornika, ale dopiero gdy zacznie się gromadzić jego nowa warstwa.

Głęboka ściółka: zabieg należy przeprowadzić w ciągu pierwszych kilku dni (do 3 dni) po usunięciu obornika, ale dopiero gdy zacznie się gromadzić jego nowa warstwa. Produkt należy stosować wzdłuż ścian, obrzeży i stref zalewania wokół karmideł, poideł i miejsc gromadzenia się obornika. Miejsca lęgowe much znajdują się prawdopodobnie tam, gdzie obornik nie jest ubity, zwłaszcza wzdłuż ścian lub ogrodzeń, ponieważ rozwój larw much w ubitej ściółce jest ograniczony.

Pomieszczenia hodowlane dla drobiu (niosek, brojlerów, stada zarodowe lub reprodukcyjne)

Głębokie kanały (w systemie klatkowym), podłoga rusztowa, składowanie obornika: zabieg należy przeprowadzić na całą powierzchnię, na której zbiera się obornik, w ciągu pierwszych kilku dni (do 3 dni) po usunięciu obornika, ale dopiero gdy zacznie się gromadzić jego nowa warstwa.

Rozkładanie ściółki: nanieść na wilgotne miejsca, w których rozwijają się larwy, takie jak strefy wokół poideł i karmideł, lub w miejscach, w których dochodzi do wyciekania wody (spadania skondensowanej pary, wyciekania wody z rur wodociągowych itp.).

Przenośniki do usuwania obornika: obornik należy usuwać poza teren zakładu w odstępach czasowych wystarczających do uniknięcia rozwoju larw. Może dojść do rozlania się obornika na podłogę lub zbierania się go w narożnikach, co ułatwia rozwój larw. Zabieg należy przeprowadzić poprzez wylewanie roztworu na te miejsca.

Pozostały drób (indyki, kaczki, gęsi)

Rozkładanie ściółki: nanieść roztwór na wilgotne miejsca, w których rozwijają się larwy, np. strefy wokół poideł i karmideł, lub w miejscach, w których dochodzi do wyciekania wody (spadania skondensowanej pary, wyciekania wody z rur wodociągowych itp.).

Strefy rusztowe: należy nanieść roztwór na całą powierzchnię, na której zbiera się obornik, w ciągu pierwszych kilku dni (do 3 dni) po usunięciu obornika, ale dopiero gdy zacznie się gromadzić jego nowa warstwa. Produkt należy zastosować ponownie, ilekroć poziom obornika wzrośnie o 10 cm.

Pomieszczenia hodowlane dla królików

Głębokie kanały gnojowe, składowanie obornika: należy nanieść roztwór na całą powierzchnię, na której zbiera się obornik, w ciągu pierwszych kilku dni (do 3 dni) po usunięciu obornika, ale dopiero gdy zacznie się gromadzić jego pierwsza warstwa. Należy zastosować ponownie, ilekroć poziom obornika wzrośnie o 10 cm.

Mechaniczne systemamy usuwania obornika: obornik należy usuwać poza teren zakładu w odstępach czasowych wystarczających do uniknięcia rozwoju larw. Może dojść do rozlania się obornika na podłogę lub zbierania się go w narożnikach, co ułatwia rozwój larw. Zabieg należy przeprowadzić poprzez wylewanie roztworu na te miejsca.

5.2. **Środki zmniejszające ryzyko**

1) Do mieszania i ładowania zaleca się stosowanie aplikatora (np. miarki lub zlewki).

2) Należy stosować następujące środki ograniczenia ryzyka bez uszczerbku dla stosowania przez pracodawców dyrektywy Rady 98/24/WE i innych przepisów unijnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

   a) Podczas obchodzenia się z produktem należy stosować rękawice ochronne odporne na chemikalia, spełniające wymagania normy europejskiej EN 374 lub równoważnej (materiał, z którego muszą być wykonane rękawice, zostanie określony przez posiadacza zezwolenia na produkt w informacji o produkcie).

   b) Podczas stosowania produktu należy używać odpowiednie chemicznymi obuwie ochronne odporne na chemikalia zgodne z normą europejską EN 13832 lub równoważne.

   c) Do celów dalszej obsługi ręcznej obornika należy nosić rękawice ochronne odporne na chemikalia zgodne z normą europejską EN 374 lub równoważne, kombinezon ochronny zgodny z normą europejską EN 13034 (co najmniej typ 6) lub równoważne oraz odpowiednie obuwie ochronne odporne na chemikalia zgodne z normą europejską EN 13832 lub równoważne.

3) Nie stosować bezpośrednio na zwierzęta.

4) Nie stosować na paszę, wodę pitną i karmidła.

5) Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6) Nie stosować w miejscach dostępnych dla osób postronnych.

7) Nie stosować w wylęgarniach ani innych pomieszczeniach wylęgowych dla kurcząt.

8) Nie stosować w budynkach dla zwierząt gospodarskich, w przypadku których nie można zapobiec ryzyku kontaktu z oczyszczalnią ścieków lub bezpośredniej emisji do wód powierzchniowych.

5.3. **Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**

1) Nie usuwać produktu biobójczego ani rozcieńczonego produktu biobójczego do kanalizacji lub wód.

2) Dokładnie zwilżyć materiał stały, aby zapobiec jego zdmuchnięciu.

3) Zebrać materiał mechanicznie i umieścić w odpowiednim pojemniku w celu utylizacji.

4) W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć skórę wodą. W razie wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

5) W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: W razie wystąpienia objawów przemyć oczy wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

6) W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W razie wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

7) W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W razie wystąpienia objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

5.4. **Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**

1) Pozostałości produktu biobójczego należy usuwać zgodnie z przepisami krajowymi i regionalnymi.

   Z pojemnikami zawierającymi pozostałości produktu należy postępować odpowiednio.

2) Przechowywać produkty biobójcze w oryginalnych pojemnikach. Nie mieszać z innymi odpadami.

5.5. **Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

1) Okres trwałości: 60 miesięcy

2) Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt.

Rozdział 6.**INNE INFORMACJE**

W odniesieniu do punktu „Kategoria(-e) użytkowników": Użytkownicy profesjonalni (w tym użytkownicy przemysłowi) oznaczają przeszkolonych użytkowników profesjonalnych, jeżeli wymagają tego przepisy krajowe.

Pełne tytuły wskazanych norm EN i przepisów o których mowa w rozdziale 5.2

EN 374 – Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.

EN 13832 – Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi

EN 13034 – Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed chemikaliami, zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6]).

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11).

(1) Instrukcje stosowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych zezwoleniem.