Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 337/2011

(2011. gada 7. aprīlis)

par atļauju izmantot endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparātu kā barības piedevu mājputniem, atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām (atļaujas turētājs ir ►M1 *Danisco (UK) Ltd*, kas veic uzņēmējdarbību kā *Danisco Animal Nutrition* un ko pārstāv *Genencor International B.V.* ◄)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 94, 8.4.2011., 19. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/221 (2019. gada 6. februāris)	L 35	28	7.2.2019.

▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 337/2011

(2011. gada 7. aprīlis)

par atļauju izmantot endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparātu kā barības piedevu mājputniem, atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām (atļaujas turētājs ir ►M1 *Danisco (UK) Ltd*, kas veic uzņēmējdarbību kā *Danisco Animal Nutrition* un ko pārstāv *Genencor International B.V.* ◄)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Pielikumā raksturoto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "gremošanas veicinātāji", ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku sugas vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības ar 12 % mitrumu			
Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a15	►**M1** *Danisco (UK) Ltd*, kas veic uzņēmējdarbību kā *Danisco Animal Nutrition* un ko pārstāv *Genencor International B.V.* ◄	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8. Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6.	*Piedevas sastāvs* No *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts (cietā un šķidrā veidā) un no *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) iegūta endo-1,3(4)-beta-glikanāze ar minimuma aktivitāti attiecīgi 12 200 U ([1])/g un 1 520 U ([2])/g. *Darbīgās vielas raksturojums* No *Trichoderma reesei* (ATCC PTA 5588) iegūta endo-1,4-beta-ksilanāze un no *Trichoderma reesei* (ATCC SD 2106) iegūta endo-1,3(4)-beta-glikanāze. *Analīžu metodes* ([3]) Piedevā, premiksos un barības vielās iekļautās darbīgās vielas raksturojums: — kolorimetriskā metode, ar ko nosaka ūdenī šķīstošas krāsvielas daudzumu, kuru endo-1,4-β-ksilanāze izdala no kviešu arabinoksilāna substrātiem, kas saistīti ar azurīnu, — kolorimetriskā metode, ar ko nosaka ūdenī šķīstošas krāsvielas daudzumu, kuru endo-1,3(4)-β-glikanāze izdala no miežu betaglikāna substrātiem, kas saistīti ar azurīnu.	Gaļas tītari un vaislas tītari Dējējvistas	—	endo-1,4-beta-ksilanāze 1 220 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze 152 U	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Izmantošanai lopbarībā, kurā ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt beta-glikānu un arabinoksilānu), piemēram, tādā, kas satur vairāk nekā 30 % kviešu, miežu, rudzu un/vai tritikāli. 3. Drošības apsvērumi: rīkojoties ar piedevu, jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi. 4. Atšķirtiem sivēniem līdz 35 kg.	2021. gada 28. aprīlis
				Pārējie mājputni Sivēni (atšķirti) Nobarojamās cūkas		endo-1,4-beta-ksilanāze 610 U endo-1,3(4)-beta-glikanāze 76 U			

([1]) 1 U ir fermenta daudzums, kas no kviešu arabinoksilāna vienā minūtē pie pH 4,2 un 50 °C izdala 0,48 μmol reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentos).
([2]) 1 U ir fermenta daudzums, kas no miežu glikāna vienā minūtē pie pH 5,0 un 50 °C izdala 2,4 μmol reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentos).
([3]) Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Eiropas Savienības references laboratorijas barības piedevu jomā tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.