Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1847/2003

2003 m. spalio 20 d.

dėl laikinųjų leidimų naudoti pašarų priedus naujai paskirčiai ir ilgalaikių leidimų patvirtintiems pašarų priedams

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 269, 2003 10 21, p. 3)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1018/2012	L 307	56	2012 11 7
►M2	2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/347	L 67	21	2018 3 9

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1847/2003

2003 m. spalio 20 d.

dėl laikinųjų leidimų naudoti pašarų priedus naujai paskirčiai ir ilgalaikių leidimų patvirtintiems pašarų priedams

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede nurodytą „Fermentų“ grupei priklausantį priedą leidžiama naudoti kaip pašarų priedą šio reglamento priede nurodytomis sąlygomis.

▼M2

_____

▼B

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

I PRIEDAS

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūnų rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimas galioja iki
					Aktyvumo vienetų/kg visaverčio pašaro			
„**Fermentai**								
14	Endo-1,4-beta-ksilanazė EB 3.2.1.8	Endo-1,4-bet-ksilanazės, gautos iš *Aspergillus niger* (CBS 520.94) preparatas, kurio aktyvumas ne mažesnis kaip: kieto pavidalo: 600 U/g ([1]) skysto pavidalo: 300 U/ml	Penimi kalakutai	—	300 U	—	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Vienam kg visaverčio pašaro rekomenduojama norma: 300–1 200 U 3. Skirtas naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose gausu nekrakmolinių polisacharidų (daugiausia arabinoksilanų), pvz., turinčiuose daugiau kaip 40 % kviečių	2007 10 24

([1]) vienas U – tai fermento kiekis, kuris esant pH 5,3 ir 50 °C temperatūrai per minutę iš bero medienos ksilano atpalaiduoja 1 μmol ksilozės.“

▼M2

—————