C/2024/2110

11.3.2024 г.

Публикация на заявление за регистрация на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(C/2024/2110)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета ([1]) в срок от три месеца от датата на нейното публикуване.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„ISTARSKI MED / ISTRSKI MED“

ЕС №: PDO-HR+SI-2833 — 14.3.2022 г.

ЗНП (X) ЗГУ ()

1. **Наименование/наименования [на ЗНП или ЗГУ]**

„Istarski med / Istrski med“

2. **Държава членка или трета държава**

Република Хърватия и Република Словения

3. **Описание на селскостопанския продукт или храната**

3.1. *Вид продукт*

Клас 1.4. Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти, с изключение на масло, и др.).

3.2. *Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1*

„Istarski med“/ „Istrski med“ е мед, произвеждан от медоносни пчели *Apis mellifera* от нектара на медоносни растения или от секрети на живите части на растенията, или от екскретите на смучещите насекоми по растенията, които пчелите събират, трансформират чрез комбиниране със специфични вещества от организма си, отлагат, дехидратират, складират и съхраняват във восъчни пити за узряване.

Физикохимични характеристики:

— Съдържание на вода: ≤ 18,6 %

— Диастазна активност ≥ 10, с изключение на меда от бяла акация, който е ≥ 3 по скалата на Шаде

— Съдържание на хидроксиметилфурфурол (HMF) ≤ 15,0 mg/kg

Мелисопалинологични характеристики:

Поленовият спектър на „Istarski med“ / „Istrski med“ трябва да отразява растителността на района, определен в точка 4. В зависимост от вида на меда, голяма част от поленовия спектър се състои от пчелен прашец от нектарни растителни видове от следните семейства: *Fabaceae, Sapindaceae, Rhamnaceae, Cornaceae, Brassicaceae, Loranthaceae, Malvaceae, Liliaceae, Lamiaceae, Fagaceae, Rosaceae, Apiaceae, Salicaceae, Adoxaceae, Ericaceae, Asteraceae, Oleaceae, Araliaceae, Ranunculaceae, Asphodelaceae, Anacardiaceae*. Възможно е да има и малки количества пчелен прашец от нектарни растителни видове от следните семейства: *Aquifoliaceae, Boraginaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae, Scrophulariaceae, Urticaceae, Campanulaceae, Fumariaceae* и др.

([1]) ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

В „Istarski med“ / „Istrski med“ може да има и пчелен прашец от ненектарни растителни видове от следните семейства: *Quercus* spp., *Fraxinus* spp., *Helianthemum* spp., *Papaver* spp., *Plantago* spp., *Betula* spp., *Alnus* spp., *Carex* spp., *Pinus* spp., *Cistus* spp., Poaceae и Pinaceae, *Fragaria vesca, Cupressus sempervirens, Olea europaea, Filipendula ulmaria, Vitis vinifera, Corylus avellana* и други в по-малки процентни дялове.

Физикохимични характеристики:

Вид пчелен мед	Електропроводимост
Мед от бяла акация	≤ 0,25 mS/cm
Мед от градински чай	0,20–0,55 mS/cm
Мед от кестен	≥ 0,8 mS/cm
Цветен мед	≤ 0,8 mS/cm
Манов мед от широколистни растения	≥ 0,8 mS/cm
Мед от зимна чубрица	≤ 0,8 mS/cm
Мед от липа	0,5–1,1 mS/cm

Мелисопалинологични характеристики:

	Описание
Мед от бяла акация	Той трябва да съдържа пчелен прашец от бяла акация (*Robinia pseudoacacia* L.), като може да се появи и съпътстващ пчелен прашец от следните растения: Rosaceae, Fabaceae, *Cornus sanguinea*, *Prunus* spp., Poaceae, *Salix* spp., *Fragaria vesca*, *Quercus* spp., *Fraxinus* spp., *Lotus* spp., *Ligustrum vulgare*, *Helianthemum* spp. Може да се появи изолиран пчелен прашец от следните растения: *Cornus mas*, *Aesculus hippocastanum*, Apiaceae, *Loranthus europaeus*, *Acer* spp., *Pinus* spp., *Plantago* spp. *Filipendula ulmaria*, *Castanea sativa*, Lamiaceae, Brassicaceae, *Asparagus* spp., *Tilia* spp., *Taraxacum officinale*, *Phacelia tanacetifolia*, *Paliurus spina christi*, *Olea europea*, Asteraceae (род *Solidago*).
Мед от градински чай	Той трябва да съдържа най-малко 15 % пчелен прашец от градински чай (*Salvia officinalis* L.). Може да се появи съпътстващ пчелен прашец от следните растения: Rosaceae, *Robinia pseudoacacia*, *Quercus* spp., *Prunus* spp., *Paliurus spina christi*, *Olea europea*, *Ligustrum vulgare*. Може да се появи изолиран пчелен прашец от следните растения: Poaceae, *Pistacia* spp., Lamiaceae, *Filipendula ulmaria*, *Cornus sanguinea*.
Мед от кестен	Той трябва да съдържа най-малко 85 % пчелен прашец от сладък кестен (*Castanea sativa* Mill.). Може да се появи изолиран пчелен прашец от следните растения: *Paliurus spina christi*, Fabaceae, Rosaceae, *Pistacia* spp., *Prunus* spp., *Salix* spp.
Цветен мед	Той може да съдържа различно съотношение на пчелен прашец от следните растения: Fabaceae, Rosaceae, *Quercus* spp., *Prunus* spp., Poaceae, *Paliurus spina christi*, *Acer* spp., fungal spores, *Salix* spp., Apiaceae, *Robinia pseudoacacia*, *Fraxinus* spp., *Fragaria vesca*, *Cornus sanguinea*, *Lotus* spp., *Lamiaceae*, *Castanea sativa*, *Aesculus hippocastanum*.

Манов мед от широколистни растения	Съотношението между броя на мановите елементи (гъбични спори, части от хифи, зелени водорасли) и поленовите зърна на нектарните растителни видове трябва да бъде най-малко 1,5, с променливо съотношение на пчелния прашец от следните растения: Fabaceae, *Castanea sativa*, Rosaceae, *Salix* spp., *Paliurus spina christi*, *Robinia pseudoacacia*, *Cornus sanguinea*, *Prunus* spp., *Lotus* spp., Poaceae, *Quercus* spp., *Olea europea*, *Fraxinus* spp., *Filipendula ulmaria*, *Fragaria vesca*, Asteraceae (род *Solidago*), Apiaceae, *Tilia* spp., *Taraxacum officinale*, *Pinus* spp., *Loranthus europaeus*, Liliaceae, *Ligustrum vulgare*, Lamiaceae, *Helianthemum* spp., *Cornus mas*, Brassicaceae, Asteraceae (род *Taraxacum*), *Acer* spp.
Мед от зимна чубрица	Той трябва да съдържа най-малко 20 % пчелен прашец от зимна чубрица (*Satureja montana* L.). Може да се появи съпътстващ пчелен прашец от следните растения: *Hedera helix*, *Satureja montana*, Fabaceae, *Tilia* spp., Rosaceae. Може да се появи изолиран пчелен прашец от следните растения: *Castanea sativa*, *Echium vulgare*, *Filipendula ulmaria*, Liliaceae, Poaceae, Asteraceae (род *Solidago*), Asteraceae (род *Taraxacum*), *Centaurea jacea*, *Fragaria vesca*.
Мед от липа	Той трябва да съдържа най-малко 25 % липов (*Tilia* sp.) пчелен прашец. Може да се появи съпътстващ пчелен прашец от следните растения: Rosaceae, *Quercus* spp., Poaceae, *Paliurus spina christi*, Fabaceae, *Castanea sativa*, *Fraxinus* spp., Asteraceae (род *Solidago*). Може да се появи изолиран пчелен прашец от следните растения: *Vitis vinifera*, *Trifolium* spp., *Sambucus nigra*, *Ranunculus* spp., *Phacelia tanacetifolia*, Liliaceae, *Helichrysum italicum*, *Helianthus annuus*, *Centaurea* spp., *Centaurea jacea*, *Carex* spp., Asteraceae, Apiaceae.

Органолептични характеристики:

	Цвят	Мирис	Вкус
Мед от бяла акация	яркожълт до жълт, почти безцветен	лек, на необработена пчелна пита, пресен восък и цвят от бяла акация	сладък до много сладък, краткотраен
Мед от градински чай	червено-кафяв, оранжево-червен, жълтеникаво-червен, кехлибарен, със зеленикав оттенък	на дървесина, приятен	леко тръпчив, траен, сладък, леко горчив
Мед от кестен	червеникаво-кафяв	умерено наситен до наситен, на цвят на кестен	наситен, горчив до много горчив, дълготраен умерено сладък до сладък
Цветен мед	жълт до тъмно кехлибарен	приятен, цветен, на задушени плодове, ливадни цветя, восък и захар може да бъде остър	сладък до много сладък, леко кисел до кисел, дълготраен
Манов мед от широколистни растения	светлокафяв до тъмночервеникаво-кафяв	на дървесина и карамел, наситен	леко тръпчив, на дървесина или карамел, умерено сладък
Мед от зимна чубрица	кехлибарен червеникав	на сушени плодове	сладък, дълготраен и леко кисел
Мед от липа	жълт до кехлибарен	изразен, освежаващ, на липов цвят, ментол, лимонова кора и дървесина	умерено сладък, леко кисел, леко до умерено горчив, освежаващ, дълготраен

3.3. *Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)*

—

3.4. *Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район*

Всички етапи на производството — от пашата на пчелите до ваденето на меда — трябва да се извършват в рамките на географския район.

3.5. *Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование*

Опаковането на „Istarski med“ / „Istrski med“ се извършва изключително в рамките на географския район, посочен в точка 4, основно за да се гарантира проследяването на продукта, а оттам и неговата автентичност и неговите специфични характеристики. Това помага да се сведе до минимум възможността за фалшифициране на продукта чрез смесване с подобни продукти, което е по-вероятно, ако опаковането се извършва извън определения географски район.

3.6. *Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование*

Когато продуктът се пуска на пазара в предварително опакован вид, наименованието „Istarski med“ или „Istrski med“ трябва да бъде изписано с по-големи букви от всяко друго наименование върху предварително опакования продукт. Етикетирането трябва да включва и печат с пореден идентификационен номер и общ символ (лого).

Всички ползватели на защитеното наименование за произход „Istarski med“ / „Istrski med“, които пускат продукта на пазара в съответствие с настоящата спецификация, имат право да използват печата при същите условия.

Общият символ е капка мед, оцветена в редуващи се сиви и черни хоризонтални ивици, на фона на жълт шестоъгълник, който изобразява стилизирана пчелна пита. Под шестоъгълника с главни букви е изписано „ISTARSKI MED“ в хърватския вариант (фигура 1) и „ISTRSKI MED“ в словенския вариант (фигура 2).

Фигура 1



Фигура 2



4. **Кратко определение на географския район**

Районът на производство на „Istarski med“ / „Istrski med“ в Хърватия е полуостров Istria и неговите острови в окръг Istria, също така общините Opatija, Lovran, Mošćenička Draga и Matulji, островите Cres и Lošinj и по-малките острови Unije, Ilovik, Susak и Vele Srakane, както и редица необитаеми островчета. В Словения районът на производство включва региона на словенската част от Istria, която се състои от общините Koper, Izola, Piran и Ankaran.

В Словения границите на района на производство съвпадат със северната граница на общините Ankaran и Koper, която се простира от граничния пункт Lazaret/Lazzaretto на словенско-италианската граница до границата между общините Koper и Sežana до природния парк Dolina Glinščice/Val Rosandra. Географският район продължава по границата между общините Koper и Sežana южно от село Ocizla и северно от село Črnotiče, след което се спуска към природния парк Slavnik и преминава покрай североизточния му край до границата с Хърватия.

5. **Връзка с географския район**

5.1 *Специфична характеристика на географския район*

Istria се характеризира с богата и разнообразна флора благодарение на редица благоприятни обстоятелства, характерни за района. Първото от тях е географското положение на Istria, следвано от неговия климат, релеф, петрографска основа и почва.

Географският район се характеризира също и със специфични климатични условия; климатът е много разнороден, най-вече поради факта, че като полуостров Istria е заобиколен от три страни от море, но също така и поради това, че се намира в северния край на Адриатическо море, на кръстопътя между Средиземноморието и континенталната част на Евразия. В зависимост от географската ширина и характеристиките на релефа Istria се разделя на три климатични зони. Централната и южната крайбрежна част се характеризират със средиземноморски климат, докато северната част и частта по-навътре в сушата се характеризират с умерено топъл, влажен климат с горещо лято. В северната, континентална част преобладава субсредиземноморският климат.

Различните видове „Istarski med“ / „Istrski med“ се различават в зависимост от растителните съобщества, които на свой ред се променят в зависимост от взаимодействието между климата, почвата и релефа. В географско отношение Istria е разположен на границата между Средиземно море и Динарските и Алпийските планински масиви, така че по отношение на растителността той се характеризира с флората на тези райони. Поради това на полуостров Istria има няколко растителни зони и тази разнообразна растителност е важна основа за производството на различните видове „Istarski med“ / „Istrski med“. Тясна ивица покрай морето образува зона с вечнозелени гори от каменен дъб и храсти — растителен свят, характерен за средиземноморския регион. Широколистните гори от каменен дъб и ориенталски габър са най-често срещаната форма на горска растителност в Istria, разпространена в по-голямата част от континенталната част на Istria, от пояса на вечнозелената растителност, до който се простират, чак до централните части на Istria. Този вид растителност е доминиран от косматия дъб или от обикновения дъб, като двата заедно представляват значителен източник на мана. Кестенови дървета се срещат по склоновете на Učka, над Lovran, както и в Западна Istria (Bujština), главно в горите от ориенталски габър и космат дъб, поради дълбоките кисели почви, образувани върху бившите червени почви. Тези насаждения от сладък кестен осигуряват достатъчни количества нектар, което поставя определения район в категорията на все още добре запазените хърватски райони, където е възможно да се произвежда кестенов мед, който е изключително едноцветен. В югоизточните части на Istria са разпространени лечебни растения от рода на лечебния градински чай и вълнестата медовица, които се използват като растения за паша, осигуряват значителни количества нектар и гарантират производството на най-ценения вид мед, характерен за средиземноморския климат — мед от градински чай. Същевременно този район е най-северната точка, където лечебният градински чай е широко разпространен в естествената си форма. Районът на косматия дъб и блатните треви е най-разнообразната част от Istria по отношение на растителността. По-голямата част от насажденията от бяла акация се намират в централната и северната част, но някои от тях се простират и по-далеч в средиземноморската климатична зона, където се съчетават със средиземноморската флора, за да осигурят нектарни ресурси. Всичко това, заедно с основните растителни видове, оказва влияние върху спецификата на меда от бяла акация.

В описанието на флората на архипелага Cres-Lošinj, Wallnöfer (2008 г.) посочва, че от 1 130 регистрирани таксона 253 са съобщени само за Cres, а 273 — само за Lošinj. В северната субсредиземноморска част на остров Cres най-значимите съобщества на скалистата растителност са пасищата от лечебен градински чай и съобществата от овсига и коелерия. Районът на Osoršćice наброява около 700 растителни вида, което представлява две трети от общата флора на Lošinj.

Miloš Furlan (2007 г.) казва за характеристиките на пчелните пасища в словенската част на Istria, че „районът разполага с почти всички типични сезонни пасища, от раннопролетните до основните пасища от бяла акация (акация) и сладък кестен и есенните пасища на есенната растителност, последвани от появата на мана по дърветата и възможността за събиране на сладки вещества по различни зрели плодове, като смокини, грозде и други подобни.“

5.2 *Специфична характеристика на продукта*

Спецификата на „Istarski med“ / „Istrski med“ се дължи на природните ресурси, на които се основава производството му. Като рядък хранителен продукт медът, поради своята специфика (наличието на поленови зърна), представлява добра илюстрация на района, в който се произвежда. Разположен на границата на два биогеографски региона — средиземноморски и континентален — Istria е изключителен район по отношение на флората.

В меда от бяла акация се открива голям процентен дял на пчелен прашец от следните растителни видове: *Fraxinus*, растения от семейство Rhamnaceae, *Salix*, *Loranthus europaeus*, *Cotinus coggyria*, *Prunus* f., *Vicia*, *Trifolium pratense* gr., *Coronilla*/*Hippocrepis*, *Chamaerops* и *Filipendula*, като се има предвид, че различни проучвания показват, че характерният дял на пчелния прашец на бялата акация варира от 7 % до 60 %, така че при определянето на произхода се обръща внимание на идентифицирането на специфични физични или химични характеристики.

Допълнително потвърждение на произхода на пробите от мед от бяла акация бяха установените много ниски стойности на електропроводимост (0,11—0,18 mS/cm), тъй като тези стойности са типични за меда от бяла акация.

Наблюдава се и пълна липса на кристализация на меда — свойство, което обикновено се свързва с наличието на рапичен нектар. Като се има предвид потвърдената липса на поленови зърна от рапица, можем да заключим, че това е специфична характеристика на меда от бяла акация от полуостров Istria.

Известно е, че медът от кестен има голямо количество пчелен прашец, който винаги съставлява повече от 90 % в пробите от Istria. Освен това поленовият спектър на кестеновия мед от Istria се различава от този на меда, произведен в съседните страни, като например в алпийския регион на Италия, където преобладава прашецът на растителни видове от планинската растителност, като например растения от семействата *Ericaceae* и *Tilia*.

Откритият пчелен прашец в пробите от цветен мед произхожда в значителна степен от *Castanea* и *Prunus* f. и в по-малка степен от *Rubus* f, *Clematis*, *Castanea*, *Brassica* f., Umbelliferae/Apiaceae, растения от семейство Rhamnaceae, *Trifolium repens* gr., *Vicia*, *Melilotus* и *Coronilla/Hippocrepis*. Спецификата на поленовия спектър се потвърждава и от наличието на пчелен прашец от следните растителни видове, които обикновено се срещат в района: *Ailanthus*, *Loranthus*, *Asparagus acutifolius*, *Aesculus* и *Cotinus coggyria*.

Освен нектарните видове мед пчеларите в Istria произвеждат и манов мед от широколистни растения, който има специфични характеристики. Анализите на проби от мед показват, че съотношението между мановите елементи и поленовите зърна от нектарни растителни видове варира от 2,03 до 29,3, като средната стойност е 8,2, което е много по-голямо от стойностите, необходими за класифицирането на мановия мед (> 3). По подобен начин мелисопалинологичните анализи потвърждават характерен поленов спектър, в който присъства и пчелен прашец от ненектарни растителни видове, като *Fraxinus*, *Quercus*, *Plantago* и Gramineae/Poaceae. Освен това характерният поленов спектър на нектарните растителни видове включва растения от семейство Rhamnaceae и *Prunus* f., които присъстват в 100 % от пробите, следвани от *Castanea*, *Rubus* f., *Compositae* T, *Brassica* f., *Asparagus acutifolius* и *Clematis*, докато процентният дял на пчелен прашец от *Cotinus coggyria* и *Aesculus* е малко по-нисък.

Спецификата на меда от градински чай от Istria се изразява в неговия ботанически произход и по-голямото присъствие на пчелен прашец от *Robinia pseudoacacia*, Rosaceae, *Ligustrum vulgare*, Fabaceae, Ericaceae, *Acer* spp., *Lotus* spp. и *Salix* spp. Той се различава от меда от градински чай от местата по северното крайбрежие на Адриатическо море, където по-голямата част от открития пчелен прашец произхожда от Rhamnaceae, *Acer* spp., *Castanea sativa*, *Myosotis* spp., *Prunus* spp. и *Rubus* spp., като същевременно поленовият спектър в Dalmatia се характеризира с наличието на пчелен прашец от *Paliurus spina christi*, *Erica arborea*, *Trifolium pratense*, *Melilotus* spp., *Centaurea jacea* и Apiaceae.

Въз основа на поленовия спектър, открит в анализираните проби от мед от зимна чубрица, беше установено, че голяма част от пчелния прашец произхожда от *Hedera helix*, Fabaceae, *Tilia* spp., Rosaceae, *Castanea sativa*, *Echium vulgare* и Liliaceae. Това се различава значително от пробите мед от Испания, в които преобладава пчелният прашец от *Diplotaxis* spp., *Onobrychis vicifolia*, *Centaurea* spp., *Lavandula latifolia*, *Thymus* spp. и Apiaceae.

Анализите на проби от липов мед показват, че голяма част от пчелния прашец произхожда от Rosaceae, *Paliurus spina christi*, Fabaceae, *Castanea sativa*, Asteraceae (род *Solidago*), Liliaceae, *Centaurea* spp. и Asteraceae. При сравнение на посочените растителни видове се вижда ясно, че те се различават от тези, установени в липовия мед от Италия, където по-голямата част от открития пчелен прашец произхожда от *Rubus* spp., *Trifolium repens*, *Robinia pseudoacacia*, *Ailanthus altissima*, *Amorpha* spp. и *Acer* spp., докато поленовият спектър на липовия мед от Румъния се характеризира с наличието на пчелен прашец от *Brassica napus*, *Helianthus annuus*, *Melilotus* spp. и *Solidago* spp.

Тези научни изследвания и анализи, при които се установява комбинация от пчелен прашец от континентални и средиземноморски растителни видове, показват, че „Istarski med“ / „Istrski med“ се различава от меда, произведен в други райони. Съотношението на пчелния прашец от различни растителни видове също допринася за специфичните физико-химични и органолептични характеристики (цвят, вкус, мирис) на „Istarski med“ / „Istrski med“ в сравнение със същите видове мед от други географски райони. „Istarski med“ / „Istrski med“ се характеризира също така със своята свежест (максимална стойност на HMF 15,0 % mg/kg) и съдържание на вода до 18,6 %. За да се запазят тези свойства, „Istarski med“ / „Istrski med“ не се подлага на интензивна топлинна обработка, което гарантира запазването на свойствата му, произтичащи от специфичната флора в района на производство.

5.3 *Причинно-следствена връзка между спецификата на географския район и спецификата на продукта*

Istria е уникален агроекологичен район, който е много разнообразен по отношение на релефа, почвите, геоморфологията и климата. Взаимодействието на тези фактори води до типичен флористичен състав, който е в основата на производството на различни видове мед. Разнообразието и богатството на този растителен състав влияят пряко върху спецификата на „Istarski med“ / „Istrski med“, която се изразява в специфичните му вкусове и миризми. Процентните съотношения на пчелен прашец от различни растения, открити в някои видове мед, им придават специфични органолептични характеристики (цвят, мирис и вкус), които се различават от пробите от същия вид мед от други географски райони. С течение на времето пчеларите от Istria са допринесли за специфичните свойства на меда, като са се запознали с ботаническия състав и климатичните характеристики на различните микрорайони, което им е позволило да следят по-точно фазите на жизнения цикъл на определени медоносни растения. Наблюдавайки внимателно природата и климата, пчеларите в Istria могат да определят точно къде и кога да разположат пчелните си кошери или кога да започнат да вадят меда, за да постигнат типичния характер и висока степен на чистота на нектара. Тези практики допринасят за изключително едноцветния характер на меда. Спецификата на почвено-климатичните условия на района на производство, дългогодишният опит на пчеларите и традицията на производство, датираща от началото на миналия век и предавана от поколение на поколение, в крайна сметка превръщат „Istarski med“ / „Istrski med“ в разпознаваем продукт сред потребителите.

Препратка към публикуваната спецификация

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Specifikacija%20Istarski%20med%2026-4-2023.doc

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-IZBRANA-KAKOVOST/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-ZASCITENIH-KMETIJSKIH-PRIDELKOV/Istrski_med_Istarski_med.pdf