C/2024/2110

11.3.2024

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering af en betegnelse i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

(C/2024/2110)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 ([1]), senest tre måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse.

ENHEDSDOKUMENT

"ISTARSKI MED / ISTRSKI MED"

EU-nr.: PDO-HR+SI-2833 – 14.3.2022

BOB (X) BGB ()

1. **Betegnelse [på en BOB eller BGB]**

"Istarski med / Istrski med"

2. **Medlemsstat eller tredjeland**

Republikken Kroatien og Republikken Slovenien

3. **Beskrivelse af landbrugsprodukteller fødevaren**

3.1. *Produkttype*

Kategori 1.4. Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør m.m.)

3.2. *Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1*

"Istarski med" / "Istrski med" er en honning, der frembringes af *Apis mellifera*-bier på grundlag af nektar fra biplanter eller udsvedning fra planters levende dele eller ekskrementer fra plantesugende insekter på planters levende dele, som bierne opsuger, omdanner ved at blande dem med deres egne særlige stoffer, oplagrer, tørrer, deponerer og lader modne i honningtavler.

Fysisk-kemiske egenskaber:

— Vandindhold ≤ 18,6 %

— Diastatisk indeks ≥ 10, undtagen for akaciehonning, som er ≥ 3 på Schade- skalaen

— HMF ≤ 15,0 mg/kg

Pollenegenskaber:

Pollenspektret i "Istarski med" / "Istrski med" skal afspejle vegetationen i det område, der er afgrænset i punkt 4. Afhængigt af honningtypen udgør pollen fra nektarplantearter i følgende familier en stor del af spektret: *Fabaceae, Sapindaceae, Rhamnaceae, Cornaceae, Brassicaceae, Loranthaceae, Malvaceae, Liliaceae, Lamiaceae, Fagaceae, Rosaceae, Apiaceae, Salicaceae, Adoxaceae, Ericaceae, Asteraceae, Oleaceae, Araliaceae, Ranunculaceae, Asphodelaceae, Anacardiaceae*. Der kan også forekomme små mængder pollen fra nektarplantearter af følgende familier: *Aquifoliaceae, Boraginaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae, Scrophulariaceae, Urticaceae, Campanulaceae, Fumariaceae* m.fl.

([1]) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

Pollen fra ikkenektarplantearter af følgende familier kan også forekomme i "Istarski med" / "Istrski med": *Quercus* spp., *Fraxinus* spp., *Helianthemum* spp., *Papaver* spp., *Plantago* spp., *Betula* spp., *Alnus* spp., *Carex* spp., *Pinus* spp., *Cistus* spp., Poaceae og Pinaceae, *Fragaria vesca, Cupressus sempervirens, Olea europaea, Filipendula ulmaria, Vitis vinifera, Corylus avellana,* og andre i mindre mængder.

Fysisk-kemiske egenskaber:

Honningtype	Elektrisk ledningsevne
Akaciehonning	≤ 0,25 mS/cm
Salviehonning	0,20-0,55 mS/cm
Kastanjehonning	≥ 0,8 mS/cm
Blomsterhonning	≤ 0,8 mS/cm
Honningdughonning fra løvtræer	≥ 0,8 mS/cm
Vintersarhonning	≤ 0,8 mS/cm
Lindehonning	0,5-1,1 mS/cm

Honning-palynologiske egenskaber:

	Beskrivelse
Akaciehonning	Den skal indeholde pollen fra almindelig robinie (*Robinia pseudoacacia* L.), og der kan forekomme ledsagende pollen fra følgende planter: Rosaceae, Fabaceae, *Cornus sanguinea, Prunus* spp., Poaceae, *Salix* spp., *Fragaria vesca, Quercus* spp., *Fraxinus* spp., *Lotus* spp., *Ligustrum vulgare, Helianthemum* spp. Der kan forekomme isoleret pollen fra følgende planter: *Cornus mas, Aesculus hippocastanum*, Apiaceae, *Loranthus europaeus, Acer* spp., *Pinus* spp., *Plantago* spp. *Filipendula ulmaria, Castanea sativa*, Lamiaceae, Brassicaceae, *Asparagus* spp., *Tilia* spp., *Taraxacum officinale, Phacelia tanacetifolia, Paliurus spina christi, Olea europea*, Asteraceae (slægten *Solidago*).
Salviehonning	Den skal indeholde mindst 15 % pollen fra salvie (*Salvia officinalis* L.). Der kan forekomme ledsagende pollen fra følgende planter: Rosaceae, *Robinia pseudoacacia, Quercus* spp., *Prunus* spp., *Paliurus spina christi, Olea europea, Ligustrum vulgare*. Der kan forekomme isoleret pollen fra følgende planter: Poaceae, *Pistacia* spp., Lamiaceae, *Filipendula ulmaria, Cornus sanguinea,*
Kastanjehonning	Den skal indeholde mindst 85 % pollen fra ægte kastanje (*Castanea sativa* Mill.). Der kan forekomme isoleret pollen fra følgende planter: *Paliurus spina christi*, Fabaceae, Rosaceae, *Pistacia* spp., *Prunus* spp., *Salix* spp.
Blomsterhonning	Den kan indeholde varierende mængder pollen fra følgende planter: Fabaceae, Rosaceae, *Quercus* spp., *Prunus* spp., Poaceae, *Paliurus spina christi, Acer* spp., svampesporer, *Salix* spp., Apiaceae, *Robinia pseudoacacia, Fraxinus* spp., *Fragaria vesca, Cornus sanguinea, Lotus* spp., *Lamiaceae, Castanea sativa, Aesculus hippocastanum*

Honningdughonning fra løvtræer	Forholdet mellem antal elementer af honningdug (svampesporer, dele af svampetråde, grønalger) og pollenkorn fra nektarplantearter skal være mindst 1,5 med varierende mængder pollen fra følgende planter: Fabaceae, *Castanea sativa*, Rosaceae, *Salix* spp., *Paliurus spina christi*, *Robinia pseudoacacia*, *Cornus sanguinea*, *Prunus* spp., *Lotus* spp., Poaceae, *Quercus* spp., *Olea europea*, *Fraxinus* spp., *Filipendula ulmaria*, *Fragaria vesca*, Asteraceae (slægten *Solidago*), Apiaceae, *Tilia* spp., *Taraxacum officinale*, *Pinus* spp., *Loranthus europaeus*, Liliaceae, *Ligustrum vulgare*, Lamiaceae, *Helianthemum* spp., *Cornus mas*, Brassicaceae, Asteraceae (slægten *Taraxacum*), *Acer* spp.
Vintersarhonning	Den skal indeholde mindst 20 % pollen fra vintersar (*Satureja montana* L.). Der kan forekomme ledsagende pollen fra følgende planter: *Hedera helix*, *Satureja montana*, Fabaceae, *Tilia* spp., Rosaceae. Der kan forekomme isoleret pollen fra følgende planter: *Castanea sativa*, *Echium vulgare*, *Filipendula ulmaria*, Liliaceae, Poaceae, Asteraceae (slægten *Solidago*), Asteraceae (slægten *Taraxacum*), *Centaurea jacea*, *Fragaria vesca*.
Lindehonning	Den skal indeholde mindst 25 % pollen fra lind (*Tilia* sp.). Der kan forekomme ledsagende pollen fra følgende planter: Rosaceae, *Quercus* spp., Poaceae, *Paliurus spina christi*, Fabaceae, *Castanea sativa*, *Fraxinus* spp., Asteraceae (slægten *Solidago*). Der kan forekomme isoleret pollen fra følgende planter: *Vitis vinifera*, *Trifolium* spp., *Sambucus nigra*, *Ranunculus* spp., *Phacelia tanacetifolia*, Liliaceae, *Helichrysum italicum*, *Helianthus annuus*, *Centaurea* spp., *Centaurea jacea*, *Carex* spp., Asteraceae, Apiaceae.

Organoleptiske egenskaber:

	Farve	Lugt	Smag
Akaciehonning	lys gul til gul, næsten farveløs	mild, af jomfrutavle, frisk voks og akacieblomst	sød til meget sød, flygtig
Salviehonning	rødbrun, orangerød, gulrød, ravgul med grønne strejf	af træ, behagelig	med en let prikkende fornemmelse, holdbar, sød, let bitter
Kastanjehonning	rødbrun	moderat intens til intens, af kastanjeblomst	intens, bitter til meget bitter, meget holdbar moderat sød til sød
Blomsterhonning	gul til mørk ravgul	behagelig, blomsteragtig, af frugtkompot, engblomster, voks og sukker kan være skarp	sød til meget sød, let syrlig til syrlig, holdbar
Honningdughonning fra løvtræer	lys brun til mørk rødbrun	af træ og karamel, intens	med en let prikkende fornemmelse, af træ eller karamel, moderat sød
Vintersarhonning	ravgul rødlig	af tørret frugt	sød, holdbar og let syrlig
Lindehonning	gul til ravgul	markant, forfriskende, af lindeblomst, mentol, citronskræl og træ	moderat sød, let syrlig, let til moderat bitter, forfriskende, holdbar

3.3. *Foder (kun for animalske produkter) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)*

—

3.4. *Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område*

Alle stadier af produktionen, fra biernes træk til udvinding, skal finde sted i det geografiske område.

3.5. *Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til*

"Istarski med" / "Istrski med" må udelukkende emballeres i det afgrænsede geografiske område, der er omhandlet i punkt 4, hovedsagelig for at sikre produktets sporbarhed og dermed dets særlige kendetegn. Dette bidrager til at minimere risikoen for forfalskning af produktet ved blanding med lignende produkter, hvilket er mere sandsynligt, hvis emballeringen finder sted uden for det afgrænsede geografiske område.

3.6. *Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til*

Ved markedsføring af produktet i færdigpakket form skal betegnelsen "Istarski med" eller "Istrski med" angives med større bogstaver end enhver anden betegnelse på færdigpakningen. Mærkningen skal også indeholde et stempel med et progressivt identifikationsnummer og det fælles symbol (logo).

Alle brugere af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Istarski med" / "Istrski med", som markedsfører produktet i overensstemmelse med denne varespecifikation, har ret til at anvende stemplet på samme betingelser.

Det fælles symbol er en dråbe honning, der er farvet i skiftende grå og sorte horisontale striber mod en gul sekskant, der viser en stiliseret honningtavle. Under sekskanten skrives med store bogstaver "ISTARSKI MED" i den kroatiske variant (figur 1) og "ISTRSKI MED" i den slovenske variant (figur 2) med blokbogstaver.

Figur 1



Figur 2



4. **Kort angivelse af det geografiske områdes afgrænsning**

Produktionsområdet for "Istarski med" / "Istrski med" i Kroatien er den istriske halvø og dens øer i Istrien-distriktet efterfulgt af kommunerne Opatija, Lovran, Mošćenička Draga og Matulji, øerne Cres og Lošinj og deres mindre øer Unije, Ilovik, Susak og Vele Srakane samt en række ubeboede øer. I Slovenien omfatter produktionsområdet regionen Slovensk Istrien, som består af kommunerne Koper, Izola, Piran og Ankaran.

I Slovenien løber produktionsområdets grænser sammen med den nordlige grænse for kommunerne Ankaran og Koper, der strækker sig fra grænsen til Lazaret/Lazzaretto på den slovensk-italienske grænse til grænsen mellem kommunerne Koper og Sežana ved siden af naturparken Dolina Glinščice/Val Rosandra. Det geografiske område fortsætter langs grænsen mellem kommunerne Koper og Sežana syd for landsbyen Ocizla og nord for landsbyen Črnotiče ned til Slavnik naturpark og passerer langs den nordøstlige grænse, indtil det når grænsen til Kroatien.

5. **Tilknytning til det geografiske område**

5.1 *Det geografiske områdes egenart*

Istrien er kendetegnet ved en rig og mangfoldig flora takket være en række gunstige forhold i området. Det første er Istriens geografiske beliggenhed og derudover klima- og -terrænforhold, petrografiske forhold og jordbundsforhold.

Det geografiske område har også særlige klimaforhold. Klimaet er meget varierende, hovedsagelig fordi Istrien som halvø er omgivet af hav på tre sider, men også fordi Istrien er beliggende på den nordlige kant af Adriaterhavet ved skillevejen mellem Middelhavet og den kontinentale del af Eurasien. Istrien er opdelt i tre klimazoner ud fra breddegrad og terrænforhold. Det centrale og sydlige kystområde er kendetegnet ved et middelhavsklima, mens det nordlige kystområde og området længere inde i landet har et moderat varmt og fugtigt klima med varme somre. Den nordlige kontinentale del har et fremherskende submiddelhavsklima.

De forskellige typer "Istarski med" / "Istrski med" varierer alt efter plantesamfund, der ligeledes varierer alt efter samspillet mellem klima, jord og terræn. Geografisk ligger Istrien ved skillelinjen mellem Middelhavet og bjergkæderne Dinaric og Alperne, og vegetationen er derfor kendetegnet af floraen i disse regioner. Der er derfor flere vegetationsområder på den istriske halvø, og denne forskelligartede vegetation er et vigtigt grundlag for fremstillingen af de forskellige typer "Istarski med" / "Istrski med". En smal kant langs havet danner et område med stedsegrønne skove med steneg og kratskov, som er en planteverden, der kendetegner Middelhavsområdet. Løvskovene med duneg og orientalsk avnbøg er den mest udbredte form for skovbevoksning i Istrien og er spredt ud over størstedelen af det istriske fastland, lige fra bæltet af stedsegrøn vegetation, som de strækker sig til, til de centrale områder i Istrien. Denne type vegetation domineres af duneg eller stilkeg, som sammen med steneg er en vigtig kilde til honningdug. Kastanjetræer vokser på skråningerne i Učka oven over Lovran og i det vestlige Istrien (Bujština), hovedsagelig i skove med orientalsk avnbøg og duneg, på grund af den dybe sure jord, der dannes oven på den tidligere røde jord. Disse bevoksninger med ægte kastanje giver tilstrækkelige mængder nektar, hvilket placerer det afgrænsede område i en kategori af kroatiske regioner, der stadig er velbevarede, og hvor det er muligt at fremstille kastanjehonning, der er usædvanlig enkeltblomstret. Der er hovedsagelig i sydøstlige dele af Istrien store græsgange med salvie og fjergræs, der anvendes som græsningsplanter og sikrer betydelige mængder nektar til fremstilling af den mest værdsatte type honning, der kendetegner middelhavsklimaet: salviehonning. Samtidig er dette område det nordligste punkt, hvor salvie er udbredt i sin oprindelige form. Området med duneg og blågræs har den mest varierende vegetation i Istrien. De fleste bevoksninger med almindelig robinie ligger i den centrale og nordlige del, men nogle strækker sig længere ud i middelhavsklimazonen, hvor de vokser sammen med middelhavsfloraen som nektarkilder. Dette påvirker sammen med de vigtigste plantearter de særlige kendetegn ved akaciehonning.

I en beskrivelse af Cres-Lošinj-øgruppens flora anfører Wallnöfer (2008), at ud af de 1 130 registrerede taxa blev 253 alene indberettet for Cres og 273 alene for Lošinj. I den nordlige submediterrane del af øen Cres er de vigtigste områder med klippevegetation græsgangene med salvie og området med svingel og koeleria. Området Osoršćice tæller omkring 700 plantearter og tegner sig for to tredjedele af den samlede flora i Lošinj.

Miloš Furlan (2007) anfører, at de særlige kendetegn ved biernes træk i Slovensk Istrien er, at "området har næsten alle de typiske sæsonbestemte græsgange fra tidligt forår til de vigtigste græsgange med almindelig robinie (akacie) og græsgange med ægte kastanje og efterårsgræsgange på efterårsvegetationen efterfulgt af tilsynekomsten af honningdug på træerne og muligheden for at indsamle søde stoffer fra forskellige modne frugter såsom figner, druer og lignende."

5.2 *Produktets egenart*

De særlige kendetegn ved "Istarski med" / "Istrski med" kan tilskrives de naturressourcer, som fremstillingen er baseret på. Som en sjælden fødevare illustrerer honning på grund af sin egenart (tilstedeværelsen af pollenkorn) fint det område, hvor den fremstilles. Istrien, der ligger på grænsen mellem to biogeografiske regioner — Middelhavsområdet og kontinentet— er en usædvanlig region i floramæssig henseende.

Akaciehonning har et stort indhold af følgende plantearter: *Fraxinus*, planter af Rhamnaceae-familien, *Salix*, *Loranthus europaeus*, *Cotinus coggyria*, *Prunus* f., *Vicia*, *Trifolium pratense* gr., *Coronilla/Hippocrepis*, *Chamaerops* og *Filipendula*. Det fremgår af forskellige undersøgelser, at den karakteristiske andel af pollen fra almindelig robinie varierer fra 7 % til 60 %, således at der ved bestemmelse af oprindelsen lægges vægt på at identificere specifikke fysiske eller kemiske egenskaber.

De meget lave værdier for elektrisk ledningsevne (0,11-0,18 mS/cm) var en yderligere bekræftelse af oprindelsen af akaciehonningen i stikprøverne, da disse værdier er typiske for akaciehonning.

Der blev også konstateret en fuldstændig mangel på krystallisering af honning — en egenskab, der normalt forbindes med tilstedeværelsen af nektar fra rasp. I betragtning af den konstaterede mangel på pollenkorn fra rasp kan det konkluderes, at dette er et særligt kendetegn ved akaciehonning fra den istriske halvø.

Kastanjehonning er kendt for at have en stor mængde pollen, som altid udgør mere end 90 % i stikprøver fra Istrien. Desuden adskiller pollenspektret for kastanjehonning fra Istrien sig fra honning, der fremstilles i nabolande som f.eks. i Alperegionen i Italien, hvor pollen fra plantearter i bjergvegetation såsom planter af familien *Ericaceae* og *Tilia* dominerer.

I stikprøver af blomsterhonning stammede pollen fundet i betydelige mængder fra *Castanea* og *Prunus* f. og i mindre mængder fra *Rubus* f., *Clematis*, *Castanea*, *Brassica* f., Umbelliferae/Apiaceae, planter af Rhamnaceae-familien, *Trifolium repens* gr., *Vicia, Melilotus* og *Coronilla/Hippocrepis*. Pollenspektrummets egenart understøttes yderligere af tilstedeværelsen af pollen fra følgende plantearter, der typisk findes i regionen: *Ailanthus, Loranthus, Asparagus acutifolius, Aesculus* og *Cotinus coggyria*.

Ud over nektarhonningtyper fremstiller Istriens biavlere også honningdughonning fra løvtræer med særlige egenskaber. Analyser af honningprøver har vist, at forholdet mellem elementer af honningdug og pollenkorn fra nektarplantearter varierede fra 2,03 til 29,3 med en medianværdi på 8,2, hvilket er langt højere end de værdier, der kræves for at klassificere honningdughonning (>3). På samme måde har honning-palynologiske analyser bekræftet et karakteristisk pollenspektrum, hvor der også forekommer pollen fra ikkenektarplantearter såsom *Fraxinus, Quercus, Plantago* og Gramineae/Pocaeae. Desuden omfatter det karakteristiske pollenspektrum for nektarplantearter planter af Rhamnaceae-familien og *Prunus* f., som var til stede i 100 % af stikprøverne, efterfulgt af *Castanea, Rubus* f., *Compositae* T, *Brassica* f., *Asparagus acutifolius* og *Clematis*, mens *Cotinus coggyria* og *Aesculus* blev fundet i lidt lavere mængder.

Den særlige karakter af salviehonning fra Istrien afspejles i dens botaniske oprindelse og den større forekomst af pollen fra *Robinia pseudoacacia*, Rosaceae, *Ligustrum vulgare*, Fabaceae, Ericaceae, *Acer* spp., *Lotus* spp. og *Salix* spp. Den adskiller sig fra salviehonning fra det nordlige område omkring Adriaterhavet, hvor størstedelen af det fundne pollen stammer fra Rhamnaceae, *Acer spp*., *Castanea sativa*, *Myosotis spp*., *Prunus spp*. og *Rubus spp*., mens pollenspektret i Dalmatia er kendetegnet ved forekomst af pollen fra *Paliurus spina christi, Erica arborea, Trifolium pratense, Melilotus* spp., *Centaurea jacea* og Apiaceae.

Det pollenspektrum, der blev fundet i de analyserede stikprøver af vintersarhonning, viste, at en stor del af pollenet stammede fra *Hedera helix*, Fabaceae, *Tilia* spp., Rosaceae, *Castanea sativa*, *Echium vulgare* og Liliaceae. Dette adskiller sig væsentligt fra honningprøver fra Spanien, hvor pollen fra *Diplotaxis* spp., *Onobrychis vicifolia, Centaurea* spp., *Lavandula latifolia*, *Thymus* spp. og Apiacea er fremherskende.

Analyser af stikprøver af lindehonning har vist, at en stor del af pollenet stammer fra Rosaceae, *Paliurus spina christi*, Fabaceae, *Castanea sativa,* Asteraceae (slægten *Solidago*), Liliaceae, *Centaurea* spp. og Asteraceae. Ved at sammenligne de identificerede plantearter står det klart, at de adskiller sig fra de arter, der findes i lindehonning fra Italien, hvor størstedelen af det fundne pollen stammer fra *Rubus* spp., *Trifolium repens*, *Robinia pseudoacacia*, *Ailanthus altissima*, *Amorpha* spp og *Acer* spp., mens pollenspektret i lindehonning fra Rumænien er kendetegnet ved forekomsten af pollen fra *Brassica napus*, *Helianthus annuus, Melilotus* spp. og *Solidago* spp.

Disse videnskabelige undersøgelser og analyser, der identificerer en kombination af pollen fra kontinentale plantearter og middelhavsplantearter, viser, at "Istarski med" / "Istrski med" adskiller sig fra honning produceret i andre regioner. Andelen af pollen af forskellige plantearter bidrager også til de specifikke fysisk-kemiske og organoleptiske egenskaber (farve, smag, lugt) for "Istarski med" / "Istrski med" sammenlignet med de samme typer honning fra andre geografiske områder. "Istarski med" / "Istrski med" er også kendetegnet ved sin friskhed (maksimal HMF-værdi på 15,0 % mg/kg) og et vandindhold på op til 18,6 %. For at bevare disse egenskaber underkastes "Istarski med" / "Istrski med" ikke intensiv varmebehandling, hvilket sikrer, at honningens egenskaber, som er afledt fra den specifikke flora i produktionsområdet, bevares.

5.3 *Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets egenskaber*

Istrien er et unikt agroøkologisk område med varierende terræn-, jordbunds- og klimaforhold og geomorfologi. Samspillet mellem disse faktorer resulterer i en typisk florasammensætning, der danner grundlag for produktionen af forskellige typer honning. Florasammensætningens varietet og rigdom påvirker direkte de særlige kendetegn ved "Istarski med" / "Istrski med", som afspejles i honningens særlige smag og lugt. Kombinationen af forskellige mængder pollen i visse typer honning giver honningen særlige organoleptiske egenskaber (farve, lugt og smag), der adskiller sig fra stikprøver af samme type honning fra andre geografiske områder. Med tiden har biavlerne i Istrien bidraget til honningens særlige egenskaber ved at blive fortrolige med de forskellige mikroområders botaniske sammensætning og klimatiske karakteristika, hvilket giver dem mulighed for at følge faserne i visse honningproducerende planters livscyklus mere præcist. Ved at iagttage naturen og klimaet nøje kan Istriens biavlere fastslå præcist, hvor og hvornår de skal placere deres bistader, eller hvornår de skal begynde at udvinde honningen for at opnå nektarens typiske karakter og høje renhedsgrad. Denne praksis bidrager til honningens udprægede enkeltblomstrede karakter. De særlige jordbunds- og klimaforhold i produktionsområdet, biavlernes mange års erfaring og den traditionelle fremstillingsmetode, der går tilbage til begyndelsen af sidste århundrede og er gået i arv fra generation til generation, betyder i sidste ende, at "Istarski med" / "Istrski med" er et genkendeligt produkt blandt forbrugerne.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Specifikacija%20Istarski%20med%2026-4-2023.doc

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-IZBRANA-KAKOVOST/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-ZASCITENIH-KMETIJSKIH-PRIDELKOV/Istrski_med_Istarski_med.pdf