C/2024/2110
11.3.2024

Offentliggörande av en ansökan om registrering av ett namn i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(C/2024/2110)

I enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 ([1]) ges rätt att göra invändningar inom tre månader från dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”ISTARSKI MED / ISTRSKI MED”

EU-nr: PDO-HR+SI-2833 – 14 mars 2022

SUB (X) SGB ( )

1. **Namn [på SUB eller SGB]**

”Istarski med” / ”Istrski med”

2. **Medlemsstat eller tredjeland**

Republiken Kroatien och Republiken Slovenien

3. **Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet**

3.1. *Produkttyp*

Klass 1.4 Andra produkter av animaliskt ursprung (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör).

3.2. *Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt*

”Istarski med” / ”Istrski med” är en honung som Apis mellifera-bin bereder av nektar från dragväxter eller av sekret från levande växtdelar eller av exkret av växtsugande insektsarter på de levande växtdelarna, som bina samlar och omvandlar genom att förena dem med egna särskilda ämnen, deponerar, torkar, lagrar och låter utvecklas i vaxkakor.

Fysikalisk-kemiska egenskaper:

— Vattenhalt: ≤ 18,6 %

— Diastasaktivitet ≥ 10, utom för akaciahonung där den uppgår till ≥ 3 på Schade- skalan-

— HMF ≤ 15,0 mg/kg

Pollenets egenskaper:

Pollenspektrumet för ”Istarski med” / ”Istrski med” måste återspegla vegetationen i det område som definieras i punkt 4. Beroende på typen av honung står pollen från nektarutsöndrande växtsorter från följande familjer för en stor andel av spektrumet: Fabaceae, Sapindaceae, Rhamnaceae, Cornaceae, Brassicaceae, Loranthaceae, Malvaceae, Liliaceae, Lamiaceae, Fagaceae, Rosaceae, Apiaceae, Salicaceae, Adoxaceae, Ericaceae, Asteraceae, Oleaceae, Araliaceae, Ranunculaceae, Asphodelaceae, Anacardiaceae. Små mängder pollen från nektarutsöndrande växtsorter från följande familjer kan också förekomma: Aquifoliaceae, Boraginaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae, Scrophulariaceae, Urticaceae, Campanulaceae, Fumariaceae med flera.

([1]) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

Pollen från växtsorter som inte utsöndrar nektar från följande familjer kan också förekomma i ”Istarski med” / ”Istrski med”: *Quercus* spp., *Fraxinus* spp., *Helianthemum* spp., *Papaver* spp., *Plantago* spp., *Betula* spp., *Alnus* spp., *Carex* spp., *Pinus* spp., *Cistus* spp., Poaceae och Pinaceae, *Fragaria vesca, Cupressus sempervirens, Olea europaea, Filipendula ulmaria, Vitis vinifera, Corylus avellana*, med flera i mindre mängder.

Fysikalisk-kemiska egenskaper:

Typ av honung	Elektrisk ledningsförmåga
Akaciahonung	≤ 0,25 mS/cm
Salviahonung	0,20–0,55 mS/cm
Kastanjehonung	≥ 0,8 mS/cm
Blomhonung	≤ 0,8 mS/cm
Bladhonung från lövträd	≥ 0,8 mS/cm
Vinterkyndelhonung	≤ 0,8 mS/cm
Lindhonung	0,5–1,1 mS/cm

Pollenegenskaper:

	Beskrivning
Akaciahonung	Den måste innehålla pollen från robinia (*Robinia pseudoacacia* L.) och dessutom kan pollen från följande växter förekomma: Rosaceae, Fabaceae, *Cornus sanguinea*, *Prunus* spp., Poaceae, *Salix* spp., *Fragaria vesca*, *Quercus* spp., *Fraxinus* spp., *Lotus* spp., *Ligustrum vulgare*, *Helianthemum* spp. Enstaka pollen från följande växter kan förekomma: *Cornus mas*, *Aesculus hippocastanum*, Apiaceae, *Loranthus europaeus*, *Acer* spp., *Pinus* spp., *Plantago* spp. *Filipendula ulmaria*, *Castanea sativa*, Lamiaceae, Brassicaceae, *Asparagus* spp., *Tilia* spp., *Taraxacum officinale*, *Phacelia tanacetifolia*, *Paliurus spina christi*, *Olea europea*, Asteraceae (släktet *Solidago*).
Salviahonung	Honungen måste innehålla minst 15 % pollen från salvia (*Salvia officinalis* L.). Dessutom kan pollen från följande växter förekomma: Rosaceae, *Robinia pseudoacacia*, *Quercus* spp., *Prunus* spp., *Paliurus spina christi*, *Olea europea*, *Ligustrum vulgare*. Enstaka pollen från följande växter kan förekomma: Poaceae, *Pistacia* spp., Lamiaceae, *Filipendula ulmaria*, *Cornus sanguinea*.
Kastanjehonung	Honungen måste innehålla minst 85 % pollen från äkta kastanj (*Castanea sativa* Mill.). Enstaka pollen från följande växter kan förekomma: *Paliurus spina christi*, Fabaceae, Rosaceae, *Pistacia* spp., *Prunus* spp., *Salix* spp.
Blomhonung	Honungen får innehålla varierande proportioner av pollen från följande växter: Fabaceae, Rosaceae, *Quercus* spp., *Prunus* spp., Poaceae, *Paliurus spina christi*, *Acer* spp., svampsporer, *Salix* spp., Apiaceae, *Robinia pseudoacacia*, *Fraxinus* spp., *Fragaria vesca*, *Cornus sanguinea*, *Lotus* spp., *Lamiaceae*, *Castanea sativa*, *Aesculus hippocastanum*.

Bladhonung från lövträd	Förhållandet mellan antalet honungsdaggsinslag (svampsporer, delar av hyfer, grönalger) och pollenkorn från nektarutsöndrande växtsorter måste minst vara 1,5, med varierande andelar pollen från följande växter: Fabaceae, *Castanea sativa*, Rosaceae, *Salix* spp., *Paliurus spina christi*, *Robinia pseudoacacia*, *Cornus sanguinea*, *Prunus* spp., *Lotus* spp., Poaceae, *Quercus* spp., *Olea europea*, *Fraxinus* spp., *Filipendula ulmaria*, *Fragaria vesca*, Asteraceae (släkten *Solidago*), Apiaceae, *Tilia* spp., *Taraxacum officinale*, *Pinus* spp., *Loranthus europaeus*, Liliaceae, *Ligustrum vulgare*, Lamiaceae, *Helianthemum* spp., *Cornus mas*, Brassicaceae, Asteraceae (släkten *Taraxacum*), *Acer* spp.
Vinterkyndelhonung	Honungen måste innehålla minst 20 % pollen från vinterkyndel (*Satureja montana* L.). Dessutom kan pollen från följande växter förekomma: *Hedera helix*, *Satureja montana*, Fabaceae, *Tilia* spp., Rosaceae. Enstaka pollen från följande växter kan förekomma: *Castanea sativa*, *Echium vulgare*, *Filipendula ulmaria*, Liliaceae, Poaceae, Asteraceae (släkten *Solidago*), Asteraceae (släkten *Taraxacum*), *Centaurea jacea*, *Fragaria vesca*.
Lindhonung	Honungen måste innehålla minst 25 % pollen från lind (*Tilia* sp.). Dessutom kan pollen från följande växter förekomma: Rosaceae, *Quercus* spp., Poaceae, *Paliurus spina christi*, Fabaceae, *Castanea sativa*, *Fraxinus* spp., Asteraceae (släkten *Solidago*). Enstaka pollen från följande växter kan förekomma: *Vitis vinifera*, *Trifolium* spp., *Sambucus nigra*, *Ranunculus* spp., *Phacelia tanacetifolia*, Liliaceae, *Helichrysum italicum*, *Helianthus annuus*, *Centaurea* spp., *Centaurea jacea*, *Carex* spp., Asteraceae, Apiaceae.

Organoleptiska egenskaper:

	Färg	Doft	Smak
Akaciahonung	ljusgul till gul, nästan färglös	mild, av rå bikaka, färskt vax och robiniablommor	söt till mycket söt, kortvarig
Salviahonung	rödbrun, orangeröd, gulröd, bärnstensgul, med grönaktiga skiftningar	av trä, behaglig	lätt kittlande, bestående, söt, något bitter
Kastanjehonung	rödbrun	medelintensiv till intensiv, av kastanjeblommor	intensiv, bitter till mycket bitter, kvardröjande medelsöt till söt
Blomhonung	gul till mörkt bärnstensgul	behaglig, blommig, av kokt frukt, ängsblommor, vax och socker kan vara skarp	söt till mycket söt, något sur till sur, kvardröjande
Bladhonung från lövträd	klarbrun till mörkt rödbrun	av trä och kola, intensiv	lätt kittlande, av trä eller kola, måttligt söt
Vinterkyndelhonung	bärnstensröd	av torkad frukt	söt, kvardröjande och något sur
Lindhonung	gul till bärnstensfärgad	uttalad, uppfriskande, av lindblommor, mentol, citronskal och trä	medelsöt, något sur, lätt till måttligt bitter, uppfriskande, kvardröjande

3.3. *Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)*

—

3.4. *Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området*

Alla produktionssteg, från binas insamling av nektar till utvinningen måste äga rum inom det geografiska området.

3.5. *Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser*

”Istarski med” / ”Istrski med” förpackas uteslutande i det geografiska område som anges i punkt 4, huvudsakligen för att säkerställa att produkten är spårbar och således dess ursprung och särskilda egenskaper. Detta hjälper till att minimera möjligheten att förfalska produkten genom att blanda den med liknande produkter, vilket är mer sannolikt om förpackningen sker utanför det avgränsade geografiska området.

3.6. *Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser*

När produkten släpps ut på marknaden i en färdigförpackad form krävs det att namnet ”Istarski med” eller ”Istrski med” anges med större bokstäver än något annat namn på förpackningen. Märkningen ska även omfatta en stämpel med ett progressivt registreringsnummer och den gemensamma symbolen (logotyp).

Samtliga användare av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Istarski med” / ”Istrski med” som släpper ut produkten på marknaden i enlighet med denna produktspecifikation har rätt att använda stämpeln på samma villkor.

Den gemensamma symbolen är en honungsdroppe med omväxlande grå och svarta horisontella ränder, vilken avtecknar sig mot en gul hexagon som avbildar en stiliserad bikaka. Under hexagonen anges med stora bokstäver, ”ISTARSKI MED” i den kroatiska varianten (bild 1) och ”ISTRSKI MED” i den slovenska varianten (bild 2).

Bild 1



Bild 2



4. Kort beskrivning av det geografiska området

I Kroatien är produktionsområdet för ”Istarski med” / ”Istrski med” halvön Istrien och dess öar i länet Istrien, följt av kommunerna Opatija, Lovran, Mošćenička Draga och Matulji, öarna Cres och Lošinj och de mindre öarna Unije, Ilovik, Susak och Vele Srakane samt ett antal små obebodda öar. I Slovenien består produktionsområdet av den slovenska regionen Istrien som består av kommunerna Koper, Izola, Piran och Ankaran.

I Slovenien sammanfaller produktionsområdets gränser med den norra gränsen för kommunerna Ankaran och Koper, vilken sträcker sig från den gräns som korsar Lazaret/Lazzaretto på gränsen mellan Slovenien och Italien till gränsen mellan kommunerna Koper och Sežana intill naturreservatet Dolina Glinščice/Val Rosandra. Det geografiska området fortsätter längs gränsen mellan kommunerna Koper och Sežana söder om byn Ocizla och norr om byn Črnotiče, innan den går ner till naturreservatet Slavnik och passerar längs dess nordöstra kant tills den når den kroatiska gränsen….

5. Samband med det geografiska området

5.1 *Specifika uppgifter om det geografiska området*

Istrien utmärks av en rik och omväxlande flora tack vare ett antal gynnsamma omständigheter som påverkar området. Den första av dessa är Istriens geografiska läge, följt av dess klimat, terräng, petrografiska grund och jordmån.

Det geografiska området gynnas även av särskilda klimatförhållanden. Klimatet är mycket heterogent, vilket huvudsakligen beror på att Istrien är en halvö som är omgiven av havet på tre sidor, men även för att det är beläget i norra utkanten av Adriatiska havet, i skärningspunkten mellan Medelhavet och den kontinentala delen av Eurasien. Beroende på latitud och terrängens karaktär delas Istrien in i tre klimatzoner. De centrala och södra kustdelarna har ett medelhavsklimat, medan den norra delen och den del som är belägen mer inåt landet har ett måttligt varmt, fuktigt klimat med varma somrar. I den norra, kontinentala delen råder huvudsakligen ett submediterrant klimat.

De olika typerna av ”Istarski med” / ”Istrski med” varierar utifrån växtsamhällena, vilka i sin tur varierar utifrån samspelet mellan klimat, jordmån och terräng. I geografiskt hänseende är Istrien beläget vid skiljelinjen mellan Medelhavet och de dinariska och alpinska bergskedjorna, vilket innebär att vegetationen består av den typiska floran från dessa regioner. Det finns därför flera vegetationsområden på den istriska halvön och denna varierande vegetation utgör en viktig grund för framställningen av olika typer av ”Istarski med” / ”Istrski med”. En smal remsa längs havet bildar ett område med vintergröna skogar av stenek och buskvegetation, en växtlighet som är typisk för medelhavsregionen. Lövskogarna med dunek och orientalisk avenbok är den mest utbredda formen av skogsvegetation i Istrien och sträcker sig över större delen av det istriska fastlandet, från det bälte av vintergrön vegetation dit de sträcker sig till de centrala delarna av Istrien. Denna typ av vegetation domineras av dunek eller vanlig ek, vilken tillsammans med stenek utgör en viktig källa till honungsdagg. Kastanjeträd återfinns på Učkas sluttningar, ovanför Lovran, och i västra Istrien (Bujština), huvudsakligen i skogar med orientalisk avenbok och dunek, till följd av de djupa sura jordar som formats ovanpå den tidigare rödjorden. Dessa bestånd av äkta kastanj tillhandahåller tillräckligt med nektar, vilket gör att det avgränsade området ingår i den kategori av kroatiska regioner som fortfarande är välbevarade, där det är möjligt att framställa kastanjehonung som undantagsvis är enblommig. Det finns ett utbrett bestånd av medicinsk salvia och fjädergräs, främst i sydöstra delarna av Istrien, vilket används som bete och som tillhandahåller betydande mängder nektar. Därigenom säkerställs framställningen av den mest uppskattade typen av honung som är karakteristisk för Medelhavsklimatet, nämligen salviahonung. Detta utgör samtidigt det nordligaste området där medicinsk salvia är utbredd i dess inhemska form. Området med dunek och blåtåtel är den del av Istrien med den mest varierande växtligheten. De flesta av robiniabestånden finns i de centrala och norra delarna, men vissa sträcker sig längre in i området med medelhavsklimat, där de tillsammans med medelhavsfloran ger resurser för nektar. Detta påverkar, tillsammans med de huvudsakliga växtarterna, akaciahonungens särdrag.

Vid en beskrivning av floran på halvön Cres-Lošinj uppger Wallnöfer (2008) att av de 1 130 taxa som registrerats, rapporterades 253 endast för Cres och 273 endast för Lošinj. I den norra, submediterrana delen av ön Cres är de mest utmärkande områdena av stenig vegatation betesmarkerna med medicinsk salvia och områdena med singel och tofsäxing. I området Osoršćice finns omkring 700 växtarter, vilket motsvarar två tredjedelar av Lošinjs totala flora.

Miloš Furlan (2007) uppger följande avseende biinsamlingens särdrag i slovenska Istrien: ”i området finns nästan alla de säsongsbetonade betesmarkerna, från tidig vår till de huvudsakliga betesmarkerna med robinia (acacia) och äkta kastanj och höstbete med höstvegetation, följt av honungsdagg på träden och möjligheten att samla in söta ämnen på olika mogna frukter, såsom fikon, vindruvor och liknande.”

5.2 *Produktens särskilda egenskaper*

De särskilda egenskaperna hos ”Istarski med” / ”Istrski med” härrör från de naturresurser som ligger till grund för framställningen. Honung utgör ett sällsynt livsmedel som på grund av dess särskilda egenskaper (förekomsten av pollenkorn), ger en bra illustration av det område där den framställs. Eftersom Istrien är beläget på gränsen mellan två biogeografiska regioner – medelhavsområdet och den kontinentala regionen – har regionen en speciell flora.

I akaciahonung finns stora andelar av följande växtarter: *Fraxinus*, från växtfamiljen Rhamnaceae, *Salix*, *Loranthus europaeus*, *Cotinus coggyria*, *Prunus* f., *Vicia*, *Trifolium pratense* gr., *Coronilla/Hippocrepis*, *Chamaerops* och *Filipendula*, medan olika studier talar för att den karaktäristiska andelen robiniapollen varierar mellan 7 %–60 %, vilket innebär att de särskilda fysiska eller kemiska egenskaperna identifieras vid fastställandet av ursprunget.

Ytterligare bekräftelse på ursprunget för prover av akaciahonung har erhållits genom de mycket låga värdena för elektrisk ledningsförmåga som konstaterats (0,11–0,18 mS/cm), eftersom dessa värden är typiska för akaciahonung.

Dessutom observerades att honungen aldrig kristalliserades, en egenskap som normalt sett är kopplad till förekomsten av nektar från rapsfrön. Eftersom det bekräftades att pollenkorn från rapsfrö saknades, kan man dra slutsatsen att detta utgör en särskild egenskap hos akaciahonung från istriska halvön.

Kastanjehonung är känd för en hög andel pollen, vilken alltid står för mer än 90 % i proverna från Istrien. Dessutom skiljer sig pollenspektrumet för kastanjehonung från Istrien från honung från grannländer såsom i Alpregionen i Italien, där pollen från bergsväxtarter såsom växter från familjerna Ericaceae och *Tilia* dominerar.

I prover från blomhonung fanns betydande andelar pollen från *Castanea* och *Prunus* f. och mindre andelar från *Rubus* f., *Clematis, Castanea, Brassica* f., Umbelliferae/Apiaceae, växter från familjen Rhamnaceae, *Trifolium repens* gr., *Vicia, Melilotus* och *Coronilla/Hippocrepis*. Vidare stöds pollenspektrumets särskilda egenskaper av förekomsten av pollen från följande växtarter som är vanligt förekommande i regionen: *Ailanthus, Loranthus, Asparagus acutifolius, Aesculus* och *Cotinus coggyria*.

Utöver honungstyper av nektar, framställer biodlarna i Istrien även bladhonung från lövträd med särskilda egenskaper. Analyser av honungsprover har visat att halten av honungsdagg i förhållande till pollenkorn från nektarutsöndrande växtsorter varierade från 2,03 till så mycket som 29,3, med ett medianvärde på 8,2. Detta är mycket högre än de värden som krävs för en klassificering som bladhonung (> 3). På ett liknande sätt har analyser av pollen bekräftat ett karaktäristiskt pollenspektrum i vilket det även förekommer pollen från växtsorter som inte utsöndrar nektar såsom *Fraxinus, Quercus, Plantago* och Gramineae/Pocaeae. Dessutom omfattar det karaktäristiska pollenspektrumet från nekarutsöndrande växtsorter växer från familjen Rhamnaceae och *Prunus* f., vilka återfanns i samtliga prover, följt av *Castanea, Rubus* f., *Compositae* T, *Brassica* f., *Asparagus acutifolius* och *Clematis*, medan något lägre andelar av *Cotinus coggyria* och *Aesculus* hittades.

De särskilda egenskaper som salviahonung från Istrien har avspeglas i dess botaniska ursprung och den större förekomsten av pollen från *Robinia pseudoacacia,* Rosaceae, *Ligustrum vulgare*, Fabaceae, Ericaceae, *Acer* spp., *Lotus* spp. och *Salix* spp. Den skiljer sig från salviahonung från den norra adriatiska regionen, där de flesta pollen som hittas kommer från Rhamnaceae, *Acer spp., Castanea sativa, Myosotis spp., Prunus spp.* och *Rubus spp.,* medan pollenspektrumet i Dalmatien kännetecknas av förekomsten av pollen från *Paliurus spina christi, Erica arborea, Trifolium pratense, Melilotus* spp., *Centaurea jacea* och Apiaceae.

På grundval av det pollenspektrum som återfinns i prover av vinterkyndelhonung som analyserats, kom en stor andel av pollenet från *Hedera helix,* Fabaceae, *Tilia* spp., Rosaceae, *Castanea sativa, Echium vulgare* och Liliaceae. Detta utgör en stor skillnad från honungsprover från Spanien, där pollen från *Diplotaxis* spp., *Onobrychis vicifolia, Centaurea* spp., *Lavandula latifolia, Thymus* spp. och Apiaceae dominerar.

Analyser av prover av lindhonung har visat att en stor andel av pollenet kommer från Rosaceae, *Paliurus spina christi,* Fabaceae, *Castanea sativa,* Asteraceae (släkten *Solidago*), Liliaceae, *Centaurea* spp. och Asteraceae. Vid en jämförelse av de sorter som identifierats är det uppenbart att de skiljer sig från dem som återfunnits i lindhonung från Italien, där de flesta pollen som hittades var från *Rubus* spp., *Trifolium repens, Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Amorpha* spp. och *Acer* spp., medan pollenspektrumet från lindhonung från Rumänien karaktäriseras av förekomsten av pollen från *Brassica napus, Helianthus annuus, Melilotus* spp. och *Solidago* spp.

I dessa vetenskapliga studier och analyser identifieras en kombination av pollen från kontinentala växtarter och växtarter från Medelhavet som visar att ”Istarski med” / ”Istrski med” skiljer sig från honung som framställts i andra regioner. Andelen pollen från olika växtarter bidrar även till de särskilda fysikalisk-kemiska och organoleptiska egenskaper (färg, smak, doft) som ”Istarski med” / ”Istrski med” har jämfört med samma typer av honung från andra geografiska områden. Utmärkande för ”Istarski med” / ”Istrski med” är även dess friskhet (maximalt HMF-värde på 15,0 % mg/kg) och en vattenhalt på upp till 18,6 %. För att dessa egenskaper ska bibehållas genomgår ”Istarski med” / ”Istrski med” inte någon intensiv värmebehandling, vilket säkerställer att de egenskaper som honungen erhåller från den särskilda floran i produktionsområdet bibehålls.

5.3 *Orsakssamband mellan det geografiska områdets särskilda egenskaper och produktens särskilda egenskaper*

Istrien är ett unikt agroekologiskt område med mycket varierande terräng, jordmån, geomorfologi och klimat. Genom samspelet mellan dessa faktorer erhålls en typisk florasammansättning som utgör grunden för framställningen av en rad typer av honung. Florasammansättningens mångfald och rikedom inverkar direkt på de särskilda egenskaperna hos ”Istarski med” / ”Istrski med”, vilket återspeglas i dess särskilda smak och doft. Kombinationen av andelen pollen i vissa typer av honung ger dem särskilda organoleptiska egenskaper (färg, doft, smak) som skiljer sig från prover av samma typ av honung från andra geografiska områden. Biodlarna i Istrien har över tid bidragit till honungens särskilda egenskaper genom att lära sig mer om den botaniska sammansättningen och klimatförhållandena i de olika småområdena, vilket gör att de kan följa faserna i livscykeln för vissa honungsproducerande växter med större precision. Dessa biodlare kan genom att noggrant betrakta naturen och klimatet korrekt fastställa var och när de ska placera ut sina bikupor eller när de ska börja utvinna honungen för att erhålla den typiska karaktären och nektar med en hög renhetsgrad. Dessa metoder bidrar till honungens till stor del enblommiga karaktär. Det är i slutänden de särskilda mark- och klimatförhållandena i produktionsområdet, biodlarnas mångåriga erfarenhet och en framställningstradition som går tillbaka till början av förra århundradet och som förts vidare från generation till generation som gör ”Istarski med” / ”Istrski med” till en produkt som konsumenterna känner igen.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Specifikacija%20Istarski%20med%2026-4-2023.doc

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/HRANA/SHEME-KAKOVOSTI/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-IZBRANA-KAKOVOST/CERTIFICIRANI-PROIZVAJALCI-ZASCITENIH-KMETIJSKIH-PRIDELKOV/Istrski_med_Istarski_med.pdf