II

*(Nelegislativní akty)*

# NAŘÍZENÍ

## PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/202

## ze dne 4. října 2019

## o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Iodine Teat Dip Products“

**(Text s významem pro EHP)**

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ([1]), a zejména na čl. 44 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 20. srpna 2015 předložila společnost GEA Farm Technologies GmbH v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Iodine Teat Dip Products“ (dále jen „kategorie biocidních přípravků“), které jsou typem přípravku 3 podle definice v příloze V uvedeného nařízení. Příslušný orgán Spojeného království souhlasil s tím, že tuto žádost podle čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-AL019223-55.

(2) Uvedená kategorie biocidních přípravků obsahuje účinnou látku jod, který je zařazen na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise s ohledem na vnitřní vlastnosti účinné látky a na vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ([2]) zváží v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 528/2012 nutnost přezkoumat schválení jodu, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem. Na základě výsledků uvedeného přezkumu potom Komise zváží, zda povolení Unie pro přípravky obsahující uvedenou účinnou látku musí být přezkoumáno v souladu s článkem 48 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3) Dne 6. června 2018 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4) V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 18. ledna 2019 Komisi stanovisko ([3]), včetně návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) této kategorie biocidních přípravků a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie přípravků. Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že zmíněná kategorie biocidních přípravků spadá do definice „kategorie biocidních přípravků“ uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

([1]) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

([2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1).

([3]) Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 14. prosince 2018 k povolení Unie pro „Iodine Teat Dip Products“ (ECHA/BPC/217/2018).

(5) Dne 20. května 2019 předala agentura Komisi návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(6) Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro uvedenou kategorii biocidních přípravků.

(7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

*Článek 1*

Společnosti GEA Farm Technologies GmbH se s číslem povolení EU-0020125-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání kategorie biocidních přípravků „Iodine Teat Dip Products“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 19. listopadu 2019 do 31. října 2029

*Článek 2*

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. října 2019.

*Za Komisi*
*předseda*
Jean-Claude JUNCKER

*PŘÍLOHA*

**Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků**

Iodine Teat dip products

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0020125-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0020125-0000

ČÁST I

**PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ**

1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. **Název kategorie biocidních přípravků**

| | |
|---|---|
| Název | Iodine Teat dip products |

1.2. **Typ přípravku (typy přípravků)**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku (typy přípravků) | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |

1.3. **Držitel povolení**

| | | |
|---|---|---|
| Jméno (název) a adresa držitele povolení | Jméno (název) | GEA Farm Technologies GmbH |
| | Adresa | Siemensstraße 25-27, 59199, Bönen, Německo |
| Číslo povolení | EU-0020125-0000 | |
| *Číslo záznamu v registru R4BP* | EU-0020125-0000 | |
| Datum udělení povolení | 19. listopadu 2019 | |
| Datum skončení platnosti povolení | 31. října 2029 | |

1.4. **Výrobce (výrobci) biocidních přípravků**

| | |
|---|---|
| Jméno výrobce | GEA Farm Technologies |
| Adresa výrobce | Wylye Works, BA12 9HT Warminster Spojené království |
| Umístění výrobních závodů | Wylye Works, Watery Lane, BA12 9HT Warminster Spojené království<br>Gewerbestraße 5, 5325 Plainfeld Rakousko<br>ul. Olowiana 10, 85-461 Bydgoszcz Polsko |

1.5. **Výrobce(i) účinné látky/účinných látek**

| | |
|---|---|
| Účinná látka | Jod |
| Jméno výrobce | SQM Europe N.V. |
| Adresa výrobce | St Pietersvliet 7“ bus 8 2000 Antwerp Belgie |
| Umístění výrobních závodů | Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes, 4290 Piso 4 Santiago Chile |

| | |
|---|---|
| Účinná látka | Jod |
| Jméno výrobce | Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC) |
| Adresa výrobce | Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun“ 299-4205 Chosei-Gun Japonsko |
| Umístění výrobních závodů | Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun“ 299-4205 Chosei-Gun Japonsko |

| | |
|---|---|
| Účinná látka | Jod |
| Jméno výrobce | Norkem Ltd |
| Adresa výrobce | Norkem House, Bexton Lane“ WA16 9FB Knutsford Spojené království |
| Umístění výrobních závodů | OFICINA CALA CALA S/N, Unknown POZO ALMONTE Chile |

2. SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků**

| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,16 | 2,47 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9 – 11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 2,35 |

2.2. **Typ(y) složení (forma)**

| | |
|---|---|
| Forma (formy) | AL - Jakákoliv jiná kapalina<br>SL - Rozpustný koncentrát |

ČÁST II

**DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC**

**META SPC 1**

1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1. **Identifikátor meta SPC 1**

| | |
|---|---|
| Identifikátor | Meta SPC 1 - Koncentráty-koncentráty pro profesionální použití s poměry ředění 1:3, 1:4 a 1:7 |

1.2. **Přípona k číslu povolení**

| | |
|---|---|
| Číslo | 1-1 |

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku (typy přípravků) | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |

2. SLOŽENÍ META SPC 1

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1**

| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 1,58 | 2,47 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9 – 11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 1,51 | 2,35 |

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 1**

| | |
|---|---|
| Forma (formy) | SL - Rozpustný koncentrát |

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení pro meta SPC **1**

| | |
|---|---|
| Standardní věty o nebezpečnosti | Způsobuje vážné podráždění očí.<br>Může způsobit poškození orgánů (štítná žláza) při prodloužené nebo opakované expozici ..<br>Může být korozivní pro kovy.<br>Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| Pokyny pro bezpečné zacházení | Nevdechujte páry.<br>Omyjte ruce důkladně po manipulaci.<br>Používejte ochranné rukavice.<br>Používejte ochranný oděv.<br>Používejte ochranné brýle.<br>PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.<br>Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou ošetření.<br>Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.<br>Uniklý produkt seberte.<br>Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci<br>Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. |

4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1. **Popis použití**

*Tabulka 1.*

**Použití # 1 – Koncentráty – koncentráty pro profesionální použití s poměry ředění 1:3, 1:4 a 1:7 pro dezinfekci po dojení – metoda namočení**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace namočením.<br>Aplikace pomocí namáčecí nádoby: Použijte aplikační nádobu se zpětným ventilem. Naředěný roztok nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do naředěného roztoku. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství naředěného přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml)<br>Přípravek je třeba naředit dle poměru uvedeného na štítku:<br>1 díl přípravku na 3 díly vody,<br>1 díl přípravku na 4 díly vody,<br>1 díl přípravku na 7 dílů vody.<br>Obsah jódu v naředěném roztoku je v rozmezí 0,29 a 0,52 hm. %.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení ponořte dvě třetiny délky každého struku do naředěného roztoku přípravku.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám

(materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku) a ochranné brýle.

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků před dojením přípravek bez obsahu jódu.

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2. **Popis použití**

*Tabulka 2.*

**Použití # 2 – Koncentráty – koncentráty pro profesionální použití s poměry ředění 1:3, 1:4 a 1:7 pro dezinfekci po dojení – metoda postřiku**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace postřikem.<br>Aplikace pomocí tlakového postřikovače: Přívodní část postřikovače je umístěna v nádobě s naředěným přípravkem. Naředěný přípravek se poté čerpá do trysky postřikovače umístěné v dojírně. Použijte postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku naředěným přípravkem.<br>Aplikace pomocí ručního postřikovače: Naplňte ruční postřikovač naředěným přípravkem. Použijte ruční postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku naředěným přípravkem. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství naředěného přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml)<br>Přípravek je třeba naředit dle poměru uvedeného na štítku:<br>1 díl přípravku na 3 díly vody,<br>1 díl přípravku na 4 díly vody,<br>1 díl přípravku na 7 dílů vody.<br>Obsah jódu v naředěném roztoku je v rozmezí 0,29 a 0,52 hm. %.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |

| | |
|---|---|
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení aplikujte naředěný roztok pomocí postřikovače k pokrytí spodních dvou třetin každého struku.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám

(materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku) a ochranné brýle.

Při aplikaci přípravku ručním postřikem používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku) a vhodnou pracovní obuv.

Je třeba nosit ochranný oděv (minimálně typ 6 dle normy EN 13034).

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků před dojením přípravek bez obsahu jódu.

4.2.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3. **Popis použití**

*Tabulka 3.*

**Použití # 3 – Koncentráty – koncentráty pro profesionální použití s poměry ředění 1:3, 1:4 a 1:7 pro dezinfekci po dojení – metoda nanesení pěny**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace nanesením pěny.<br>Aplikace pomocí zpěňovacího aplikátoru: Použijte zpěňovací aplikátor. Naředěný roztok nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté opakovaně stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do vzniklé pěny. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |

| | |
|---|---|
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství naředěného přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml)<br>Přípravek je třeba naředit dle poměru uvedeného na štítku:<br>1 díl přípravku na 3 díly vody,<br>1 díl přípravku na 4 díly vody,<br>1 díl přípravku na 7 dílů vody.<br>Obsah jódu v naředěném roztoku je v rozmezí 0,29 a 0,52 hm. %.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení ponořte dvě třetiny délky každého struku do naředěného roztoku přípravku.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám

(materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku) a ochranné brýle.

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků před dojením přípravek bez obsahu jódu.

4.3.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ [1] META SPC 1

5.1. **Pokyny pro používání**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi.

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu vyšší než 20 °C.

Před aplikací přípravek nařeďte dle poměru uvedeného na štítku přípravku. Ruční ředění koncentrátu: pro dosažení požadovaného zředění přidejte poměr koncentrátu a vody uvedený na štítku přípravku do nádoby vhodného rozměru. Smíchejte tak, aby se vytvořil homogenní roztok.

Před připojením dojicího zařízení by měly být veškeré zbytky přípravku na strucích odstraněny jednorázovou nebo opakovaně použitelnou utěrkou. Jedna utěrka by měla být použita na jedno zvíře (krávu).

K zajištění dostatečné účinnosti proti bakteriím a kvasinkám musí být přípravek ponechán v kontaktu s pokožkou po dobu nejméně 60 sekund.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

Přípravek lze použít během celé doby laktace.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Před opětovným použitím kontaminovaný oděv svlékněte a vyperte.

V případě nadýchání: V případě neúmyslného nadýchání výparů vzniklých přehřátím nebo hořením přípravku přejděte na čerstvý vzduch. V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě styku s kůží: Umyjte postižené místo vodou a mýdlem. Pokud podráždění pokožky přetrvává, vyhledejte lékaře.

V případě zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody i pod víčky a vyplachujte po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření očním lékařem.

V případě požití: Vypláchněte ústa a vypijte dostatečné množství vody. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Poraďte se s lékařem.

V případě rozlití velkého množství přípravku uniklý přípravek absorbujte dostatečným množstvím absorbentu (např. písek, zemina, vermikulit nebo křemelina), absorpční materiál uložte do uzavřených nádob označených pro sběr nebezpečného odpadu a následně předejte oprávněné osobě.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Chraňte před mrazem.

Neskladujte při teplotách nad 30 °C.

Doba použitelnosti je 12 měsíců.

6. DALŠÍ INFORMACE

[1] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

| Obchodní název | Ioklene Concentrate. Coars Dual | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo povolení | EU-0020125-0001 1-1 | | | | |
| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 1,58 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9 – 11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 1,51 |

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

| Obchodní název | Clinidip L Concentrate, Maxadine C, Diamond 3:1 Concentrate, Kristal 321, IO Spray 3:1 Concentrate, Coars Shield | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo povolení | EU-0020125-0002 1-1 | | | | |
| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 2,06 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9 – 11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 1,96 |

7.3. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

| Obchodní název | Clinidip Superconcentrate, Dunglinson Super IO 421 Concentrate, Ceanodine 4:1, Iodosan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo povolení | EU-0020125-0003 1-1 | | | | |
| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 2,47 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9 – 11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 2,35 |

7.4. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

| Obchodní název | Priodine, Diamond Predip | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo povolení | EU-0020125-0004 1-1 | | | | |
| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 2,32 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9 – 11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 2,21 |

**META SPC 2**

1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1. **Identifikátor meta SPC 2**

| Identifikátor | Meta SPC 2 - Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - ošetření před a po dojení |
|---|---|

1.2. **Přípona k číslu povolení**

| Číslo | 1-2 |
|---|---|

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

| Typ přípravku (typy přípravků) | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
|---|---|

2. SLOŽENÍ META SPC 2

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2**

| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,16 | 0,5 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9 – 11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,0 | 0,56 |

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 2**

| | |
|---|---|
| Forma (formy) | AL - Jakákoliv jiná kapalina |

3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

| | |
|---|---|
| Standardní věty o nebezpečnosti | Může být korozivní pro kovy.<br>Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| Pokyny pro bezpečné zacházení | Zabraňte uvolnění do životního prostředí.<br>Odstraňte obsah/<br>obal předáním oprávněné osobě.<br>Uniklý produkt seberte. |

4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1. **Popis použití**

*Tabulka 4.*

**Použití # 1 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - ošetření před dojením - metoda namočení**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace namočením.<br>Aplikace pomocí namáčecí nádoby: Použijte aplikační nádobu se zpětným ventilem. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do přípravku. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je v rozmezí 0,16 a 0,3 hm. %..<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |

| | |
|---|---|
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků po dojení přípravek bez obsahu jódu.

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2. **Popis použití**

*Tabulka 5.*

**Použití # 2 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - ošetření před dojením - metoda postřiku**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky<br>[[...]] |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace postřikem.<br>Aplikace pomocí tlakového postřikovače: Přívodní část postřikovače je umístěna v nádobě s přípravkem. Přípravek se poté čerpá do trysky postřikovače umístěné v dojírně. Použijte postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem.<br>Aplikace pomocí ručního postřikovače: Naplňte ruční postřikovač přípravkem. Použijte ruční postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem. |

| | |
|---|---|
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je v rozmezí 0,16 a 0,3 hm. %.<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Při aplikaci přípravku ručním postřikem používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku).

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků po dojení přípravek bez obsahu jódu.

4.2.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3. **Popis použití**

*Tabulka 6.*

**Použití # 3 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - ošetření před dojením – metoda nanesení pěny**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky<br>[[...]] |

| | |
|---|---|
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace nanesením pěny.<br>Aplikace pomocí zpěňovacího aplikátoru: Použijte zpěňovací aplikátor. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté opakovaně stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do vzniklé pěny. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je v rozmezí 0,16 a 0,3 hm. %.<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků po dojení přípravek bez obsahu jódu.

4.3.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4. **Popis použití**

*Tabulka 7.*

**Použití # 4 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - ošetření po dojení - metoda namočení**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace namočením.<br>Aplikace pomocí namáčecí nádoby: Použijte aplikační nádobu se zpětným ventilem. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do přípravku. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je v rozmezí 0,16 a 0,5 hm. %.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení ponořte dvě třetiny délky každého struku do přípravku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků před dojením přípravek bez obsahu jódu.

4.4.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5. **Popis použití**

*Tabulka 8.*

**Použití # 5 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - ošetření po dojení – metoda postřiku**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace postřikem.<br>Aplikace pomocí tlakového postřikovače: Přívodní část postřikovače je umístěna v nádobě s přípravkem. Přípravek se poté čerpá do trysky postřikovače umístěné v dojírně. Použijte postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem.<br>Aplikace pomocí ručního postřikovače: Naplňte ruční postřikovač přípravkem. Použijte ruční postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je v rozmezí 0,16 a 0,5 hm. %.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.5.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení aplikujte přípravek pomocí postřikovače k pokrytí spodních dvou třetin každého struku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

4.5.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Při aplikaci přípravku ručním postřikem používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku) a vhodnou pracovní obuv.

Je třeba nosit ochranný oděv (minimálně typ 6 dle normy EN 13034).

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků před dojením přípravek bez obsahu jódu.

4.5.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.6. **Popis použití**

*Tabulka 9.*

**Použití # 6 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - ošetření po dojení – metoda nanesení pěny**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace nanesením pěny.<br>Aplikace pomocí zpěňovacího aplikátoru: Použijte zpěňovací aplikátor. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté opakovaně stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do vzniklé pěny. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je v rozmezí 0,16 a 0,5 hm. %.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |

| | |
|---|---|
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.6.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení ponořte dvě třetiny délky každého struku do přípravku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

4.6.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků před dojením přípravek bez obsahu jódu.

4.6.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.6.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.6.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.7. **Popis použití**

*Tabulka 10.*

**Použití # 7 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - před a po dojení – metoda namočení**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace namočením.<br>Aplikace pomocí namáčecí nádoby: Použijte aplikační nádobu se zpětným ventilem. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do přípravku. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |

| | |
|---|---|
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je v rozmezí 0,16 a 0,3 hm. %.<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.7.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení:

Po dojení ponořte dvě třetiny délky každého struku do přípravku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

4.7.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Při aplikaci přípravku používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku).

Tento přípravek lze použít k dezinfekci struků před a po dojení. Nesmí se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jodu.

4.7.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.7.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.7.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.8. **Popis použití**

*Tabulka 11.*

**Použití # 8 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - před a po dojení – metoda postřiku**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace postřikem.<br>Aplikace pomocí tlakového postřikovače: Přívodní část postřikovače je umístěna v nádobě s přípravkem. Přípravek se poté čerpá do trysky postřikovače umístěné v dojírně. Použijte postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem.<br>Aplikace pomocí ručního postřikovače: Naplňte ruční postřikovač přípravkem. Použijte ruční postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je v rozmezí 0,16 a 0,3 hm. %.<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.8.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení:

Po dojení aplikujte přípravek pomocí postřikovače k pokrytí spodních dvou třetin každého struku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

4.8.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Při aplikaci přípravku ručním postřikem používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku) a vhodnou pracovní obuv.

Je třeba nosit ochranný oděv (minimálně typ 6 dle normy EN 13034).

Tento přípravek lze použít k dezinfekci struků před a po dojení. Nesmí se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jodu.

4.8.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.8.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.8.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.9. **Popis použití**

*Tabulka 12.*

**Použití # 9 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - před a po dojení – metoda nanesení pěny**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace nanesením pěny.<br>Aplikace pomocí zpěňovacího aplikátoru: Použijte zpěňovací aplikátor. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté opakovaně stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do vzniklé pěny. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je v rozmezí 0,16 a 0,3 hm. %.<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.9.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení:

Po dojení ponořte dvě třetiny délky každého struku do přípravku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

4.9.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Při aplikaci přípravku používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku).

Tento přípravek lze použít v kombinaci pro dezinfekci před a po dojení. Nesmí se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jodu.

4.9.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.9.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.9.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

5. Obecný návod k použití ([2]) meta SPC 2

5.1. **Pokyny pro používání**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi.

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu vyšší než 20 °C.

Přípravek lze použít během celé doby laktace.

Před připojením dojicího zařízení by měly být veškeré zbytky přípravku na strucích odstraněny jednorázovou nebo opakovaně použitelnou utěrkou. Jedna utěrka by měla být použita na jedno zvíře (krávu).

K zajištění dostatečné účinnosti proti bakteriím a kvasinkám musí být přípravek ponechán v kontaktu s pokožkou po dobu nejméně 60 sekund.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Před opětovným použitím kontaminovaný oděv svlékněte a vyperte.

V případě nadýchání: V případě neúmyslného nadýchání výparů vzniklých přehřátím nebo hořením přípravku přejděte na čerstvý vzduch.

V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě styku s kůží: Umyjte postižené místo vodou a mýdlem. Pokud podráždění pokožky přetrvává, vyhledejte lékaře.

V případě zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody i pod víčky a vyplachujte po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření očním lékařem.

([2]) Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

V případě požití: Vypláchněte ústa a vypijte dostatečné množství vody. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Poraďte se s lékařem.

V případě rozlití velkého množství přípravku uniklý přípravek absorbujte dostatečným množstvím absorbentu (např. písek, zemina, vermikulit nebo křemelina), absorpční materiál uložte do uzavřených nádob označených pro sběr nebezpečného odpadu a následně předejte oprávněné osobě.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Chraňte před mrazem.

Neskladujte při teplotách nad 30 °C.

Doba použitelnosti je 12 měsíců.

6. DALŠÍ INFORMACE

7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

| Obchodní název | LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/Post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo povolení | EU-0020125-0005 1-2 | | | | |
| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9 – 11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,305 |

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

| Obchodní název | LuxSpray 50, Silkidip, Ceanodine, IoSpray 10, Maxadine RTU, Diamond Superdip, Kristal Iocare Post, KiwiDip, Superdip Excel, Ioguard RTU, Shepherd's IoSpray 50 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo povolení | EU-0020125-0006 1-2 | | | | |
| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9 – 11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,56 |

7.3. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

| Obchodní název | LuxDip 50B, Postguard | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo povolení | EU-0020125-0007 1-2 | | | | |
| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,5 |

7.4. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

| Obchodní název | LuxDip 25, Kote It, Corston Barracide Post Film Forming Dip, Pro-Tect, Kristal Iocare Film, Coars Iodinegel, Coars Iodogel, LuxDip 20B | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo povolení | EU-0020125-0008 1-2 | | | | |
| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,25 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9 – 11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,5 |

**META SPC 3**

1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1. **Identifikátor meta SPC 3**

| Identifikátor | Meta SPC 3 Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - před a po dojení (LuxSpray 15) |
|---|---|

1.2. **Přípona k číslu povolení**

| Číslo | 1-3 |
|---|---|

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

| Typ přípravku (typy přípravků) | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
|---|---|

2. SLOŽENÍ META SPC 3

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3**

| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Min. | Max. |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,16 | 0,16 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9–11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,166 | 0,166 |

2.2. **Typ(y) složení meta SPC 3**

| | |
|---|---|
| Forma (formy) | AL - Jakákoliv jiná kapalina |

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení pro meta SPC 3

| | |
|---|---|
| Standardní věty o nebezpečnosti | Může být korozivní pro kovy. |
| Pokyny pro bezpečné zacházení | Zabraňte uvolnění do životního prostředí.<br>Odstraňte obsah/<br>obal předáním oprávněné osobě.<br>Uniklý produkt seberte. |

4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1. **Popis použití**

*Tabulka 13.*

**Použití # 1 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - před dojením – metoda namočení**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |

| | |
|---|---|
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace namočením.<br>Aplikace pomocí namáčecí nádoby: Použijte aplikační nádobu se zpětným ventilem. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do přípravku. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je 0,16 hm. %.<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků po dojení přípravek bez obsahu jódu.

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2. **Popis použití**

*Tabulka 14.*

**Použití # 2 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - před dojením – metoda postřiku**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace postřikem.<br>Aplikace pomocí tlakového postřikovače: Přívodní část postřikovače je umístěna v nádobě s přípravkem. Přípravek se poté čerpá do trysky postřikovače umístěné v dojírně. Použijte postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem.<br>Aplikace pomocí ručního postřikovače: Naplňte ruční postřikovač přípravkem. Použijte ruční postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je 0,16 hm. %.<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Při aplikaci přípravku ručním postřikem používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku).

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků po dojení přípravek bez obsahu jódu.

4.2.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3. **Popis použití**

*Tabulka 15*

**Použití # 3 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - před dojením – metoda nanesení pěny**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace nanesením pěny.<br>Aplikace pomocí zpěňovacího aplikátoru: Použijte zpěňovací aplikátor. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté opakovaně stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do vzniklé pěny. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je 0,16 hm. %.<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků po dojení přípravek bez obsahu jódu.

4.3.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4. **Popis použití**

*Tabulka 16.*

**Použití # 4 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - po dojení – metoda namočení**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace namočením.<br>Aplikace pomocí namáčecí nádoby: Použijte aplikační nádobu se zpětným ventilem. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do přípravku. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je 0,16 hm. %.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |

| | |
|---|---|
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení ponořte dvě třetiny délky každého struku do přípravku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků před dojením přípravek bez obsahu jódu.

4.4.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.4.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5. **Popis použití**

*Tabulka 17.*

**Použití # 5 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - po dojení – metoda postřiku**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky<br>[[...]] |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace postřikem.<br>Aplikace pomocí tlakového postřikovače: Přívodní část postřikovače je umístěna v nádobě s přípravkem. Přípravek se poté čerpá do trysky postřikovače umístěné v dojírně. Použijte postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem.<br>Aplikace pomocí ručního postřikovače: Naplňte ruční postřikovač přípravkem. Použijte ruční postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem. |

| | |
|---|---|
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je 0,16 hm. %.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.5.1. Návod k danému způsobu použití

Po dojení aplikujte přípravek pomocí postřikovače k pokrytí spodních dvou třetin každého struku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

4.5.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Při aplikaci přípravku ručním postřikem používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel ovolení v informacích o přípravku) a vhodnou pracovní obuv.

Je třeba nosit ochranný oděv (minimálně typ 6 dle normy EN 13034).

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků před dojením přípravek bez obsahu jódu.

4.5.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.5.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.6. **Popis použití**

*Tabulka 18.*

**Použití # 6 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - po dojení – metoda nanesení pěny**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace nanesením pěny.<br>Aplikace pomocí zpěňovacího aplikátoru: Použijte zpěňovací aplikátor. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté opakovaně stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do vzniklé pěny. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je 0,16 hm. %.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.6.1. Návod k danému způsobu použití

Po dojení ponořte dvě třetiny délky každého struku do přípravku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

4.6.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

V případě dezinfekce struků před i po dojení doporučujeme použít pro dezinfekci struků před dojením přípravek bez obsahu jódu.

4.6.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.6.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.6.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.7. **Popis použití**

*Tabulka 19.*

**Použití # 7 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - před a po dojení – metoda namočení**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace namočením.<br>Aplikace pomocí namáčecí nádoby: Použijte aplikační nádobu se zpětným ventilem. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do naředěného roztoku. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je 0,16 hm. %.<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci |

4.7.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení:

Po dojení ponořte dvě třetiny délky každého struku do přípravku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy poaplikaci alespoň 5 minut stály).

4.7.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Při aplikaci přípravku používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku).

Tento přípravek lze použít k dezinfekci struků před a po dojení. Nesmí se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jodu.

4.7.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.7.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.7.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.8. **Popis použití**

*Tabulka 20.*

**Použití # 8 – Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - před a po dojení – metoda postřiku**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace postřikem.<br>Aplikace pomocí tlakového postřikovače: Přívodní část postřikovače je umístěna v nádobě s přípravkem. Přípravek se poté čerpá do trysky postřikovače umístěné v dojírně. Použijte postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem.<br>Aplikace pomocí ručního postřikovače: Naplňte ruční postřikovač přípravkem. Použijte ruční postřikovač k pokrytí spodních dvou třetin každého struku přípravkem. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je 0,16 hm. %.<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |

| | |
|---|---|
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.8.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení:

Po dojení aplikujte přípravek pomocí postřikovače k pokrytí spodních dvou třetin každého struku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

4.8.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Při aplikaci přípravku ručním postřikem používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku) a vhodnou pracovní obuv.

Je třeba nosit ochranný oděv (minimálně typ 6 dle normy EN 13034).

Tento přípravek lze použít k dezinfekci struků před a po dojení. Nesmí se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jodu.

4.8.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.8.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.8.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.9. **Popis použití**

*Tabulka 21.*

**Použití # 9 –-Kapalné přípravky k přímému použití - pro profesionální použití - před a po dojení – metoda nanesení pěny**

| | |
|---|---|
| Typ přípravku | Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky) |
| V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití | - |
| Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia) | Bakterie<br>Kvasinky |
| Oblast použití | Vnitřní Ve vnitřních prostorách. |

| | |
|---|---|
| Metoda(y) aplikace | Otevřený systém: aplikace nanesením pěny.<br>Aplikace pomocí zpěňovacího aplikátoru: Použijte zpěňovací aplikátor. Přípravek nalijte do zásobníku a našroubujte aplikační nádobu, poté opakovaně stiskněte zásobník. Dvě třetiny délky každého struku ponořte do vzniklé pěny. Odstraňte nepoužitý přípravek předáním oprávněné osobě.<br>Aplikační dávku v namáčecí nádobě lze použít na ošetření struků více zvířat v rámci jednoho dojícího cyklu, použitý roztok již nelze použít pro další dojící cyklus. |
| Aplikační dávka (dávky) a četnost | Množství přípravku na jednu dávku:<br>— krávy a buvoli: 3 až 10 ml (doporučeno 5 ml),<br>— ovce 1,5 až 5 ml (doporučeno 1,5 ml)<br>— kozy 2,5 až 6 ml (doporučeno 2,5 ml).<br>Obsah jódu v přípravku je 0,16 hm. %.<br>2 aplikace před dojením na jedno zvíře za den.<br>2 aplikace po dojení na jedno zvíře za den. |
| Kategorie uživatelů | Vyškolený profesionál<br>profesionál |
| Velikost balení a obalový materiál | Plastový sud (HDPE), 10 l<br>Plastový sud (HDPE), 20 l<br>Plastový sud (HDPE), 25 l<br>Plastový sud (HDPE), 200 l<br>IBC kontejner, plast: HDPE, 1000 l<br>Plastový sud (HDPE), 5 l<br>Všechny obaly s výjimkou obalů o objemu 200 l a 1000 l jsou stříbrné nebo bílé (transparentní) barvy. Sudy o objemu 200 l jsou stříbrné nebo modré barvy. IBC - nebarvený plast.<br>Všechny sudy jsou uzavřeny bezpečnostním víkem a mají UN certifikaci. |

4.9.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po dojení:

Po dojení ponořte dvě třetiny délky každého struku do přípravku.

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby přípravek po aplikaci nebyl odstraněn (např. zajistěte, aby krávy po aplikaci alespoň 5 minut stály).

4.9.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Při aplikaci přípravku používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám

(materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku).

Tento přípravek lze použít v kombinaci pro dezinfekci před a po dojení. Nesmí se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jodu.

4.9.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.9.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

4.9.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití.

5. Obecný návod k použití ([3]) meta SPC 3

5.1. **Pokyny pro používání**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi.

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu vyšší než 20 °C.

Přípravek lze použít během celé doby laktace.

Před připojením dojicího zařízení by měly být veškeré zbytky přípravku na strucích odstraněny jednorázovou nebo opakovaně použitelnou utěrkou. Jedna utěrka by měla být použita na jedno zvíře (krávu).

K zajištění dostatečné účinnosti proti bakteriím a kvasinkám musí být přípravek ponechán v kontaktu s pokožkou po dobu nejméně 60 sekund.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Před opětovným použitím kontaminovaný oděv svlékněte a vyperte.

V případě nadýchání: V případě neúmyslného nadýchání výparů vzniklých přehřátím nebo hořením přípravku přejděte na čerstvý vzduch.

V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě styku s kůží: Umyjte postižené místo vodou a mýdlem. Pokud podráždění pokožky přetrvává, vyhledejte lékaře.

V případě zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody i pod víčky a vyplachujte po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření očním lékařem.

V případě požití: Vypláchněte ústa a vypijte dostatečné množství vody. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Poraďte se s lékařem.

V případě rozlití velkého množství přípravku uniklý přípravek absorbujte dostatečným množstvím absorbentu (např. písek, zemina, vermikulit nebo křemelina), absorpční materiál uložte do uzavřených nádob označených pro sběr nebezpečného odpadu a následně předejte oprávněné osobě.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

Po dokončení ošetření nepoužitý přípravek a obal zlikvidujte podle místních požadavků. Použitý produkt lze v závislosti na místních požadavcích spláchnout do městské kanalizace nebo vyhodit na hnůj. Vyvarujte se uvolnění do samostatné čistírny odpadních vod na pozemku farmy.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Chraňte před mrazem.

Neskladujte při teplotách nad 30 °C.

Doba použitelnosti je 12 měsíců.

([3]) Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.

6. DALŠÍ INFORMACE

7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků**

| Obchodní název | LuxSpray 15 - Priodine RTU/Kristal Iocare Pre/Super Pre | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Číslo povolení | EU-0020125-0009 1-3 | | | | |
| Obecný název | Název podle IUPAC | Funkce | Číslo CAS | Číslo ES | Obsah (%) |
| Jod | | účinná látka | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,16 |
| C9-11 Alkohol ethoxylát | Alkohol C 9 – 11 s 6 moly etoxylátu. K dispozici jsou různé značky včetně „Imbentin C-91-060“. | Jiná než účinná látka | 68439-46-3 | 614-482-0 | 0,166 |