II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/202 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Οκτωβρίου 2019

για τη χορήγηση ενωσιακής άδειας για την οικογένεια βιοκτόνων προϊόντων «Iodine Teat Dip Products»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ([1]), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 20 Αυγούστου 2015, η GEA Farm Technologies GmbH υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τη χορήγηση άδειας για την οικογένεια βιοκτόνων με την ονομασία «Iodine Teat Dip Products» («η οικογένεια βιοκτόνων») του τύπου προϊόντων 3, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού. Η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησε να αξιολογήσει την αίτηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η αίτηση καταχωρίστηκε με τον αριθμό υπόθεσης BC-AL019223-55 στο Μητρώο Βιοκτόνων.

(2) Η οικογένεια βιοκτόνων περιέχει ως δραστική ουσία ιώδιο, το οποίο περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Λαμβάνοντας υπόψη τις εγγενείς ιδιότητες της δραστικής ουσίας, καθώς και τα επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη, που ορίζονται στην κατ' εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής ([2]), η Επιτροπή θα εκτιμήσει την ανάγκη επανεξέτασης της έγκρισης του ιωδίου, συμπεριλαμβανομένης της ιωδιούχου πολυβινυλοπυρρολιδόνης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή θα εξετάσει στη συνέχεια κατά πόσον οι ενωσιακές άδειες για τα προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία πρέπει να επανεξεταστούν σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3) Στις 6 Ιουνίου 2018 η αρμόδια αρχή αξιολόγησης υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, την έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησής της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός»).

(4) Στις 18 Ιανουαρίου 2019 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή γνωμοδότηση ([3]), συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου («ΠΧΠ») της οικογένειας βιοκτόνων και την τελική έκθεση αξιολόγησης για την οικογένεια βιοκτόνων σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οικογένεια βιοκτόνων εμπίπτει στον ορισμό της «οικογένειας βιοκτόνων», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ότι είναι επιλέξιμη για άδεια της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και ότι, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο της ΠΧΠ, η οικογένεια βιοκτόνων πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 6 του εν λόγω κανονισμού.

([1]) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

([2]) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2100 της Επιτροπής, της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 301 της 17.11.2017, σ. 1).

([3]) Γνωμοδότηση του ECHA, της 14ης Δεκεμβρίου 2018, για τη χορήγηση ενωσιακής άδειας για προϊόντα «Iodine Teat Dip Products» (ECHA/BPC/217/2018).

(5) Στις 20 Μαΐου 2019 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή το σχέδιο ΠΧΠ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(6) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού και, επομένως, θεωρεί σκόπιμη τη χορήγηση ενωσιακής άδειας για την οικογένεια βιοκτόνων.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται ενωσιακή άδεια στην GEA Farm Technologies GmbH για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση της οικογένειας βιοκτόνων «Iodine Teat Dip Products» με αριθμό έγκρισης EE-0020125-0000 σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου που παρατίθεται στο παράρτημα.

Η ενωσιακή άδεια ισχύει από τις 11 Νοεμβρίου 2019 έως τις 31 Οκτωβρίου 2029.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

Iodine Teat dip products

Τύπος προϊόντων 3 – Κτηνιατρική υγιεινή (Απολυμαντικά)

Αριθμός άδειας: EU-0020125-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: EU-0020125-0000

ΜΕΡΟΣ I

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. **Επώνυμο**

Ονομασία	Iodine Teat dip products

1.2. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή

1.3. **Κάτοχος άδειας**

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	GEA Farm Technologies GmbH
	Διεύθυνση	Siemensstraße 25-27, 59199, Bönen, Γερμανία
Αριθμός άδειας	EU-0020125-0000	
Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP	EU-0020125-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	11 November 2019	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31 October 2019	

1.4. **Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων**

Επωνυμία παρασκευαστή	GEA Farm Technologies
Διεύθυνση παρασκευαστή	Wylye Works, BA12 9HT Warminster Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Wylye Works, Watery Lane, BA12 9HT Warminster Ηνωμένο Βασίλειο Gewerbestraße 5, 5325 Plainfeld Αυστρία ul. Olowiana 10, 85-461 Bydgoszcz Πολωνία

1.5. **Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών**

Δραστικής ουσίας	Ιώδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	SQM Europe N.V.
Διεύθυνση παρασκευαστή	St Pietersvliet 7„ bus 8 2000 Antwerp Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes, 4290 Piso 4 Santiago Χιλή

Δραστικής ουσίας	Ιώδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299-4205 Chosei-Gun Ιαπωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299-4205 Chosei-Gun Ιαπωνία

Δραστικής ουσίας	Ιώδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	Norkem Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Norkem House, Bexton Lane„ WA16 9FB Knutsford Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	OFICINA CALA CALA S/N, Unknown POZO ALMONTE Χιλή

2. ΣΎΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΎΑΣΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,16	2,47
C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου. Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	0,0	2,35

2.2. **Τύπος(οι) σκευάσματος**

Σκεύασμα(σκευάσματα)	AL – Κάθε άλλο υγρό SL – Πυκνό διάλυμα

ΜΕΡΟΣ II

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – META-SPC

Μετα-SPC 1

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΜΕΤΑ-SPC 1

1.1. **Αναγνωριστικό μετα-SPC 1**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC 1 – Συμπυκνώματα – Επαγγελματικά συμπυκνώματα με αναλογίες αραίωσης 1: 3, 1: 4 και 1: 7

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-1

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή

2. ΣΎΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ-SPC 1

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 1**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	1,58	2,47
C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου. Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	1,51	2,35

2.2. **Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 1**

Σκεύασμα(σκευάσματα)	SL – Πυκνό διάλυμα

3. ΔΗΛΏΣΕΙς ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑς ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗς ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο θυρεοειδή αδένα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	Μην αναπνέετε ατμούς. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:Συμβουλευθείτε γιατρό. Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ/-Ες ΧΡΉΣΗ/-ΕΙς ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1.

Χρήση # 1 – Συμπυκνώματα – Επαγγελματικά συμπυκνώματα με ρυθμούς αραίωσης 1: 3, 1: 4 και 1: 7, για μετά το άρμεγμα – εμβάπτιση

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλλου εμβάπτισης: Χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό κύπελο εμβάπτισης με βαλβίδες αντεπιστροφής, διανείμετε το αραιωμένο προϊόν στη δεξαμενή. Βιδώστε το τμήμα εφαρμογής. Πιέστε τη δεξαμενή για να γεμίσετε το εφαρμογέα. Καλύψτε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με υλικό. Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο υλικό μετά από κάθε άρμεγμα Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος. Τα κύπελλα πρέπει να ξαναγεμίζονται με φρέσκο διάλυμα πριν από την έναρξη της νέας περιόδου αρμέγματος
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα αραιωμένου προϊόντος που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Το προϊόν πρέπει να αραιώνεται με το σχετικό ποσοστό που αναγράφεται στην ετικέτα. Είτε; 25 % (1 μέρος προϊόντος σε 3 μέρη νερού) 20 % (1 μέρος προϊόντος σε 4 μέρη νερού) 12,5 % (1 μέρος προϊόντος έως 7 μέρη νερού) Κατά τη χρήση της συγκέντρωσης προϊόντων μεταξύ 0,29 και 0,52 % (β/β) ιωδίου. 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βάλτε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια και προστασία των ματιών όταν χειρίζεστε το συμπύκνωμα

(υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στο πλαίσιο των πληροφοριών για το προϊόν).

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος χωρίς ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2.

Χρήση # 2 – Συμπυκνώματα – Επαγγελματικά συμπυκνώματα με ρυθμούς αραίωσης 1: 3, 1: 4 και 1: 7, για μετά το άρμεγμα – ψεκασμό

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό Εφαρμογή μέσω πνευματικού ψεκαστήρα: Ο σωλήνας εισαγωγής του συστήματος ψεκασμού τοποθετείται στο δοχείο του αραιωμένου προϊόντος. Το αραιωμένο προϊόν στη συνέχεια αντλείται σε έναν ακροφύσιο ψεκασμού που βρίσκεται στο θάλαμο αρμέγματος. Στη συνέχεια, η λυχνία ψεκασμού χρησιμοποιείται για να καλύψει τα δύο τρίτα των θηλών στο αραιωμένο προϊόν Εφαρμογή μέσω χειροκίνητου σπρέι σκανδάλης: Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με αραιωμένο προϊόν. Χρησιμοποιήστε σπρέι σκανδάλης για να καλύψετε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με αραιωμένο προϊόν
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα αραιωμένου προϊόντος που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Το προϊόν πρέπει να αραιώνεται με το σχετικό ποσοστό που αναγράφεται στην ετικέτα. Είτε; 25 % (1 μέρος προϊόντος σε 3 μέρη νερού) 20 % (1 μέρος προϊόντος σε 4 μέρη νερού) 12,5 % (1 μέρος προϊόντος έως 7 μέρη νερού) Κατά τη χρήση της συγκέντρωσης προϊόντων μεταξύ 0,29 και 0,52 % (β/β) ιωδίου. 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά) ασημί ή φυσικό (λευκό ημιδιαφανές) σε χρώμα. Δοχεία 200 l (200 kg) είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Ψεκάστε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια και προστασία των ματιών όταν χειρίζεστε το συμπύκνωμα

(υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στο πλαίσιο των πληροφοριών για το προϊόν).

Να φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια και μπότες κατά την εφαρμογή του προϊόντος με χειροκίνητο ψεκασμό (υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος)

Πρέπει να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034)

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος χωρίς ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3.

Χρήση # 3 – Συμπυκνώματα – Επαγγελματικά συμπυκνώματα με ρυθμούς αραίωσης 1: 3, 1: 4 και 1: 7, για μετά το άρμεγμα – αφρισμός

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλου αφρισμού: Όσο για το κύπελλο αφρισμού, όμως, όταν συμπιέζεται, το υγρό αναγκάζεται μέσα από ένα λεπτό πλέγμα, να αναμιχθεί με αέρα και να σχηματίσει αφρό. Αυτό εφαρμόζεται στη συνέχεια στα κάτω δύο τρίτα του μαστού της αγελάδας Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα αραιωμένου προϊόντος που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Το προϊόν πρέπει να αραιώνεται με το σχετικό ποσοστό που αναγράφεται στην ετικέτα. Είτε; 25 % (1 μέρος προϊόντος σε 3 μέρη νερού) 20 % (1 μέρος προϊόντος σε 4 μέρη νερού) 12,5 % (1 μέρος προϊόντος έως 7 μέρη νερού) Κατά τη χρήση της συγκέντρωσης προϊόντων μεταξύ 0,29 και 0,52 % (β/β) ιωδίου. 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βάλτε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια και προστασία των ματιών όταν χειρίζεστε το συμπύκνωμα

(υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στο πλαίσιο των πληροφοριών για το προϊόν).

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος χωρίς ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

5. ΓΕΝΙΚΈς ΟΔΗΓΊΕς ΧΡΉΣΗς ([1])ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Το προϊόν πρέπει να φέρεται σε θερμοκρασία πάνω από 20 °C πριν από τη χρήση.

Αραιώστε το προϊόν πριν από την εφαρμογή σύμφωνα με την αναλογία που καθορίζεται στην ετικέτα του προϊόντος

Ομοιόμορφη αραίωση του συμπυκνώματος. Προστίθεται ο λόγος του συμπυκνώματος και του νερού, που αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος, σε δοχείο κατάλληλου μεγέθους ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη αραίωση. Αναμίξτε σε ομοιόμορφο διάλυμα.

Πριν από την τοποθέτηση του συγκροτήματος αρμέγματος, όλα τα υπολείμματα του υγρού εμβάπτισης θηλών θα πρέπει να αφαιρεθούν είτε με πετσέτα μιας χρήσης είτε με επαναχρησιμοποιούμενο πανί. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα πανί ανά αγελάδα

Για αποτελεσματική χρήση ενάντια στα βακτήρια και τη ζύμη, το προϊόν πρέπει να παραμείνει σε επαφή με το δέρμα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά).

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια της γαλουχίας

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Βλ. συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνου.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α’ βοήθειών**

Αφαιρέστε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν επαναχρησιμοποιήσετε.

Μετά από εισπνοή: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής καπνών από υπερθέρμανση ή καύση.

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με νερό και σαπούνι ως προφύλαξη. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική περίθαλψη από ειδικό για τα μάτια.

Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και δώστε άφθονο νερό για να πιείτε. Ποτέ μη χορηγείτε ο, τιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Οι μεγάλες διαρροές θα πρέπει να περιέχονται με τη χρήση ενός κιτ χημικής διαρροής, εμποτισμένο με απορροφητικό υλικό όπως το kieselguhr και να απορρίπτεται ως επικίνδυνο απόβλητο.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Το χρησιμοποιημένο προϊόν μπορεί να ξεπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφύγετε την αποδέσμευση σε μια μεμονωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με βάση την εκμετάλλευση.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Προστατεύστε από τον παγετό

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 30 °C

Διάρκεια ζωής 12 μήνες

6. ΆΛΛΕς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς

([1]) Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 1.

7. ΤΡΊΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΤΙς ΜΕΤΑ-SPC 1

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Ioklene Concentrate. Coars Dual				
Αριθμός άδειας	EU-0020125-0001 1-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	1,58
C9-11 C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου. Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	1,51

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Clinidip L Concentrate, Maxadine C, Diamond 3:1 Concentrate, Kristal 321, IO Spray 3:1 Concentrate, Coars Shield				
Αριθμός άδειας	EU-0020125-0002 1-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	2,06
C9-11 C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	1,96

7.3. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Clinidip Superconcentrate, Dunglinson Super IO 421 Concentrate, Ceanodine 4:1, Iodosan				
Αριθμός άδειας	EU-0020125-0003 1-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	2,47
C9-11 C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	2,35

7.4. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Priodine, Diamond Predip				
Αριθμός άδειας	EU-0020125-0004 1-1				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	2,32
C9-11 C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	2,21

META-SPC 2

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ META-SPC 2

1.1. **Αναγνωριστικό μετα-SPC 2**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC 2 RTU (Έτοιμα προς χρήση) Προϊόντα – Επαγγελματικό Υγρό RTU για εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-2

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή

2. ΣΎΝΘΕΣΗ META-SPC 2

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 2**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,16	0,5
C9-11 C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,56

2.2. **Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 2**

Σκεύασμα(σκευάσματα)	AL – Κάθε άλλο υγρό

3. ΔΗΛΏΣΕΙς ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑς ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗς ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
Δηλώσεις προφύλαξης	Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ/-Ες ΧΡΉΣΗ/-ΕΙς ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4.

Χρήση # 1 – Προϊόντα RTU – Επαγγελματικό Υγρό RTU, για εφαρμογή πριν από το άρμεγμα – εμβάπτιση

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλλου εμβάπτισης: Χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό κύπελλο εμβάπτισης με βαλβίδες αντεπιστροφής, διανείμετε το RTU προϊόν στη δεξαμενή. Βιδώστε το τμήμα εφαρμογής. Πιέστε τη δεξαμενή για να γεμίσετε το εφαρμογέα. Καλύψτε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με υλικό. Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο υλικό μετά από κάθε άρμεγμα Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16-0,30 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση μετά το άρμεγμα

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 5.

Χρήση # 2 – Προϊόντα – Επαγγελματικό Υγρό RTU, για εφαρμογή πριν από το άρμεγμα – ψεκασμό

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό Εφαρμογή μέσω πνευματικού ψεκαστήρα: Ο σωλήνας εισαγωγής του συστήματος ψεκασμού τοποθετείται στο δοχείο του RTU προϊόντος. Το RTU προϊόν στη συνέχεια αντλείται σε έναν ακροφύσιο ψεκασμού που βρίσκεται στο θάλαμο αρμέγματος. Στη συνέχεια, η λυχνία ψεκασμού χρησιμοποιείται για να καλύψει τα δύο τρίτα των θηλών στο RTU προϊόν Εφαρμογή μέσω χειροκίνητου σπρέι σκανδάλης: Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με RTU προϊόν. Χρησιμοποιήστε σπρέι σκανδάλης για να καλύψετε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με RTU προϊόν

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16-0,30 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια κατά την εφαρμογή του προϊόντος με χειροκίνητο ψεκασμό (υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος)

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση μετά το άρμεγμα

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 6.

Χρήση # 3 – RTU Προϊόντα – Επαγγελματικό Υγρό RTU, για εφαρμογή πριν από το άρμεγμα – αφρισμός

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες

Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλλου αφρισμού: Όσο για το κύπελλο αφρισμού, όμως, όταν συμπιέζεται, το υγρό αναγκάζεται μέσα από ένα λεπτό πλέγμα, να αναμιχθεί με αέρα και να σχηματίσει αφρό. Αυτό εφαρμόζεται στη συνέχεια στα κάτω δύο τρίτα του μαστού της αγελάδας Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16-0,30 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση μετά το άρμεγμα

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 7.

Χρήση # 4 – RTU Προϊόντα – Επαγγελματική RTU Υγρό, για εφαρμογή μετά το άρμεγμα – εμβάπτιση

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλλου εμβάπτισης: Χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό κύπελλο εμβάπτισης με βαλβίδες αντεπιστροφής, διανείμετε το RTU προϊόν στη δεξαμενή. Βιδώστε το τμήμα εφαρμογής. Πιέστε τη δεξαμενή για να γεμίσετε το εφαρμογέα. Καλύψτε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με υλικό. Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο υλικό μετά από κάθε άρμεγμα Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16-0,50 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βάλτε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά).

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 8.

Χρήση # 5 – RTU Προϊόντα – Επαγγελματική RTU Υγρό, για εφαρμογή μετά το άρμεγμα – ψεκασμό

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό Εφαρμογή μέσω πνευματικού ψεκαστήρα: Ο σωλήνας εισαγωγής του συστήματος ψεκασμού τοποθετείται στο δοχείο του RTU προϊόντος. Το RTU προϊόν στη συνέχεια αντλείται σε έναν ακροφύσιο ψεκασμού που βρίσκεται στο θάλαμο αρμέγματος. Στη συνέχεια, η λυχνία ψεκασμού χρησιμοποιείται για να καλύψει τα δύο τρίτα των θηλών στο RTU προϊόν Εφαρμογή μέσω χειροκίνητου σπρέι σκανδάλης: Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με προϊόν. Χρησιμοποιήστε σπρέι σκανδάλης για να καλύψετε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με προϊόν
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16-0,50 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.5.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Ψεκάστε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά).

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος: Να φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια και μπότες κατά την εφαρμογή του προϊόντος με χειροκίνητο ψεκασμό (υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος)

Πρέπει να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034)

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 9.

Χρήση # 6 – RTU Προϊόντα – Επαγγελματική RTU Υγρό, για εφαρμογή μετά το άρμεγμα – αφρισμός

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλλου αφρισμού: Όσο για το κύπελλο εμβάπτισης, όμως, όταν συμπιέζεται, το υγρό αναγκάζεται μέσα από ένα λεπτό πλέγμα, να αναμιχθεί με αέρα και να σχηματίσει αφρό. Αυτό εφαρμόζεται στη συνέχεια στα κάτω δύο τρίτα του μαστού της αγελάδας Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16-0,50 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.6.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βάλτε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά)

4.6.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα

4.6.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.7. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 10.

Χρήση # 7 – Προϊόντα RTU – Επαγγελματικό Υγρό RTU, για εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα-Εμβάπτιση

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλλου εμβάπτισης: Χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό κύπελλο εμβάπτισης με βαλβίδες αντεπιστροφής, διανείμετε το RTU προϊόν στη δεξαμενή. Βιδώστε το τμήμα εφαρμογής. Πιέστε τη δεξαμενή για να γεμίσετε το εφαρμογέα. Καλύψτε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με υλικό. Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο υλικό μετά από κάθε άρμεγμα Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16-0,30 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.7.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μετά το άρμεγμα:

Βάλτε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά).

4.7.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια κατά την εφαρμογή του προϊόντος με εμβάπτιση (υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος).

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα σε συνδυασμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό προϊόν με βάση το ιώδιο.

4.7.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.7.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.7.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.8. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 11.

Χρήση # 8 – Προϊόντα RTU – Επαγγελματικό Υγρό RTU, για εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα-ψεκασμό

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό Εφαρμογή μέσω πνευματικού ψεκαστήρα: Ο σωλήνας εισαγωγής του συστήματος ψεκασμού τοποθετείται στο δοχείο του RTU προϊόντος. Το RTU προϊόν στη συνέχεια αντλείται σε έναν ακροφύσιο ψεκασμού που βρίσκεται στο θάλαμο αρμέγματος. Στη συνέχεια, η λυχνία ψεκασμού χρησιμοποιείται για να καλύψει τα δύο τρίτα των θηλών στο RTU προϊόν Εφαρμογή μέσω χειροκίνητου σπρέι σκανδάλης: Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με αραιωμένο προϊόν. Χρησιμοποιήστε σπρέι σκανδάλης για να καλύψετε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με αραιωμένο προϊόν
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16-0,30 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.8.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μετά το άρμεγμα:

Ψεκάστε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά).

4.8.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια και μπότες κατά την εφαρμογή του προϊόντος με χειροκίνητο ψεκασμό (υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος)

Πρέπει να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034)

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα σε συνδυασμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό προϊόν με βάση το ιώδιο.

4.8.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.8.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.8.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.9. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 12.

Χρήση # 9 – Προϊόντα RTU – Επαγγελματικό Υγρό RTU, για εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα – αφρισμός

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλλου αφρισμού: Όσο για το κύπελλο αφρισμού, όμως, όταν συμπιέζεται, το υγρό αναγκάζεται μέσα από ένα λεπτό πλέγμα, να αναμιχθεί με αέρα και να σχηματίσει αφρό. Αυτό εφαρμόζεται στη συνέχεια στα κάτω δύο τρίτα του μαστού της αγελάδας Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16-0,30 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.9.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μετά το άρμεγμα:

Βάλτε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά).

4.9.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια κατά την εφαρμογή του προϊόντος με (υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας) εντός των πληροφοριών του προϊόντος).

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα σε συνδυασμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό προϊόν με βάση το ιώδιο.

4.9.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.9.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.9.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

5. ΓΕΝΙΚΈς ΟΔΗΓΊΕς ΧΡΉΣΗς ([2])ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Το προϊόν πρέπει να φέρεται σε θερμοκρασία πάνω από 20 °C πριν από τη χρήση.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ 'όλη τη διάρκεια της γαλουχίας

Πριν από την τοποθέτηση του συγκροτήματος αρμέγματος, όλα τα υπολείμματα του υγρού εμβάπτισης θηλών θα πρέπει να αφαιρεθούν είτε με πετσέτα μιας χρήσης είτε με επαναχρησιμοποιούμενο πανί. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα πανί ανά αγελάδα

Για αποτελεσματική χρήση ενάντια στα βακτήρια και τη ζύμη, το προϊόν πρέπει να παραμείνει σε επαφή με το δέρμα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Βλ. συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνου.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών**

Αφαιρέστε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν επαναχρησιμοποιήσετε.

Μετά από εισπνοή: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής καπνών από υπερθέρμανση ή καύση.

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με νερό και σαπούνι ως προφύλαξη. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική περίθαλψη από ειδικό για τα μάτια.

([2]) Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 2.

Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και δώστε άφθονο νερό για να πιείτε. Ποτέ μη χορηγείτε ο, τιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Οι μεγάλες διαρροές θα πρέπει να περιέχονται με τη χρήση ενός κιτ χημικής διαρροής, εμποτισμένο με απορροφητικό υλικό όπως το kieselguhr και να απορρίπτεται ως επικίνδυνο απόβλητο.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Το χρησιμοποιημένο προϊόν μπορεί να ξεπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να διατεθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφύγετε την αποδέσμευση σε μια μεμονωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με βάση την εκμετάλλευση.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Προστατεύστε από τον παγετό

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 30 °C

Διάρκεια ζωής 12 μήνες

6. ΆΛΛΕς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς

7. ΤΡΊΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΤΙς ΜΕΤΑ-SPC 2

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/Post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre				
Αριθμός άδειας	EU-0020125-0005 1-2				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,3
C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	0,305

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	LuxSpray 50, Silkidip, Ceanodine, IoSpray 10, Maxadine RTU, Diamond Superdip, Kristal Iocare Post, KiwiDip, Superdip Excel, Ioguard RTU, Shepherd's IoSpray 50				
Αριθμός άδειας	EU-0020125-0006 1-2				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,5
C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου. Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	0,56

7.3. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	LuxDip 50B, Postguard				
Αριθμός άδειας	EU-0020125-0007 1-2				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,5

7.4. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	LuxDip 25, Kote It, Corston Barracide Post Film Forming Dip, Pro-Tect, Kristal Iocare Film, Coars Iodinegel, Coars Iodogel, LuxDip 20B				
Αριθμός άδειας	EU-0020125-0008 1-2				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,25
C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου. Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	0,5

META-SPC 3

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ META-SPC 3

1.1. **Αναγνωριστικό μετα-SPC 3**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC 3- RTU (Έτοιμα Προς Χρήση) Προϊόντα-Επαγγελματικό Υγρό RTU για εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα (LuxSpray 15)

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-3

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή

2. ΣΎΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ-SPC 3

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 3**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελάχ.	Μέγ.
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,16	0,5
C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,56

2.2. **Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 3**

Σκεύασμα(σκευάσματα)	AL – Κάθε άλλο υγρό

3. ΔΗΛΏΣΕΙς ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑς ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗς ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
Δηλώσεις προφύλαξης	Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου σε σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Διάθεση του περιέκτη σε σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ/-Ες ΧΡΉΣΗ/-ΕΙς ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 13.

Χρήση # 1 – RTU Προϊόντα – Επαγγελματική RTU Υγρό, για εφαρμογή πριν από το άρμεγμα – εμβάπτιση

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλλου εμβάπτισης: Χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό κύπελλο εμβάπτισης με βαλβίδες αντεπιστροφής, διανείμετε το RTU προϊόν στη δεξαμενή. Βιδώστε το τμήμα εφαρμογής. Πιέστε τη δεξαμενή για να γεμίσετε το εφαρμογέα. Καλύψτε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με υλικό. Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο υλικό μετά από κάθε άρμεγμα Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση μετά το άρμεγμα

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 14.

Χρήση # 2 – Προϊόντα RTU – Επαγγελματικό RTU Υγρό, για εφαρμογή πριν από το άρμεγμα – ψεκασμό

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό Εφαρμογή μέσω πνευματικού ψεκαστήρα: Ο σωλήνας εισαγωγής του συστήματος ψεκασμού τοποθετείται στο δοχείο τουRTU προϊόντος. Το RTU προϊόν στη συνέχεια αντλείται σε έναν ακροφύσιο ψεκασμού που βρίσκεται στο θάλαμο αρμέγματος. Στη συνέχεια, η λυχνία ψεκασμού χρησιμοποιείται για να καλύψει τα δύο τρίτα των θηλών στο RTU προϊόν Εφαρμογή μέσω χειροκίνητου σπρέι σκανδάλης: Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με RTU προϊόν. Χρησιμοποιήστε σπρέι σκανδάλης για να καλύψετε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με RTU προϊόν
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια κατά την εφαρμογή του προϊόντος με χειροκίνητο ψεκασμό (υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος)

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση μετά το άρμεγμα

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 15.

Χρήση # 3 – RTU Προϊόντα – Professional RTU Υγρό, για εφαρμογή πριν από το άρμεγμα – αφρισμός

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλλου αφρισμού: Όσο για το κύπελλο αφρισμού, όμως, όταν συμπιέζεται, το υγρό αναγκάζεται μέσα από ένα λεπτό πλέγμα, να αναμιχθεί με αέρα και να σχηματίσει αφρό. Αυτό εφαρμόζεται στη συνέχεια στα κάτω δύο τρίτα του μαστού της αγελάδας Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση μετά το άρμεγμα

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 16.

Χρήση # 4 – RTU Προϊόντα – Επαγγελματική RTU Υγρό, για εφαρμογή μετά το άρμεγμα – Εμβάπτιση

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλλου εμβάπτισης: Χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό κύπελλο εμβάπτισης με βαλβίδες αντεπιστροφής, διανείμετε το RTU προϊόν στη δεξαμενή. Βιδώστε το τμήμα εφαρμογής. Πιέστε τη δεξαμενή για να γεμίσετε το εφαρμογέα. Καλύψτε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με υλικό. Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο υλικό μετά από κάθε άρμεγμα Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βάλτε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά).

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 17.

Χρήση # 5 – RTU Προϊόντα – Επαγγελματική RTU Υγρό, για εφαρμογή μετά το άρμεγμα – ψεκασμό

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό Εφαρμογή μέσω πνευματικού ψεκαστήρα: Ο σωλήνας εισαγωγής του συστήματος ψεκασμού τοποθετείται στο δοχείο του RTU προϊόντος. Το RTU προϊόν στη συνέχεια αντλείται σε έναν ακροφύσιο ψεκασμού που βρίσκεται στο θάλαμο αρμέγματος. Στη συνέχεια, η λυχνία ψεκασμού χρησιμοποιείται για να καλύψει τα δύο τρίτα των θηλών στο RTU προϊόν Εφαρμογή μέσω χειροκίνητου σπρέι σκανδάλης: Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με προϊόν. Χρησιμοποιήστε σπρέι σκανδάλης για να καλύψετε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με RTU προϊόν

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ψεκάστε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά).

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια και μπότες κατά την εφαρμογή του προϊόντος με χειροκίνητο ψεκασμό (υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος)

Πρέπει να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034)

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 18.

Χρήση # 6 – RTU Προϊόντα – Επαγγελματική RTU Υγρό, για εφαρμογή μετά το άρμεγμα – αφρισμός

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλου αφρισμού: Όσο για το κύπελλο αφρισμού, όμως, όταν συμπιέζεται, το υγρό αναγκάζεται μέσα από ένα λεπτό πλέγμα, να αναμιχθεί με αέρα και να σχηματίσει αφρό. Αυτό εφαρμόζεται στη συνέχεια στα κάτω δύο τρίτα του μαστού της αγελάδας Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βάλτε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά)

4.6.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά το άρμεγμα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης άλλου προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για απολύμανση πριν από το άρμεγμα

4.6.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.7. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 19.

Χρήση # 7 – Προϊόντα RTU – Επαγγελματικό Υγρό RTU, για εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα-Εμβάπτιση

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλλου εμβάπτισης: Χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό κύπελο εμβάπτισης με βαλβίδες αντεπιστροφής, διανείμετε το RTU προϊόν στη δεξαμενή. Βιδώστε το τμήμα εφαρμογής. Πιέστε τη δεξαμενή για να γεμίσετε το εφαρμογέα. Καλύψτε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με υλικό. Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο υλικό μετά από κάθε άρμεγμα Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.7.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μετά το άρμεγμα:

Βάλτε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά).

4.7.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια κατά την εφαρμογή του προϊόντος με εμβάπτιση (υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος).

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα σε συνδυασμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό προϊόν με βάση το ιώδιο.

4.7.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.7.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.7.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.8. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 20.

Χρήση # 8 – Προϊόντα RTU – Επαγγελματικό Υγρό RTU, για εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα-ψεκασμό

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκασμό Εφαρμογή μέσω πνευματικού ψεκαστήρα: Ο σωλήνας εισαγωγής του συστήματος ψεκασμού τοποθετείται στο δοχείο του RTU προϊόντος. Το RTU προϊόν στη συνέχεια αντλείται σε έναν ακροφύσιο ψεκασμού που βρίσκεται στο θάλαμο αρμέγματος. Στη συνέχεια, η λυχνία ψεκασμού χρησιμοποιείται για να καλύψει τα δύο τρίτα των θηλών στο RTUπροϊόν Εφαρμογή μέσω χειροκίνητου σπρέι σκανδάλης: Γεμίστε τη φιάλη ψεκασμού με RTU προϊόν. Χρησιμοποιήστε σπρέι σκανδάλης για να καλύψετε τα κάτω δύο τρίτα κάθε θηλής με RTU προϊόν
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα

Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.8.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μετά το άρμεγμα:

Ψεκάστε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με αραιωμένο προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά).

4.8.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Να φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια και μπότες κατά την εφαρμογή του προϊόντος με χειροκίνητο ψεκασμό (υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος)

Πρέπει να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034)

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα σε συνδυασμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό προϊόν με βάση το ιώδιο.

4.8.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.8.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.8.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.9. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 21.

Χρήση # 9 – Προϊόντα RTU – Επαγγελματικό Υγρό RTU, για εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα – αφρισμός

Τύπος προϊόντος	PT03 – Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Βακτήρια Ζύμες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με εμβάπτιση Εφαρμογή μέσω κυπέλου αφρισμού: Όσο για το κύπελλο αφρισμού, όμως, όταν συμπιέζεται, το υγρό αναγκάζεται μέσα από ένα λεπτό πλέγμα, να αναμιχθεί με αέρα και να σχηματίσει αφρό. Αυτό εφαρμόζεται στη συνέχεια στα κάτω δύο τρίτα του μαστού της αγελάδας Η ίδια λύση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά ζώα κατά την ίδια περίοδο αρμέγματος.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσότητα προϊόντος RTU που πρέπει να εφαρμόζεται ανά εφαρμογή. — αγελάδες και βουβάλια: 3 έως 10 ml (συνιστάται 5 ml) — πρόβατα 1,5 έως 5 ml (συνιστάται 1,5 ml) — αίγες 2,5 έως 6 ml (συνιστάται 2,5 ml) Σκεύασμα έτοιμο προς χρήση Σε συγκέντρωση χρήσης 0,16 % (β/β) ιώδιο. 2 εφαρμογές πριν από το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα 2 εφαρμογές μετά το άρμεγμα ανά ζώο ανά ημέρα
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 10 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 20 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 25 l Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 200 λίτρα IBC (ενδιάμεσο εμπορευματοκιβώτιο χύδην), πλαστικό: HDPE, 1000 λίτρα Δοχείο, πλαστικό: HDPE, 5 l όλα τα τύμπανα, εκτός από 200 λίτρα (200 κιλά) και 1000 λίτρα (1000 κιλά), θα μπορούσαν να είναι ασημένια ή φυσικά (λευκά ημιδιαφανή) σε χρώμα. 200 l (200 kg) τύμπανα είναι είτε ασήμι ή μπλε χρώματος. Τα IBC είναι φυσικά χρωματισμένα. Όλα τα τύμπανα είναι επικαλυμμένα με καλύμματα ή βαλβίδες που είναι προφανή για παραβίαση και είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ.

4.9.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μετά το άρμεγμα:

Βάλτε τουλάχιστον 2/3 του μήκους της θηλής με το RTU προϊόν αμέσως μετά το άρμεγμα

Για να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. διατηρήστε τις αγελάδες σε στάση τουλάχιστον 5 λεπτά).

4.9.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια κατά την εφαρμογή του προϊόντος με

(υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας) εντός των πληροφοριών του προϊόντος).

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απολύμανση πριν και μετά το άρμεγμα σε συνδυασμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό προϊόν με βάση το ιώδιο.

4.9.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.9.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.9.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

5. ΓΕΝΙΚΈς ΟΔΗΓΊΕς ΧΡΉΣΗς ([3]) ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 3

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Το προϊόν πρέπει να φέρεται σε θερμοκρασία πάνω από 20 °C πριν από τη χρήση.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ 'όλη τη διάρκεια της γαλουχίας

Πριν από την τοποθέτηση του συγκροτήματος αρμέγματος, όλα τα υπολείμματα του υγρού εμβάπτισης θηλών θα πρέπει να αφαιρεθούν είτε με πετσέτα μιας χρήσης είτε με επαναχρησιμοποιούμενο πανί. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα πανί ανά αγελάδα

Για αποτελεσματική χρήση ενάντια στα βακτήρια και τη ζύμη, το προϊόν πρέπει να παραμείνει σε επαφή με το δέρμα για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Βλ. συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνου.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών**

Αφαιρέστε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν επαναχρησιμοποιήσετε.

Μετά από εισπνοή: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής καπνών από υπερθέρμανση ή καύση.

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Μετά από επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με νερό και σαπούνι ως προφύλαξη. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει.

Μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική περίθαλψη από ειδικό για τα μάτια.

Μετά από κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα και δώστε άφθονο νερό για να πιείτε. Ποτέ μη χορηγείτε ο, τιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Οι μεγάλες διαρροές θα πρέπει να περιέχονται με τη χρήση ενός κιτ χημικής διαρροής, εμποτισμένο με απορροφητικό υλικό όπως το kieselguhr και να απορρίπτεται ως επικίνδυνο απόβλητο.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίψτε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Το χρησιμοποιούμενο προϊόν μπορεί να ξεπλυθεί στον δημοτικό αποχετευτικό αγωγό ή να τοποθετηθεί στην εναπόθεση κοπριάς ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις. Αποφύγετε την αποδέσμευση σε μια μεμονωμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με βάση την εκμετάλλευση.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Προστατεύστε από τον παγετό

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 30 °C

Διάρκεια ζωής 12 μήνες

([3]) Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 3.

6. ΆΛΛΕς ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕς

7. ΤΡΊΤΟ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΤΙς ΜΕΤΑ-SPC 3

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/Post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre				
Αριθμός άδειας	EU-0020125-0009 1-3				
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική ουσία	7553-56-2	231-442-4	0,16
C9-11 αιθοξυλική αλκοόλη	C9-11 αλκοόλη με 6 moles αιθοξυλιωμένου. Διάφορα εμπορικά σήματα διαθέσιμα συμπεριλαμβανομένων Imbentin C-91-060	Μη δραστική ουσία	68439-46-3	614-482-0	0,166