II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/202 VAN DE COMMISSIE

van 4 oktober 2019

tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie "Iodine Teat Dip Products"

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden ([1]), en met name artikel 44, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 20 augustus 2015 is door GEA Farm Technologies GmbH overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een aanvraag ingediend voor de toelating van een biocidefamilie van productsoort 3 als omschreven in bijlage V bij die verordening, met als naam "Iodine Teat Dip Products" ("de biocidefamilie"). De bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk heeft ermee ingestemd de aanvraag te beoordelen overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-AL019223-55.

(2) De biocidefamilie bevat jood als werkzame stof; die stof is opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012. Rekening houdend met de intrinsieke eigenschappen van de werkzame stof en de wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen als vastgesteld in haar Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 ([2]), zal de Commissie overwegen of het nodig is om de goedkeuring van jood, met inbegrip van polyvinylpyrrolidonjood, overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 528/2012 te herzien. Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek zal de Commissie vervolgens nagaan of de toelatingen van de Unie voor producten die de werkzame stof bevatten overeenkomstig artikel 48 van Verordening (EU) nr. 528/2012 moeten worden herzien.

(3) Op 6 juni 2018 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 het beoordelingsrapport en de conclusies van haar beoordeling bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het agentschap") ingediend.

(4) Op 18 januari 2019 heeft het agentschap bij de Commissie een advies ([3]) ingediend dat overeenkomstig artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide voor de biocidefamilie en het definitieve beoordelingsrapport betreffende de biocidefamilie bevat. In het advies wordt geconcludeerd dat: de biocidefamilie onder de definitie van "biocidefamilie" valt als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder s), van Verordening (EU) nr. 528/2012; de biocidefamilie in aanmerking komt voor een toelating van de Unie overeenkomstig artikel 42, lid 1, van die verordening; en de biocidefamilie — onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide — voldoet aan de in artikel 19, leden 1 en 6, van die verordening vastgestelde voorwaarden.

([1]) PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

([2]) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie van 4 september 2017 tot vaststelling van wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 301 van 17.11.2017, blz. 1).

([3]) Advies van het ECHA van 14 december 2018 over de toelating van de Unie voor "Iodine Teat Dip Products" (ECHA/BPC/217/2018).

(5) Op 20 mei 2019 heeft het agentschap, overeenkomstig artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012, de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

(6) De Commissie sluit zich aan bij het advies van het agentschap en acht het daarom passend om voor de biocidefamilie een toelating van de Unie te verlenen.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan GEA Farm Technologies GmbH wordt voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie "Iodine Teat Dip Products" een toelating van de Unie verleend met toelatingsnummer EU-0020125-0000 overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 19 november 2019 tot en met 31 oktober 2029.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 oktober 2019.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

Iodine Teat dip products

Productsoort 3 — Dierhygiëne (Desinfecteermiddelen)

Toelatingsnummer: EU-0020125-0000

Toelatingsnummer in R4BP: EU-0020125-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Familienaam**

Naam	Iodine Teat dip products

1.2. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne

1.3. **Toelatingshouder**

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	GEA Farm Technologies GmbH
	Adres	Siemensstraße 25-27, 59199, Bönen, Duitsland
Toelatingsnummer	EU-0020125-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0020125-0000	
Toelatingsdatum	19 november 2019	
Vervaldatum	31 Oktober 2029	

1.4. **Fabrikant(en) van de biociden**

Naam van de fabrikant	GEA Farm Technologies
Adres van de fabrikant	Wylye Works, BA12 9HT Warminster Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Wylye Works, Watery Lane, BA12 9HT Warminster Verenigd Koninkrijk Gewerbestraße 5, 5325 Plainfeld Oostenrijk ul. Olowiana 10, 85-461 Bydgoszcz Polen

1.5. **Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)**

Werkzame stof	Jood
Naam van de fabrikant	SQM Europe N.V.
Adres van de fabrikant	St Pietersvliet 7„ bus 8 2000 Antwerpen België
Productielocatie	Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes, 4290 Piso 4 Santiago Chili

Werkzame stof	Jood
Naam van de fabrikant	Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)
Adres van de fabrikant	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299-4205 Chosei-Gun Japan
Productielocatie	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299-4205 Chosei-Gun Japan

Werkzame stof	Jood
Naam van de fabrikant	Norkem Ltd.
Adres van de fabrikant	Norkem House, Bexton Lane„ WA16 9FB Knutsford Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	OFICINA CALA CALA S/N, Unknown POZO ALMONTE Chili

2. SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,16	2,47
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,0	2,35

2.2. **Soort(en) formulering**

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning SL — Met water mengbaar concentraat

DEEL II

TWEEDE INFORMATIENIVEAU — META-SPC(S)

META-SPC 1

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 1

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 1**

Identificatiecode	Meta SPC 1 — Concentrates — Professional concentrates with 1:3, 1:4 and 1:7 dilution rates

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-1

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	1,58	2,47
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		1,51	2,35

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 1**

Formulering(en)	SL — Met water mengbaar concentraat

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan schade aan organen schildklier veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Kan bijtend zijn voor metalen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	damp niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermende handschoenen dragen. beschermende kleding dragen. oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN:Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie:Een arts raadplegen. verpakking afvoeren naar volgens lokale voorschriften verpakking afvoeren naar volgens lokale voorschriften Gelekte/gemorste stof opruimen.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 1

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 1

Gebruik # 1 — Concentraten voor professioneel gebruik met 1:3, 1:4 en 1:7 verdunningen, voor toepassing ná het melken — dippen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via dip-beker: gebruik een traditionele dip-beker met terugslagkleppen en doseer het verdunde product in het reservoir. Schroef het applicatorgedeelte vast. Druk op het reservoir om de applicator te vullen. Bedek de onderste twee derde van elke speen met materiaal. Gooi ongebruikt materiaal na elke melksessie weg Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast. Kopjes moeten worden bijgevuld met een nieuwe oplossing voor het begin van een nieuwe melksessie
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid verdund product die moet worden aangebracht per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Product moet worden verdund met de relevante verdunning vermeld op het etiket, volgens een van deze verhoudingen; 25 % (1 deel product tot 3 delen water) 20 % (1 deel product tot 4 delen water) 12,5 % (1 deel product tot 7 delen water) In gebruik concentratie van producten tussen 0,29 en 0,52 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Dip ten minste 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen en oogbescherming bij het hanteren van het concentraat

(Handschoenmateriaal dient door de toelatingshouder te worden gespecificeerd in de productinformatie).

In het geval dat een combinatie van vóór en na het melken desinfectie nodig is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie vóór het melken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Gebruik # 2 — Concentraten voor professioneel gebruik met 1:3, 1:4 en 1:7 verdunningen, voor toepassing ná het melken — sprayen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: verstuiven Aanbrengen via een pneumatische sproeier: de opneembuis van het spuitsysteem wordt in de container van het verdunde product geplaatst. Het verdunde product wordt vervolgens naar een spuitlans in de melkplaats gepompt. De spuitlans wordt vervolgens gebruikt om de onderste twee derde van de spenen in het verdunde product te bedekken Toepassing via handmatige trigger-spray: Vul de trigger-sprayfles met verdund product. Gebruik trigger-spray om de onderste twee derde van elke speen met verdund product te bedekken
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid verdund product die moet worden aangebracht per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Product moet worden verdund met de relevante verdunning vermeld op het etiket, volgens een van deze verhoudingen; 25 % (1 deel product tot 3 delen water) 20 % (1 deel product tot 4 delen water) 12,5 % (1 deel product tot 7 delen water) In gebruik concentratie van producten tussen 0,29 en 0,52 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Bespuit minimaal 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen en oogbescherming bij het hanteren van het concentraat

(Handschoenmateriaal dient door de toelatingshouder te worden gespecificeerd in de productinformatie).

Draag handschoenen en laarzen die bestand zijn tegen chemicaliën bij het aanbrengen van het product door middel van handmatig sprayen (handschoenmateriaal moet door de houder van de vergunning worden gespecificeerd in de productinformatie)

Er moet een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034) worden gedragen

In het geval dat een combinatie van vóór en na het melken desinfectie nodig is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie vóór het melken.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 3

Gebruik # 3 — Concentraten voor professioneel gebruik met 1:3, 1:4 en 1:7 verdunningen, voor toepassing ná het melken — schuimen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via schuimdipbeker:In een schuimdipbeker wordt de vloeistof door een fijn gaas geperst en vermengd met lucht voor schuimvorming. Dit wordt vervolgens toegepast op de onderste twee derde van elke speen van het dier Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.

Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid verdund product die moet worden aangebracht per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Product moet worden verdund met de relevante verdunning vermeld op het etiket, volgens een van deze verhoudingen; 25 % (1 deel product tot 3 delen water) 20 % (1 deel product tot 4 delen water) 12,2 % (1 deel product tot 7 delen water) In gebruik concentratie van producten tussen 0,29 en 0,52 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Dip ten minste 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen en oogbescherming bij het hanteren van het concentraat

(Handschoenmateriaal dient door de toelatingshouder te worden gespecificeerd in de productinformatie).

In het geval dat een combinatie van vóór en na het melken desinfectie nodig is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie vóór het melken.

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([1]) VAN DE META-SPC 1

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Buiten het bereik van kinderen houden

Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle instructies.

Het product moet vóór gebruik op een temperatuur van meer dan 20 °C worden gebracht.

Verdun het product vóór applicatie volgens de verhouding die op het productetiket is vermeld

Formele verdunning van het concentraat; Voeg de verhouding van concentraat en water, zoals aangegeven op het productetiket, toe aan een container van geschikte grootte om het vereiste verdunningspercentage te bereiken. Meng tot een uniforme oplossing.

Voordat het melkstel wordt bevestigd, moeten alle teat-dip residuen worden verwijderd met doek voor eenmalig of meermalig gebruik. Per koe moet één doek worden gebruikt

Voor een effectief gebruik tegen bacteriën en gist moet het product minstens 60 seconden in contact blijven met de huid

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

Product kan gedurende de gehele lactatieperiode worden gebruikt

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Raadpleeg de gebruiksspecifieke risicobeperkende maatregelen.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Na inademing: In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen door oververhitting of verbranding.

Als u zich onwel voelt, zoek dan medisch advies.

Na contact met de huid: Wassen met water en zeep als voorzorgsmaatregel. Raadpleeg een arts als de huidirritatie aanhoudt.

Na contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Zoek medische hulp door oogspecialist.

Na inslikken: De mond spoelen en veel water laten drinken. Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloze persoon. Raadpleeg een arts.

Grote hoeveelheden gemorste vloeistof moeten worden opgevangen met een kit met chemische spatten, opgezogen met absorberend materiaal zoals kiezelgoer en afgevoerd als gevaarlijk afval.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mogen, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling (IBA).

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Bescherm tegen vorst

Bewaren bij temperaturen tot maximaal 30 °C

Houdbaarheid twaalf maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

([1]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 1.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Ioklene Concentrate. Coars Dual				
Toelatingsnummer	EU-0020125-0001 1-1				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	1,58
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		1,51

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Clinidip L Concentrate, Maxadine C, Diamond 3:1 Concentrate, Kristal 321, IO Spray 3:1 Concentrate, Coars Shield				
Toelatingsnummer	EU-0020125-0002 1-1				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	2,06
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		1,96

7.3. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Clinidip Superconcentrate, Dunglinson Super IO 421 Concentrate, Ceanodine 4:1, Iodosan				
Toelatingsnummer	EU-0020125-0003 1-1				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	2,47
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		2,35

7.4. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Priodine, Diamond Predip				
Toelatingsnummer	EU-0020125-0004 1-1				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	2,32
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		2,21

META-SPC 2

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 2

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 2**

Identificatiecode	Meta SPC 2 — RTU Products — Professional RTU Liquid for application pre and post milking

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-2

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,16	0,5
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,0	0,56

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 2**

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2

Gevarencategorie	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsaanbevelingen	Voorkom lozing in het milieu. Inhoud naar in accordance with local regulations verpakking afvoeren naar volgens lokale voorschriften Gelekte/gemorste stof opruimen.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 2

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 4

Gebruik # 1 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór het melken — dippen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via dip-beker: gebruik een traditionele dip-beker met terugslagkleppen en doseer het verdunde product in het reservoir. Schroef het applicatorgedeelte vast. Druk op het reservoir om de applicator te vullen. Bedek de onderste twee derde van elke speen met materiaal. Gooi ongebruikt materiaal na elke melksessie weg Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16-0,30 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Als een combinatie van desinfectie vóór en na het melken noodzakelijk is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie na het melken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 5

Gebruik # 2 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór het melken — sprayen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist Toepassingsgebied
Binnen	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: verstuiven Aanbrengen via een pneumatische sproeier: de opneembuis van het spuitsysteem wordt in de container van het verdunde product geplaatst. Het verdunde product wordt vervolgens naar een spuitlans in de melkplaats gepompt. De spuitlans wordt vervolgens gebruikt om de onderste twee derde van de spenen in het verdunde product te bedekken Toepassing via handmatige trigger-spray: Vul de trigger-sprayfles met verdund product. Gebruik trigger-spray om de onderste twee derde van elke speen met verdund product te bedekken

Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16-0,30 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen bij het aanbrengen van het product door middel van handmatig sprayen (handschoenmateriaal moet door de houder van de vergunning worden gespecificeerd in de productinformatie)

Als een combinatie van desinfectie vóór en na het melken noodzakelijk is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie na het melken.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 6

Gebruik # 3 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór het melken — schuimen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist

Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via schuimdipbeker: In een schuimdipbeker wordt de vloeistof door een fijn gaas geperst en vermengd met lucht voor schuimvorming. Dit wordt vervolgens toegepast op de onderste twee derde van elke speen van het dier Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16-0,30 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Als een combinatie van desinfectie vóór en na het melken noodzakelijk is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie na het melken.

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 7

Gebruik # 4 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing ná het melken — dippen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen [[...]]
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via dip-beker: gebruik een traditionele dip-beker met terugslagkleppen en doseer het verdunde product in het reservoir. Schroef het applicatorgedeelte vast. Druk op het reservoir om de applicator te vullen. Bedek de onderste twee derde van elke speen met materiaal. Gooi ongebruikt materiaal na elke melksessie weg. Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16-0,50 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Dip ten minste 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

In het geval dat een combinatie van desinfectie vóór en na het melken nodig is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie vóór het melken.

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 8

Gebruik # 5 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing ná het melken — sprayen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: verstuiven Aanbrengen via een pneumatische sproeier: de opneembuis van het spuitsysteem wordt in de container van het gebruiksklare product geplaatst. Het gebruiksklare product wordt vervolgens naar een spuitlans in de melkplaats gepompt. De spuitlans wordt vervolgens gebruikt om de onderste twee derde van de spenen in het gebruiksklare product te bedekken Toepassing via handmatige trigger-spray: Vul de trigger-sprayfles met gebruiksklaar product. Gebruik trigger-spray om de onderste twee derde van elke speen met product te bedekken
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16-0,50 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Bespuit minimaal 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag handschoenen en laarzen die bestand zijn tegen chemicaliën bij het aanbrengen van het product door middel van handmatig sprayen (handschoenmateriaal moet door de houder van de vergunning worden gespecificeerd in de productinformatie)

Er moet een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034) worden gedragen

In het geval dat een combinatie van desinfectie vóór en na het melken nodig is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie vóór het melken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.6. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 9

Gebruik # 6 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing ná het melken — schuimen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via schuimdipbeker: In een schuimdipbeker wordt de vloeistof door een fijn gaas geperst en vermengd met lucht voor schuimvorming. Dit wordt vervolgens toegepast op de onderste twee derde van elke speen van het dier Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16-0,50 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Dip ten minste 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

In het geval dat een combinatie van desinfectie vóór en na het melken nodig is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie vóór het melken.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.7. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 10

Gebruik # 7 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór en ná het melken — dippen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via dip-beker: gebruik een traditionele dip-beker met terugslagkleppen en doseer het verdunde product in het reservoir. Schroef het applicatorgedeelte vast. Druk op het reservoir om de applicator te vullen. Bedek de onderste twee derde van elke speen met materiaal. Gooi ongebruikt materiaal na elke melksessie weg. Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.

Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16-0,30 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Na het melken:

Dip ten minste 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voldoende contacttijd te waarborgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen bij het aanbrengen van het product door onderdompeling (handschoenmateriaal wordt door de vergunninghouder gespecificeerd in de productinformatie).

Dit product kan worden gebruikt voor desinfectie vóór en na het melken in combinatie. Het mag echter niet worden gebruikt in combinatie met een ander jood-gebaseerd product.

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.8. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 11

Gebruik # 8 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór en ná het melken — sprayen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: verstuiven Aanbrengen via een pneumatische sproeier: de opneembuis van het spuitsysteem wordt in de container van het verdunde product geplaatst. Het verdunde product wordt vervolgens naar een spuitlans in de melkplaats gepompt. De spuitlans wordt vervolgens gebruikt om de onderste twee derde van de spenen in het verdunde product te bedekken Toepassing via handmatige trigger-spray: Vul de trigger-sprayfles met verdund product. Gebruik trigger-spray om de onderste twee derde van elke speen met verdund product te bedekken
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16-0,30 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Na het melken:

Bespuit minimaal 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag handschoenen en laarzen die bestand zijn tegen chemicaliën bij het aanbrengen van het product door middel van handmatig sprayen (handschoenmateriaal moet door de houder van de vergunning worden gespecificeerd in de productinformatie)

Er moet een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034) worden gedragen

Dit product kan worden gebruikt voor desinfectie vóór en na het melken in combinatie. Het mag echter niet worden gebruikt in combinatie met een ander jood-gebaseerd product.

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.9. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 12

Gebruik # 9 — Gebruiksklareproducten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór en ná het melken — schuimen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist All
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via schuimdipbeker: In een schuimdipbeker wordt de vloeistof door een fijn gaas geperst en vermengd met lucht voor schuimvorming. Dit wordt vervolgens toegepast op de onderste twee derde van elke speen van het dier Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16-0,30 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Na het melken:

Dip ten minste 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen bij het aanbrengen van het product schuimvormende applicatiemethode (handschoenmateriaal dient te worden gespecificeerd door de houder van de toelating binnen de productinformatie).

Dit product kan worden gebruikt voor desinfectie vóór en na het melken in combinatie. Het mag echter niet worden gebruikt in combinatie met een ander jood-gebaseerd product.

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([2]) VAN DE META-SPC 2

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Buiten het bereik van kinderen houden

Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle instructies.

Het product moet vóór gebruik op een temperatuur van meer dan 20 °C worden gebracht.

Product kan gedurende de gehele lactatieperiode worden gebruikt

Voordat het melkstel wordt bevestigd, moeten alle teat-dip residuen worden verwijderd met een doek voor eenmalig of meermalig gebruik. Per koe moet één doek worden gebruikt

Voor een effectief gebruik tegen bacteriën en gist moet het product minstens 60 seconden in contact blijven met de huid

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Raadpleeg de gebruiksspecifieke risicobeperkende maatregelen.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Na inademing: In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen door oververhitting of verbranding.

Als u zich onwel voelt, zoek dan medisch advies.

Na contact met de huid: Wassen met water en zeep als voorzorgsmaatregel. Raadpleeg een arts als de huidirritatie aanhoudt.

Na contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Zoek medische hulp door oogspecialist.

([2]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 2.

Na inslikken: De mond spoelen en veel water laten drinken. Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloze persoon. Raadpleeg een arts.

Grote hoeveelheden gemorste vloeistof moeten worden opgevangen met een kit met chemische spatten, opgezogen met absorberend materiaal zoals kiezelgoer en afgevoerd als gevaarlijk afval.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mogen, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling (IBA).

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Bescherm tegen vorst

Bewaren bij temperaturen tot maximaal 30 °C

Houdbaarheid twaalf maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/Post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre				
Toelatingsnummer	EU-0020125-0005 1-2				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,3
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,305

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	LuxSpray 50, Silkidip, Ceanodine, IoSpray 10, Maxadine RTU, Diamond Superdip, Kristal Iocare Post, KiwiDip, Superdip Excel, Ioguard RTU, Shepherd's IoSpray 50				
Toelatingsnummer	EU-0020125-0006 1-2				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,5
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,56

7.3. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	LuxDip 50B, Postguard				
Toelatingsnummer	EU-0020125-0007 1-2				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,5

7.4. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	LuxDip 25, Kote It, Corston Barracide Post Film Forming Dip, Pro-Tect, Kristal Iocare Film, Coars Iodinegel, Coars Iodogel, LuxDip 20B				
Toelatingsnummer	EU-0020125-0008 1-2				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,25
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,5

META-SPC 3

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 3

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 3**

Identificatiecode	Meta SPC 3 — RTU Products- Professional RTU Liquid for application pre and post milking (LuxSpray 15)

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-3

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 — Dierhygiëne

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,16	0,5
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,0	0,56

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 3**

Formulering(en)	AL — Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3

Gevarencategorie	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsaanbevelingen	Voorkom lozing in het milieu. Inhoud naar in accordance with local regulations verpakking afvoeren naar in accordance with local regulations Gelekte/gemorste stof opruimen.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 3

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 13

Gebruik # 1 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór het melken — dippen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen

Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via dip-beker: gebruik een traditionele dip-beker met terugslagkleppen en doseer het verdunde product in het reservoir. Schroef het applicatorgedeelte vast. Druk op het reservoir om de applicator te vullen. Bedek de onderste twee derde van elke speen met materiaal. Gooi ongebruikt materiaal na elke melksessie weg. Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

In case a combination of pre- and post-milking disinfection is necessary, using another product not containing iodine has to be considered for post milking disinfection

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 14

Gebruik # 2 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór het melken — sprayen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: verstuiven Aanbrengen via een pneumatische sproeier: de opneembuis van het spuitsysteem wordt in de container van het verdunde product geplaatst. Het verdunde product wordt vervolgens naar een spuitlans in de melkplaats gepompt. De spuitlans wordt vervolgens gebruikt om de onderste twee derde van de spenen in het verdunde product te bedekken Toepassing via handmatige trigger-spray: Vul de trigger-sprayfles met verdund product. Gebruik trigger-spray om de onderste twee derde van elke speen met verdund product te bedekken
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen bij het aanbrengen van het product door middel van handmatig sprayen (handschoenmateriaal moet door de houder van de vergunning worden gespecificeerd in de productinformatie)

Als een combinatie van desinfectie vóór en na het melken noodzakelijk is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie na het melken.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 15

Gebruik # 3 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór het melken — schuimen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via schuimdipbeker: In een schuimdipbeker wordt de vloeistof door een fijn gaas geperst en vermengd met lucht voor schuimvorming. Dit wordt vervolgens toegepast op de onderste twee derde van elke speen van het dier Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen van zilver of natuurlijk (wit doorschijnend) van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn natuurlijk gekleurd. Alle vaten zijn afgedekt met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Als een combinatie van desinfectie vóór en na het melken noodzakelijk is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie na het melken.

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 16

Gebruik # 4 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing ná het melken — dippen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via dip-beker: gebruik een traditionele dip-beker met terugslagkleppen en doseer het gebruiksklare product in het reservoir. Schroef het applicatorgedeelte vast. Druk op het reservoir om de applicator te vullen. Bedek de onderste twee derde van elke speen met materiaal. Gooi ongebruikt materiaal na elke melksessie weg. Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Dip ten minste 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

In het geval dat een combinatie van desinfectie vóór en na het melken nodig is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie vóór het melken.

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 17

Gebruik # 5 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing ná het melken — sprayen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist Toepassingsgebied
Binnen	
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: verstuiven Aanbrengen via een pneumatische sproeier: de opneembuis van het spuitsysteem wordt in de container van het gebruiksklare product geplaatst. Het product wordt vervolgens naar een spuitlans in de melkplaats gepompt. De spuitlans wordt vervolgens gebruikt om de onderste twee derde van de spenen met het gebruiksklare product te bedekken Toepassing via handmatige trigger-spray: Vul de trigger-sprayfles met product. Gebruik trigger-spray om de onderste twee derde van elke speen met product te bedekken

Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bespuit minimaal 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag handschoenen en laarzen die bestand zijn tegen chemicaliën bij het aanbrengen van het product door middel van handmatig sprayen (handschoenmateriaal moet door de houder van de vergunning worden gespecificeerd in de productinformatie)

Er moet een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034) worden gedragen

In het geval dat een combinatie van desinfectie vóór en na het melken nodig is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie vóór het melken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.6. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 18

Gebruik # 6 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing ná het melken — schuimen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via schuimdipbeker: In een schuimdipbeker wordt de vloeistof door een fijn gaas geperst en vermengd met lucht voor schuimvorming. Dit wordt vervolgens toegepast op de onderste twee derde van elke speen van het dier Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.6.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Dip ten minste 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

In het geval dat een combinatie van desinfectie vóór en na het melken nodig is, moet een ander product zonder jood worden gebruikt voor desinfectie vóór het melken.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.7. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 19

Gebruik # 7 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór en ná het melken — dippen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via dip-beker: gebruik een traditionele dip-beker met terugslagkleppen en doseer het verdunde product in het reservoir. Schroef het applicatorgedeelte vast. Druk op het reservoir om de applicator te vullen. Bedek de onderste twee derde van elke speen met materiaal. Gooi ongebruikt materiaal na elke melksessie weg. Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Na het melken:

Dip ten minste 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen bij het aanbrengen van het product door onderdompeling (handschoenmateriaal wordt door de vergunninghouder gespecificeerd in de productinformatie).

Dit product kan worden gebruikt voor desinfectie vóór en na het melken in combinatie. Het mag echter niet worden gebruikt in combinatie met een ander jood-gebaseerd product.

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.8. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 20

Gebruik # 8 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór en ná het melken — sprayen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Open systeem: verstuiven Aanbrengen via een pneumatische sproeier: de opneembuis van het spuitsysteem wordt in de container van het verdunde product geplaatst. Het verdunde product wordt vervolgens naar een spuitlans in de melkplaats gepompt. De spuitlans wordt vervolgens gebruikt om de onderste twee derde van de spenen in het verdunde product te bedekken Toepassing via handmatige trigger-spray: Vul de trigger-sprayfles met verdund product. Gebruik trigger-spray om de onderste twee derde van elke speen met verdund product te bedekken
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken

Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Na het melken:

Bespuit minimaal 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten staande).

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag handschoenen en laarzen die bestand zijn tegen chemicaliën bij het aanbrengen van het product door middel van handmatig sprayen (handschoenmateriaal moet door de houder van de vergunning worden gespecificeerd in de productinformatie)

Er moet een beschermende overall (ten minste type 6, EN 13034) worden gedragen

Dit product kan worden gebruikt voor desinfectie vóór en na het melken in combinatie. Het mag echter niet worden gebruikt in combinatie met een ander jood-gebaseerd product.

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.9. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 21

Gebruik # 9 — Gebruiksklare producten voor professioneel gebruik voor toepassing vóór en ná het melken — schuimen

Productsoort	PT 03 — Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Bacterien Gist
Toepassingsgebied	Binnen

Toepassingsmethode(n)	Open systeem: dippen Aanbrengen via schuimdipbeker:In een schuimdipbeker wordt de vloeistof door een fijn gaas geperst en vermengd met lucht voor schuimvorming. Dit wordt vervolgens toegepast op de onderste twee derde van elke speen van het dier Dezelfde oplossing kan tijdens dezelfde melksessie op meerdere dieren worden toegepast.
Dosering(en) en frequentie	Hoeveelheid gebruiksklaar product toe te passen per toepassing; — koeien en buffels: 3 tot 10 ml (5 ml aanbevolen) — schapen 1,5 tot 5 ml (1,5 ml aanbevolen) — geiten 2,5 tot 6 ml (2,5 ml aanbevolen) Gebruiksklare formulering In gebruik concentratie 0,16 % (w/w) jood. 2 toepassingen per dier, per dag, voor het melken 2 toepassingen per dier, per dag, na het melken
Categorie/categorieën gebruikers	Getrainde professioneel Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Vat, kunststof: HDPE, 10 l Vat, kunststof: HDPE, 20 l Vat, kunststof: HDPE, 25 l Vat, kunststof: HDPE, 200 l IBC (intermediate bulk container), Plastic: HDPE, 1000 l Vat, kunststof: HDPE, 5 l Alle vaten met uitzondering van 200 l (200 kg) en 1000 l (1000 kg) kunnen zilver of doorschijnend wit van kleur zijn. 200 l (200 kg) vaten zijn zilver of blauw van kleur. IBC's zijn doorschijnend wit gekleurd. Alle vaten zijn afgesloten met verzegelde doppen of stoppen en zijn UN-gecertificeerd.

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Na het melken:

Dip ten minste 2/3 van de speenlengte met verdund product onmiddellijk na het melken

Om voor voldoende contacttijd te zorgen, moet erop worden gelet dat het product niet wordt verwijderd na het aanbrengen (houd de koeien bijvoorbeeld ten minste 5 minuten).

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Draag beschermende chemicaliënbestendige handschoenen bij het aanbrengen van het product

schuimvormende applicatiemethode (handschoenmateriaal dient te worden gespecificeerd door de houder van de toelating binnen de productinformatie).

Dit product kan worden gebruikt voor desinfectie vóór en na het melken in combinatie. Het mag echter niet worden gebruikt in combinatie met een ander jood-gebaseerd product.

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Raadpleeg de algemene gebruiksaanwijzing.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([3]) VAN DE META-SPC 3

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Buiten het bereik van kinderen houden

Lees vóór gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle instructies.

Het product moet vóór gebruik op een temperatuur van meer dan 20 °C worden gebracht.

Product kan gedurende de gehele lactatieperiode worden gebruikt

Voordat het melkstel wordt bevestigd, moeten alle teat-dip residuen worden verwijderd met een doek voor eenmalig of meermalig gebruik. Per koe moet één doek worden gebruikt

Voor een effectief gebruik tegen bacteriën en gist moet het product minstens 60 seconden in contact blijven met de huid

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Raadpleeg de gebruiksspecifieke risicobeperkende maatregelen.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik.

Na inademing: In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen door oververhitting of verbranding.

Als u zich onwel voelt, zoek dan medisch advies.

Na contact met de huid: Wassen met water en zeep als voorzorgsmaatregel. Raadpleeg een arts als de huidirritatie aanhoudt.

Na contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Zoek medische hulp door oogspecialist.

Na inslikken: De mond spoelen en veel water laten drinken. Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloze persoon. Raadpleeg een arts.

Grote hoeveelheden gemorste vloeistof moeten worden opgevangen met een kit met chemische spatten, opgezogen met absorberend materiaal zoals kiezelgoer en afgevoerd als gevaarlijk afval.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Voer ongebruikt product en verpakking af volgens de lokale voorschriften. Residuen in bijvoorbeeld dipbekers en spuitflacons mogen, afhankelijk van de lokale voorschriften, worden geloosd op de gemeentelijke riolering of de mestopslag. Voorkom lozen op installaties voor individuele afvalwaterbehandeling (IBA).

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Bescherm tegen vorst

Bewaren bij temperaturen tot maximaal 30 °C

Houdbaarheid twaalf maanden

([3]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 3.

6. OVERIGE INFORMATIE

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/Post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre				
Toelatingsnummer	EU-0020125-0009 1-3				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Jood		Werkzame stof	7553-56-2	231-442-4	0,16
C9-11 Alcoholethoxylaat	C9-11 alcohol met 6 mol ethoxylaat	Niet-werkzame stof	68439-46-3		0,166