II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/202 AL COMISIEI

din 4 octombrie 2019

de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide „Iodine Teat Dip Products”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 44 alineatul (5),

întrucât:

(1) La 20 august 2015, GEA Farm Technologies GmbH a depus o cerere în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru autorizarea unei familii de produse biocide cu denumirea de „Iodine Teat Dip Products” (denumită în continuare „familia de produse biocide”), aparținând tipului de produs 3, astfel cum se descrie în anexa V la regulamentul respectiv. Autoritatea competentă din Regatul Unit a fost de acord să evalueze cererea astfel cum se menționează la articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Cererea a fost înregistrată cu numărul de caz BC-AL019223-55 în Registrul produselor biocide.

(2) Familia de produse biocide conține iodul ca substanță activă, care este inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Ținând seama de proprietățile intrinseci ale substanței active și de criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 ([2])al Comisiei, Comisia va examina necesitatea de a revizui aprobarea iodului, inclusiv a polivinilpirolidonei iodate, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. În funcție de rezultatul respectivei revizuiri, Comisia va analiza dacă autorizațiile Uniunii pentru produse care conțin substanța activă trebuie să fie revizuite în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3) La 6 iunie 2018, autoritatea competentă responsabilă cu evaluarea a transmis, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, raportul de evaluare și concluziile evaluării sale Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”).

(4) La 18 ianuarie 2019, agenția a prezentat Comisiei un aviz ([3]), inclusiv proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP”) al familiei de produse biocide și raportul final de evaluare privind familia de produse biocide în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Avizul a concluzionat că familia de produse biocide se încadrează în definiția pentru „familie de produse biocide” prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (s) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibilă pentru o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din acel regulament și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, familia de produse biocide îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatele (1) și (6) din regulamentul respectiv.

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei din 4 septembrie 2017 de stabilire a criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 301, 17.11.2017, p. 1).

([3]) Avizul ECHA din 14 decembrie 2018 cu privire la acordarea autorizației Uniunii pentru „Iodine Teat Dip Products” (ECHA/BPC/217/2018).

(5) La 20 mai 2019, agenția a transmis Comisiei proiectul de RCP în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(6) Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este oportun să se acorde o autorizație a Uniunii pentru familia de produse biocide.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă o autorizație a Uniunii către GEA Farm Technologies GmbH pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea familiei de produse biocide „Iodine Teat Dip Products", cu numărul de autorizare EU-0020125-0000 în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexă.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 19 noiembrie 2019 până la 31 octombrie 2029.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 octombrie 2019.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

Iodine Teat Dip Products

Tip de produs 3 – Igienă veterinară (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0020125-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0020125-0000

PARTEA I

PRIMUL NIVEL DE INFORMARE

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. **Denumirea familiei de produse**

Nume	Iodine Teat Dip Products

1.2. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 - Igienă veterinară

1.3. **Detinatorul autorizației**

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	GEA Farm Technologies GmbH
	Adresa	Siemensstraße 25-27, 59199, Bönen, Germania
Numărul curent	EU-0020125-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0020125-0000	
Data autorizației	19 noiembrie 2019	
Data de expirare a autorizației	31 octombrie 2029	

1.4. **Producătorul (Producătorii) produselor biocide**

Denumirea producătorului	GEA Farm Technologies
Adresa producătorului	Wylye Works, BA12 9HT Warminster Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Wylye Works, Watery Lane, BA12 9HT Warminster Regatul Unit Gewerbestraße 5, 5325 Plainfeld Austria ul. Olowiana 10, 85-461 Bydgoszcz Polonia

1.5. **Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active**

Substanța activa	Iod
Denumirea producătorului	SQM Europe N.V.
Adresa producătorului	St Pietersvliet 7" bus 8 2000 Antwerp Belgia
Adresa locurilor de producție	Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes, 4290 Piso 4 Santiago Chile

Substanța activa	Iod
Denumirea producătorului	Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)
Adresa producătorului	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun" 299-4205 Chosei-Gun Japonia
Adresa locurilor de producție	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun" 299-4205 Chosei-Gun Japonia

Substanța activa	Iod
Denumirea producătorului	Norkem Ltd
Adresa producătorului	Norkem House, Bexton Lane" WA16 9FB Knutsford Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	OFICINA CALA CALA S/N, Unknown POZO ALMONTE Chile

2. COMPOZIȚIA ȘI FORMA (FORMELE) DE CONDITIONARE PENTRU FAMILIA DE PRODUSE

2.1. **Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,16	2,47
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	2,35

2.2. **Forma (formele) de conditionare**

Formulare (formulări)	AL - Orice alt lichid E - concentrat solubil

PARTEA II

AL DOILEA NIVEL DE INFORMARE - META-RCP(-URI)

META-RCP 1

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 1

1.1. **Identificator Meta-RCP 1**

Identificator	Meta RCP 1 - Concentrate - Concentrate profesionale cu rate de dilutie 1:3, 1:4 si 1:7

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-1

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 - Igienă veterinară

2. COMPOZIȚIE META-RCP 1

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 1**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	1,58	2,47
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	1,51	2,35

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 1**

Formulare (formulări)	E - concentrat solubil

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 1

Fraze de pericol	Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca leziuni ale organelor (glanda tiroida) în caz de expunere prelungită sau repetată. Poate fi corosiv pentru metale. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	Nu inspirați vaporii. Spălați-vă pe maini bine după utilizare. Purtați mănuși de protecție. Purtați îmbrăcăminte de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. Dacă iritarea ochilor persistă:Consultați medicul. Colectați scurgerile de produs. Aruncați recipientul la în conformitate cu reglementările locale. Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările locale.

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 1

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 1

Utilizare # 1 – Concentrate - Concentrate profesionale cu rate de dilutie 1:3, 1:4 si 1:7, pentru aplicare dupa muls - Imersie

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare cu ajutorul unei cupe de imersie: Folosind o cupa de imersie cu supape de reținere, distribuiți produsul diluat în rezervor. Înșurubați porțiunea aplicatorului. Strângeți rezervorul pentru a umple aplicatorul. Acoperiți cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu solutia de produs biocid. Aruncați produsul biocid neutilizat după fiecare muls. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls. Cupele trebuie reumplute cu soluție proaspătă înainte de începerea unei noi sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs diluat per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Produsul care trebuie diluat cu rata corespunzătoare indicată pe etichetă. Fie: 25 % (1 parte produs la 3 părți apă) 20 % (1 parte produs la 4 părți apă) 12,5 % (1 parte produs la 7 părți apă) Concentrația de utilizare a produselor: între 0,29 și 0,52 % (g/g) iod. 2 aplicații, dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Imersati cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon in produsul diluat, imediat după muls.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se purta mănuși de protecție chimică și ochelari de protecție atunci când se manipuleaza produsul concentrat (materialul pentru manusi trebuie specificat de catre detinatorul autorizatiei in cadrul informatiilor despre produs).

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția înainte de muls

4.1.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.1.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.1.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 2

Utilizare # 2 – Concentrate - Concentrate profesionale cu rate de dilutie 1:3, 1:4 si 1:7, pentru aplicare dupa muls - Pulverizare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: tratament de pulverizare Aplicarea prin intermediul unui pulverizator pneumatic: Lancea de absorbție a sistemului de pulverizare este plasată în recipientul cu produsul diluat. Produsul diluat este apoi pompat într-o lance de pulverizare situată în salonul de muls. Lancea de pulverizare este apoi utilizată pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul diluat. Aplicare prin pulverizare manuală cu declanșator: Umpleți sticla de pulverizare cu produsul diluat. Utilizați pulverizatorul cu declanșator pentru a acoperi două treimi din fiecare mamelon cu produsul diluat.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs diluat per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) - Produsul care trebuie diluat cu rata corespunzătoare indicată pe etichetă. Fie: 25 % (1 parte produs la 3 părți apă) 20 % (1 parte produs la 4 părți apă) 12,5 % (1 parte produs la 7 părți apă) Concentrația de utilizare a produselor: între 0,29 și 0,52 % (g/g) iod. 2 aplicații dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidonr, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele cu excepția celor de 200 litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg) pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt fie de culoare argintie, fie de culoare albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Se pulverizează cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon cu produsul diluat, imediat după muls.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se purta mănuși de protecție chimică și ochelari de protecție atunci când se manipuleaza produsul concentrat (materialul pentru mănuși trebuie specificat de catre detinatorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

A se purta mănuși și cizme de protectie, rezistente la substanțe chimice atunci când se aplica produsul prin pulverizare manuală (materialul pentru mănuși trebuie specificat de detinatorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

Se recomanda purtarea unui combinezon de protecție (cel puțin tipul 6, EN 13034).

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția înainte de muls.

4.2.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.2.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.2.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 3

Utilizare # 3 – Concentrate - Concentrate profesionale cu rate de dilutie 1:3, 1:4 si 1:7, pentru aplicare dupa muls - Spumare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de spumare: În ceea ce privește cupa, atunci când aceasta este presată, lichidul este forțat sa treaca printr-o plasă fină, amestecându-se cu aer și formând spumă. Aceasta este aplicata apoi pe cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.

Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs diluat per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) - Produsul care trebuie diluat cu rata corespunzătoare indicată pe etichetă. Fie: 25 % (1 parte produs la 3 părți apă) 20 % (1 parte produs la 4 părți apă) 12,5 % (1 parte produs la 7 părți apă) Concentrația de utilizare a produselor: între 0,29 și 0,52 % (g/g) iod. 2 aplicații dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

În cazul în care este necesară o dezinfectie combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția înainte de muls.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se purta mănuși de protecție chimică și ochelari de protecție atunci când se manipuleaza produsul concentrat (materialul pentru mănuși trebuie specificat de catre detinatorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

Aplicati produsul diluat pe cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon, imediat după muls.

4.3.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.3.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.3.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([1]) ALE META-RCP-ULUI 1

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și urmați toate instrucțiunile furnizate.

Produsul trebuie adus la o temperatură mai mare de 20 °C înainte de utilizare.

Se diluează produsul înainte de aplicare, în conformitate cu ratele de dilutie specificate pe eticheta produsului.

Diluarea produsului concentrat: se adaugă produsul in procentul corespunzator și apa, conform specificatiilor de pe eticheta produsului, intr-un recipient de dimensiuni adecvate in vederea obtinerii ratei de diluare necesare. Se amesteca pentru uniformizarea solutiei..

Înainte de atașarea dispozitivului de muls, toate reziduurile de produs trebuie curățate fie cu un prosop de unică folosință, fie cu o laveta reutilizabilă. Se va folosi o laveta per vaca.

Pentru utilizarea eficientă împotriva bacteriilor și levurilor, produsul trebuie să rămână în contact cu pielea animalului timp de cel puțin 60 de secunde.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

Produsul poate fi utilizat pe întreaga perioadă de lactație.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Consultați măsurile specifice de reducere a riscurilor.

5.3. **Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Îndepărtați și spălați hainele contaminate înainte de a le refolosi.

După inhalare: Deplasați-vă la aer proaspăt în caz de inhalare accidentală a fumului din cauza supraîncălzirii sau arderii.

Dacă vă simțiți rău, cereți sfatul medicului.

După contactul cu pielea: Spălați cu apă și săpun, in scop preventiv. Consultați un medic dacă iritația pielii persistă.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitati tratament medical din partea unui medic oftalmolog.

După ingerare: Clătiți gura și beti multă apă. Nu administrati niciodată nimic per os unei persoane inconștiente. Consultați un medic.

Cantitatile mari de produs varsate ar trebui să fie retinute cu ajutorul unei truse utile in caz de scurgere a unei substante chimice, absorbite cu ajutorul unui material absorbant și eliminate ca Deșeu periculos.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

La sfârșitul tratamentului, eliminați produsul neutilizat și ambalajul în conformitate cu reglementarile locale. Produsul utilizat poate fi eliminat în reteaua municipala sau la depozitul de gunoi, în funcție de reglementarile locale. Evitați eliminarea într-o instalație individuală de tratare a apelor uzate.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

A se proteja de îngheț.

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 30 °C.

Perioada de valabilitate:12 luni.

6. ALTE INFORMAȚII

([1]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 1.

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 1

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Ioklene Concentrate. Coars Dual				
Numărul curent	EU-0020125-0001 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	1,58
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	1,51

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Clinidip L Concentrate, Maxadine C, Diamond 3:1 Concentrate, Kristal 321, IO Spray 3:1 Concentrate, Coars Shield				
Numărul curent	EU-0020125-0002 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	2,06
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	1,96

7.3. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Clinidip Superconcentrate, Dunglinson Super IO 421 Concentrate, Ceanodine 4:1, Iodosan				
Numărul curent	EU-0020125-0003 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	2,47
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	2,35

7.4. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	Priodine, Diamond Predip				
Numărul curent	EU-0020125-0004 1-1				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	2,32
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	2,21

META-RCP 2

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 2

1.1. **Identificator Meta-RCP 2**

Identificator	Meta RCP 2 - Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare pentru aplicare inainte si dupa muls

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-2

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 - Igienă veterinară

2. COMPOZIȚIE META-RCP 2

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 2**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,16	0,5
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,56

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 2**

Formulare (formulări)	AL - Orice alt lichid

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 2

Fraze de pericol	Poate fi corosiv pentru metale. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție	Evitați dispersarea în mediu. Colectați scurgerile de produs. Aruncați recipientul la în conformitate cu reglementările locale. Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările locale.

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 2

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 4

Utilizare # 1 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte de muls - Imersie

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de imersie: Folosind o cupa de imersie cu supape de reținere, distribuiți produsul gata de utilizare în rezervor. Înșurubați porțiunea aplicatorului. Strângeți rezervorul pentru a umple aplicatorul. Acoperiți cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul biocid. Eliminati produsul biocid neutilizat după fiecare muls. Aceeași soluție de produs poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml). Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16-0,30 % (g/g) iod. 2 aplicari inainte de muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida.Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În cazul în care este necesară o dezinfectie combinata inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția dupa muls.

4.1.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.1.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.1.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 5

Utilizare # 2 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte de muls - Pulverizare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: tratament de pulverizare Aplicarea prin intermediul unui pulverizator pneumatic: Lancea de absorbție a sistemului de pulverizare este plasată în recipientul cu produsul gata de utilizare. Produsul gata de utilizare este apoi pompat într-o lance de pulverizare situată în salonul de muls. Lancea de pulverizare este apoi utilizată pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare manuală cu declanșator: Umpleți sticla de pulverizare cu produsul gata de utilizare. Utilizați pulverizatorul cu declanșator pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare.

Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16-0,30 % (g/g) iod. 2 aplicari inainte de muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se purta mănuși și cizme de protecție rezistente la substanțe chimice atunci când se aplica produsul prin pulverizare manuală (materialul pentru mănuși trebuie specificat de catre detinatorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția dupa muls

4.2.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.2.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.2.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 6

Utilizare # 3 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte de muls – Spumare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast

Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de spumare: În ceea ce privește cupa, atunci când aceasta este presată, lichidul este forțat sa treaca printr-o plasă fină, amestecându-se cu aer și formând spumă. Aceasta este aplicata apoi pe cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea de produs gata de utilizare necesara per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16-0,30 % (g/g) iod. 2 aplicarii inainte de muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanelede 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid.. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția dupa muls.

4.3.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.3.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.3.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.4. **Modul de utilizare**

Tabelul 7

Utilizare # 4 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare dupa muls – Imersie

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de imersie: Folosind o cupa de imersie cu supape de reținere, distribuiți produsul în rezervor. Înșurubați porțiunea aplicatorului. Strângeți rezervorul pentru a umple aplicatorul. Acoperiți cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul biocid. Eliminati produsul biocid neutilizat după fiecare muls. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16-0,50 % (g/g) iod. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate în alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Imersati cel puțin doua treimi ale fiecarui mamelon in produsul gata de utilizare, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu, vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția inainte de muls.

4.4.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.4.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.4.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.5. **Modul de utilizare**

Tabelul 8

Utilizare # 5 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare dupa muls – Pulverizare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: tratament de pulverizare Aplicarea prin intermediul unui pulverizator pneumatic: Lancea de absorbție a sistemului de pulverizare este plasată în recipientul cu produsul gata de utizare. Produsul este apoi pompat într-o lance de pulverizare situată în salonul de muls. Lancea de pulverizare este apoi utilizată pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare manuală cu declanșator: Umpleți sticla de pulverizare cu produsul gata de utilizare. Utilizați pulverizatorul cu declanșator pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare — vaci și bivolte: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16-0,50 % (g/g) iod. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Se pulverizează cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu, vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se purta mănuși și cizme de protecție rezistente la substanțe chimice atunci când se aplica produsul prin pulverizare manuală (materialul pentru mănuși trebuie specificat de catre detinatorull autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

Se recomanda purtarea unui combinezon de protecție (cel puțin tipul 6, EN 13034).

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția inainte de muls

4.5.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.5.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.5.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.6. **Modul de utilizare**

Tabelul 9

Utilizare # 6 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare dupa muls – Spumare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de spumare: În ceea ce privește cupa, atunci când aceasta este presată, lichidul este forțat sa treaca printr-o plasă fină, amestecânduse cu aer și formând spumă. Aceasta este aplicata apoi pe cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare 0,16-0,50 % (g/g) iod. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.6.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Aplicati produsul diluat pe cel puțin doua treimi din lungimea mamelonului, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu, vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.6.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția inainte de muls

4.6.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.6.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.6.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.7. **Modul de utilizare**

Tabelul 10

Utilizare # 7 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte si dupa muls - Imersie

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de imersie: Folosind o cupa de imersie cu supape de reținere, distribuiți produsul gata de utilizare în rezervor. Înșurubați porțiunea aplicatorului. Strângeți rezervorul pentru a umple aplicatorul. Acoperiți cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul biocid gata de utilizare. Eliminati produsul biocid neutilizat după fiecare muls. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.

Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare 0,16-0,30 % (g/g) iod. 2 aplicari inainte de muls, per animal, per zi. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg),pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.7.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dupa muls:

Imersati cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon in produsul gata de utilizare, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu,vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.7.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se purta mănuși de protecție chimica atunci când se aplica produsul prin imersie (materialul pentru mănuși trebuie specificat de către deținătorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfecție combinata, înainte și după muls Totusi, nu se recomanda asocierea cu un alt produs pe bază de iod.

4.7.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.7.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.7.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.8. **Modul de utilizare**

Tabelul 11

Utilizare # 8 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte si dupa muls - Pulverizare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: tratament de pulverizare Aplicarea prin intermediul unui pulverizator pneumatic: Lancea de absorbție a sistemului de pulverizare este plasată în recipientul cu produsul gata de utilizare. Produsul gata de utilizare este apoi pompat într-o lance de pulverizare situată în salonul de muls. Lancea de pulverizare este apoi utilizată pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare manuală cu declanșator: Umpleți sticla de pulverizare cu produsul gata de utilizare. Utilizați pulverizatorul cu declanșator pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16-0,30 % (g/g) iod. 2 aplicari inainte de muls, per animal, per zi. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.8.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dupa muls:

Se pulverizează cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu,vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.8.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Se recomanda purtarea de mănuși și cizme rezistente la substanțe chimice de protecție atunci când aplicați produsul prin pulverizare manuală (materialul pentru mănuși trebuie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs)

Se recomanda purtarea unui combinezon de protecție (cel puțin tipul 6, EN 13034)

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfecție combinata, înainte și după muls. Totusi, nu se recomanda asocierea cu un alt produs pe bază de iod.

4.8.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.8.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.8.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.9. **Modul de utilizare**

Tabelul 12

Utilizare # 9 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte si dupa muls - Spumare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de spumare: În ceea ce privește cupa, atunci când aceasta este presată, lichidul este forțat sa treaca printr-o plasă fină, amestecându-se cu aer și formând spumă. Aceasta este aplicata apoi pe cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16-0,30 % (g/g) iod. 2 aplicari inainte de muls, per animal, per zi. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.9.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dupa muls:

Imersati cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon in produsul gata de utilizare, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu, vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.9.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Se recomanda purtarea de mănuși de protecție chimica atunci când se aplica produsul prin metoda spumarii (materialul pentru mănuși trebuie specificat de detinatorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfecție combinata, înainte și după muls. Totusi, nu se recomanda asocierea cu un alt produs pe bază de iod.

4.9.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.9.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.9.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([2]) ALE META-RCP-ULUI 2

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și urmați toate instrucțiunile furnizate.

Produsul trebuie adus la o temperatură mai mare de 20 °C înainte de utilizare.

Produsul poate fi utilizat pe întreaga perioadă de lactație.

Înainte de atașarea dispozitivului de muls, toate reziduurile de produs trebuie curățate fie cu un prosop de unică folosință, fie cu o laveta reutilizabilă. Se va folosi o laveta per vaca.

Pentru utilizarea eficientă împotriva bacteriilor și levurilor, produsul trebuie să rămână în contact cu pielea animalului timp de cel puțin 60 de secunde.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Consultați măsurile specifice de reducere a riscurilor.

5.3. **Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Îndepărtați și spălați hainele contaminate înainte de a le refolosi.

După inhalare: Deplasați-vă la aer proaspăt în caz de inhalare accidentală a fumului datorită supraîncălzirii sau arderii.

Dacă vă simțiți rău, cereți sfatul medicului.

După contactul cu pielea: Spălați cu apă și săpun, preventiv. Consultați un medic dacă persistă iritarea pielii.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitati tratament medical din partea unui medic oftalmolog.

([2]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 2.

După ingerare: clătiți gura și beti multă apă. Nu administrati niciodată nimic per os unei persoane inconștiente. Consultați un medic.

Cantitatile mari de produs varsate ar trebui să fie retinute cu ajutorul unei truse utile in caz de scurgere a unei substante chimice, absorbite cu ajutorul unui material absorbant și eliminate ca deșeu periculos.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

La sfârșitul tratamentului, eliminați produsul neutilizat și ambalajul în conformitate cu reflementarile locale. Produsul utilizat poate fi eliminat în reteaua municipala sau la depozitul de gunoi, în funcție de reglementarile locale. Evitați eliminarea într-o instalație individuală de tratare a apelor uzate.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

A se proteja de îngheț.

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 30 °C.

Perioada de valabilitate: 12 luni.

6. ALTE INFORMAȚII

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 2

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/Post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre				
Numărul curent	EU-0020125-0005 1-2				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,3
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	0,305

7.2. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	LuxSpray 50, Silkidip, Ceanodine, IoSpray 10, Maxadine RTU, Diamond Superdip, Kristal Iocare Post, KiwiDip, Superdip Excel, Ioguard RTU, Shepherd's IoSpray 50				
Numărul curent	EU-0020125-0006 1-2				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,5
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	0,56

7.3. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	LuxDip 50B, Postguard				
Numărul curent	EU-0020125-0007 1-2				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,5

7.4. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	LuxDip 25, Kote It, Corston Barracide Post Film Forming Dip, Pro-Tect, Kristal Iocare Film, Coars Iodinegel, Coars Iodogel, LuxDip 20B				
Numărul curent	EU-0020125-0008 1-2				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,25
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	0,5

META-RCP 3

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE META-RCP 3

1.1. **Identificator Meta-RCP 3**

Identificator	Meta RCP 3 - Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare pentru aplicare inainte si dupa muls (LuxSpray 15)

1.2. **Sufix la numărul autorizației**

Număr	1-3

1.3. **Tipul (tipurile) de produs (produse)**

Tipul (tipurile) de produs (produse)	TP 03 - Igienă veterinară

2. COMPOZIȚIE META-RCP 3

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția meta-RCP-ului 3**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)	
					Min.	Max.
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,16	0,5
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,56

2.2. **Tipuri de formulare ale meta-RCP-ului 3**

Formulare (formulări)	AL - Orice alt lichid

3. FRAZELE DE PERICOL ȘI FRAZELE DE PRECAUȚIE ALE META-RCP-ULUI 3

Fraze de pericol	Poate fi corosiv pentru metale.
Fraze de precauție	Evitați dispersarea în mediu. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Aruncați conținutul la in conformitate cu reglementarile locale. Aruncați recipientul la in conformitate cu reglementarile locale.

4. UTILIZĂRI AUTORIZATE ALE META-RCP-ULUI 3

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 13

Utilizare # 1 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte de muls - Imersie

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior

Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de imersie: Folosind o cupa de imersie cu supape de reținere, distribuiți produsul gata de utilizare în rezervor. Înșurubați porțiunea aplicatorului. Strângeți rezervorul pentru a umple aplicatorul. Acoperiți cele două treimi ale fiecarui mamelon cu produsul biocid. Eliminati produsul biocid neutilizat după fiecare muls. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16 % (g/g) iod %. 2 aplicari inainte de muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate în alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția dupa muls.

4.1.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.1.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.1.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 14

Utilizare # 2 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte de muls - Pulverizare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast All
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: tratament de pulverizare Aplicarea prin intermediul unui pulverizator pneumatic: Lancea de absorbție a sistemului de pulverizare este plasată în recipientul cu produsul gata de utilizare. Produsul gata de utilizare este apoi pompat într-o lance de pulverizare situată în salonul de muls. Lancea de pulverizare este apoi utilizată pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare manuală cu declanșator: Umpleți sticla de pulverizare cu produsul gata de utilizare. Utilizați pulverizatorul cu declanșator pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16 % (g/g) iod %. 2 aplicari inainte de muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Se recomanda purtarea de mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice atunci când se aplica produsul prin pulverizare manuală (materialul pentru mănuși trebuie specificat de catre detinatorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția dupa muls.

4.2.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.2.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.2.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 15

Utilizare # 3 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte de muls – Spumare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de spumare: În ceea ce privește cupa, atunci când aceasta este presată, lichidul este forțat sa treaca printr-o plasă fină, amestecându-se cu aer și formând spumă. Aceasta este aplicata apoi pe cele două treimi ale fiecarui mamelon. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16 % (g/g) iod %. 2 aplicari inainte de muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN..

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția dupa muls.

4.3.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.3.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.3.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.4. **Modul de utilizare**

Tabelul 16

Utilizare # 4 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare dupa muls – Imersie

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de imersie: Folosind o cupa de imersie cu supape de reținere, distribuiți produsul gata de utilizare în rezervor. Înșurubați porțiunea aplicatorului. Strângeți rezervorul pentru a umple aplicatorul. Acoperiți cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produs biocid. Eliminati produsul biocid neutilizat după fiecare muls. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16 % (g/g) iod %. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate de UN.

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Imersati cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon in produsul gata de utilizare, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu,vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția inainte de muls

4.4.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.4.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.4.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.5. **Modul de utilizare**

Tabelul 17

Utilizare # 5 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare dupa muls – Pulverizare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: tratament de pulverizare Aplicarea prin intermediul unui pulverizator pneumatic: Lancea de absorbție a sistemului de pulverizare este plasată în recipientul cu produsul gata de utilizare. Produsul gata de utilizare este apoi pompat într-o lance de pulverizare situată în salonul de muls. Lancea de pulverizare este apoi utilizată pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare manuală cu declanșator: Umpleți sticla de pulverizare cu produsul gata de utilizare. Utilizați pulverizatorul cu declanșator pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare.

Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivoli: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16 % (g/g) iod %. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau naturale alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.5.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Se pulverizează cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon cu produsul diluat, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu, vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se purta mănuși și cizme de protecție rezistente la substanțe chimice atunci când se aplica produsul prin pulverizare manuală (materialul pentru mănuși trebuie specificat de catre detinatorull autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

Se recomanda purtarea unui combinezon de protecție (cel puțin tipul 6, EN 13034).

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția inainte de muls

4.5.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.5.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.5.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.6. **Modul de utilizare**

Tabelul 18

Utilizare # 6 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare dupa muls – Spumare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de spumare: În ceea ce privește cupa, atunci când aceasta este presată, lichidul este forțat sa treaca printr-o plasă fină, amestecându-se cu aer și formând spumă. Aceasta este aplicata apoi pe cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16 % (g/g) iod %. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.6.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Imersati cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon in produsul gata de utilizare, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu,vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.6.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

În cazul în care este necesară o dezinfecție combinata, inainte si dupa muls, trebuie luată în considerare utilizarea unui alt produs care nu conține iod pentru dezinfecția inainte de muls.

4.6.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.6.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.6.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.7. **Modul de utilizare**

Tabelul 19

Utilizare # 7 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte si dupa muls - Imersie

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de imersie: Folosind o cupa de imersie cu supape de reținere, distribuiți produsul gata de utilizare în rezervor. Înșurubați porțiunea aplicatorului. Strângeți rezervorul pentru a umple aplicatorul. Acoperiți cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare. Eliminati produsul biocid neutilizat după fiecare muls. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16 % (g/g) iod %. 2 aplicari inainte de muls, per animal, per zi. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.7.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dupa muls:

Imersati cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon in produsul diluat, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu, vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.7.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

A se purta mănuși de protecție chimica atunci când se aplica produsul prin imersie (materialul pentru mănuși trebuie specificat de către deținătorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfecție combinata, înainte și după muls Totusi, nu se recomanda asocierea cu un alt produs pe bază de iod.

4.7.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.7.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.7.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.8. **Modul de utilizare**

Tabelul 20

Utilizare # 8 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte si dupa muls - Pulverizare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast
Domeniul de utilizare	De interior
Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: tratament de pulverizare Aplicarea prin intermediul unui pulverizator pneumatic: Lancea de absorbție a sistemului de pulverizare este plasată în recipientul cu produsul gata de utilizare. Produsul gata de utilizare este apoi pompat într-o lance de pulverizare situată în salonul de muls. Lancea de pulverizare este apoi utilizată pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare. Aplicare prin pulverizare manuală cu declanșator: Umpleți sticla de pulverizare cu produsul gata de utilizare. Utilizați pulverizatorul cu declanșator pentru a acoperi cele două treimi de baza ale fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16 % (g/g) iod %. 2 aplicari inainte de muls, per animal, per zi. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.

Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate alb translucid.. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate de UN.

4.8.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dupa muls:

Se pulverizează cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon cu produsul gata de utilizare, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu, vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.8.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Se recomanda purtarea de mănuși și cizme rezistente la substanțe chimice de protecție atunci când se aplica produsul prin pulverizare manuală (materialul pentru mănuși trebuie specificat de catre titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs)

Se recomanda purtarea unui combinezon de protecție (cel puțin tipul 6, EN 13034)

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfecție combinata, înainte și după muls. Totusi, nu se recomanda asocierea cu un alt produs pe bază de iod.

4.8.3. *În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.8.4. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.8.5. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea instructiunile de utilizare.

4.9. **Modul de utilizare**

Tabelul 21

Utilizare # 9 – Produse gata de utilizare - Lichide profesionale gata de utilizare, pentru aplicare inainte si dupa muls - Spumare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Bacteria Yeast All
Domeniul de utilizare	De interior

Metoda (metodele) de aplicare	Sistem deschis: imersie Aplicare prin intermediul unei cupe de spumare: În ceea ce privește cupa, atunci când aceasta este presată, lichidul este forțat sa treaca printr-o plasă fină, amestecându-se cu aer și formând spumă. Aceasta este aplicata apoi pe cele două treimi ale fiecarui mamelon. Aceeași soluție poate fi aplicată mai multor animale în timpul aceleiași sesiuni de muls.
Ratele și frecvența de aplicare	Cantitatea necesara de produs gata de utilizare per aplicare: — vaci și bivolite: 3 până la 10 ml (recomandare 5 ml) — oi 1,5 până la 5 ml (recomandare 1,5 ml) — caprine 2,5-6 ml (recomandare 2,5 ml) Formulare gata de utilizare. Concentrație de utilizare: 0,16 % (g/g) iod %. 2 aplicari inainte de muls, per animal, per zi. 2 aplicari dupa muls, per animal, per zi.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bidon, plastic: HDPE, 10 l Bidon, plastic: HDPE, 20 l Bidon, plastic: HDPE, 25 l Bidon, plastic: HDPE, 200 l RIV (recipient intermediar pentru vrac), plastic: HDPE, 1000 l Bidon, plastic: HDPE, 5 l Toate bidoanele, cu excepția celor de 200 de litri (200 kg) și 1000 l (1000 kg), pot fi de culoare argintie sau alb translucida. Bidoanele de 200 l (200 kg) sunt de culoare argintie sau albastră. RIV-urile sunt colorate în alb translucid. Toate bidoanele sunt inchise cu capace sau cepuri evidentiate și sunt certificate UN.

4.9.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Dupa muls:

Imersati cel puțin doua treimi din lungimea fiecarui mamelon in produsul gata de utilizare, imediat după muls.

Pentru a asigura un timp de contact suficient, trebuie avut grijă ca produsul să nu fie îndepărtat după aplicare (de exemplu,vacile trebuie mentinute în picioare cel puțin 5 minute).

4.9.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Se recomanda purtarea de mănuși de protecție chimica atunci când se aplica produsul prin metoda spumarii (materialul pentru mănuși trebuie specificat de detinatorul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

Acest produs poate fi utilizat pentru dezinfecție combinata, înainte și după muls Totusi, nu se recomanda asocierea cu un alt produs pe bază de iod.

În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

4.9.3. *În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia*

A se vedea 5.3

4.9.4. *In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitatare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

A se vedea 5.4

4.9.5. *A nu se lăsa la îndemâna copiilor*

A se vedea 5.5

5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE ([3]) ALE META-RCP-ULUI 3

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și urmați toate instrucțiunile furnizate.

Produsul trebuie adus la o temperatură mai mare de 20 °C înainte de utilizare.

Produsul poate fi utilizat pe întreaga perioadă de lactație.

Înainte de atașarea dispozitivului de muls, toate reziduurile de produs trebuie curățate fie cu un prosop de unică folosință, fie cu o laveta reutilizabilă. Se va folosi o laveta per vaca.

Pentru utilizarea eficientă împotriva bacteriilor și levurilor, produsul trebuie să rămână în contact cu pielea animalului timp de cel puțin 60 de secunde.

Cantitatile mari de produs varsate ar trebui să fie retinute cu ajutorul unei truse utile in caz de scurgere a unei substante chimice, absorbite cu ajutorul unui material absorbant și eliminate ca deșeu periculos.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

Consultați măsurile specifice de reducere a riscurilor.

5.3. **Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Îndepărtați și spălați hainele contaminate înainte de a le refolosi.

După inhalare: Deplasați-vă la aer proaspăt în caz de inhalare accidentală a fumului din cauza supraîncălzirii sau arderii.

Dacă vă simțiți rău, cereți sfatul medicului.

După contactul cu pielea: Spălați cu apă și săpun, in scop preventiv. Consultați un medic dacă iritația pielii persistă.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitati tratament medical din partea unui medic oftalmolog.

După ingerare: Clătiți gura și beti multă apă. Nu administrati niciodată nimic per os unei persoane inconștiente. Consultați un medic.

Cantitatile mari de produs varsate ar trebui să fie retinute cu ajutorul unei truse utile in caz de scurgere a unei substante chimice, absorbite cu ajutorul unui material absorbant și eliminate ca deșeu periculos.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

La sfârșitul tratamentului, eliminați produsul neutilizat și ambalajul în conformitate cu reglementarile locale. Produsul folosit poate fi eliminat în canalul municipal sau depozitat la depozitul de gunoi în funcție de reglementarile locale. Evitați eliminarea într-o instalație individuală de tratare a apelor uzate.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

A se protejaț de îngheț.

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 30 °C.

Perioada de valabilitate: 12 luni.

([3]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată din cadrul meta-RCP-ului 3.

6. ALTE INFORMAȚII

7. AL TREILEA NIVEL DE INFORMARE: PRODUSE INDIVIDUALE ÎN META-RCP-UL 3

7.1. **Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual**

Denumirea comercială	LuxSpray 15 - Priodine RTU/Kristal Iocare Pre/Super Pre				
Numărul curent	EU-0020125-0009 1-3				
Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Iod		Substanța activă	7553-56-2	231-442-4	0,16
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol cu 6 moli de ethoxylate. Disponibile diverse nume de marci incluzand Imbentin C-91-060.	Substanta inactiva	68439-46-3	614-482-0	0,166