II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/202

av den 4 oktober 2019

om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Iodine Teat Dip Products

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter ([1]), särskilt artikel 44.5, och

av följande skäl:

(1) Den 20 augusti 2015 lämnade GEA Farm Technologies GmbH i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012 in en ansökan om godkännande av en biocidproduktfamilj med namnet Iodine Teat Dip Products (nedan kallad *biocidproduktfamiljen*) i produkttyp 3, såsom den beskrivs i bilaga V till den förordningen. Den behöriga myndigheten i Förenade kungariket gick med på att utvärdera ansökan enligt artikel 43.1 i förordning (EU) nr 528/2012. Ansökan registrerades med nummer BC-AL019223-55 i registret över biocidprodukter.

(2) Biocidproduktfamiljen innehåller jod som verksamt ämne, som är upptaget i den unionsförteckning över godkända verksamma ämnen som avses i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 528/2012. Med beaktande av det verksamma ämnets inneboende egenskaper och de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 ([2]) kommer kommissionen att överväga om godkännandet av jod, inbegripet polyvinylpyrrolidonjod, behöver omprövas i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 528/2012. Beroende på resultatet av den omprövningen kommer kommissionen sedan att överväga huruvida unionsgodkännanden av produkter som innehåller det verksamma ämnet måste omprövas i enlighet med artikel 48 i förordning (EU) nr 528/2012.

(3) Den 6 juni 2018 lämnade den utvärderande behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 528/2012, in bedömningsrapporten och slutsatserna av sin utvärdering till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad *kemikaliemyndigheten*).

(4) Den 18 januari 2019 lämnade kemikaliemyndigheten ett yttrande ([3]) till kommissionen, inklusive utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper för biocidproduktfamiljen och den slutliga bedömningsrapporten om biocidproduktfamiljen i enlighet med artikel 44.3 i förordning (EU) nr 528/2012. I yttrandet konstateras det att biocidproduktfamiljen omfattas av definitionen av biocidproduktfamilj i artikel 3.1 s i förordning (EU) nr 528/2012, att den får beviljas ett unionsgodkännande i enlighet med artikel 42.1 i den förordningen och att biocidproduktfamiljen, förutsatt att den överensstämmer med utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, uppfyller villkoren i artikel 19.1 och 19.6 i den förordningen.

([1]) EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 av den 4 september 2017 om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 301, 17.11.2017, s. 1).

([3]) Kemikaliemyndighetens yttrande av den 14 december 2018 om unionsgodkännande av Iodine Teat Dip Products (ECHA/BPC/217/2018).

(5) Den 20 maj 2019 översände myndigheten utkastet till sammanfattning av biocidproduktens egenskaper till kommissionen på unionens alla officiella språk, i enlighet med artikel 44.4 i förordning (EU) nr 528/2012.

(6) Kommissionen instämmer med kemikaliemyndighetens yttrande och anser därför att ett unionsgodkännande bör beviljas för biocidproduktfamiljen.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

GEA Farm Technologies GmbH beviljas unionsgodkännande för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidproduktfamiljen Iodine Teat Dip Products med godkännandenummer EU-0020125-0000 i enlighet med sammanfattningen av biocidproduktens egenskaper i bilagan.

Unionsgodkännandet är giltigt från och med den 19 november 2019 till och med den 31 oktober 2029.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2019.

På kommissionens vägnar
Ordförande
Jean-Claude JUNCKER

BILAGA

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

Iodine Teat dip products

Produkttyp 3 – Veterinärhygien (desinfektionsmedel)

Godkännandenummer: EU-0020125-0000

R4BP-tillgångsnummer: EU-0020125-0000

DEL I

FÖRSTA INFORMATIONSNIVÅN

1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1 **Familjenamn**

Namn	Iodine Teat dip products

1.2 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 - Veterinärhygien

1.3 **Innehavare av produktgodkännande**

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	GEA Farm Technologies GmbH
	Adress	Siemensstraße 25–27, 59199, Bönen, Tyskland
Godkännandenummer	EU-0020125-0000	
R4BP-tillgångsnummer	EU-0020125-0000	
Datum för godkännande	19 november 2019	
Utgångsdatum för godkännande	31 oktober 2029	

1.4 **Tillverkare av biocidprodukter**

Tillverkarens namn	GEA Farm Technologies
Tillverkarens adress	Wylye Works, BA12 9HT Warminster Storbritannien
Tillverkningsställe(n)	Wylye Works, Watery Lane, BA12 9HT Warminster Storbritannien Gewerbestraße 5, 5325 Plainfeld Österrike ul. Olowiana 10, 85–461 Bydgoszcz Polen

1.5 **Tillverkare av det verksamma ämnet**

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	SQM Europe NV.
Tillverkarens adress	St Pietersvliet 7„ bus 8 2000 Antwerp Belgien
Tillverkningsställe(n)	Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes, 4290 Piso 4 Santiago Chile

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe plc)
Tillverkarens adress	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299–4205 Chosei-Gun Japan
Tillverkningsställe(n)	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun„ 299–4205 Chosei-Gun Japan

Verksamt ämne	Jod
Tillverkarens namn	Norkem Ltd
Tillverkarens adress	Norkem House, Bexton Lane„ WA16 9FB Knutsford Storbritannien
Tillverkningsställe(n)	OFICINA CALA CALA S/N, Unknown POZO ALMONTE Chile

2. PRODUKTFAMILJENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,16	2,47
C9-11 Alcohol Etoxylat	C 9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom "Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	0,0	2,35

2.2 **Typ(er) av formuleringar**

Formulering(ar)	AL - Övriga vätskor SL - Lösligt koncentrat

DEL II

ANDRA INFORMATIONSNIVÅN – META-SPC

META-SPC 1

1. META-SPC 1 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1 **Meta-SPC 1 identitetsbeteckning**

Benämning	Meta SPC 1 – Koncentrat – professionella koncentrat med utspädningsförhållandena 1:3, 1:4 och 1:7

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–1

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 - Veterinärhygien

2. META-SPC 1 SAMMANSÄTTNING

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 1**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	1,58	2,47
C9-11 Alcohol Etoxylat	C 9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom "Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	1,51	2,35

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 1**

Formulering(ar)	SL - Lösligt koncentrat

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 1

Faroangivelse	Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador Sköldkörtel genom lång eller upprepad exponering. Kan vara korrosivt för metaller. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse	Inandas inte ångor. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar. Använd skyddskläder. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag. Vid bestående ögonirritation:Sök läkarhjälp. Samla upp spill. behållaren lämnas till i enlighet med lokala /regionala /nationella /internationella regler. Innehållet lämnas till i enlighet med lokala /regionala /nationella /internationella regler.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 1

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 1

Användning # 1–Koncentrat – Professionella koncentrat med utspädningsförhållanden 1:3, 1:4 och 1:7, för användning efter mjölkning – doppning

Produkttyp	PT 03 — Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via doppkopp: Användning av en traditionell doppkopp med backventiler. Fyll utspädd produkt i behållaren. Skruva ner applikatordelen. Krama behållaren för att fylla applikatorn. Täck de nedre två tredjedelarna av varje spene med produkt. Kassera oanvänd produkt efter varje mjölkning. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass. Kopparna ska fyllas på med ny lösning innan ett nytt mjölkningspass påbörjas
Dosering(ar) och frekvens	Mängd utspädd produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 ml till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Produkten ska spädas ut enligt förhållandena som anges på etiketten. Antingen; 25 % (1 del produkt till 3 delar vatten), 20 % (1 del produkt till 4 delar vatten) eller 12,5 % (1 del produkt till 7 delar vatten). Vid användning ska produkternas koncentration ligga mellan 0,29 och 0,52 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnorna är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Doppa åtminstone 2/3 av spenlängden i den utspädda produkten omedelbart efter mjölkningen

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och ögonskydd vid hantering av koncentratet

(handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.2 **Bruksanvisning**

Tabell 2

Användning # 2–Koncentrat – Professionella koncentrat med utspädningsförhållandena 1:3, 1:4 och 1:7, för användning efter mjölkning – sprutning

Produkttyp	PT 03 — Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	öppet system: sprutapplicering Applicering via pneumatisk spruta: Sprutsystemets upptagningslans är placerad i behållaren med den utspädda produkten. Den utspädda produkten pumpas sedan till en sprutlans i mjölkningsrummet. Sprutlansen används sedan för att täcka de nedre två tredjedelarna av spenarna med den utspädda produkten. Applicering via manuell sprayflaska: Fyll sprayflaskan med utspädd produkt. Spraya för att täcka de nedre två tredjedelarna av varje spene med utspädd produkt.
Dosering(ar) och frekvens	Mängd utspädd produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 ml till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Produkten ska spädas enligt förhållandena som anges på etiketten. Antingen; 25 % (1 del produkt till 3 delar vatten), 20 % (1 del produkt till 4 delar vatten) eller 12,5 % (1 del produkt till 7 delar vatten). Vid användning ska produkternas koncentration ligga mellan 0,29 och 0,52 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Spruta åtminstone 2/3 av spenlängden med den utspädda produkten omedelbart efter mjölkningen.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och ögonskydd vid hantering av koncentratet

(handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och stövlar vid applicering av produkten genom manuell sprutning (handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

En skyddsoverall (åtminstone typ 6, EN 13034) ska bäras.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.3 **Bruksanvisning**

Tabell 3

Användning # 3–Koncentrat – Professionella koncentrat med utspädningsförhållandena 1:3, 1:4 och 1:, för användning efter mjölkning – skumning

Produkttyp	PT 03 — Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	—
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via skummande doppkopp: När det gäller doppkoppar, pressas vätskan genom ett finmaskigt nät, varigenom den blandas med luft och bildar skum. Detta appliceras sedan på de nedre två tredjedelarna av kons juver. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.

Dosering(ar) och frekvens	Mängd utspädd produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 ml till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Produkten ska spädas ut i de relevanta utspädningsförhållandena som anges på etiketten. Antingen; 25 % (1 del produkt till 3 delar vatten), 20 % (1 del produkt till 4 delar vatten) eller 12,5 % (1 del produkt till 7 delar vatten). Vid användning ska produkternas koncentration ligga mellan 0,29 och 0,52 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Doppa åtminstone 2/3 av spenlängden i den utspädda produkten omedelbart efter mjölkningen

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och ögonskydd vid hantering av koncentratet

(handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER ([1]) FÖR META-SPC 1

5.1 **Bruksanvisning**

Förvaras oåtkomligt för barn

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste värmas till en temperatur på över 20 °C före användningen.

Späd produkten före applicering enligt det förhållande som anges på produktens etikett.

För manuell utspädning av koncentratet; Ställ in det förhållande mellan koncentrat och vatten som specificeras på produktetiketten, och tillsätt lösningen till en behållare med lämplig storlek för att uppnå det erfordrade utspädningsförhållandet. Blanda till en enhetlig lösning.

Innan mjölkningsklustret fästs, ska alla spendopprester avlägsnas antingen med en handduk för engångsbruk eller med en återanvändbar trasa. En tygtrasa per ko bör användas.

För effektiv användning mot bakterier och jäst måste produkten vara i kontakt med huden i minst 60 sekunder.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid måste man se till att produkten inte avlägsnas efter appliceringen (se t.ex. till att korna förblir stående i minst 5 minuter).

Produkten kan användas under hela mjölkgivningsperioden

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.

Efter inandning: Flytta till frisk luft vid oavsiktlig inandning av rök från överhettning eller förbränning.

Om du känner dig dålig, kontakta läkare.

Efter hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten som en försiktighetsåtgärd. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.

Efter kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med rikligt med vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök medicinsk behandling av ögonspecialist.

Efter intag: Skölj munnen och ge rikligt med vatten att dricka. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Rådgör med läkare.

Stora spill ska inneslutas med hjälp av en kemisk spill-sats, sugas upp med hjälp av absorberande material som kiselgur och bortskaffas som farligt avfall.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Skyddas mot frost

Förvaras inte vid temperaturer över 30 °C

Hållbarhet 12 månader

6. ÖVRIG INFORMATION

([1]) Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 1.

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC **1**

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Ioklene Concentrate Coars Dual				
Godkännandenummer	EU-0020125-0001 1–1				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	1,58
C9-11 Alcohol Etoxylat	C 9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom "Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	1,51

7.2 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Maxadine C Clinidip L Concentrate Diamond 3:1 Concentrate Kristal 321 IO Spray 3:1 Concentrate Coars Shield				
Godkännandenummer	EU-0020125-0002 1–1				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	2,06
C9-11 Alcohol Etoxylat	C9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom "Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	1,96

7.3 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Dunglinson Super IO 421 Concentrate Clinidip Superconcentrate Ceanodine 4:1 Iodosan				
Godkännandenummer	EU-0020125-0003 1–1				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	2,47
C9-11 Alcohol Etoxylat	C 9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom "Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	2,35

7.4 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	Priodine Diamond Predip				
Godkännandenummer	EU-0020125-0004 1–1				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	2,32
C9-11 Alcohol Etoxylat	C 9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom "Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	2,21

META-SPC 2

1. META-SPC 2 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1 **Meta-SPC 2 identitetsbeteckning**

Benämning	Meta SPC 2 – RTU Produkter – Professionell RTU vätska för applicering före och efter mjölkning

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–2

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 - Veterinärhygien

2. META-SPC 2 SAMMANSÄTTNING

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 2**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,16	0,5
C9-11 Alcohol Etoxylat	C 9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom "Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	0,0	0,56

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 2**

Formulering(ar)	AL - Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 2

Faroangivelse	Kan vara korrosivt för metaller. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. behållaren lämnas till i enlighet med lokala /regionala /nationella /internationella regler. .. Innehållet lämnas till i enlighet med lokala /regionala /nationella /internationella regler ..

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 2

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 4

Användning # 1–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före mjölkning – doppning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via doppkopp: Använd en traditionell doppkopp med backventiler. Fyll RTU-produkt i behållaren. Skruva ner applikatordelen. Krama behållaren för att fylla applikatorn. Täck de nedre två tredjedelarna av varje spene med produkt. Kassera oanvänd produkt efter varje mjölkning. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16–0,30 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen efter mjölkningen.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.2 **Bruksanvisning**

Tabell 5

Användning # 2–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före mjölkning – sprutning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: Sprutapplicering Applicering via pneumatisk spruta: Sprutsystemets upptagningslans är placerad i behållaren med RTU-produkt. RTU-produkten pumpas sedan till en sprutlans i mjölkningsrummet. Sprutlansen används sedan för att täcka de nedre två tredjedelarna av spenarna med RTU-produkten. Applicering via manuell sprayflaska: Fyll sprayflaskan med RTU-produkt. Spraya för att täcka de nedre två tredjedelarna av varje spene med RTU-produkt.

Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16–0,30 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och ögonskydd vid applicering genom manuell sprutning (handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen efter mjölkningen

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.3 **Bruksanvisning**

Tabell 6

Användning # 3–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före mjölkning – skumning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst

Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via skummande doppkopp: När det gäller doppkoppar, pressas vätskan genom ett finmaskigt nät, varigenom den blandas med luft och bildar skum. Detta appliceras sedan på de nedre två tredjedelarna av kons juver. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16–0,30 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen efter mjölkningen.

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.4 **Bruksanvisning**

Tabell 7

Användning # 4–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering efter mjölkning – doppning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via doppkopp: Använd en traditionell doppkopp med backventiler. Fyll RTU-produkt i behållaren. Skruva ner applikatordelen. Krama behållaren för att fylla applikatorn. Täck de nedre två tredjedelarna av varje spene med produkt. Kassera oanvänd produkt efter varje mjölkning. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16–0,50 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Doppa åtminstone 2/3 av spenlängden i RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att korna förblir stående i minst 5 minuter).

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.5 **Bruksanvisning**

Tabell 8

Användning # 5–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering efter mjölkning – sprutning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: Sprutapplicering Applicering via pneumatisk spruta: Sprutsystemets upptagningslans är placerad i behållaren med RTU-produkt. RTU-produkten pumpas sedan till en sprutlans i mjölkningsrummet. Sprutlansen används sedan för att täcka de nedre två tredjedelarna av spenarna med RTU-produkt. Applicering via manuell sprayflaska: Fyll sprayflaskan med RTU-produkt. Spraya för att täcka de nedre två tredjedelarna av varje spene med RTU-produkt.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16–0,50 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.5.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Spruta åtminstone 2/3 av spenlängden med RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att hålla korna stående i minst 5 minuter).

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och stövlar vid applicering av produkten genom manuell sprutning (handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

En skyddsoverall (åtminstone typ 6, EN 13034) ska bäras.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.6 **Bruksanvisning**

Tabell 9

Användning # 6–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering efter mjölkning – skumning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via skummande doppkopp: När det gäller doppkoppar, pressas vätskan genom ett finmaskigt nät, varigenom den blandas med luft och bildar skum. Detta appliceras sedan på de nedre två tredjedelarna av kons juver. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16–0,50 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla trummor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.6.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Doppa åtminstone 2/3 av spenlängden i RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att korna förblir stående i minst 5 minuter).

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.7 **Bruksanvisning**

Tabell 10

Användning # 7–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före och efter mjölkning – doppning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via doppkopp: Använd en traditionell doppkopp med backventiler. Fyll RTU-produkt i behållaren. Skruva ner applikatordelen. Krama behållaren för att fylla applikatorn. Täck de nedre två tredjedelarna av varje spene med produkt. Kassera oanvänd produkt efter varje mjölkning. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.

Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16–0,30 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Efter mjölkning:

Doppa åtminstone 2/3 av spenlängden i RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att korna förblir stående i minst 5 minuter).

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar vid applicering av produkten genom doppning (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination. Den ska dock inte användas i kombination med någon annan jodbaserad produkt.

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.8 **Bruksanvisning**

Tabell 11

Användning # 8–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före och efter mjölkning – sprutning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: Sprutapplicering Applicering via pneumatisk spruta: Sprutsystemets upptagningslans är placerad i behållaren med RTU-produkt. RTU-produkten pumpas sedan till en sprutlans i mjölkningsrummet. Sprutlansen används sedan för att täcka de nedre två tredjedelarna av spenarna med RTU-produkten. Applicering via manuell sprayflaska: Fyll sprayflaskan med RTU-produkt. Spraya för att täcka de nedre två tredjedelarna av varje spene med RTU-produkt.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16–0,30 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnorär försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Efter mjölkning:

Spruta åtminstone 2/3 av spenlängden med RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att hålla korna stående i minst 5 minuter).

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och stövlar vid applicering av produkten genom manuell sprutning (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

En skyddsoverall (minst typ 6, EN 13034) ska bäras.

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination. Den ska dock inte användas i kombination med någon annan jodbaserad produkt.

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.9 **Bruksanvisning**

Tabell 12

Användning # 9–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före och efter mjölkning – skumning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via skummande doppkopp: När det gäller doppkoppar, pressas vätskan genom ett finmaskigt nät, varigenom den blandas med luft och bildar skum. Detta appliceras sedan på de nedre två tredjedelarna av kons juver. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16–0,30 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Efter mjölkning:

Doppa åtminstone 2/3 av spenlängden i RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att korna förblir stående i minst 5 minuter).

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar vid applicering av produkten genom skumning (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination. Den ska dock inte användas i kombination med någon annan jodbaserad produkt.

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER ([2]) FÖR META-SPC 2

5.1 **Bruksanvisning**

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste värmas till en temperatur på över 20 °C före användningen.

Produkten kan användas under hela mjölkgivningsperioden

Innan mjölkningsklustret fästs, ska alla spendopprester avlägsnas antingen med en handduk för engångsbruk eller med en återanvändbar trasa. En tygtrasa per ko bör användas.

För effektiv användning mot bakterier och jäst måste produkten vara i kontakt med huden i minst 60 sekunder.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.

Efter inandning: Flytta till frisk luft vid oavsiktlig inandning av rök från överhettning eller förbränning.

Om du känner dig dålig, kontakta läkare.

Efter hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten som en försiktighetsåtgärd. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.

Efter kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med rikligt med vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök medicinsk behandling av ögonspecialist.

([2]) Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 2.

Efter intag: Skölj munnen och ge rikligt med vatten att dricka. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Rådgör med läkare.

Stora spill ska inneslutas med hjälp av en kemisk spill-sats, sugas upp med hjälp av absorberande material som kiselgur och bortskaffas som farligt avfall.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Skyddas mot frost

Förvaras inte vid temperaturer över 30 °C

Hållbarhet 12 månader

6. ÖVRIG INFORMATION

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 2

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	LuxSpray 30, Ioklene RTU, Corston Pre/Post Sprayable, Kristal Iocare Plus, PrePost, Autodine, Coars Super Pre				
Godkännandenummer	EU-0020125-0005 1–2				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,3
C9-11 Alcohol Etoxylat	C 9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom "Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	0,305

7.2 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	LuxSpray 50, Ceanodine, IoSpray 10, Maxadine RTU, Diamond Superdip, Kristal Iocare Post, KiwiDip, Superdip Excel, Ioguard RTU, Shepherd's IoSpray 50				
Godkännandenummer	EU-0020125-0006 1–2				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,5
C9-11 Alcohol Etoxylat	C 9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom "Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	0,56

7.3 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	LuxDip 50B Postguard				
Godkännandenummer	EU-0020125-0007 1–2				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,5

7.4 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	LuxDip 25, Kote It, Corston Barracide Post Film Forming Dip, Kristal Iocare Film, Coars Iodinegel, Coars Iodogel, LuxDip 20B				
Godkännandenummer	EU-0020125-0008 1–2				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,25
C9-11 Alcohol Etoxylat	C 9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom "Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	0,5

META-SPC 3

1. META-SPC 3 ADMINISTRATIV INFORMATION

1.1 **Meta-SPC 3 identitetsbeteckning**

Benämning	Meta SPC 3 – RTU Produkter – Professionell RTU vätska för applicering före och efter mjölkning (LuxSpray 15)

1.2 **Tillägg till registreringsnummer**

Nummer	1–3

1.3 **Produkttyp(er)**

Produkttyp(er)	PT 03 - Veterinärhygien

2. META-SPC 3 SAMMANSÄTTNING

2.1 **Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen av meta-SPC 3**

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)	
					Minst	Högst
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,16	0,16
C9-11 Alcohol Etoxylat	C 9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom "Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	0,166	0,166

2.2 **Typ(er) av formulering av meta-SPC 3**

Formulering(ar)	AL - Övriga vätskor

3. FAROANGIVELSER OCH SKYDDSANGIVELSER I META-SPC 3

Faroangivelse	Kan vara korrosivt för metaller. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse	Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. behållaren lämnas till i enlighet med lokala /regionala /nationella /internationella regler. Innehållet lämnas till i enlighet med lokala /regionala /nationella /internationella regler.

4. TILLÅTEN ANVÄNDNING/TILLÅTNA ANVÄNDNINGAR AV META-SPC 3

4.1 **Bruksanvisning**

Tabell 13

Användning # 1–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före mjölkning – doppning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -

Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via doppkopp: Använd en traditionell doppkopp med backventiler. Fyll RTU-produkt i behållaren. Skruva ner applikatordelen. Krama behållaren för att fylla applikatorn. Täck de nedre två tredjedelarna av varje spene med produkt. Kassera oanvänd produkt efter varje mjölkning. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.1.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.1.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen efter mjölkningen.

4.1.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.1.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.1.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.2 **Bruksanvisning**

Tabell 14

Användning # 2–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före mjölkning – sprutning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: Sprutapplicering Applicering via pneumatisk spruta: Sprutsystemets upptagningslans är placerad i behållaren med RTU-produkt. RTU-produkten pumpas sedan till en sprutlans i mjölkningsrummet. Sprutlansen används sedan för att täcka de nedre två tredjedelarna av spenarna med RTU-produkten. Applicering via manuell sprayflaska: Fyll sprayflaskan med RTU-produkt. Spraya för att täcka de nedre två tredjedelarna av varje spene med RTU-produkt.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.2.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.2.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och ögonskydd vid hantering av koncentratet (handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen

4.2.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.2.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.2.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.3 **Bruksanvisning**

Tabell 15

Användning # 3–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före mjölkning – skumning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via skummande doppkopp: När det gäller doppkoppar, pressas vätskan genom ett finmaskigt nät, varigenom den blandas med luft och bildar skum. Detta appliceras sedan på de nedre två tredjedelarna av kons juver. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.3.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.3.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen efter mjölkningen.

4.3.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.3.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.3.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.4 **Bruksanvisning**

Tabell 16

Användning # 4–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering efter mjölkning – doppning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via doppkopp: Använd en traditionell doppkopp med backventiler. Fyll RTU-produkt i behållaren. Skruva ner applikatordelen. Krama behållaren för att fylla applikatorn. Täck de nedre två tredjedelarna av varje spene med produkt. Kassera oanvänd produkt efter varje mjölkning. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.4.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Doppa åtminstone 2/3 av spenlängden i RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att korna förblir stående i minst 5 minuter).

4.4.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

4.4.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.4.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.4.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.5 **Bruksanvisning**

Tabell 17

Användning # 5–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering efter mjölkning – sprutning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: Sprutapplicering Applicering via pneumatisk spruta: Sprutsystemets upptagningslans är placerad i behållaren med RTU-produkt. RTU-produkten pumpas sedan till en sprutlans i mjölkningsrummet. Sprutlansen används sedan för att täcka de nedre två tredjedelarna av spenarna med RTU-produkt. Applicering via manuell sprayflaska: Fyll sprayflaskan med RTU-produkt. Spraya för att täcka de nedre två tredjedelarna av varje spene med RTU-produkt.

Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.5.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Spruta åtminstone 2/3 av spenlängden med RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att hålla korna stående i minst 5 minuter).

4.5.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och stövlar vid applicering av produkten genom manuell sprutning (handskmaterialet ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

En skyddsoverall (åtminstone typ 6, EN 13034) ska bäras.

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen.

4.5.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.5.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.5.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.6 **Bruksanvisning**

Tabell 18

Användning # 6–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering efter mjölkning – skumning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via skummande doppkopp: När det gäller doppkoppar, pressas vätskan genom ett finmaskigt nät, varigenom den blandas med luft och bildar skum. Detta appliceras sedan på de nedre två tredjedelarna av kons juver. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.6.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Doppa åtminstone 2/3 av spenlängden i RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att korna förblir stående i minst 5 minuter).

4.6.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Om en kombination av desinfektion före och efter mjölkning är nödvändig, måste en annan produkt som inte innehåller jod övervägas för desinfektionen före mjölkningen

4.6.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.6.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.6.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.7 **Bruksanvisning**

Tabell 19

Användning # 7–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före och efter mjölkning – doppning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via doppkopp: Använd en traditionell doppkopp med backventiler. Fyll RTU-produkt i behållaren. Skruva ner applikatordelen. Krama behållaren för att fylla applikatorn. Täck de nedre två tredjedelarna av varje spene med produkt. Kassera oanvänd produkt efter varje mjölkning. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.7.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Efter mjölkning:

Doppa åtminstone 2/3 av spenlängden i RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att korna förblir stående i minst 5 minuter).

4.7.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar vid applicering av produkten genom doppning (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination. Den ska dock inte användas i kombination med någon annan jodbaserad produkt.

4.7.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.7.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.7.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.8 **Bruksanvisning**

Tabell 20

Användning # 8–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före och efter mjölkning – sprutning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Öppet system: Sprutapplicering Applicering via pneumatisk spruta: Sprutsystemets upptagningslans är placerad i behållaren med RTU-produkt. RTU-produkten pumpas sedan till en sprutlans i mjölkningsrummet. Sprutlansen används sedan för att täcka de nedre två tredjedelarna av spenarna med RTU-produkt. Applicering via manuell sprayflaska: Fyll sprayflaskan med RTU-produkt. Spraya för att täcka de nedre två tredjedelarna av varje spene med RTU-produkt.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.

Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.8.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Efter mjölkning:

Spruta åtminstone 2/3 av spenlängden med RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att hålla korna stående i minst 5 minuter).

4.8.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar och stövlar vid applicering av produkten genom manuell sprutning (handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

En skyddsoverall (minst typ 6, EN 13034) ska bäras.

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination. Den ska dock inte användas i kombination med någon annan jodbaserad produkt.

4.8.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.8.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.8.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

4.9 **Bruksanvisning**

Tabell 21

Användning # 9–RTU Produkter – Professionell RTU vätska, för applicering före och efter mjölkning – skumning

Produkttyp	PT 03 - Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Bakterier Jäst
Användningsområde	Inomhus -

Appliceringsmetod	Öppet system: doppning Applicering via skummande doppkopp: När det gäller doppkoppar, pressas vätskan genom ett finmaskigt nät, varigenom den blandas med luft och bildar skum. Detta appliceras sedan på de nedre två tredjedelarna av kons juver. Samma lösning kan appliceras på flera djur under samma mjölkningspass.
Dosering(ar) och frekvens	Mängden RTU-produkt som ska appliceras per applikation; — kor och bufflar: 3 till 10 ml (5 ml rekommenderas) — får 1,5 till 5 ml (1,5 ml rekommenderas) — getter 2,5 till 6 ml (2,5 ml rekommenderas) Bruksfärdig formulering, koncentration vid användning 0,16 % (vikt/vikt) jod. 2 applikationer före mjölkning per djur, per dag. 2 applikationer efter mjölkning per djur, per dag.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning Yrkesmässig användare
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tunna, plast: HDPE, 10 l Tunna, plast: HDPE, 20 l Tunna, plast: HDPE, 25 l Tunna, plast: HDPE, 200 l IBC behållare, Plast: HDPE, 1000 l Tunna, plast: HDPE, 5 l Alla tunnor med undantag av 200 l (200 kg) och 1000 l (1000 kg) kan vara antingen silverfärgade eller naturfärgade (vita genomskinliga). 200 l (200 kg) tunnor är antingen silverfärgade eller blåfärgade. IBC:er är naturfärgade. Alla tunnor är försedda med lock eller tappar på vilka det syns om de har manipulerats och de är FN-certifierade.

4.9.1 *Bruksanvisning specifik för denna användning*

Efter mjölkning:

Doppa åtminstone 2/3 av spenlängden i RTU-produkt omedelbart efter mjölkningen.

För att säkerställa tillräcklig kontakttid, bör man se till att produkten inte avlägsnas efter applicering (se t.ex. till att korna förblir stående i minst 5 minuter).

4.9.2 *Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder*

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar vid applicering av produkten genom skumning

(handskmaterial ska specificeras av tillståndsinnehavaren i produktinformationen).

Denna produkt kan användas för desinfektion före och efter mjölkning i kombination. Den ska dock inte användas i kombination med någon annan jodbaserad produkt.

4.9.3 *Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön*

Se allmänna villkor för användning.

4.9.4 *Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning*

Se allmänna villkor för användning.

4.9.5 *Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden*

Se allmänna villkor för användning.

5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER ([3]) FÖR META-SPC 2

5.1 **Bruksanvisning**

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läs alltid etiketten eller bipacksedeln före användning och följ alla de givna instruktionerna.

Produkten måste värmas till en temperatur på över 20 °C före användningen.

Produkten kan användas under hela mjölkgivningsperioden

Innan mjölkningsklustret fästs, ska alla spendopprester avlägsnas antingen med en handduk för engångsbruk eller med en återanvändbar trasa. En tygtrasa per ko bör användas.

För effektiv användning mot bakterier och jäst måste produkten vara i kontakt med huden i minst 60 sekunder.

5.2 **Riskbegränsande åtgärder**

Se användningsspecifika riskreducerande åtgärder.

5.3 **En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön**

Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.

Efter inandning: Flytta till frisk luft vid oavsiktlig inandning av rök från överhettning eller förbränning.

Om du känner dig dålig, kontakta läkare.

Efter hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten som en försiktighetsåtgärd. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.

Efter kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med rikligt med vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök medicinsk behandling av ögonspecialist.

Efter intag: Skölj munnen och ge rikligt med vatten att dricka. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Rådgör med läkare.

Stora spill skall inneslutas med hjälp av en kemisk spill-sats, sugas upp med hjälp av absorberande material som kiselgur och bortskaffas som farligt avfall.

5.4 **Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Vid slutet av behandlingen, kassera oanvänd produkt och förpackningen i enlighet med lokala krav. Använd produkt kan spolas ut i det kommunala avloppssystemet eller kasseras vid en uppsamlingsplats för gödsel, beroende på lokala krav. Undvik utsläpp till enskilda avlopp.

5.5 **Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Skyddas mot frost

Förvaras inte vid temperaturer över 30 °C

Hållbarhet 12 månader

([3]) Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar inom meta-SPC 2.

6. ÖVRIG INFORMATION

7. TREDJE INFORMATIONSNIVÅN: ENSKILDA PRODUKTER I META-SPC 3

7.1 **Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt**

Handelsnamn	LuxSpray 15, Kristal Iocare Pre, Super Pre, Priodine RTU				
Godkännandenummer	EU-0020125-0009 1–3				
Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Jod		Verksamt ämne	7553-56-2	231-442-4	0,16
C9-11 Alcohol Etoxylat	C 9–11" Alkohol med 6 mol av Etoxylat. Flertalet varumärken tillgängliga, såsom ""Imbentin C-91-060".	Inaktivt ämne	68439-46-3	614-482-0	0,166