392R1996

N:o L 199/18 *EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI* 18.7.92

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1996/92,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 1992,

oliiviöljyn ja uutetun oliiviöljyn ominaisuuksista sekä niihin liittyvistä määritysmenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2568/91 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1720/91(2), ja erityisesti sen 35 a artiklan,

sekä katsoo, että

ottaen huomioon saadut kokemukset tietyt mukautukset ovat osoittautuneet tarpeellisiksi komission asetuksessa (ETY) N:o 2568/91(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1683/92(4), säädettyyn trilinoleiinin määritysmenetelmään, ja tämän vuoksi mainittu asetus on syytä muuttaa, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liite VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.*

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 1992.

Komission puolesta

RAY MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o 172, 30.9.1966, s. 3025/66
(2) EYVL N:o L 162, 26.6.1991, s. 27
(3) EYVL N:o L 248, 5.9.1991, s. 1
(4) EYVL N:o L 176, 30.6.1992, s. 27

LIITE

Lisätään asetuksen (ETY) N:o 2568/91 liitteeseen VIII huomautus seuraavasti:

"*Huom. 5:* Jotta trilinoleiinipiikki erottuisi selvästi viereisistä piikeistä, puhdistamaton uutettu oliiviöljy on etukäteen puhdistettava liitteessä VII olevan 6.2 kohdan mukaisesti tai vaihtoehtoisesti 200 µl laimentamatonta öljyä absorboidaan silikakolonniin nesteen erottamiseksi kiintoaineesta (tyyppi SEP PAK silika cartridge-waters port. n:o 51900).

Triglyseridit eluoidaan 20 ml:lla vedetöntä heksaania nestekromatografiaa varten.

Eluoitu tuote kuivatetaan typpivirrassa ja pannaan isopropanoliin tai asetoniin (5 ml). 10–20 µl ruiskutetaan nestekromatografialaitteistoon. Käytettäessä näitä kahta puhdistusmenetelmää on tarkistettava, että öljyn rasvahappokoostumus on sama ennen puhdistusta ja sen jälkeen. Jos koostumus ei ole sama, käytetyn absorboimisaineen laatua on asteittain vähennettävä."