Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/114

ze dne 26. ledna 2022

o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „SchwabEX-Guard“

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 19, 28.1.2022, s. 11)

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 24, 3.2.2022, s. 136 (2022/114)

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/114

ze dne 26. ledna 2022

o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „SchwabEX-Guard“

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Společnosti Sumitomo Chemical Agro Europe SAS se uděluje povolení Unie s číslem EU-0025436-0000 pro dodávání stejného jednotlivého biocidního přípravku „SchwabEX-Guard“ na trh a jeho používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné od 17. února 2022 do 30. června 2026.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼B

PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku

SchwabEX-Guard

Typ přípravku 18 – Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: EU-0025436-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0025436-0000

1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Obchodní název (názvy) přípravku**

Obchodní název	SchwabEX-Guard

1.2. **Držitel povolení**

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Adresa	Parc d' Affaires de Crécy 10 A, rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or Francie
Číslo povolení	EU-0025436-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	EU-0025436-0000	
Datum udělení povolení	17. února 2022	
Datum skončení platnosti povolení	30. června 2026	

1.3. **Výrobce (výrobci) přípravku**

Jméno výrobce	McLaughlin Gormley King Company (MGK)
Adresa výrobce	8810 10th Avenue North, MN 55427 Minneapolis Spojené státy
Umístění výrobních závodů	McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road, MN 55318 Chaska Spojené státy

1.4. **Výrobce(i) účinné látky/účinných látek**

Účinná látka	(E)-1-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-3-methyl-2-nitroguanidin (chlothianidin)
Jméno výrobce	Sumitomo Chemical Co. Ltd.

▼B

Adresa výrobce	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo Japonsko
Umístění výrobních závodů	Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City“ 870-0106 Oita Japonsko
Účinná látka	Pyriproxyfen
Jméno výrobce	Sumitomo Chemical Co. ltd.
Adresa výrobce	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo Japonsko
Umístění výrobních závodů	Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa“ 033-0022 Aomori Japonsko

2. **SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU A JEHO TYP SLOŽENÍ**

▼C1

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Chlothianidin	(E)-1-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-3-methyl-2-nitroguanidin	účinná látka	210880-92-5	433-460-1	0,526
Pyriproxyfen	(4-fenoxyfenyl)[(2RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl]ether	účinná látka	95737-68-1	429-800-1	0,515
Kyselina octová	Kyselina ethanová	Neúčinná látka	64-19-7	200-580-7	0,3
Sorbát draselný	kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát	Neúčinná látka	24634-61-5	246-376-1	0,5

▼B

2.2. **Typ složení přípravku**

RB - Nástraha k přímému použití

3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ**

Standardní věty o nebezpečnosti	Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

▼B

Pokyny pro bezpečné zacházení	PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce:Vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte ochranné rukavice. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obal v souladu s místními předpisy. Uniklý produkt seberte.

4. **POVOLENÉ(Á) POUŽITÍ**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Použití # 1 – Profesionální použití - návnada připravená k použití

Typ přípravku	Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Insekticid.
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Blattella germanica Obecný název: German cockroach Vývojové stadium: Nymfy Latinský název: Blattella germanica Obecný název: German cockroach Vývojové stadium: Dospělci Latinský název: Supella longipalpa Obecný název: Brown-banded cockroach Vývojové stadium: Nymfy Latinský název: Supella longipalpa Obecný název: Brown-banded cockroach Vývojové stadium: Dospělci Latinský název: Blatta orientalis Obecný název: Oriental Cockroach Vývojové stadium: Nymfy Latinský název: Blatta orientalis Obecný název: Oriental Cockroach Vývojové stadium: Dospělci Latinský název: Periplaneta americana Obecný název: American Cockroach Vývojové stadium: Nymfy Latinský název: Periplaneta americana Obecný název: American Cockroach Vývojové stadium: Dospělci
Oblast použití	Vnitřní V trhlinách a štěrbinách nebo na skrytých místech nepřístupných pro člověka a domácí zvířata: za skříněmi a policemi chladniček, pod kuchyňskými spotřebiči, v elektrických rozvodných skříních, dutinách a potrubích, pod koupelnovými zařízeními atd.
Metoda(y) aplikace	Metoda: Použití ve formě návnady Podrobný popis: Insekticidní gelová návnada pro hubení švábů ve veřejné hygieně připravená k použití (RTU)

▼B

Aplikační dávka (dávky) a četnost	Míra aplikace: SchwabEX-Guard měl by být aplikován v několika kapkách o průměru přibližně 4 mm (každá kapka obsahuje přibližně 0,032 g návnady). V případech silného zamoření, kde jsou přítomny větší druhy švábů (šváb obecný, šváb americký), v oblastech, které jsou obzvláště znečištěné, špinavé nebo kde nelze zcela vyloučit alternativní zdroje potravy, je doporučeno použít vyšší aplikační dávku (např. 2 kapky na m2 v případě slabého zamoření). Ředění (%): 0 Počet a načasování aplikace: — Slabé zamoření 1 - 2 (0,032 - 0,064 g) kapek na m^2 — Střední zamoření 3 - 6 (0,096 - 0,192 g) kapek na m^2 — Silné zamoření 6 - 10 (0,192 - 0,320 g) kapek na m^2 Maximální počet použití za rok je 11.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	30 g polypropylenová (PP) stříkačka Šroubovací víčko z vysokohustotního polyethylenu (HDPE)

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz návod k použití

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

Viz návod k použití

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz návod k použití

5. **OBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ** [1]

5.1. **Pokyny pro používání**

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a respektujte/dodržujte všechny uvedené pokyny.

Kapky návnady nevystavujte slunečnímu záření ani teplu (např. radiátorům).

Předplněná plastová nádoba obsahující SchwabEX-Guard je určena k použití s dodávaným pístem nebo se specifickým zařízením pro aplikaci návnad, které je běžné v odvětví ochrany proti škůdcům. Pokyny k použití aplikátoru najdete v pokynech výrobce.

[1] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

▼B

Vstříkněte návnadu do trhlin a štěrbin, prázdných prostor nebo do skrytých míst nepřístupných lidem nebo domácím zvířatům, kde může hmyz žít, krmit se a množit se. Takové oblasti jsou obecně teplé, vlhké a tmavé (za ledničkami, skříněmi a policemi, pod kuchyňskými spotřebiči, v elektrických rozvodných skříních, dutinách a potrubích a pod koupelnovými zařízeními atd.). Před ošetřením se doporučuje kontrola nebo odchyt k potvrzení zamoření. Zajistěte, aby byly odstraněny všechny alternativní zdroje potravy, a umístění návnad soustřeďte na jednotlivé body v místech působnosti švábů. Produkt by měl být aplikován pouze v oblastech nepřístupných dětem a zvířatům.

Neaplikujte SchwabEX-Guard na místa, která přicházejí do styku s vodou nebo na místa, která jsou pravidelně čištěna. Nejčastěji švábi zemřou několik hodin po jediném použití SchwabEX-Guard. V zamořených prostorách budou mrtví švábi obvykle viděni do 24 hodin po ošetření.

Sejměte víčko z trysky, přiložte horní část k povrchu, který má být ošetřen, a zatlačte na píst. Po ukončení nasaďte na dávkovač víčko.

Návnada přilne k nemastným nebo neprášivým povrchům a zůstane pružná a chutná pro švábys tak dlouho, dokud je viditelná.

Ošetřené oblasti by měly být zkontrolovány po 1–2 týdnech. Pokud bylo počáteční zamoření těžké, může být vyžadována druhá aplikace SchwabEX-Guard, pokud bylo aplikováno první ošetření a stále jsou přítomni živí švábi.

Druhá kontrola návnad se doporučuje 2-4 týdny po počátečním ošetření. Znovu použijte, pokud návnada již není vidět, podle úrovně zamoření (lehké, střední nebo těžké). Vyměňte návnadu dříve, než je zcela spotřebována, aby se švábi nevrátili.

Pokud je ošetření neúčinné, informujte držitele registrace.

Úniky a zbytky obsahující produkt je třeba odstranit jako chemický odpad.

Je třeba dbát na to, aby se gel neusazoval na exponovaných površích. Pokud se gel dotkne exponovaného povrchu, odstraňte gel papírovou utěrkou a očistěte oblast jednorázovými vlhčenými ubrousky.

Během následných kontrol zkontrolujte umístění návnad, které v případě potřeby znovu aplikujte.

Neumisťujte návnadu na místa, která jsou pravidelně myta, protože návnada bude odstraněna mytím. Nepoužívejte tento výrobek na nebo v elektrických zařízeních, kde existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vyvarujte se kontaktu s textilem a oblečením, protože návnada může skvrnit.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

Během fáze manipulace s výrobkem noste ochranné, chemicky odolné rukavice (materiál rukavic specifikuje držitel povolení v informacích o přípravku).

Neaplikujte návnadu v oblastech, kde byly použity repelentní insekticidy, aniž byste povrch důkladně očistili jednorázovou vlhkou utěrkou. Po aplikaci návnady neaplikujte repelentní insekticidy.

Neaplikujte přímo na nebo v blízkosti potravin, krmiv nebo nápojů, ani na povrchy nebo nádobí, které by mohly přijít do přímého kontaktu s potravinami, krmivy, nápoji a zvířaty.

▼B

Rozsypané látky a zbytky obsahující produkt musí být odstraněny jako chemický odpad.

Nepoužívejte gel na textilie nebo koberce, protože by mohl skvrnit některé absorpční materiály. Aby se zabránilo zbarvení, měla by být vystavená návnada okamžitě očištěna jednorázovými vlhčenými ubrousky.

Čisticí materiály musí být zlikvidovány jako pevný odpad.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

Tento biocidní přípravek obsahuje klothianidin, který je nebezpečný pro včely

Popis první pomoci

Kontakt s pokožkou: kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte a pokožku omyjte mýdlem a vodou. Pokud podráždění po umytí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontakt s očima: Pokud se objeví příznaky; opláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Polknutí: Při požití: Při výskytu příznaků volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Při vdechnutí: nevztahuje se.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Oči: Může způsobit dočasné podráždění očí.

Nouzová opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte uvolnění produktu do životního prostředí.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

K recyklaci používejte pouze prázdné nádoby/obaly.

Likvidace tohoto obalu by měla být vždy v souladu s legislativou o likvidaci odpadu a jakýmikoli požadavky místních úřadů.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření.

Doba použitelnosti: 2 roky.

6. **DALŠÍ INFORMACE**