Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B **REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/114 AL COMISIEI**

din 26 ianuarie 2022

de acordare a unei autorizaţii a Uniunii pentru produsul biocid unic „SchwabEX-Guard”

(Text cu relevanţă pentru SEE)

(JO L 19, 28.1.2022, p. 11)

rectificat prin:

►C1 Rectificare, JO L 24, 3.2.2022, p. 136 (2022/114)

▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/114 AL COMISIEI

din 26 ianuarie 2022

de acordare a unei autorizaţii a Uniunii pentru produsul biocid unic „SchwabEX-Guard”

(Text cu relevanţă pentru SEE)

Articolul 1

Se acordă societăţii Sumitomo Chemical Agro Europe SAS o autorizaţie a Uniunii cu numărul de autorizaţie EU-0025436-0000 pentru punerea la dispoziţie pe piaţă și utilizarea produsului biocid unic „SchwabEX-Guard”, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexă.

Autorizaţia Uniunii este valabilă de la 17 februarie 2022 până la 30 iunie 2026.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

SchwabEX-Guard

Tip de produs 18 – Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode (Produse pentru combaterea dăunătorilor)

Numărul curent: EU-0025436-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0025436-0000

1. **INFORMAŢII ADMINISTRATIVE**

1.1. **Denumirea sau denumirile comerciale ale produsului**

Denumirea comercială	SchwabEX-Guard

1.2. **Deţinătorul autorizaţiei**

Numele și adresa deținătorului autorizației	Numele	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Adresa	Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Franța
Numărul curent	EU-0025436-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0025436-0000	
Data autorizației	17 februarie 2022	
Data de expirare a autorizației	30 iunie 2026	

1.3. **Producătorul(ii) produsului**

Denumirea producătorului	McLaughlin Gormley King Company (MGK)
Adresa producătorului	8810 10th Avenue North, MN 55427 Minneapolis, Statele Unite
Adresa locurilor de producţie	McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road, MN 55318 Chaska, Statele Unite

1.4. **Producătorul (producătorii) substanţei (substanţelor) active**

Substanţa activă	(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidină (Clotianidină)
Denumirea producătorului	Sumitomo Chemical Co. Ltd.

▼B

Adresa producătorului	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo, Japonia
Adresa locurilor de producţie	Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City" 870-0106 Oita, Japonia
Substanţa activă	Piriproxifen
Denumirea producătorului	Sumitomo Chemical Co. ltd.
Adresa producătorului	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 104-8260 Tokyo, Japonia
Adresa locurilor de producţie	Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, 033-0022 Aomori, Japonia

2. **COMPOZIŢIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI**

▼C1

2.1. **Informaţii calitative și cantitative privind compoziţia produsului**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcţia	Numărul CAS	Numărul CE	Conţinut (%)
Clotianidină	(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidină	Substanţa activă	210880-92-5	433-460-1	0,526
Piriproxifen	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	Substanţa activă	95737-68-1	429-800-1	0,515
Acid acetic	Acid etanoic	Substanţa inactivă	64-19-7	200-580-7	0,3
Sorbat de potasiu	(E,E)-hexa-2,4-dienoat de potasiu	Substanţa inactivă	24634-61-5	246-376-1	0,5

▼B

2.2. **Tipul preparatului**

RB – Bait (gata de utilizare)

3. **FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUŢIE**

Fraze de pericol	Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

▼B

Fraze de precauţie	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă. În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: Consultaţi medicul. Purtaţi mănuși de protecţie. Evitaţi dispersarea în mediu. Aruncaţi recipientul la conform reglementărilor locale. Colectaţi scurgerile de produs.

4. **UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)**

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 1

Utilizare # 1 – Utilizare profesională – Momeală RTU

Tipul produsului	TP 18 – Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: *Blattella germanica* denumirea comună: Gândacul roșu de bucătărie etapă de dezvoltare: Nimfe denumirea științifică: *Blattella germanica* denumirea comună: Gândacul roșu de bucătărie etapă de dezvoltare: Adulţi denumirea științifică: *Supella longipalpa* denumirea comună: Gândacul dungat etapă de dezvoltare: Nimfe denumirea științifică: *Supella longipalpa* denumirea comună: Gândacul dungat etapă de dezvoltare: Adulţi denumirea științifică: *Blatta orientalis* denumirea comună: Gândacul de bucătărie oriental etapă de dezvoltare: Nimfe denumirea științifică: *Blatta orientalis* denumirea comună: Gândacul de bucătărie oriental etapă de dezvoltare: Adulţi denumirea științifică: *Periplaneta americana* denumirea comună: Gândacul de bucătărie american etapă de dezvoltare: Nimfe denumirea științifică: *Periplaneta americana* denumirea comună: Gândacul de bucătărie american etapă de dezvoltare: Adulţi
Domeniul de utilizare	de interior În crăpături și fisuri sau în locuri ascunse, inaccesibile oamenilor sau animalelor domestice: în spatele frigiderelor, dulapurilor și rafturilor, sub aparatele de bucătărie, în cutiile de comandă electrice, în golurile și ţevile de sub instalațiile sanitare etc.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: O momeală din gel insecticid gata de folosit (*ready to use* – RTU) pentru combaterea gândacilor în igiena publică

▼B

Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: SchwabEX-Guard ar trebui să fie aplicat ca mai multe puncte cu un diametru de aproximativ 4 mm (fiecare punct conține aproximativ 0,032 g de momeală). În cazul infestărilor grave, atunci când sunt prezente specii de gândaci mai mari (*B. orientalis* sau *P. americana*), în zonele foarte murdare sau ticsite sau în care sursele alternative de hrană nu pot să fie integral eliminate, ar trebui să fie folosită o rată de aplicare mai mare (de exemplu, 2 puncte în loc de 1 punct pe m^2 ca în cazul infestării reduse). Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: — Infestare redusă 1-2 (0,032-0,064 g) puncte pe m^2 — Infestare medie 3-6 (0,096-0,192 g) puncte pe m^2 — Infestare ridicată 6-10 (0,192-0,320 g) puncte pe m^2 Numărul maxim de aplicări pe an este 11.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Seringă de 30 g din polipropilenă (PP) Dop filetat în partea superioară din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor si măsuri de urgență pentru protecția mediului*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

Consultați instrucțiunile generale de utilizare

5. **DIRECȚII GENERALE DE UTILIZARE** ([1])

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

Înainte de utilizare, citiți întotdeauna eticheta sau prospectul și respectați/urmați toate instrucțiunile furnizate.

Nu expuneți momelile din gel la lumina soarelui sau căldură (de exemplu, un radiator).

Recipientul preumplut din plastic care conține SchwabEX-Guard este destinat folosirii împreună cu pistonul furnizat sau un dispozitiv de aplicare a momelii comun în domeniul combaterii dăunătorilor. Consultați instrucțiunile de utilizare de la producător privind folosirea aplicatorului.

([1]) Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

▼B

Injectați momeala în crăpături și fisuri, în găuri sau în locuri ascunse, inaccesibile oamenilor sau animalelor domestice, acolo unde insectele pot să trăiască, să se hrănească și să se înmulțească. Astfel de zone sunt în general calde/umede și întunecoase (în spatele frigiderelor, dulapurilor și rafturilor, sub aparatele de bucătărie, în cutiile de comandă electrice, în golurile și țevile de sub instalațiile sanitare etc.). Înainte de tratament, se recomandă verificarea și prinderea în capcană, pentru a confirma infestarea. Asigurați-vă că orice surse alternative de hrană sunt îndepărtate și concentrați amplasarea momelii în puncte individuale în locurile unde gândacii sunt vizibili. Produsul ar trebui să fie aplicat numai în zone neaccesibile copiilor și animalelor de companie.

Nu aplicați SchwabEX-Guard acolo unde va veni în contact cu apa sau în zone care sunt des curățate. De obicei, gândacii vor muri în câteva ore după o singură ingerare a SchwabEX-Guard. În spațiile infestate, gândacii morți vor fi în mod normal văzuți după 24 de ore de la tratament.

Scoateți capacul de pe duză, atingeți partea de sus a suprafeței de tratat și apăsați pe piston. Puneți din nou capacul pe dozator după terminarea tratamentului.

Momeala se va lipi de suprafețele fără grăsimi și praf depus și va rămâne flexibilă și atractivă pentru gândaci atât timp cât este prezentă vizibil.

Zona tratată ar trebui să fie inspectată vizual după 1-2 săptămâni. În cazul în care infestarea inițială a fost serioasă, este posibil să fie necesară o a doua aplicare a SchwabEX-Guard, dacă primul tratament a fost consumat și gândacii vii sunt încă prezenți.

O a doua inspecție vizuală a momelilor amplasate este recomandată la 2-4 săptămâni de la tratamentul inițial. Reaplicați atunci când momeala nu mai este vizibil prezentă, în funcție de nivelul de infestare (scăzut, mediu, ridicat). Înlocuiți momeala înainte de a fi complet consumată pentru a împiedica revenirea gândacilor.

Informați titularul înregistrării dacă tratamentul este ineficient.

Produsul vărsat și resturile de produs trebuie să fie eliminate ca deșeuri chimice.

Trebuie procedat cu atenție pentru a evita depunerea gelului pe suprafețele expuse. Dacă gelul intră în contact cu o suprafață expusă, îndepărtați-l cu un prosop din hârtie și curățați zona cu șervețele umede de unică folosință.

În timpul vizitelor de urmărire, inspectați momelile amplasate și reaplicați dacă este necesar.

Nu așezați momeala în locuri ce sunt spălate în mod normal, deoarece aceasta poate să fie îndepărtată prin spălare. Nu folosiți acest produs în sau pe echipamente electrice unde există posibilitatea de electrocutare. Evitați contactul cu materialele textile și hainele, deoarece momeala poate să păteze.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

În etapa de manevrare a produsului, purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de către deținătorul autorizației, în informațiile despre produs).

Nu aplicați momeala în zone în care au fost folosite insecticide repelente fără o curățare amănunțită a suprafeței cu șervețele umede de unică folosință. Nu aplicați insecticide repelente după aplicarea momelii.

Nu aplicați direct pe sau aproape de alimente, hrană pentru animale sau băuturi sau pe suprafețe și instrumente care vor intra probabil în contact cu alimente, hrană pentru animale, băuturi și animale.

▼B

Produsul vărsat și resturile de produs trebuie să fie eliminate ca deșeuri chimice.

Evitaţi amplasarea gelului pe materiale textile sau mochete, deoarece poate să păteze anumite materiale absorbante. Pentru a preveni pătarea, momeala expusă ar trebui să fie curăţată imediat cu şerveţele umede de unică folosinţă.

Materialele de curăţare trebuie să fie eliminate ca deșeuri solide.

5.3. **Particularităţi ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucţiuni de prim ajutor și măsuri de urgenţă pentru protecţia mediului**

Acest produs biocid conţine clotianidin care este periculos pentru albine

Descrierea măsurilor de prim ajutor

Contactul cu pielea: Scoateţi imediat îmbrăcămintea contaminată și spălaţi pielea cu apă și săpun. Solicitaţi un consult medical dacă iritaţia persistă după spălare.

Contactul cu ochii: Dacă apar simptome, spălaţi cu apă. Scoateţi lentilele de contact, dacă există și operaţiunea este ușor de efectuat. Contactaţi un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Ingerare: Dacă este înghiţit: Dacă apar simptome, contactaţi un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Dacă este inhalat: nu se aplică.

Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Ochi: Poate să cauzeze iritarea temporară a ochilor.

Măsuri de urgenţă pentru protecţia mediului

Evitaţi deversarea produsului în mediul înconjurător.

5.4. **Instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă a produsului și a ambalajului acestuia**

Trimiteţi spre reciclare numai recipiente/ambalaje goale.

Eliminarea acestui ambalaj ar trebui să respecte în permanenţă legislaţia privind eliminarea deșeurilor și cerinţele administraţiei locale regionale.

5.5. **Condiţii de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiţii normale de depozitare**

Protejaţi împotriva îngheţului. Depozitaţi departe de lumina directă a soarelui.

Perioada de valabilitate: 2 ani.

6. **ALTE INFORMAŢII**