377L0101

3.2.77 'Επίσημη 'Εφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων 'Αριθ. N 32/1

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τῆς 23ης Νοεμβρίου 1976

περί τῆς ἐμπορίας τῶν ἁπλῶν ζωοτροφῶν

(77/101/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος, καί ἰδίως τά ἄρθρα 43 καί 100,

τήν πρόταση τῆς 'Επιτροπῆς,

τή γνώμη τῆς Συνελεύσεως([1]),

τή γνώμη τῆς Οἰκονομικῆς καί Κοινωνικῆς 'Επιτροπῆς([2]),

'Εκτιμώντας:

ὅτι ἡ ζωική παραγωγή κατέχει πολύ σημαντική θέση στή γεωργία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος καί ὅτι τά ἱκανοποιητικά ἀποτελέσματα ἐξαρτῶνται κατά μεγάλο βαθμό ἀπό τή χρησιμοποίηση τῶν καταλλήλων καί καλῆς ποιότητος ζωοτροφῶν·

ὅτι ἡ νομοθεσία στόν τομέα τῶν ζωοτροφῶν εἶναι ἕνας σημαντικός παράγοντας γιά τήν αὔξηση τῆς παραγωγικότητος τῆς γεωργίας, λαμβανομένου ὑπόψη τοῦ ρόλου πού μποροῦν νά παίζουν πρός τό σκοπό αὐτό οἱ ἁπλές ζωοτροφές·

ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νά θεσπισθοῦν κανόνες γιά τίς πλέον σημαντικές ἁπλές ζωοτροφές· ὅτι ἀντίστοιχες ὀνομασίες πρέπει νά χρησιμοποιοῦνται γιά τίς ἁπλές ζωοτροφές πού εἶναι ἀντικείμενο ἐμπορίας καί ὅτι αὐτές πρέπει νά ἀνταποκρίνονται στίς περιγραφές πού τούς ἔχουν δοθεῖ·

ὅτι κατά τή ρύθμιση τῆς ἐμπορίας τῶν ἁπλῶν ζωοτροφῶν ὑπάρχει ἀνάγκη ἐπιμελοῦς μέριμνας, ὥστε οἱ ζωοτροφές αὐτές νά ἔχουν θετικό ἀποτέλεσμα στή ζωική παραγωγή· ὅτι πρός τό σκοπό αὐτό οἱ ζωοτροφές πρέπει πάντοτε νά εἶναι ὑγιεῖς, ἀνόθευτες καί σύμφωνες μέ τά συναλλακτικά ἤθη· ὅτι δέν πρέπει ἐπίσης νά ἐνέχουν κίνδυνο γιά τήν ὑγεία τῶν ζώων καί τοῦ ἀνθρώπου καί ἀκόμη δέν πρέπει νά προσφέρονται στό ἐμπόριο κατά τρόπο πού νά δημιουργεῖ πλάνη·

ὅτι οἱ διατάξεις τῆς παρούσας ὁδηγίας ἐφαρμόζονται στά ἁπλά προϊόντα πού πρόκειται νά χρησιμοποιηθοῦν σέ φυσική κατάσταση ἀπό τούς ἐκτροφεῖς τῶν ζώων· ὅτι ἐν τούτοις τά Κράτη Μέλη πρέπει νά ἔχουν τή δυνατότητα νά ἐπεκτείνουν τίς ἀρχές τῆς ὁδηγίας σέ προϊόντα καί οὐσίες τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται γιά τήν παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφῶν·

ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νά δοθεῖ στόν καταναλωτή μία ἀκριβής καί οὐσιαστική πληροφόρηση σχετικά μέ τή σύνθεση τῶν ἁπλῶν ζωοτροφῶν πού τίθενται στή διάθεσή του· ὅτι πρός τοῦτο πρέπει νά δηλωθεῖ τουλάχιστον ἡ περιεκτικότητα σέ συστατικά τά ὁποῖα καθορίζουν κατά οὐσιαστικό τρόπο τήν ποιότητα τῆς ζωοτροφῆς·

ὅτι κρίνεται ἀναγκαῖο, ἔχοντας ὑπόψη τήν ὑφισταμένη πρακτική σέ ὁρισμένα Κράτη Μέλη, νά προβλεφθεῖ ἡ δυνατότητα νά ἀπαιτεῖται πληρέστερη δήλωση τῆς συνθέσεως τῶν ἁπλῶν ζωοτροφῶν· ὅτι ἐν τούτοις οἱ πρόσθετες αὐτές δηλώσεις δέν μποροῦν νά ἀπαιτηθοῦν παρά μόνο ἐφ' ὅσον προβλέπονται στό παράρτημα·

ὅτι τά Κράτη Μέλη μποροῦν νά ὁρίσουν ὀνομασίες, περιγραφές καί διατάξεις ἐπικολλήσεως ἐτικετῶν γιά ἁπλές ζωοτροφές, διάφορες ἀπό ἐκεῖνες πού ἀναφέρονται στό παράρτημα·

ὅτι πρέπει ἄλλωστε νά δοθεῖ στά Κράτη Μέλη τό δικαίωμα νά προβλέψουν μία ὑποχρεωτική συσκευασία γιά ὁρισμένες ἁπλές ζωοτροφές πού ἀναφέρονται στό παράρτημα·

ὅτι φαίνεται χρήσιμο, ἐν ὄψει τῆς προωθήσεως τῆς παραγωγῆς ζωοτροφῶν ὑψηλῆς ποιότητος, νά δοθεῖ στά Κράτη Μέλη τό δικαίωμα νά προτείνουν ποιοτικά κριτήρια πού ἀφοροῦν στή σύνθεση ὁρισμένων ζωοτροφῶν·

ὅτι μπορεῖ νά εἶναι ἀναγκαῖο ἀφ' ἑνός, γιά νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ἐλεύθερη κυκλοφορία τῶν ἁπλῶν ζωοτροφῶν στό ἐσωτερικό τῆς Κοινότητος, νά καθορισθοῦν ὡς πρός τή σύνθεσή τους ὁρισμένες ἐλάχιστες ἀπαιτήσεις· ὅτι πρέπει ἀφ' ἑτέρου τά Κράτη Μέλη νά ἔχουν τή δυνατότητα νά καταστήσουν ὑποχρεωτικές αὐτές τίς ἀπαιτήσεις γιά τήν ἐμπορία τῶν ζωοτροφῶν στό ἔδαφός τους·

([1]) ΕΕ ἀριθ. A 10 τῆς 5.2.1972, σ. 35.
([2]) ΕΕ ἀριθ. A 4 τῆς 20.1.1972, σ. 3.

ὅτι τά Κράτη Μέλη πρέπει ἐν τούτοις νά μεριμνοῦν ὥστε οἱ ἁπλές ζωοτροφές οἱ ὁποῖες ἀνταποκρίνονται πρός τίς διατάξεις τῆς ὁδηγίας αὐτῆς νά μήν ὑπόκεινται ἐντός τῆς Κοινότητος σέ κανένα περιορισμό ἐμπορίας σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ὀνομασία τους, τήν περιγραφή τους καί τήν ἐπικόλληση τῆς ἐτικέτας τους·

ὅτι, γιά νά ἐξασφαλίζεται ἀπό τή στιγμή τῆς προσφορᾶς τους στό ἐμπόριο, ἡ τήρηση τῶν ὅρων πού ὁρίζονται γιά τίς ἁπλές ζωοτροφές, τά Κράτη Μέλη πρέπει νά προβλέπουν καταλλήλους ἐλέγχους·

ὅτι, γιά νά διευκολυνθεῖ ἡ ἐφαρμογή τῶν μέτρων πού ἔχουν ἀναφερθεῖ καί γιά νά διενεργηθοῦν ἰδίως οἱ ἀπαραίτητες τροποποιήσεις καί προσθῆκες, πρέπει νά προβλεφθεῖ μία διαδικασία πού νά καθιερώνει μία στενή συνεργασία μεταξύ τῶν Κρατῶν Μελῶν καί τῆς Ἐπιτροπῆς, στά πλαίσια τῆς Μόνιμης Ἐπιτροπῆς Ζωοτροφῶν ἡ ὁποία συνεστήθη μέ τήν ἀπόφαση 70/372/ΕΟΚ(1),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Ἄρθρο 1

1. Ἡ παρούσα ὁδηγία ἀναφέρεται στίς ἁπλές ζωοτροφές πού διατίθενται στό ἐμπόριο στό ἐσωτερικό τῆς Κοινότητος.

2. Ἡ παρούσα ὁδηγία ἐφαρμόζεται μέ τήν ἐπιφύλαξη τῶν διατάξεων πού ἀφοροῦν:

α) τίς πρόσθετες ὕλες πού χρησιμοποιοῦνται στή διατροφή ζώων·

β) τόν καθορισμό τῆς μεγίστης περιεκτικότητος σέ ἀνεπιθύμητες οὐσίες καί προϊόντα στίς ζωοτροφές·

γ) τόν καθορισμό τῆς μεγίστης περιεκτικότητος τῶν καταλοίπων τῶν παρασιτοκτόνων ἐπί ἤ ἐντός τῶν προϊόντων τά ὁποῖα προορίζονται γιά τή διατροφή ἀνθρώπων ἤ ζώων.

Ἄρθρο 2

Κατά τήν ἔννοια τῆς παρούσας ὁδηγίας νοοῦνται ὡς ἁπλές ζωοτροφές τά διάφορα προϊόντα τῶν φυτῶν καί τῶν ζώων σέ φυσική κατάσταση, νωπά ἤ συντηρημένα καί τά παράγωγα τῶν βιομηχανικῶν τους μεταποιήσεων, καθώς καί οἱ διάφορες ὀργανικές ἤ ἀνόργανες οὐσίες πού προορίζονται στήν κατάσταση πού εὑρίσκονται γιά τή διατροφή τῶν ζώων.

Ἄρθρο 3

Τά Κράτη Μέλη ὁρίζουν ὅτι οἱ ἁπλές ζωοτροφές ἐπιτρέπεται νά διατίθενται στό ἐμπόριο, μόνον ἄν εἶναι ὑγιεῖς, ἀνόθευτες καί σύμφωνες μέ τά συναλλακτικά ἤθη. Τά Κράτη Μέλη ὁρίζουν ὅτι οἱ ἁπλές ζωοτροφές δέν ἐπιτρέπεται νά ἐνέχουν κίνδυνο γιά τήν ὑγεία τῶν ζώων οὔτε γιά τήν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου καί ὅτι δέν πρέπει νά προσφέρονται ἤ νά τίθενται στό ἐμπόριο κατά τρόπο πού νά μπορεῖ νά δημιουργεῖ πλάνη.

Ἄρθρο 4

Τά Κράτη μέλη ὁρίζουν ὅτι κατά τήν ἐμπορία τῶν ἁπλῶν ζωοτροφῶν ἐφαρμόζονται οἱ γενικές διατάξεις τοῦ παραρτήματος, τμῆμα Α.

Ἄρθρο 5

1. Τά Κράτη Μέλη ὁρίζουν ὅτι οἱ ἁπλές ζωοτροφές πού ἀπαριθμοῦνται στό παράρτημα Β, στήλη 2 ἐπιτρέπεται νά γίνουν ἀντικείμενο ἐμπορίας μόνο μέ τίς ὀνομασίες πού προβλέπονται καί μέ τούς ὅρους πού ἀνταποκρίνονται στίς περιγραφές τοῦ παραρτήματος, τμῆμα Β, στήλη 3.

2. Τά Κράτη Μέλη δύνανται νά ὁρίσουν ὀνομασίες καί περιγραφές γιά ἄλλες ἁπλές ζωοτροφές, διάφορες ἀπό ἐκεῖνες πού ἀναφέρονται στό παράρτημα, τμῆμα Β.

Ἄρθρο 6

Τά Κράτη Μέλη δύνανται νά ὁρίσουν ὅτι οἱ ἁπλές ζωοτροφές οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στό παράρτημα, τμῆμα Β, στήλη 7 δέν ἐπιτρέπεται νά τεθοῦν στό ἐμπόριο παρά μόνο σέ κλειστές συσκευασίες ἤ δοχεῖα. Τά Κράτη Μέλη δύνανται νά ὁρίσουν ὅτι οἱ συσκευασίες ἤ τά δοχεῖα κλείνονται κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε τό σφράγισμα νά καταστρέφεται κατά τό ἄνοιγμα καί νά μή μπορεῖ νά ξαναχρησιμοποιηθεῖ.

Ἄρθρο 7

1. Τά Κράτη Μέλη ὁρίζουν ὅτι οἱ ἁπλές ζωοτροφές οἱ ὁποῖες ἀπαριθμοῦνται στό παράρτημα, τμῆμα Β, στήλη 2 μποροῦν νά τεθοῦν στό ἐμπόριο, μόνο ἄν οἱ ἐνδείξεις οἱ ὁποῖες ἀπαριθμοῦνται κατωτέρω καί οἱ ὁποῖες συνεπάγονται τήν εὐθύνη ἤ τοῦ παραγωγοῦ ἤ τοῦ συσκευαστοῦ ἤ τοῦ εἰσαγωγέα ἤ τοῦ πωλητῆ ἤ τοῦ διανομέα πού εἶναι ἐγκατεστημένος στό ἐσωτερικό τῆς Κοινότητος ἀναφέρονται ἐπί τῆς συσκευασίας, ἐπί τοῦ δοχείου ἤ ἐπί ἐτικέτας ἡ ὁποία ἐπικολλᾶται ἐπ' αὐτοῦ:

α) οἱ λέξεις «ἁπλή ζωοτροφή»·

β) ἡ ὀνομασία σύμφωνα πρός τό παράρτημα, τμῆμα Β, στήλη 2·

γ) σέ δεδομένη περίπτωση, οἱ ἐνδείξεις πού ἀναφέρονται στό παράρτημα, τμῆμα Α·

δ) ἡ περιεκτικότητα σέ συστατικά πού ἀναφέρονται στό παράρτημα, τμῆμα Β, στήλη 4·

ε) τό καθαρό βάρος·

στ) τό ὄνομα ἤ ἡ ἑταιρική ἐπωνυμία καί ἡ διεύθυνση ἤ ἡ ἕδρα τῆς ἑταιρείας τοῦ ὑπευθύνου γιά τίς ἐνδείξεις πού ἀναφέρονται στήν παράγραφο αὐτή.

(1) ΕΕ ἀριθ. Ν 170 τῆς 3.8.1970, σ. 1.

2. Τά Κράτη Μέλη ὁρίζουν ὅτι, ὅταν οἱ ἁπλές ζωοτροφές τίθενται σέ ἐμπορία χύμα, οἱ ἐνδείξεις πού ἀναφέρονται στήν παράγραφο 1 ἀναγράφονται σέ ἕνα συνοδευτικό ἔγγραφο.

3. Τά Κράτη Μέλη δύνανται νά ὁρίσουν ὅτι οἱ ἐνδείξεις πού ἀναφέρονται στήν παράγραφο 1 δύνανται νά ἀναγράφονται μόνο σέ ἕνα συνοδευτικό ἔγγραφο, ὑπό τόν ὅρο ὅτι ἐπί τῆς συσκευασίας, τοῦ δοχείου ἤ τῆς ἐτικέτας, καθώς καί στό συνοδευτικό ἔγγραφο τοποθετεῖται παρόμοιο σῆμα τό ὁποῖο θά ἐπιτρέπει τήν ἀναγνώριση τοῦ πρός παράδοση προϊόντος.

4. Κατά παρέκκλιση τῆς παραγράφου 1 τά Κράτη Μέλη μποροῦν νά ὁρίσουν νά ἀναγράφεται πλήρως ἤ μερικῶς ἡ ἔνδειξη τῶν περιεχομένων συστατικῶν πού ἀπαριθμοῦνται στό παράρτημα, τμῆμα Β, στήλη 5.

5. Τά Κράτη Μέλη ὁρίζουν ὅτι σχετικά μέ τίς ἐνδείξεις πού ἀναφέρονται στήν παράγραφο 1 μόνο οἱ συμπληρωματικές ἐνδείξεις πού ἀπαριθμοῦνται κατωτέρω δύνανται νά τεθοῦν στή συσκευασία, στό δοχεῖο, στήν ἐτικέτα ἤ τό συνοδευτικό ἔγγραφο τῶν ἁπλῶν ζωοτροφῶν:

α) τό σῆμα ἀναγνωρίσεως ἤ τό ἐμπορικό σῆμα τοῦ ὑπευθύνου γιά τίς ἐνδείξεις πού ἀναφέρονται στήν παρούσα παράγραφο·

β) ὁ ἀριθμός ἀναφορᾶς τῆς παρτίδας·

γ) ὁ τρόπος χρήσεως καί ἡ ἡμερομηνία λήξεως διατηρήσεως τοῦ προϊόντος·

δ) ἡ χώρα παραγωγῆς ἤ παρασκευῆς·

ε) ἡ τιμή τοῦ προϊόντος·

στ) σέ δεδομένη περίπτωση οἱ ἐνδείξεις οἱ ὁποῖες ἀνταποκρίνονται στίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 14 ὑπό β)·

ζ) πλήρως ἤ μερικῶς, ἡ περιεκτικότητα σέ συστατικά πού ἀναφέρονται στό παράρτημα, τμῆμα Β, στήλη 5.

6. Τά Κράτη Μέλη δύνανται νά ὁρίσουν διατάξεις παρόμοιες πρός ἐκεῖνες πού ἀναφέρονται στίς παραγράφους 1 ἕως 5 γιά τίς ἁπλές ζωοτροφές πού εἶναι διάφορες ἀπό ἐκεῖνες πού ἀναφέρονται στό παράρτημα, τμῆμα Β.

7. Οἱ ἄλλες πληροφορίες πού ἐμφαίνονται σέ δεδομένη περίπτωση ἐπί τῶν συσκευασιῶν, τῶν δοχείων, τῶν ἐτικετῶν καί τῶν συνοδευτικῶν ἐγγράφων πρέπει νά διαχωρίζονται ἀπό τίς ἐνδείξεις πού ἀναφέρονται στίς παραγράφους 1 ἕως 6.

Ἄρθρο 8

Τά Κράτη Μέλη δύνανται γιά τήν ἐμπορία τῶν ἁπλῶν ζωοτροφῶν στό ἔδαφός τους νά ὁρίσουν τήν τήρηση τῶν ἀπαιτήσεων, ὅπως ἀπαριθμοῦνται στό παράρτημα, τμῆμα Β, στήλη 6, καί νά καθορίσουν ἀντίστοιχα τίς ἀπαιτήσεις γιά ἄλλες ἁπλές ζωοτροφές.

Ἄρθρο 9

Τά Κράτη Μέλη μεριμνοῦν ὥστε οἱ ἁπλές ζωοτροφές νά μήν ὑποβάλλονται, γιά λόγους πού ἀφοροῦν τίς διατάξεις πού περιέχονται στήν παρούσα ὁδηγία, σέ περιορισμούς ἐμπορίας ἄλλους ἀπό ἐκείνους πού προβλέπονται στήν παρούσα ὁδηγία.

Ἄρθρο 10

Οἱ τροποποιήσεις οἱ ὁποῖες πρόκειται νά διενεργηθοῦν στό παράρτημα λόγω τῆς ἐξελίξεως τῶν ἐπιστημονικῶν καί τεχνικῶν γνώσεων θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό ἄρθρο 13.

Ἄρθρο 11

Γιά τήν ἐμπορία μεταξύ τῶν Κρατῶν Μελῶν οἱ ἐνδείξεις πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 7, παράγραφοι 1 ἕως 6, συντάσσονται τουλάχιστον σέ μία ἀπό τίς ἐθνικές ἤ ἐπίσημες γλῶσσες τῆς χώρας προορισμοῦ.

Ἄρθρο 12

Τά Κράτη Μέλη λαμβάνουν ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα ὥστε κατά τή διάρκεια τῆς ἐμπορίας ὁ ἐπίσημος ἔλεγχος τηρήσεως τῶν ὅρων πού προβλέπονται ἀπό τήν παρούσα ὁδηγία νά πραγματοποιεῖται τουλάχιστον δειγματοληπτικά.

Ἄρθρο 13

1. Στήν περίπτωση πού γίνεται ἀναφορά στή διαδικασία πού ὁρίζεται στό παρόν ἄρθρο, ἡ Μόνιμη Ἐπιτροπή Ζωοτροφῶν, ἀποκαλούμενη στό ἑξῆς «ἡ ἐπιτροπή», συγκαλεῖται ἀμέσως ἀπό τόν προεδρό της εἴτε ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας εἴτε μετά ἀπό αἴτηση Κράτους Μέλους.

2. Στήν ἐπιτροπή οἱ ψῆφοι τῶν Κρατῶν Μελῶν σταθμίζονται σύμφωνα μέ τήν ἀναλογία πού ὁρίζεται στό ἄρθρο 148, παράγραφος 2 τῆς συνθήκης. Ὁ πρόεδρος δέν ψηφίζει.

3. Ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς ὑποβάλλει σχέδιο τῶν μέτρων πού πρέπει νά ληφθοῦν. Ἡ ἐπιτροπή διατυπώνει τή γνώμη της γιά τά μέτρα αὐτά ἐντός προθεσμίας πού ὁ πρόεδρος μπορεῖ νά ὁρίσει σέ συνάρτηση μέ τόν ἐπείγοντα χαρακτήρα τῶν πρός ἐξέταση θεμάτων. Ἀποφαίνεται μέ πλειοψηφία σαράντα μιᾶς ψήφων.

4. Ἡ Ἐπιτροπή θεσπίζει τά μέτρα καί τά θέτει ἀμέσως σέ ἐφαρμογή, ὅταν εἶναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τῆς ἐπιτροπῆς. Ἂν δέν εἶναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τῆς ἐπιτροπῆς ἤ ἐλλείψει γνώμης της, ἡ Ἐπιτροπή ὑποβάλλει ἀμέσως στό Συμβούλιο πρόταση σχετικά μέ τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθοῦν. Τό Συμβούλιο θεσπίζει τά μέτρα μέ εἰδική πλειοψηφία.

Ἐάν μέ τή λήξη προθεσμίας τριῶν μηνῶν ἀπό τήν ἡμερομηνία κατά τήν ὁποία συγκλήθηκε, τό Συμβού-

λιο δέν ἔχει θεσπίσει μέτρα, ἡ Ἐπιτροπή θεσπίζει τά προταθέντα μέτρα καί τά θέτει ἀμέσως σέ ἐφαρμογή, ἐκτός ἐάν τό Συμβούλιο ἀποφανθεῖ μέ ἁπλή πλειοψηφία κατά τῶν μέτρων αὐτῶν.

Ἄρθρο 14

Δέν θίγεται τό δικαίωμα τῶν Κρατῶν Μελῶν:

α) νά ἐφαρμόζουν ἐπίσης τίς ἀρχές τῆς παρούσας ὁδηγίας σέ προϊόντα καί οὐσίες πού προορίζονται γιά τή διατροφή ζώων τά ὁποῖα δέν θεωροῦνται ἁπλές ζωοτροφές κατά τήν ἔννοια τοῦ ἄρθρου 2·

β) νά συστήνουν κριτήρια ποιότητος γιά ὁρισμένες ἁπλές ζωοτροφές·

γ) νά μήν ἐφαρμόζουν τίς διατάξεις τῆς παρούσας ὁδηγίας στίς ἁπλές ζωοτροφές γιά τίς ὁποῖες ἀποδεικνύεται τουλάχιστον μέ μιά κατάλληλη ἔνδειξη ὅτι αὐτές προορίζονται γιά ἐξαγωγή σέ τρίτες χῶρες.

Ἄρθρο 15

Τά Κράτη Μέλη θέτουν σέ ἰσχύ τήν 1η Ἰανουαρίου 1979 τίς ἀπαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές ἤ διοικητικές διατάξεις γιά νά συμμορφωθοῦν μέ τήν παρούσα ὁδηγία. Ἐνημερώνουν ἀμέσως περί τούτου τήν Ἐπιτροπή.

Ἄρθρο 16

Ἡ παρούσα ὁδηγία ἀπευθύνεται στά Κράτη Μέλη.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 23 Νοεμβρίου 1976.

Γιά τό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος

A.P.L.M.M. van der STEE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. **'Αφοροῦν τήν ὀνομασία**

1.1. 'Εάν ἡ ἁπλή ζωοτροφή ἔχει ὑποστεῖ μία ἐπεξεργασία ἡ ὁποία δέν φαίνεται στήν ὀνομασία, αὐτή πρέπει πάντοτε νά συμπληρωθεῖ ἀπό μία ἔνδειξη σχετική μέ τήν ἐπεξεργασία πού ἐφαρμόστηκε, μέ τόν τρόπο παρασκευῆς καί κατά περίπτωση μέ τή μορφή παρουσιάσεως, τέτοια ἔνδειξη ὅπως «πεπιεσμένη», «πεπλατυσμένη», «σπασμένη», «ἀλεσμένη», «πλακοῦς πιέσεως», «τεμαχισμένος πλακοῦς», «πλακοῦς σέ μικρά τεμάχια», «ἄλεσμα πλακούντων», «θραύσματα ἤ ἀλέσματα μετά ἀπό ἔκθλιψη» ἤ «προϊόντα ἐκχυλίσεως».

1.2. 'Εφ' ὅσον πρόκειται γιά ἁπλές ζωοτροφές πού ἀπαριθμοῦνται στό τμῆμα Β, 2.1.1 μέχρι 2.1.3, μπορεῖ νά ὁριστεῖ ὅτι ἡ ὀνομασία θά συμπληρωθεῖ μέ τήν ἔνδειξη τοῦ ἤ τῶν τύπων σίτου, ἤτοι: μαλακός σίτος, σκληρός σίτος ἤ μαλακός καί σκληρός σίτος.

1.3. 'Εφ' ὅσον πρόκειται γιά ἁπλές ζωοτροφές οἱ ὁποῖες ἀπαριθμοῦνται στό τμῆμα Β, 2.9.2 καί 3.2.8, μπορεῖ νά ὁριστεῖ ὅτι ἡ ὀνομασία θά συνοδεύεται μέ ἔνδειξη καθορίζουσα τό φυτικό ἤ ζωικό εἶδος ἐκ τοῦ ὁποίου τό προϊόν ἔχει παραχθεῖ.

2. **'Αφοροῦν τίς ὑποχρεωτικές δηλώσεις καί ἀπαιτήσεις**

2.1. Οἱ περιεκτικότητες οἱ ὁποῖες ὑποδεικνύονται ἤ δηλώνονται σύμφωνα μέ τό τμῆμα Β ἀναφέρονται:

— στό βάρος τῆς ἁπλῆς ζωοτροφῆς, στή φυσική της κατάσταση, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς στῆλες 4 καί 5,

— στό βάρος τῆς περιεχομένης ξηρῆς οὐσίας τῆς ἁπλῆς ζωοτροφῆς, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή στήλη 6, μέ ἐξαίρεση τῶν περιπτώσεων 2.6.5, 2.6.6, 3.2.8 καί 3.3.2.

2.2. Ὅταν τά προϊόντα τά ὁποῖα ἀναφέρονται στό τμῆμα Β, στήλη 2 χρησιμοποιοῦνται γιά τή μετουσίωση ἤ τή συγκόλληση τῶν ἁπλῶν ζωοτροφῶν, πρέπει νά δηλωθοῦν τά ἀκόλουθα:

— προϊόντα μετουσιώσεως: φύση καί ποσότητα χρησιμοποιουμένων προϊόντων,

— προϊόντα συγκολλήσεως: φύση χρησιμοποιουμένων προϊόντων.

'Εφ' ὅσον πρόκειται γιά προϊόντα συγκολλήσεως, ἡ ποσότητα τῶν χρησιμοποιουμένων προϊόντων δέν πρέπει νά ὑπερβεῖ τό 3% τοῦ ὁλικοῦ βάρους.

2.3. 'Εφ' ὅσον δέν ἔχουν καθοριστεῖ γιά ὁρισμένες ἁπλές ζωοτροφές ἄλλα ποσοστά, ἡ βοτανική καθαρότητα τῶν προϊόντων καί ὑποπροϊόντων πού ἀπαριθμοῦνται στό τμῆμα Β, 1 καί 2, δέν πρέπει νά εἶναι μικρότερη τοῦ 95%.

2.4. Ἄν κατόπιν ἐπισήμων ἐλέγχων τῶν ἁπλῶν ζωοτροφῶν πού ὁρίζονται στό ἄρθρο 12 τῆς παρούσας ὁδηγίας διαπιστωθεῖ μία διαφορά μεταξύ τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ ἐλέγχου καί τῆς δηλωμένης περιεκτικότητος ἡ ὁποία ὑποβαθμίζει τό προϊόν, γίνονται δεκτές οἱ ἀκόλουθες ἐλάχιστες ἀνοχές:

α) γιά τίς ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες, τό ἄζωτο, τά ὁλικά σάκχαρα, τά ἀναγωγικά σάκχαρα, τή σακχαρόζη, τή λακτόζη καί τή γλυκόζη (δεξτρόζη):

2 μονάδες γιά τίς περιεκτικότητες πού ἔχουν δηλωθεῖ ἴσες ἤ ἀνώτερες τοῦ 20%,

10% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος γιά τίς περιεκτικότητες πού ἔχουν δηλωθεῖ κατώτερες τοῦ 20%,

0,5 τῆς μονάδος γιά τίς περιεκτικότητες πού ἔχουν δηλωθεῖ κατώτερες τοῦ 5%·

β) γιά τό ἄμυλο καί τήν ἰνουλίνη:

3 μονάδες γιά τίς περιεκτικότητες πού ἔχουν δηλωθεῖ ἴσες ἤ ἀνώτερες τοῦ 30%,

10% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος γιά τίς περιεκτικότητες πού ἔχουν δηλωθεῖ κατώτερες τοῦ 30%,

1 μονάδα γιά τίς περιεκτικότητες πού ἔχουν δηλωθεῖ κατώτερες τοῦ 10%·

γ) γιά τίς λιπαρές καί τίς ἐνώδεις οὐσίες:

1,5 μονάδα γιά τίς περιεκτικότητες πού ἔχουν δηλωθεῖ ἴσες ἤ ἀνώτερες τοῦ 15%,

10% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος, γιά τίς περιεκτικότητες πού ἔχουν δηλωθεῖ κατώτερες τοῦ 15%,

0,5 τῆς μονάδος γιά τίς περιεκτικότητες πού ἔχουν δηλωθεῖ κατώτερες τοῦ 5%·

δ) γιά τήν ὑγρασία, τήν τέφρα, τόν ὁλικό φωσφόρο, τό ἀνθρακικό ἀσβέστιο, τό ἀσβέστιο, τό μαγνήσιο, τό δείκτη ὀξύτητος, τά ὀξειδωμένα λιπαρά ὀξέα, τίς ἀδιάλυτες στόν αἰθέρα καί τίς μή σαπωνοποιήσιμες οὐσίες:

1 μονάδα γιά τίς περιεκτικότητες (τιμές) πού δηλώθηκαν ἴσες ἤ ἀνώτερες τοῦ 10% (10), κατά περίπτωση,

10% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος (τιμῆς) γιά τίς περιεκτικότητες πού ἔχουν δηλωθεῖ κατώτερες τοῦ 10% (10), κατά περίπτωση,

0,2 τῆς μονάδος γιά τίς περιεκτικότητες (τιμές) πού ἔχουν δηλωθεῖ κατώτερες τοῦ 2% (2), κατά περίπτωση·

ε) γιά τήν ἀδιάλυτη τέφρα στό ὑδροχλωρικό ὀξύ καί τά χλωρίδια τά ὁποῖα ἐκφράζονται σέ NaCl:

10% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος γιά τίς περιεκτικότητες πού δηλώθηκαν ἴσες ἤ ἀνώτερες τοῦ 2%,

0,2 τῆς μονάδος γιά τίς περιεκτικότητες οἱ ὁποῖες δηλώθηκαν κατώτερες τοῦ 2%·

στ) γιά τήν καροτίνη, τή βιταμίνη Α καί ξανθοφύλλη:

30% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος·

ζ) γιά τή μεθιονίνη:

20% τῆς δηλουμένης περιεκτικότητος.

2.5. Ὑπό τήν ἐπιφύλαξη τῶν διατάξεων πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 3, ἡ περιεκτικότητα τῆς ἀδιαλύτου τέφρας στό ὑδροχλωρικό ὀξύ τῶν ἁπλῶν ζωοτροφῶν πού ἀπαριθμοῦνται στό τμῆμα Β δέν πρέπει νά ὑπερβεῖ τό 2%, ἐκτός ἐάν μία διάφορος περιεκτικότητα ἔχει ἐπιτραπεῖ στή στήλη 6.

2.6. Θεωροῦνται σάν ξένες ὕλες ἀπό βοτανικῆς πλευρᾶς:

α) οἱ φυσικές ἀλλά ἀβλαβεῖς ξένες ὕλες (γιά παράδειγμα τό ἄχυρο ἤ τά ὑπολείμματα ἀχύρου, οἱ σπόροι τῶν ἄλλων καλλιεργουμένων φυτῶν ἤ οἱ σπόροι τῶν ζιζανίων)·

β) τά ἀβλαβή ὑπολείμματα ἄλλων ἐλαιούχων σπόρων ἤ καρπῶν πού προέρχονται ἀπό προηγηθεῖσα μέθοδο ἐπεξεργασίας, ἐφ' ὅσον ἡ περιεκτικότητά τους δέν ὑπερβαίνει τό 0,5%.

ΤΜΗΜΑ Β

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Ὀνομασία	Περιγραφή	Ὑποχρεωτικές δηλώσεις	Προαιρετικές δηλώσεις	Ἀπαιτήσεις γιά τή σύνθεση			Ἀπαιτήσεις γιά συσκευασία
1	2	3	4	5	6			7
1.	ΠΛΑΚΟΥΝΤΕΣ							
1.1.	Πλακοῦντες πιέσεως τῶν ἐνδοσπερμίων τοῦ φοίνικος τῆς μακόγια (Παραγουάη)	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως σπόρων πού ἔχουν διαχωριστεῖ ἐκ τῆς πούλπας των, τῶν ἀκολούθων εἰδῶν τοῦ φοίνικα τῆς μακόγια (Παραγουάης): Acrocomia sclerocarpa Mart. καί Acrocomia totai Mart.	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὑγρασία Τέφρα	ἐλαχ. μεγ. μεγ.	29,5% 12 % 8 %	
1.2.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως τῶν ἐνδοσπερμίων τοῦ φοίνικος τῆς μακόγια (Παραγουάη)	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως σπόρων πού ἔχουν διαχωρισθεῖ ἐκ τῆς πούλπας των, τῶν εἰδῶν τοῦ φοίνικος μακόγια (Παραγουάη).	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Λιπαρές οὐσίες Τέφρα Ὑγρασία	ἐλαχ. μεγ. μεγ. μεγ.	32 % 2,3% 8 % 12 %	
1.3.	Πλακοῦς τῆς πούλπας τοῦ φοίνικος τῆς μακόγια (Παραγουάη)	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως τῆς πούλπας τοῦ φοίνικος τῆς μακόγια (Παραγουάη)	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὑγρασία Ἰνώδεις οὐσίες Τέφρα	ἐλαχ. μεγ. μεγ. μεγ.	11,5% 12 % 24 % 9 %	
1.4.	Πλακοῦς ἀποφλοιωθείσης ἀραχίδος	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως τῶν σπόρων τῆς ἀραχίδος Arachis hypogaea καί ἄλλων εἰδῶν ἀποφλοιωμένης Arachis	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὑγρασία Ἰνώδεις οὐσίες Τέφρα	ἐλαχ. μεγ. μεγ. μεγ.	49 % 12 % 7 % 7 %	

1	2	3	4	5	6	7
1.5.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως ἀποφλοιωθείσης ἀραχίδος	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως τῶν ἀποφλοιωμένων σπόρων τῆς ἀραχίδος	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 52,5% Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3% Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 8 % Τέφρα μεγ. 7 % Ὑγρασία μεγ. 12 %	
1.6.	Πλακοῦς πιέσεως μερικῶς ἀποφλοιωθείσης ἀραχίδος	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ πιέσεως μερικῶς ἀποφλοιωμένων σπόρων ἀραχίδος	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 40 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 10 % Τέφρα μεγ. 8 %	
1.7.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως μερικῶς ἀποφλοιωθείσης ἀραχίδος	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως τῶν μερικῶς ἀποφλοιωμένων σπόρων ἀραχίδος.	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 43 % Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3,% Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 16 % Τέφρα μεγ. 8 % Ὑγρασία μεγ. 12 %	
1.8.	Πλακοῦς πιέσεως τῆς κράμβης (Colza)	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως τῶν σπόρων τῆς κράμβης (Colza) Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., τῆς ἰνδικῆς κράμβης Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz, καθώς καί τῆς κράμβης Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg) Sinsk	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 36 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Τέφρα μεγ. 9,5% Βοτανική καθαρότης ἐλαχ. 94 %	
1.9.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως τῆς κράμβης (Colza)	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως τῶν σπόρων τῆς κράμβης (Colza), τῆς ἰνδικῆς κράμβης, καθώς καί τοῦ εἴδους κράμβης-Navette	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 38,5% Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3% Τέφρα μεγ. 10,0% Ὑγρασία μεγ. 12 % Βοτανική καθαρότης ἐλαχ. 94 %	
1.10.	Πλακοῦς πιέσεως κοκοκαρύου (Coprah)	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως τῶν ἀπεξηρανθέντων ἐνδοσπερμίων πού καλύπτονται ὑπό τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβλήματος τοῦ σπόρου τῆς κοκοκαρυᾶς Cocos nucifera L.	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Μή ἀζωτοῦχες ἐκχυλισματικές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 20,5% Ὑγρασία μεγ. 12 % Τέφρα μεγ. 8 %	

1	2	3	4	5	6	7
1.11.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως κράμβης (Coprah)	Ὑποπροϊον ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως τῶν ἀπεξηραθέντων ἐνδοσπερμίων πού καλύπτονται ὑπό τοῦ ἐσωτερικοῦ περιβλήματος τοῦ σπόρου τῆς κοκοκαρυᾶς	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 22,5% Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3% Τέφρα μεγ. 8 % Ὑγρασία μεγ. 12 %	
1.12.	Πλακοῦς πιέσεως τοῦ φοινικοκαρύου	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως φοινικοκαρύων, τῶν ὁποίων ἔχει ἀφαιρεθεῖ, ὅσον τοῦτο εἶναι δυνατόν, τό ξυλῶδες κέλυφος, τῶν ἀκολούθων εἰδῶν: Elaeis guineensis Jacq. καί Corozo oleifera (H.B.K.) — L.H. Bailey (Elaeis melanococca)	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 17 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Τέφρα μεγ. 5,5%	
1.13.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως τοῦ φοινικοκαρύου	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως φοινικοκαρύων τῶν εἰδῶν τῆς ἐλαιούχου φοινικοκαρυᾶς τῶν ὁποίων ἔχει ἀφαιρεθεῖ, ὅσον τοῦτο εἶναι δυνατόν, τό ξυλῶδες κέλυφος	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 18 % Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3% Τέφρα μεγ. 5,5% Ὑγρασία μεγ. 12 %	
1.14.	Πλακοῦς σόγιας	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῶν σπόρων τῆς σόγιας Glycine max (L.) Merr.	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 47,5% Ὑγρασία μεγ. 12 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 8 % Τέφρα μεγ. 7,5%	
1.15.	Πλακοῦς ἐψημένης σόγιας	Ὑποπροϊόν ἐκχυλίσεως προερχόμενο ἐκ τῶν σπόρων τῆς σόγιας, οἱ ὁποῖοι ὑπεβλήθησαν εἰς τήν ἐνδεδειγμένην θερμικήν ἐπεξεργασίαν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 50 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 8 % Τέφρα μεγ. 7,5% Δραστικότης οὐρεάσης μεγ. 0,5% Λιπαρές οὐσίες 2,3%	

1	2	3	4	5	6	7
1.16.	**Πλακοῦς ἐψημένης** ἀναποφλοιώτου σόγιας	**Ὑποπροϊόν ἐκχυλίσεως προερχόμενο ἐξ** ἀναποφλοιώτων σπόρων σόγιας, οἱ ὁποῖοι ὑπεβλήθησαν εἰς τήν ἐνδεδειγμένην θερμικήν ἐπεξεργασίαν	— **Ὁλικές ἀζωτοῦχες** οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— **Τέφρα** — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	**Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες** ἐλαχ. **54,5%** Ὑγρασία μεγ. 12 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 4 % Τέφρα μεγ. 7 % Δραστικότης οὐρεάσης μεγ. 0,5% Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3%	
1.17.	Πλακοῦς πιέσεως ἀποφλοιωθέντων σπόρων βάμβακος	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως σπόρων βάμβακος τοῦ εἴδους Gossypium sp. p., τῶν ὁποίων οἱ ἶνες καί τά περιβλήματά των ἔχουν ἀφαιρεθεῖ	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 45,5% Ὑγρασία μεγ. 12 % Τέφρα μεγ. 9 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 12,5%	
1.18.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως ἀποφλοιωθέντων σπόρων βάμβακος	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως σπόρων βάμβακος, τῶν ὁποίων ἔχουν ἀφαιρεθεῖ οἱ ἶνες καί τά περιβλήματα	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 47,5% Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3% Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 13,5% Τέφρα μεγ. 9 % Ὑγρασία μεγ. 12 %	
1.19.	Πλακοῦς πιέσεως μερικῶς ἀποφλοιωθέντων σπόρων βάμβακος	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως σπόρων βάμβακος ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν ἀφαιρεθεῖ οἱ ἶνες καί ἐν μέρει τά περιβλήματά των	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 34 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 22,5% Τέφρα μεγ. 10 %	
1.20.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως μερικῶς ἀποφλοιωθέντων σπόρων βάμβακος	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως σπόρων βάμβακος, τῶν ὁποίων ἔχουν ἀφαιρεθεῖ οἱ ἶνες καί ἐν μέρει τά περιβλήματά των	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 36,5% Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3% Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 22,5% Τέφρα μεγ. 10 % Ὑγρασία μεγ. 12 %	
1.21.	Πλακοῦς πιέσεως σπόρων τῆς γουιζοτίας τῆς ἐλαιοφόρου	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως σπόρων τῆς γουιζοτίας τῆς ἐλαιοφόρου Guizotia abyssinica (L.F.) Cass.	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 33 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Τέφρα μεγ. 9 % Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl μεγ. 3,4%	

1	2	3	4	5	6		7
1.22.	Πλακοῦς πιέσεως ἀποφλοιωμένων σπόρων ἡλιοτροπίου	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως σπόρων ἡλιτροπίου, Helianthus Annuus L. ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν ἀφαιρεθεῖ ὅσον τό δυνατόν περισσότερα περιβλήματα	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὑγρασία Ἰνώδεις οὐσίες Τέφρα	ἐλαχ. 43 % μεγ. 12 % μεγ. 16 % μεγ. 9 %	
1.23.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως ἀποφλοιωθέντων σπόρων ἡλιοτροπίου	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως σπόρων ἡλιοτροπίου	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Λιπαρές οὐσίες Τέφρα Ὑγρασία	ἐλαχ. 45,5% μεγ. 2,3% μεγ. 9 % μεγ. 12 %	
1.24.	Πλακοῦς πιέσεως μερικῶς ἀποφλοιωθέντωνσπόρωνἡλιοτροπίου	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως σπόρων ἡλιοτροπίου τῶν ὁποίων ἔχει ἀφαιρεθεῖ μέρος τῶν περιβλημάτων	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὑγρασία Ἰνώδεις οὐσίες Τέφρα	ἐλαχ. 30,5% μεγ. 12 % μεγ. 27,5% μεγ. 9 %	
1.25.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως μερικῶς ἀποφλοιωθέντων σπόρων ἡλιοτροπίου.	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως σπόρων ἡλιοτροπίου, τῶν ὁποίων ἔχει ἀφαιρεθεῖ μέρος τῶν περιβλημάτων	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Λιπαρές οὐσίες Ἰνώδεις οὐσίες Τέφρα Ὑγρασία	ἐλαχ. 32 % μεγ. 2,3% μεγ. 27,5% μεγ. 9 % μεγ. 12 %	
1.26.	Πλακοῦς πιέσεως σπόρων λίνου	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως σπόρων λίνου Linum usitatissimum L.	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὑγρασία Τέφρα Βοτανική καθαρότης	ἐλαχ. 34 % μεγ. 12 % μεγ. 8 % ἐλαχ. 93 %	
1.27.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως σπόρων λίνου	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως σπόρων λίνου	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Λιπαρές οὐσίες Τέφρα Ὑγρασία Βοτανική καθαρότης	ἐλαχ. 36,5% μεγ. 2,3% μεγ. 8 % μεγ. 12 % ἐλαχ. 93 %	

1	2	3	4	5	6	7
1.28.	**Πλακοῦς φοινικοκαρύων** babassu	**Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ** τῆς πιέσεως φοινικοκαρύων, τῶν ὁποίων ἀφαιρέθησαν ὅσον τό δυνατόν περισσότερα ξυλώδη κελύφη, τοῦ βραζιλιανοῦ φοίνικος (Babassu) Orbignya oleifera Burr. **καί ἄλλων** εἰδῶν Orbignya	— **Ὁλικές ἀζωτοῦχες** οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— **Τέφρα** — Ὑγρασία	**Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες** **ἐλαχ. 22,5%** Ὑγρασία μεγ. 12 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 17 % Τέφρα μεγ. 7,5%	
1.29.	Πλακοῦς πιέσεως σπερμάτων ὀρύζης	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως σπερμάτων ὀρύζης τῆς Oryza sativa L. στά ὁποῖα μέρος τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου καί τῶν καλυμμάτων παραμένουν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 25 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 10 % Λέπυρα ὀρύζης μεγ. 1 %	
1.30.	Ἐκχύλισμα σπερμάτων ὀρύζης	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως σπερμάτων ὀρύζης ἐκ τῶν ὁποίων μέρος τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου καί τῶν καλυμμάτων παραμένουν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 26 % Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3% Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 10 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Λέπυρα ὀρύζης μεγ. 1 %	
1.31.	Πλακοῦς πιέσεως σπόρων σησάμου	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως σπόρων σησάμου, τοῦ Sesamum indicum L.	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 43 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Τέφρα μεγ. 15 % Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl μεγ. 5 %	
1.32.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως σπόρων σησάμου	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως σπόρων σησάμου	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 45,5% Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3% Τέφρα μεγ. 15 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl μεγ. 5 %	
1.33.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως τοῦ κακαοδένδρου, χαμηλῆς περιεκτικότητος εἰς θεοβρωμίνη	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως ἀπεξηραθέντων καί ἐψημένων κόκκων τοῦ κακαοδένδρου Theobroma cacao L. τῶν ὁποίων ἀφαιρέθησαν ὅσον τό δυνατόν περισσότερα ἐκ τῶν περιβλημάτων	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 22,5% Ὑγρασία μεγ. 12 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 13 % Τέφρα μεγ. 9 %	

1	2	3	4	5	6	7
1.34.	Πλακοῦς πιέσεως σπερμάτων σίτου	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως σπερμάτων σίτου τῶν εἰδῶν Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. καί ἄλλων καλλιεργημένων εἰδῶν σίτου, ἄνευ κελύφους ἤ ἀποφλοιωμένου σίτου, τῶν εἰδῶν Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L., εἰς τά ὁποῖα τά τμήματα τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου καί τῶν περιβλημάτων παραμένουν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 28,5% Ὑγρασία μεγ. 12 % Τέφρα μεγ. 7 %	
1.35.	Πλακοῦς πιέσεως σπερμάτων ἀραβοσίτου (ὑποπροϊόν ἀλέσεως τοῦ ἀραβοσίτου)	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως καί τῆς ξηρᾶς ἐπεξεργασίας τῶν σπερμάτων ἀραβοσίτου Zea maïs L., εἰς τά ὁποῖα μέρος τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου καί τῶν περιβλημάτων παραμένουν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 12,5% Ὑγρασία μεγ. 12,5% Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 8 % Τέφρα μεγ. 9 %	
1.36.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως σπερμάτων ἀραβοσίτου (ὑποπροϊόν ἀλέσεως τοῦ ἀραβοσίτου)	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως καί τῆς ξηρᾶς ἐπεξεργαίας τῶν σπερμάτων ἀραβοσίτου, εἰς τό ὁποῖον μέρος τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου καί τῶν περιβλημάτων παραμένουν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 13,5% Ὑγρασία μεγ. 12,5% Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 8 % Τέφρα μεγ. 9 % Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3%	
1.37.	Πλακοῦς πιέσεως σπερμάτων ἀραβοσίτου (ὑποπροϊόν βιομηχανίας ἀλεύρου)	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς πιέσεως καί τῆς ὑγρῆς ἐπεξεργασίας τῶν σπερμάτων ἀραβοσίτου, εἰς τά ὁποῖα μέρος τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου καί τῶν περιβλημάτων παραμένουν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 20 % Ὑγρασία μεγ. 12,5% Τέφρα μεγ. 7,5%	
1.38.	Πλακοῦς ἐκχυλίσεως σπερμάτων (ὑποπροϊόν βιομηχανίας ἀλεύρου)	Ὑποπροϊόν ἐλαιουργίας προερχόμενο ἐκ τῆς ἐκχυλίσεως καί τῆς ὑγρῆς ἐπεξεργασίας τῶν σπερμάτων ἀραβοσίτου, εἰς τά ὁποῖα μέρος τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου καί τῶν περιβλημάτων παραμένουν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 21,5% Λιπαρές οὐσίες μεγ. 2,3% Τέφρα μεγ. 7,5% Ὑγρασία μεγ. 12,5%	

1	2	3	4	5	6	7
2.	**ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ**					
2.1.	**Ὑποπροϊόντα ἀλευροποιίας**					
2.1.1.	Πίτυρα σίτου	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς παρασκευῆς ἀλεύρου, ἐκ σίτου ἢ ἀποφλοιωμένου σίτου (Epeautre) ὁ ὁποῖος προηγουμένως ἔχει καθαρισθεῖ. Ἀποτελεῖται κυρίως ἐκ τμημάτων ἐξωτερικῶν φλοιῶν καί ἀφ' ἑτέρου ἐκ τεμαχίων σπόρου, τῶν ὁποίων τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου ἔχει ἀφαιρεθεῖ	— Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 14,5% Τέφρα μεγ. 8,5%	
2.1.2.	Κτηνάλευρα σίτου, «βῆττες»	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς παρασκευῆς ἀλεύρου, ἐκ σίτου ἢ ἀποφλοιωμένου σίτου (Epeautre) ὁ ὁποῖος προηγουμένως ἔχει καθαρισθεῖ. Ἀποτελεῖται κυρίως ἐκ τμημάτων ἐξωτερικῶν φλοιῶν καί ἀφ' ἑτέρου ἐκ τεμαχίων σπόρων, τῶν ὁποίων ἕνα μικρότερο μέρος τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου, ἐν σχέσει μέ τά πίτυρα σίτου, ἔχει ἀφαιρεθεῖ	— Ἰνώδεις οὐσίες	— Ἄμυλον — Τέφρα — Ὑγρασία	Ἄμυλον ἐλαχ. 21 % Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 11,5% Τέφρα μεγ. 7,5%	
2.1.3.	Κτηνάλευρα σίτου, «ψιλά πίτυρα»	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς παρασκευῆς ἀλεύρου, ἐκ σίτου ἢ ἀποφλοιωμένου σίτου (Epeautre) ὁ ὁποῖος προηγουμένως ἔχει καθαρισθεῖ. Ἀποτελεῖται κυρίως ἐκ τεμαχίων ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου καί ἀφ' ἑτέρου ἐκ λεπτῶν τμημάτων ἐξωτερικῶν φλοιῶν καί ὑπολειμμάτων σπόρων	— Ἰνώδεις οὐσίες	— Ἄμυλον — Τέφρα — Ὑγρασία	Ἄμυλον ἐλαχ. 35 % Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 6 % Τέφρα μεγ. 6,5%	

1	2	3	4	5	6	7
2.1.4.	Σπέρματα σίτου	Ὑποπροϊόν ἀλέσεως, συνιστάμενο κυρίως ἐκ σπερμάτων σίτου, πεπλατυσθέντων κατόπιν κυλινδρίσεως ἢ μή, εἰς τά ὁποῖα παραμένουν τμήματα τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου καί τῶν ἐξωτερικῶν περιβλημάτων	— Ἰνώδεις οὐσίες	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες — Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 28,5% Λιπαρές οὐσίες ἐλαχ. 8 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 4,5%	x
2.1.5.	Πίτυρα σικάλεως	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς παρασκευῆς ἀλεύρου τῆς σικάλεως, Secale cereale L., ἡ ὁποία προηγουμένως ἔχει καθαρισθεῖ. Ἀποτελεῖται κυρίως ἐκ τεμαχίων ἐξωτερικῶν φλοιῶν καί ἀφ' ἑτέρου ἐκ τεμαχίων σπόρων τῶν ὁποίων ἔχει ἀφαιρεθεῖ τό μεγαλύτερον μέρος τοῦ ἐνδοσπερμίου	— Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 10,5% Τέφρα μεγ. 6,5%	
2.1.6.	Κτηνάλευρα σικάλεως	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς παρασκευῆς ἀλεύρου σικάλεως, ἡ ὁποία προηγουμένως ἔχει καθαρισθεῖ. Ἀποτελεῖται κυρίως ἐκ τεμαχίων ἐξωτερικῶν φλοιῶν καί ἀφ' ἑτέρου ἐκ τεμαχίων σπόρων, τῶν ὁποίων ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἕνα μικρότερο μέρος τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου ἐν σχέσει μέ τά πίτυρα σικάλεως	— Ἰνώδεις οὐσίες	— Ἄμυλον — Τέφρα — Ὑγρασία	Ἄμυλον ἐλαχ. 21 % Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 7,5% Τέφρα μεγ. 7 %	
2.1.7.	Κατωτέρας ποιότητος ἄλευρον σικάλεως (κοσκινίσματα σικάλεως)	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς παρασκευῆς ἀλεύρου σικάλεως ἡ ὁποία ἔχει προηγουμένως καθαρισθεῖ. Ἀποτελεῖται κυρίως ἐκ τμημάτων τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου καί ἀφ' ἑτέρου ἐκ τῶν λεπτῶν τμημάτων τῶν ἐξωτερικῶν φλοιῶν καί ὑπολειμμάτων σπόρων	— Ἰνώδεις οὐσίες	— Ἄμυλον — Τέφρα — Ὑγρασία	Ἄμυλον ἐλαχ. 35 % Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 4,5% Τέφρα μεγ. 4,5%	
2.2.	**Προϊόντα καί ὑποπροϊόντα τῆς βιομηχανίας παρασκευῆς τολυπῶν ἀλεύρου, ἀλεσμάτων καί ἀποφλοιωμένων σπόρων**					
2.2.1.	Τεμαχίδια ἀποφλοιωμένης βρώμης (ψιλά πίτυρα)	Ὑποπροϊόν πλούσιο σέ ἄμυλο παραγόμενο κατά τή διαδικασία μεταποιήσεως τῆς καθαρισμένης καί ἀποφλοιωμένης βρώμης (Avena sativa L.) καί ἄλλων εἰδῶν καλλιεργουμένης βρώμης, εἰς χονδρά ἀλέσματα καί εἰς κοσκινισμένον ἄλευρον βρώμης	— Ἰνώδεις οὐσίες — Ἄμυλον	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ἄμυλον ἐλαχ. 46,5% Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 8 % Τέφρα μεγ. 5 %	

1	2	3	4	5	6	7
2.2.2.	**Τεμαχίδια θρώμης**	**Ὑποπροϊόν παραγόμενο κατά τή διαδικασία καθαρισμοῦ θρώμης ἀναποφλοιώτου, πρός παραγωγήν ἀλεύρου χονδροῦ ἀλέσματος. Ἡ ποσότης φλοιῶν ἡ ὁποία ὑπάρχει εἰς τό ὑποπροϊόν πρέπει νά ἀτιστοιχεῖ πρός τήν ποσότητα ἡ ὁποία προκύπτει ἀπό τήν κανονική ἐπεξεργασία τῆς θρώμης**	— Ἰνώδεις οὐσίες	— Ἄμυλον — Τέφρα — Ὑγρασία	Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 30 % Τέφρα μεγ. 7 %	
2.2.3.	Τολῦπαι κριθῆς	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς συμπιέσεως ἀποφλοιωθείσης κριθῆς Hordeum Vulgare L., ἡ ὁποία ἔχει ἐπεξεργασθεῖ δι' ἀτμοῦ	— Ἰνώδεις οὐσίες	— Ἄμυλον — Ὑγρασία	Ἄμυλον ἐλαχ. 58 % Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 2,3% Τέφρα μεγ. 4,7%	
2.2.4.	Τεμαχίδια κριθῆς	Ὑποπροϊόν τό ὁποῖον προκύπτει ἐκ τῆς μεταποιήσεως τῆς κριθῆς, ἡ ὁποία προηγουμένως ἔχει καθαρισθεῖ καί ἀποφλοιωθεῖ, εἰς ἄλευρον κριθῆς ἤ σιμιγδάλι ἤ κοσκινισμένον ἄλευρον κριθῆς	— Ἰνώδεις οὐσίες — Ἄμυλον	— Τέφρα — Ὑγρασία	Ἄμυλον ἐλαχ. 40,5% Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 11,5% Τέφρα μεγ. 6,5%	
2.2.5.	Τολῦπαι ἀραβοσίτου	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς συμπιέσεως ἀραβοσίτου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπεξεργασθεῖ δι' ἀτμοῦ	— Ἰνώδεις οὐσίες	— Ἄμυλον — Ὑγρασία	Ἄμυλον ἐλαχ. 70 % Ὑγρασία μεγ. 40 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 4,7% Τέφρα μεγ. 3,5%	
2.2.6.	Τεμαχίδια πίσου (κτηνάλευρον πίσου)	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς παρασκευῆς ἀλεύρου πίσου Pisum Sativum L. Ἀποτελεῖται κυρίως ἐκ τεμαχιδίων ἐνδοσπερμίου καί εἰς μικροτέραν ἔκτασιν ἐκ τῶν φλοιῶν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Λιπαρές οὐσίες — Τέφρα — Ὑγρασία	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 23,5% Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 9,5%	

1	2	3	4	5	6	7
2.2.7.	Τολῦπαι γεωμήλων	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς ξηράνσεως γεωμήλων Solanum tuberosum L., ἀποφλοιωθέντων ἤ μή, πού ἔχουν ἀτμισθεῖ ἤ ἔχουν θρασθεῖ καί τεμαχισθεῖ	— Ἰνώδεις οὐσίες — Ἄμυλον — Ὑγρασία	— Ἄμυλον — Ὑγρασία	Ἄμυλον ἐλαχ. 70 % Ὑγρασία μεγ. 14 % Τέφρα μεγ. 7,5% Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl μεγ. 1,7%	
2.3.	**Ὑποπροϊόντα ἀλέσεως ἀραβοσίτου**					
2.3.1.	Κτηνάλευρον ἀραβοσίτου	Ὑποπροϊόν, πλούσιο σέ ἄμυλο, προερχόμενο ἐκ τῆς παρασκευῆς ἀλεύρου ἤ σιμιγδάλεως ἀραβοσίτου	— Ἄμυλον	— Ἰνώδεις οὐσίες — Τέφρα — Λιπαρές οὐσίες — Ὑγρασία — Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	Ἄμυλον ἐλαχ. 37 % Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 8 % Τέφρα μεγ. 5 %	
2.3.2.	Πίτυρα ἀραβοσίτου	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς παρασκευῆς ἀλεύρου ἤ σιμιγδάλεως ἀραβοσίτου. Ἀποτελεῖται κυρίως ἀπό ἐξωτερικούς φλοιούς, καθώς καί σπέρματα ἀραβοσίτου, μέ τινα τμήματα τοῦ ἀλευρώδους ἐνδοσπερμίου	— Ἰνώδεις οὐσίες	— Τέφρα — Λιπαρές οὐσίες — Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 14 % Τέφρα μεγ. 5 %	
2.4.	**Προϊόντα καί ὑποπροϊόντα ἀλέσεως ὀρύζης**					
2.4.1.	Κτηνάλευρον ὀρύζης	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς ἀλέσεως κτηνοτροφικῆς ὀρύζης Oryza sativa L., συνιστάμενον εἴτε ἐκ πρασίνων, ἀνωρίμων ἤ μαλακῶν σπόρων, πού προέρχονται ἐκ τοῦ κοσκινίσματος κατά τήν ἐπεξεργασίαν ἀποφλοιωμένης ὀρύζης εἴτε ἐκ κανονικῶν ἀποφλοιωμένων σπόρων κιτρίνων ἤ μετά κηλίδων	— Ἄμυλον	— Ἰνώδεις οὐσίες — Τέφρα — Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες — Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	Ἄμυλον ἐλαχ. 76 % Ὑγρασία μεγ. 14 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 2,9% Τέφρα μεγ. 3,5%	
2.4.2.	Θραύσματα ὀρύζης	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς παρασκευῆς στιλβούσης ὀρύζης ἤ ὀρύζης γλασέ. Ἀποτελεῖται κυρίως ἀπό μικτούς σπόρους ἤ θραύσματα σπόρων	— Ἄμυλον		Βοτανική καθαρότης ἐλαχ. 99 % Ὑγρασία μεγ. 14 %	

1	2	3	4	5	6	7
2.4.3.	**Πίτυρα ὀρύζης (σκοτεινοῦ χρώματος)**	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς πρώτης στιλβώσεως ἀποφλοιωμένης ὀρύζης. Ἀποτελεῖται ἐκ λεπύρων, τμημάτων ἀλευρώδους στρώματος, ἐνδοσπερμίου καί σπερμάτων	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Ὑγρασία — Τέφρα — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 13,5% Λιπαρές οὐσίες ἐλαχ. 13,5% Ὑγρασία μεγ. 12 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 12,5% Τέφρα μεγ. 13,5% Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl μεγ. 1,7% Λέπυρα ὀρύζης μεγ. 3 %	
2.4.4.	Κατωτέρας ποιότητος ἄλευρον ὀρύζης (λευκόν κτηνάλευρον ὀρύζης)	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς δευτέρας στιλβώσεως ἀποφλοιωμένης ὀρύζης. Ἀποτελεῖται κυρίως ἐκ τμημάτων ἐνδοσπερμίου, ἀλευρώδους στρώματος καί σπερμάτων	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Ὑγρασία — Τέφρα — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 13,5% Λιπαρές οὐσίες ἐλαχ. 13,5% Ὑγρασία μεγ. 12 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 7 % Τέφρα μεγ. 10 % Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl μεγ. 0,6% Λέπυρα ὀρύζης μεγ. 1 %	
2.5.	**Προϊόντα καί ὑποπροϊόντα βιομηχανίας ἀμύλου**					
2.5.1.	Ἄμυλον ἀραβοσίτου	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον ἀραβοσίτου	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἄμυλον ἐλαχ. 98 % Ὑγρασία μεγ. 14 % Τέφρα μεγ. 0,6%	
2.5.2.	Διογκωμένον ἄμυλον ἀραβοσίτου	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον ἀραβοσίτου, πού διογκοῦται πολύ λόγω καταλλήλου θερμικῆς ἐπεξεργασίας	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἄμυλον ἐλαχ. 98 % Ὑγρασία μεγ. 10 % Τέφρα μεγ. 0,6%	
2.5.3.	Προζελατινοποιηθέν, μερικῶς ὑδρολυθέν, ἄμυλον ἀραβοσίτου	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον ἀραβοσίτου, εὐρέως προ-ζελατινοποιηθέν καί μερικῶς ὑδρολυθέν	— Ἄμυλον — Ἀναγωγικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς γλυκόζη	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἀναγωγικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς γλυκόζη ἐλαχ. 28 % Ὑγρασία μεγ. 10 % Τέφρα μεγ. 1,1%	

1	2	3	4	5	6	7
2.5.4.	Σπέρματα καί πίτυρα ἀραβοσίτου	Ὑποπροϊόν βιομηχανίας ἀλεύρου ἀραβοσίτου, ἀποτελούμενο ἐκ μή ἐκχυλισθέντων σπερμάτων, πιτύρων ἀραβοσίτου καί μερικῶν τεμαχίων ἐνδοσπερμίου	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Ἰνώδεις οὐσίες — Τέφρα — Ἄμυλον	Λιπαρές οὐσίες ἐλαχ. 11 % Ὑγρασία μεγ. 13 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 9 %	
2.5.5.	Γλουτένη ἀραβοσίτου	Ἀπεξηραμμένο ὑποπροϊόν βιομηχανίας ἀλεύρου ἀραβοσίτου. Ἀποτελεῖται κυρίως ἐκ γλουτένης, προερχομένης ἐκ τοῦ διαχωρισμοῦ τοῦ ἀμύλου	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Ἰνώδεις οὐσίες — Τέφρα — Λιπαρές οὐσίες — Ξανθοφύλλη	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 67 % Ὑγρασία μεγ. 13 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 5 % Τέφρα μεγ. 3,5%	
2.5.6.	Κτηνοτροφική γλουτένη ἀραβοσίτου	Ἀπεξηραμμένο ὑποπροϊόν βιομηχανίας ἀλεύρου ἀραβοσίτου. Ἀποτελεῖται ἐκ πιτύρων καί μικροτέρας ποσότητος γλουτένης. Ἀπεξηραμμένα ὑποπροϊόντα οἰνοπνευματοποιίας καί σπέρματα, ἐκ τῶν ὁποίων ἀπομακρύνθηκαν τά ἔλαια, εἶναι δυνατόν νά προστεθοῦν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Ἰνώδεις οὐσίες — Τέφρα — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 20,5% Ὑγρασία μεγ. 13 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 11,5% Τέφρα μεγ. 10,5%	
2.5.7.	Ἄμυλον ὀρύζης	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον ὀρύζης	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἄμυλον ἐλαχ. 98 % Ὑγρασία μεγ. 14 % Τέφρα μεγ. 1,2%	
2.5.8.	Διογκωμένον ἄμυλον ὀρύζης	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον ὀρύζης, πού διογκοῦται πολύ, λόγω καταλλήλου θερμικῆς ἐπεξεργασίας	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἄμυλον ἐλαχ. 94 % Ὑγρασία μεγ. 10 % Τέφρα μεγ. 1,1%	

1	2	3	4	5	6		7
2.5.9.	Γλουτένη ὀρύζης	Ὑποπροϊόν βιομηχανίας ἀλεύρου ὀρύζης, συνιστάμενον κυρίως ἐκ γλουτένης	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὑγρασία Ἰνώδεις οὐσίες Τέφρα	ἐλαχ. 63 % μεγ. 13 % μεγ. 2,3% μεγ. 5 %	
2.5.10	Κτηνοτροφική γλουτένη σόργου	Ἀπεξηραμμένον ὑποπροϊόν βιομηχανίας ἀλεύρου σόργου (Sorghum bicolor (L.) Moench). Ἀποτελεῖται ἐκ πιτύρων καί μικροτέρας ποσότητος γλουτένης. Ἀπεξηραμμένα κατάλοιπα οἰνοπνευματοποιίας καί τά σπέρματα εἶναι δυνατόν νά προστεθοῦν.	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Ἰνώδεις οὐσίες — Τέφρα — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὑγρασία Ἰνώδεις οὐσίες Τέφρα	ἐλαχ. 20,5% μεγ. 13 % μεγ. 11 % μεγ. 9 %	
2.5.11.	Ἄμυλον σίτου	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον σίτου	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἄμυλον Ὑγρασία Τέφρα	ἐλαχ. 98 % μεγ. 14 % μεγ. 0,6%	
2.5.12.	Διογκωμένον ἄμυλον σίτου	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον σίτου, διογκωμένον πολύ, λόγω καταλλήλου θερμικῆς ἐπεξεργασίας	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἄμυλον Ὑγρασία Τέφρα	ἐλαχ. 91 % μεγ. 10 % μεγ. 0,6%	
2.5.13.	Προζελατινοποιηθέν ἄμυλον σίτου, μερικῶς ὑδρολυθέν	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον σίτου, σημαντικῶς προζελατινοποιηθέν καί μερικῶς ὑδρολυθέν	— Ἄμυλον — Ἀναγωγικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς γλυκόζη	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἀναγωγικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς γλυκόζη Ὑγρασία Τέφρα	ἐλαχ. 28 % μεγ. 10 % μεγ. 1,1%	x

1	2	3	4	5	6		7
2.5.14.	Γλουτένη σίτου	Ἀπεξηραμμένο ὑποπροϊόν βιομηχανίας ἀλεύρου σίτου. Ἀποτελεῖται κυρίως ἐκ γλουτένης προερχομένης ἐκ τοῦ διαχωρισμοῦ τοῦ ἀμύλου	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὑγρασία Τέφρα	ἐλαχ. 80 % μεγ. 12 % μεγ. 1,7%	
2.5.15.	Ἄμυλον μανιόκας	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον, προερχόμενο ἐκ ριζῶν μανιόκας (Manihot esculenta Crantz)	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἄμυλον Ὑγρασία Τέφρα	ἐλαχ. 92 % μεγ. 15 % μεγ. 1,2%	
2.5.16.	Διογκωμένον ἄμυλον μανιόκας	Ἄμυλον προερχόμενον ἐκ ριζῶν μανιόκας, τό ὁποῖον διογκοῦται πολύ λόγω καταλλήλου θερμικῆς ἐπεξεργασίας	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἄμυλον Ὑγρασία Τέφρα	ἐλαχ. 91 % μεγ. 10 % μεγ. 1,1%	
2.5.17.	Ἄμυλον γεωμήλων	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον γεωμήλων	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἄμυλον Ὑγρασία Τέφρα	ἐλαχ. 98 % μεγ. 20 % μεγ. 1 %	x
2.5.18.	Προζελατινοποιηθέν ἄμυλον γεωμήλων (διογκωθέν)	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον γεωμήλων, τό ὁποῖον ἔει διογκωθεῖ πολύ, λόγω καταλλήλου θερμικῆς ἐπεξεργασίας	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἄμυλον Ὑγρασία Τέφρα	ἐλαχ. 96 % μεγ. 10 % μεγ. 1,1%	
2.5.19.	Προζελατινοποιηθέν, μερικῶς ὑδρολυθέν, ἄμυλον γεωμήλων	Οὐσιαστικῶς καθαρόν ἄμυλον γεωμήλων, τό ὁποῖον ἔχει διογκωθεῖ πολύ καί μερικῶς ἔχει ὑποστεῖ ὑδρόλυσιν	— Ἄμυλον — Ἀναγωγικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς γλυκόζη	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἀναγωγικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς γλυκόζη Ὑγρασία Τέφρα	ἐλαχ. 31,5% μεγ. 20 % μεγ. 1,5%	x

1	2	3	4	5	6	7
2.5.20.	Πρωτεΐνη γεωμήλων	Ἀπεξηραμμένον ὑποπροϊόν ἀλευροβιομηχανίας, ἀποτελούμενο κυρίως ἐκ πρωτεϊνούχων οὐσιῶν, προερχομένων ἐκ τοῦ διαχωρισμοῦ τοῦ ἀλεύρου	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Τέφρα — Λιπαρές οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 76 % Ὑγρασία μεγ. 14 %	
2.5.21.	Ἀπεξηραμμένη πούλπα γεωμήλων	Ἀπεξηραμμένον ὑποπροϊόν βιομηχανίας ἀλεύρου (γεωμήλων)	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα — Λιπαρές οὐσίες — Ἰνώδεις οὐσίες	Ἄμυλον ἐλαχ. 40,5% Ὑγρασία μεγ. 1 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 21 %	
2.5.22.	Δεξτρόζη (γλυκόζη)	Προϊόν σακχαροποιήσεως τοῦ ἀμύλου ἀποτελούμενο ἐκ καθαρισμένης, κρυσταλλικῆς γλυκόζης (μετά ἤ ἄνευ κρυσταλλικοῦ ὕδατος)	— Γλυκόζη	— Ὑγρασία	Γλυκόζη ἐλαχ. 99,5% Ὑγρασία μεγ. 10 %	x
2.5.23	Μελάσσα δεξτρόζης	Ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς κρυσταλλοποιήσεως τῆς δεξτρόζης	— Ἀναγωγικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς γλυκόζη	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ἀναγωγικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς γλυκόζη ἐλαχ. 60 % Ὑγρασία μεγ. 40 % Τέφρα μεγ. 4 %	x
2.6.	**Προϊόντα καί ὑποπροϊόντα βιομηχανίας σακχάρεως**					
2.6.1.	Σάκχαρη (σακχαρόζη)	Σάκχαρη τεύτλων ἤ σακχαροκαλάμου ὑπό στερεάν μορφήν	— Σακχαρόζη	— Τέφρα	Σακχαρόζη ἐλαχ. 97 %	x
2.6.2.	Ἀπεξηραμμένα τεμαχίδια σακχαροτεύτλων	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς ἀποξηράνσεως ἐκπλυθέντων τεμαχιδίων σακχαροτεύτλων (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell)	— Ὁλικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς σακχαρόζη	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ὁλικά σάκχαρα, ἐκφραζόμενα εἰς σακχαρόζη ἐλαχ. 57 % Ὑγρασία μεγ. 12 % Τέφρα μεγ. 7,5%	
2.6.3.	Ἀπεξηραμμένα, μερικῶς ἐκχυλισθέντα τεμαχίδια σακχαροτεύτλων	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς ἀποξηράνσεως ἐκπλυθέντων, μερικῶς ἐκχυλισθέντων τεμαχιδίων σακχαροτεύτλων	— Ὁλικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς σακχαρόζη	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ὁλικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς σακχαρόζη ἐλαχ. 20,5% Ὑγρασία μεγ. 13 % Τέφρα μεγ. 7 %	

1	2	3	4	5	6	7
2.6.4.	Ἀπεξηραμμένη πούλπα σακχαροτεύτλων	**Ὑποπροϊόν βιομηχανίας σακχάρεως, ἀποτελούμενο ἐξ ἀπεξηραμμένων, ἐκχυλισθέντων τεμαχιδίων σακχαροτεύτλων**		— **Ἰνώδεις οὐσίες**	**Ὑγρασία** μεγ. 13 % Τέφρα μεγ. 8 % Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl μεγ. 3,5%	
2.6.5.	Μελάσσα σακχαροτεύτλων	Ὑποπροϊόν ἀποτελούμενο ἐκ τοῦ σιροπιώδους ὑπολείμματος πού συλλέγεται κατά τή διάρκεια τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς ἤ τῆς διυλίσεως σακχάρεως, προερχομένης ἐκ σακχαροτεύτλων	— Ὁλικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς σακχαρόζην		Ὁλικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς σακχαρόζη, ἐν σχέσει μέ τό προϊόν ἐλαχ. 45 %	x
2.6.6.	Μελάσσα σακχαροκαλάμου	Ὑποπροϊόν ἀποτελούμενο ἐκ τοῦ σιροπιώδους ὑπολείμματος πού συλλέγεται κατά τή διάρκεια τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς ἤ τῆς διυλίσεως σακχάρεως, προερχομένης ἐκ σακχαροκαλάμου (Saccharum officinarum L.)	— Ὁλικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς σακχαρόζη		Ὁλικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα εἰς σακχαρόζη ἐν σχέσει μέ τό προϊόν ἐλαχ. 50 %	x
2.7.	**Προϊόντα καί ὑποπροϊόντα βυνοποιίας, ζυθοποιίας, ἀποστάξεως καί μεταποιήσεως φρούτων, καθώς καί ἀπεξηραμμένες κτηνοτροφικές ζύμες**					
2.7.1.	Ριζίδια κριθῆς	Ὑποπροϊόν τῆς ζυθοποιίας, ἀποτελούμενο ἐξ ἀπεξηραμμένων ριζιδίων κριθῆς, ἡ ὁποία ἔχει βλαστήσει	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Τέφρα — Ἰνώδεις οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 26,5% Ὑγρασία μεγ. 12,5% Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 18,5% Τέφρα μεγ. 8,5%	
2.7.2.	Ἀπεξηραμμένη ζύμη	Ζύμαι, ἀναμεμιγμέναι ἤ ὄχι, ἀνήκουσαι εἰς τάς οἰκογενείας τῶν Saccharomycetaceae, Endomycetaceae, Cryptococcaceae, καλλιεργούμεναι ἐπί τῶν ἀκολούθων ὑποστρωμάτων: χυμοί καί μελάσσαι τεύτλων ἤ σακχαροκαλάμου, ἀπόβλητα ἀποστάξεως ἤ ζυμώσεως, τυρόγαλον, δημητριακά καί προϊόντα προερχόμενα ἐκ τῆς μεταποιήσεώς των, διαλύματα ὑδρολύσεως κυτταρινούχων ὑλῶν τῶν ὁποίων τά κύτταρα νεκρώθηκαν κατά τήν ἀποξήρανση	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 49 % Ὑγρασία μεγ. 10 % Τέφρα μεγ. 9,5% Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl μεγ. 1,1%	x

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.	Ὑποπροϊόντα ζυμώσεως σπόρων δημητριακῶν	Ὑποπροϊόντα ζυθοποιίας, προερχόμενα ἐκ τῆς ἀποξηράνσεως ὑπολειμμάτων δημητριακῶν, τά ὁποῖα ἔχουν ἤ ὄχι ἀποσταχθεῖ, καθώς καί ἄλλων ἀμυλούχων ὑλῶν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Ἰνώδεις οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 23 % Ὑγρασία μεγ. 12,5% Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 19,5% Τέφρα μεγ. 6,5% Διαλυτή πρωτεῖνη ἐκ τῆς ζυμώσεως ἐλαχ. 16 %	
2.7.4.	Ὑποπροϊόντα ἀποστάξεως σπόρων δημητριακῶν	Ὑποπροϊόντα ἀποστάξεως προερχόμενα ἐκ τῆς ἀποξηράνσεως ὑπολειμμάτων ἀποσταχθέντων δημητριακῶν ἤ ἄλλων ἀμυλούχων ὑλῶν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Ἰνώδεις οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 23 % Ὑγρασία μεγ. 12,5% Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 19,5% Τέφρα μεγ. 6,5% Διαλυτή πρωτεῖνη ἐκ ζυμώσεως ἐλαχ. 16 %	
2.7.5.	Ἀφυδατωμένη πούλπα ἑσπεριδοειδῶν	Ἀπεξηραμμένο ὑποπροϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς βιομηχανικῆς παρασκευῆς χυμοῦ ἑσπεριδοειδῶν		— Ὑγρασία — Ἰνώδεις οὐσίες	Ὑγρασία μεγ. 13 % Ὀξύτης ἐκφραζόμενη εἰς ἄνυδρον κιτρικόν ὀξύ μεγ. 4,6%	
2.8.	**Τεχνητῶς ἀπεξηρανθέντα γεωργικά προϊόντα**					
2.8.1.	Ἄλευρον ἀφυδατωμένων χόρτων	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς τεχνητῆς ἀποξηράνσεως νεαρῶν λειμωνίων φυτῶν, τῶν ὁποίων τά ἔνζυμα, τά ὁποῖα προκαλοῦν τήν ὀξείδωση, ἔχουν πρακτικῶς ἐξουδετερωθεῖ διά τῆς ἀποξηράνσεως (ἀφυδατώσεως)	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Τέφρα — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl — Ἰνώδεις οὐσίες — Καροτίνια — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 16 % Καροτίνια ἐλαχ. 0,01% Ὑγρασία μεγ. 15 % Τέφρα μεγ. 12 % Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl μεγ. 3,4%	

1	2	3	4	5	6	7
2.8.2.	Ἄλευρον ἀφυδατωμένης μηδικῆς	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς τεχνητῆς ἀποξηράνσεως τῆς μηδικῆς Medicago sativa L. καί Medicago varia Martyn, τῶν ὁποίων τά ἔνζυμα τά ὁποῖα προκαλοῦν τήν ὀξείδωση ἔχουν πρακτικῶς ἐξουδετερωθεῖ διά τῆς ἀποξηράνσεως. Τό προϊόν αὐτό δύναται νά περιέχει περίπου 20% λειμωνίων φυτῶν ἤ τριφυλλίου, πού ἔχει ἀποξηρανθεῖ τεχνητῶς, συγχρόνως μέ τήν μηδική	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Τέφρα — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl — Ἰνώδεις οὐσίες — Καροτίνια — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 18 % Καροτίνια ἐλαχ. 0,01% Ὑγρασία* μεγ. 12 % Τέφρα μεγ. 15 % Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl μεγ. 3,4%	
2.8.3.	Ἄλευρον ἀφυδατωμένου τριφυλλίου	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς τεχνητῆς ἀποξηράνσεως νεαρῶν φυτῶν τριφυλλίου Trifolium spp., τῶν ὁποίων τά ἔνζυμα τά ὁποῖα προκαλοῦν τήν ὀξείδωση ἔχουν πρακτικῶς ἐξουδετερωθεῖ διά τῆς ἀποξηράνσεως. Τό προϊόν αὐτό μπορεῖ νά περιέχει περίπου 20% λειμωνίων φυτῶν ἤ μηδικῆς, πού ἔχει ἀποξηρανθεῖ τεχνητῶς συγχρόνως μέ τό τριφύλλι	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Τέφρα — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl — Ἰνώδεις οὐσίες — Καροτίνια — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 18 % Καροτίνια ἐλαχ. 0,01% Ὑγρασία μεγ. 12 % Τέφρα μεγ. 15 % Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl μεγ. 3,4%	
2.8.4.	Ἀφυδατωμένες κορυφές καί φύλλα σακχαροτεύτλων	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς τεχνητῆς ἀποξηράνσεως τῶν κορυφῶν καί τῶν φύλλων σακχαροτεύτλων, ἐκπλυθέντων κατόπιν ἤ ἄνευ τεμαχισμοῦ		— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Ὁλικά σάκχαρα, ἐκφραζόμενα εἰς σακχαρόζη — Ὑγρασία — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl — Ἰνώδεις οὐσίες	Ὑγρασία μεγ. 12 % Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς τό HCl μεγ. 4 %	
2.8.5.	Τεμαχίδια ἤ ἄλευρον τοῦ ἡλιάνθου τοῦ κονδυλορρίζου	Προϊόν προερχόμενο ἀντιστοίχως ἐκ τῆς θραύσεως ἤ τῆς ἀλέσεως καθαρισθέντων καί ἀπεξηρανθέντων κονδύλων τοῦ ἡλιάνθου τοῦ κονδυλορρίζου (Helianthus tuberosus L.)	— Ἰνουλίνη	— Ὑγρασία — Τέφρα — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες — Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	Ἰνουλίνη ἐλαχ. 63 % Ὑγρασία μεγ. 13 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 6,5% Τέφρα μεγ. 4,6%	

1	2	3	4	5	6	7
2.8.6.	Τεμαχίδια ἢ ἄλευρον γλυκοπατάτας	Προϊόν προερχόμενο ἀντιστοίχως ἐκ τῆς θραύσεως ἢ τῆς ἀλέσεως καθαρισθέντων ἢ ἀπεξηρανθέντων κονδύλων τῆς γλυκοπατάτας (Ipomosa batatas (L.) Poir)	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες — Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	Ἄμυλον ἐλαχ. 57,5% Ὑγρασία μεγ. 13 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 6,5% Τέφρα μεγ. 4,6%	
2.8.7.	Ἄλευρον μανιόκας, Τεμάχια ἢ τεμαχίδια μανιόκας, ρίζαι μανιόκας	Ρίζαι μανιόκας αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἀποξηρανθεῖ, ἐκπλυνθεῖ καί, ἐφ' ὅσον εἶναι ἀπαραίτητο, ἀποφλοιωθεῖ, θραυσθεῖ ἢ ἀλεσθεῖ	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες — Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	Ἄμυλον ἐλαχ. 75 % Ὑγρασία μεγ. — Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 4,6% Τέφρα μεγ. 3,5%	
2.8.8.	Ἄλευρον μανιόκας τοῦ τύπου 55	Μή ἀποφλοιωθεῖσες ρίζες μανιόκας, ἐκπλυνθεῖσες, ἀποξηρανθεῖσες καί ἀλεσθεῖσες	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες — Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	Ἄμυλον ἐλαχ. 63 % Ὑγρασία μεγ. 13 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 9 % Τέφρα Τέφρα ἀδιάλυτος μεγ. 6 % εἰς τό HCl μεγ. 3,5%	
2.8.9.	Πούλπα μανιόκας	Ὑπολείμματα προερχόμενα ἐκ τῆς βιομηχανικῆς ἐπεξεργασίας ἀλεύρου μανιόκας, τά ὁποῖα ἀπεξηράνθηκαν καί ἀλέσθηκαν.	— Ἄμυλον	— Ὑγρασία — Τέφρα — Ἰνώδεις οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες — Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	Ἄμυλον ἐλαχ. 57,5% Ὑγρασία μεγ. 13 % Ἰνώδεις οὐσίες μεγ. 12,5% Τέφρα Τέφρα ἀδιάλυτος μεγ. 6 % εἰς τό HCl μεγ. 2,3%	
2.9.	**Ἄλλα προϊόντα φυτικῆς προελεύσεως**					
2.9.1.	Τεμαχισθέντες καρποί ξυλοκερατέας	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τοῦ τεμαχισμοῦ ἀπεξηρανθέντων, κατόπιν ἀφαιρέσεως τῶν πυρήνων, καρπῶν τῆς ξυλοκερατέας (Ceratonia siliqua L.)		— Ὁλικά σάκχαρα, ἐκφραζόμενα ὡς σακχαρόζη — Ὑγρασία — Τέφρα	Ὁλικά σάκχαρα ἐκφραζόμενα ὡς σακχαρόζη ἐλαχ. 35 % Ὑγρασία μεγ. 14 % Τέφρα μεγ. 5 %	

1	2	3	4	5	6	7
2.9.2.	Φυτικά λίπη, φυτικά **ἔλαια**	Προϊόν ἀποτελούμενο ἐξ ὁλοκλήρου ἤ **σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ λιπῶν ἤ ἐλαίων** φυτικῆς προελεύσεως. Κατά τόν ὀργανοληπτικό ἔλεγχο τοῦ προϊόντος δέν πρέπει νά διαπιστωθεῖ τάγγισις		— Ὑγρασία — **Δείκτης ὀξύτητος** — Μή σαπωνοποιούμενο τμῆμα	Δείκτης ὀξύτητος μεγ. 12 % **Μή** σαπωνοποιούμενο τμῆμα ἐκφραζόμενο ἐν σχέσει μέ τό προϊόν, ὡς ἔχει μεγ. 3 %	x
3.	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ					
3.1.	**Προϊόντα γάλακτος**					
3.1.1.	Κόνις ἀποκορυφωμένου γάλακτος διά τῆς μεθόδου τοῦ ψεκασμοῦ (spray), κόνις ἀποβουτυρωμένου γάλακτος hatmaker ἤ roller	Προϊόν προερχόμενον ἐκ τῆς ἀφαιρέσεως ὕδατος πού περιέχεται ἐντός τοῦ ἀποκορυφωμένου γάλακτος εἴτε διά τῆς ἐξατμίσεως ἐντός θερμοῦ ρεύματος ἀέρος (κόνις ἀποβουτυρωμένου γάλακτος spray) εἴτε διά τῆς ξηράνσεως ἐπί κυλίνδρων (κόνις ἀποβουτυρωμένου γάλακτος hatmaker ἤ roller)	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Λακτόζη — Λιπαρές οὐσίες — Τέφρα	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 33,5% Ὑγρασία μεγ. 5 % Τέφρα μεγ. 9 % Λιπαρές οὐσίες μεγ. 1,6%	x
3.1.2.	Κόνις ἀποβουτυρωμένου γάλακτος	Προϊόν προερχόμενο εἴτε διά τῆς ἀφαιρέσεως ὕδατος πού περιέχεται ἐντός τοῦ ἀποβουτυρωμένου γάλακτος εἴτε δι' ἐξατμίσεως διά θερμοῦ στρώματος ἀέρος (κόνις ἀποβουτυρωμένου γάλακτος spray) εἴτε διά τῆς ξηράνσεως ἐπί κυλίνδρων (κόνις ἀποβουτυρωμένου γάλακτος hatmaker ἤ roller)	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες — Λακτόζη	— Ὑγρασία — Τέφρα	Ὑγρασία μεγ. 6 % Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 32 % Τέφρα μεγ. 10,5%	x
3.1.3.	Κόνις τυρογάλακτος, τυρόγαλα εἰς θρόμβους	Προϊόντα παραγόμενα δι' ἀφαιρέσεως ὕδατος πού περιέχεται ἐντός τοῦ τυρογάλακτος. Τό ὀξυνισθέν τυρόγαλα δύναται νά οὐδετεροποιηθεῖ	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Λακτόζη	— Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες — Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα ὡς NaCl — Τέφρα	Λακτόζη ἐλαχ. 60 % Λιπαρές οὐσίες μεγ. 3,3% Ὑγρασία μεγ. 8 % Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα εἰς NaCl μεγ. 4,9%	x
3.1.4.	Κόνις τυρογάλακτος, ἐκ τοῦ ὁποίου ἔχει ἀφαιρεθεῖ ἐν μέρει ἡ λακτόζη	Προϊόν παραγόμενο διά τῆς ἀφαιρέσεως ὕδατος πού περιέχεται ἐντός τοῦ τυρογάλακτος τοῦ ὁποίου ἕνα μέρος τῆς λακτόζης ἔχει ἀφαιρεθεῖ	— Λακτόζη — Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα ὡς NaCl — Τέφρα — Λιπαρές οὐσίες	Λακτόζη ἐλαχ 32,5% Ὑγρασία μεγ 8 % Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα ὡς NaCl μεγ. 6,5% Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 19,5% Τέφρα μεγ. 31,5%	x

1	2	3	4	5	6		7
3.1.5.	Κόνις πρωτεΐνης τυρογάλακτος. Κόνις ἀλβουμίνης γάλακτος	Προϊόντα προερχόμενα ἐκ τῆς ξηράνσεως πρωτεϊνούχων ἑνώσεων, τά ὁποῖα ἐξάγονται ἐκ τοῦ τυρογάλακτος ἤ τοῦ γάλακτος διά χημικῆς ἤ φυσικῆς ἐπεξεργασίας	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὑγρασία Λιπαρές οὐσίες	ἐλαχ. 85% μεγ. 12 % μεγ. 2,3%	x
3.1.6.	Κόνις καζεΐνης γάλακτος	Προϊόν προερχόμενον ἐκ τῆς ξηράνσεως καί κατακρημνίσεως τῆς καζεΐνης τοῦ γάλακτος, διά τῆς χρήσεως ὀξέων ἤ πυτιᾶς	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὑγρασία Λιπαρές οὐσίες	ἐλαχ. 85 % μεγ. 2,3% μεγ. 2,3%	x
3.2.	**Προϊόντα προερχόμενα ἐκ τῆς ἐπεξεργασίας ζώων ξηρᾶς**						
3.2.1.	Αἱματάλευρον	Προϊόν προερχόμενον ἐκ τῆς ξηράνσεως αἵματος σφαγέντων ζώων, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν πτηνῶν. Τό προϊόν αὐτό θά πρέπει οὐσιαστικά νά εἶναι ἀπαλλαγμένο ξένων ὑλῶν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία Τέφρα	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Πρωτεΐνη διαλυτή διά ζυμώσεως Ὑγρασία Τέφρα	ἐλαχ. 89 % ἐλαχ. 80 % μεγ. 10 % μεγ. 5,5%	x
3.2.2.	Ὀστεοκρεατάλευρον	Προϊόν παραγόμενον κατόπιν ξηράνσεως καί ἀλέσεως τεμαχίων κρέατος, τά ὁποῖα περιέχουν μεγάλην ἀναλογίαν ὀστῶν πού προέρχονται ἐκ σφαγέντων θερμοαίμων ζώων ξηρᾶς. Τό προϊόν θά πρέπει οὐσιαστικῶς νά εἶναι ἀπηλλαγμένον τριχῶν, φτερῶν, κεράτων, χηλῶν, δέρματος καί αἵματος, καθώς καί περιεχομένων στομάχου καί ἐντέρων	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα εἰς NaCl — Ὁλικός φωσφόρος — Τέφρα — Μεθειονίνη — Ἄζωτον	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Πρωτεΐνη διαλυτή διά ζυμώσεως Ὁλικός φωσφόρος Ὑγρασία Λιπαρές οὐσίες Χλωριοῦχα, ἐκφραζόμενα εἰς NaCl	ἐλαχ. 50 % ἐλαχ. 43,5% μεγ. 8 % μεγ. 10 % μεγ. 13,5% μεγ. 2,2%	x
3.2.3.	Ὀστεάλευρον	Προϊόν παραγόμενο κατόπιν ξηράνσεως καί ἀλέσεως ὀστῶν, ἀπολιπωθέντων κατά μεγάλο ποσοστό, πού προέρχονται ἐκ σφαγέντων θερμοαίμων ζώων ξηρᾶς. Τό προϊόν θά πρέπει οὐσιαστικῶς νά εἶναι ἀπηλλαγμένον τριχῶν, φτερῶν, κεράτων, χηλῶν, δέρματος καί αἵματος, καθώς καί τῶν περιεχομένων στομάχου καί ἐντέρων. Ἐπίσης, θά πρέπει νά εἶναι ἀπηλλαγμένον αἰχμηρῶν τεμαχίων ὀστῶν καί δέν πρέπει νά περιέχει τεμάχια ὀστῶν μέ ἀνωμάλους ἐπιφανείας ἤ μέ κοφτερά ἄκρα	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Τέφρα — Ὁλικός φωσφόρος — Λιπαρές οὐσίες	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες Ὁλικός φωσφόρος Ὑγρασία Λιπαρές οὐσίες	ἐλαχ. 26,5% ἐλαχ. 9 % μεγ. 10 % μεγ. 5,5%	x

1	2	3	4	5	6		7
3.2.4.	Κρεατάλευρον	Προϊόν παραγόμενο ἐκ τῆς ξηράνσεως καί **ἀλέσεως σφαγίων καί τμημάτων σφαγίων** θερμοαίμων ζώων ξηρᾶς, εἰς δεδομένην περίπτωσιν ἀπολιπωθέντων διά μιᾶς μεθόδου ἐκχυλίσεως. Θά πρέπει οὐσιαστικῶς νά εἶναι ἀπηλλαγμένον τριχῶν, φτερῶν, κεράτων, χηλῶν, δέρματος, καθώς καί τοῦ περιεχομένου τοῦ στομάχου καί τῶν ἐντέρων	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Ὑγρασία — **Ὁλικός φωσφόρος** — Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα εἰς NaCl — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl — Μεθειονίνη — Ἄζωτον	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 61 % **Πρωτεΐνη διαλυτή διά** ζυμώσεως ἐλαχ. 53,5% Ὑγρασία μεγ. 10 % Λιπαρές οὐσίες μεγ. 11 % Ὁλικός φωσφόρος μεγ. 5,5% Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα εἰς NaCl μεγ. 2,2% Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl μεγ. 2,2%	x
3.2.5.	Ὑπόλοιπα τήξεως τοῦ λίπους (Greaves)	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῶν ὑπολειμμάτων παρασκευῆς λίπους καί ἄλλων λιπαρῶν οὐσιῶν ζωικῆς προελεύσεως	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα ὡς NaCl — Λιπαρές οὐσίες — Τέφρα	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 53,5% Ὑγρασία μεγ. 10 % Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα ὡς NaCl μεγ. 2,2%		x
3.2.6.	Ἀπεξηραμμένα ὑπολείμματα σφαγῆς πουλερικῶν. Τά προϊόντα τῶν ὁποίων ἡ περιεκτικότης εἰς λιπαράς οὐσίας ὑπερβαίνει τό 12%, πρέπει νά χαρακτηρίζονται ὡς «πλούσια εἰς λιπαράς οὐσίας»	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς ξηράνσεως καί ἀλέσεως ὑπολειμμάτων σφαγμένων πουλερικῶν. Οὐσιαστικῶς πρέπει νά εἶναι ἀπηλλαγμένο πτερῶν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενη ὡς NaCl — Λιπαρές οὐσίες — Τέφρα	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 61 % Πρωτεΐνη διαλυτή διά ζημώσεως ἐλαχ. 49 % Ὑγρασία μεγ. 10 % Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα ὡς NaCl μεγ. 2,2% Τέφρα ἀδιάλυτη εἰς HCl μεγ. 3,3%		x
3.2.7.	Ὑδρολυθέν πτεράλευρον	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς ὑδρολύσεως, ξηράνσεως καί ἀλέσεως πτερῶν πτηνῶν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες	— Ὑγρασία — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 87 % Πρωτεΐνη διαλυτή διά ζυμώσεως ἐλαχ. 65 % Ὑγρασία μεγ. 11 % Τέφρα ἀδιάλυτη εἰς HCl μεγ. 3,4%		x

1	2	3	4	5	6	7
3.2.8.	Ζωικόν λίπος	Προϊόν ἀποτελούμενο ἐκ λιπῶν, προερχομένων ἐκ θερμοαίμων ζώων ξηρᾶς ἢ τμημάτων αὐτῶν. Κατά τόν ὀργανοληπτικό ἔλεγχο δέν πρέπει νά διαπιστωθεῖ τάγγιση	— Μή σαπωνοποιούμενες ὕλες	— Ὑγρασία — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl — Ὀξειδωμένα λιπαρά ὀξέα — Δείκτης ὀξύτητος	Μή σαπωνοποιούμενες ὕλες, ἐκφραζόμενες ἐν σχέσει μέ τό προϊόν ὡς ἔχει μεγ. 3 % Δείκτης ὀξύτητος μεγ. 30 %	x
3.3.	**Προϊόντα προερχόμενα ἐκ τῆς ἐπεξεργασίας τῶν ἰχθύων ἢ ἄλλων θαλασσίων ζώων**					
3.3.1.	Ἰχθυάλευρον, τά προϊόντα τῶν ὁποίων ἡ περιεκτικότης εἰς χλωριοῦχα, ἐκπεφρασμένα ὡς NaCl, εἶναι μικροτέρα τοῦ 2%, δύνανται νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «πτωχά εἰς ἅλας»	Προϊόν προερχόμενο ἐκ τῆς ξηράνσεως καί ἀλέσεως διαφόρων εἰδῶν ὁλοκλήρων ἰχθύων ἢ τμημάτων αὐτῶν	— Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες — Λιπαρές οὐσίες	— Ὑγρασία — Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα ὡς NaCl — Ἀνθρακικόν ἀσβέστιον — Ὁλικός φωσφόρος	Ὁλικές ἀζωτοῦχες οὐσίες ἐλαχ. 61 % Πρωτεΐνη διαλυτή διά ζυμώσεως ἐλαχ. 53,5% Ὑγρασία Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα μεγ. 10 % ὡς NaCl μεγ. 4,4% Ἀνθρακικόν ἀσβέστιον μεγ. 2,8% Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl μεγ. 2,2%	x
3.3.2.	Ἔλαιον ἥπατος ὀνίσκου (βακαλάου)	Ἔλαιον προερχόμενο ἐκ νωποῦ ὑπατος ἰχθύων τῆς οἰκογενείας τῶν βακαλάων (Gadidae). Κατά τόν ὀργανοληπτικό ἔλεγχο τοῦ ἐλαίου ἥπατος ὀνίσκου δέν πρέπει νά διαπιστωθεῖ τάγγιση	— Βιταμίνη A	— Ὑγρασία — Δείκτης ὀξύτητος — Ἀδιάλυτα εἰς τόν αἰθέρα — Μή σαπωνοποιούμενες ὕλες	Βιταμίνη A(1) ἐλαχ. 750 Δ.Μ./γραμ. Ὑγρασία μεγ. 0,15% Ἀδιάλυτα εἰς τόν αἰθέρα(1) μεγ. 0,5% Μή σαπωνοποιούμενες ὕλες(1) μεγ. 2 % Δείκτης σαπωνοποιήσεως 180/196 Δείκτης ἰωδίου 150/180 Δείκτης ὀξύτητος μεγ. 6 %	x
4.	ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΟΥΣΙΑΙ					
4.1.	Ἀνθρακικόν ἀσβέστιον Ἡ φύσις τοῦ προϊόντος (στήλη 3) θά πρέπει νά ἐμφαίνεται εἰς τήν ὀνομασίαν	Ἀνθρακικόν ἀσβέστιον ἐκ κατακρημνίσεως, ἀλεσμένη μαρμαρόσκονη, κοκκώδης κιμωλία, ἀλεσμένα ὄστρακα στρειδιῶν ἢ μυδιῶν	Ἀσβέστιον Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl		Ἀσβέστιον ἐλαχ. 36 % Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl μεγ. 5 %	x

(1) Περιεκτικότης ἐκφραζομένη σέ σχέση μέ τήν οὐσία

1	2	3	4	5	6		7
4.2.	Ἀνθρακικόν ἀσβέστιον καί μαγνήσιον	Φυσικόν μίγμα ἀνθρακικοῦ ἀσβεστίου καί ἀνθρακικοῦ μαγνησίου	— Ἀσβέστιον — Μαγνήσιον		Ἀσβέστιον Μαγνήσιον Ποσότητα διερχομένη τελείως ἀπό κόσκινον, τοῦ ὁποίου οἱ ὀπές τοῦ δικτυωτοῦ ἔχουν διάμετρο 0,25 χιλιοστομ. Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl	ἐλαχ. 19 % ἐλαχ. 11 % ἐλαχ. 99,5% μεγ. 2 %	x
4.3.	Ἀσβεστοῦχα φύκη θαλάσσης (Maerl)	Προϊόντα φυσικῆς προελεύσεως προερχόμενα ἐξ ἀσβεστούχων φυκῶν, ἀλεσμένα ἤ μεταποιημένα εἰς κόκκους	— Ἀσβέστιον — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl		Ἀσβέστιον Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl	ἐλάχ. 33 - % μεγ. 5 %	x
4.4.	Ὀξείδιον τοῦ μαγνησίου	Τεχνικῶς καθαρόν ὀξείδιον τοῦ μαγνησίου (MgO)	— Μαγνήσιον		Μαγνήσιον	ἐλαχ. 50 %	x
4.5.	Κιζερίτης	Φυσικόν θειικόν μαγνήσιον, $MgSO_4H_2O$	— Μαγνήσιον		Μαγνήσιον	ἐλαχ. 15 %	x
4.6.	Φωσφορικόν διασβέστιον. Ἡ μέθοδος παρασκευῆς δύναται νά ἐμφαίνεται εἰς τήν ὀνομασίαν	Τεχνικῶς καθαρόν φωσφορικόν διασβέστιον	— Ὁλικός φωσφόρος — Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα ὡς NaCl	— Ἀσβέστιον	Ὁλικός φωσφόρος Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα ὡς NaCl	ἐλαχ. 16 % μεγ. 1 %	x
4.7.	Φυσικά φωσφορικά ἅλατα. Τά προϊόντα τῶν ὁποίων ἡ περιεκτικότης εἰς φθόριον δέν εἶναι ἀνωτέρα τοῦ 0,1% δύνανται νά χαρακτιρίζονται ὡς «μή φθοριοῦχα»	Προϊόν προερχόμενον ἐκ τῆς ἁλέσεως φυσικῶν φωσφορικῶν ὀρυκτῶν, τά ὁποῖα ἐνδεχομένως ἔχουν καθαρισθεῖ καί τά ὁποῖα ἔχουν ἀποφθοριωθεῖ σέ μεγαλύτερο ἤ μικρότερο βαθμό	— Ὁλικός φωσφόρος	—Ἀσβέστιον	Ὁλικός φωσφόρος	ἐλαχ. 14, %	x
4.8.	Ἀποζελατινοποιηθέν ὀστεάλευρον	Ἀπολιπωθέντα, ἀποζελατινοποιηθέντα, ἀποστειρωθέντα καί ἁλεσθέντα ὀστά	— Ὁλικός φωσφόρος — Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl	— Ὑγρασία — Ἀσβέστιον	Ὁλικός φωσφόρος Ὑγρασία Τέφρα ἀδιάλυτος εἰς HCl Ποσότης διερχομένη ἀπό κόσκινον τοῦ ὁποίου οἱ ὀπές τοῦ δικτυωτοῦ ἔχουν διάμετρο 1 χιλιοστόμ. Ἄζωτον	ἐλαχ. 14,5% μεγ. 10 % μεγ. 3,3% ἐλαχ. 90 % μεγ. 1,7%	x
4.9.	Φωσφορικόν μονοασβέστιον	Προϊόν ἀποτελούμενο ἐκ τεχνικῶς καθαροῦ φωσφορικοῦ μονασβεστίου	— Ὁλικός φωσφόρος	— Ἀσβέστιον	Ὁλικός φωσφόρος Ἀσβέστιον Χλωριοῦχα ἐκφραζόμενα ὡς NaCl	ἐλαχ. 22 % ἐλαχ. 16 % μεγ. 1 %	x