Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 574/2011 z dne 16. junija 2011 o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za nitrit, melamin, *Ambrosio* spp. ter prenosa nekaterih kokcidiostatikov ali sredstev proti histomonijazi in o konsolidaciji prilog I in II k Direktivi

(Uradni list Evropske unije L 159 z dne 17. junija 2011)

Na strani 9 se Priloga nadomesti z naslednjim:

„*PRILOGA*

Prilogi I in II k Direktivi 2002/32/ES se nadomestita z naslednjim:

‚*PRILOGA I*

MEJNE VREDNOSTI NEZAŽELENIH SNOVI IZ ČLENA 3(2)

ODDELEK I: ANORGANSKI ONESNAŽEVALCI IN DUŠIKOVE SPOJINE

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
1. Arzen ([1])	Posamična krmila,	2
	razen:	
	— moke, pridobljene iz trave, posušene lucerne in posušene detelje ter posušenih pesnih rezancev in posušenih melasiranih pesnih rezancev,	4
	— luščine palmovih jeder,	4 ([2])
	— fosfatov in apnenčastih morskih alg,	10
	— kalcijevega karbonata,	15
	— magnezijevega oksida in magnezijevega karbonata,	20
	— rib, drugih vodnih živali in proizvodov iz njih,	25 ([2])
	— moke iz morske trave in posamičnih krmil, pridobljenih iz morske trave.	40 ([2])
	Železovi delci, ki se uporabljajo kot sledivo.	50
	Krmni dodatki iz funkcionalnih skupin spojin elementov v sledovih,	30
	razen:	
	— bakrovega sulfata pentahidrata in bakrovega karbonata,	50
	— cinkovega oksida, manganovega oksida in bakrovega oksida.	100
	Dopolnilna krmna mešanica,	4
	razen:	
	— mineralne krme.	12
	Popolna krmna mešanica,	2
	razen:	
	— popolne krmne mešanice za ribe in popolne krmne mešanice za kožuharje.	10 ([2])
2. Kadmij	Posamična krmila rastlinskega izvora.	1
	Posamična krmila živalskega izvora.	2
	Posamična krmila mineralnega izvora,	2
	razen:	
	— fosfatov.	10
	Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino spojin elementov v sledovih,	10
	razen:	
	— bakrovega oksida, manganovega oksida, cinkovega oksida in manganovega sulfata monohidrata.	30

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
	Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalne skupine vezalcev in sredstev proti strjevanju.	2
	Premiksi ([6]).	15
	Dopolnilna krmna mešanica,	0,5
	razen:	
	— mineralne krmne mešanice,	
	– – ki vsebuje < 7 % fosforja ([8]),	5
	– – ki vsebujejo ≥ 7 % fosforja ([8]),	0,75 na 1 % fosforja ([8]), vendar največ 7,5
	— dopolnilne krmne mešanice za hišne živali.	2
	Popolna krmna mešanica,	0,5
	razen:	
	— popolne krmne mešanice za govedo (razen telet), ovce (razen jagnjet), koze (razen kozličkov) in ribe;	1
	— popolne krmne mešanice za hišne živali.	2
3. Fluor ([7])	Posamična krmila,	150
	razen:	
	— posamičnih krmil živalskega izvora, razen morskih rakov, kot je morski kril,	500
	— morskih rakov, kot je morski kril,	3 000
	— fosfatov,	2 000
	— kalcijevega karbonata,	350
	— magnezijevega oksida,	600
	— apnenčastih morskih alg.	1 000
	Vermikulit (E 561).	3 000
	Dopolnilna krmna mešanica,	
	— ki vsebuje ≤ 4 % fosforja ([8]),	500
	— ki vsebuje > 4 % fosforja ([8]).	125 na 1 % fosforja ([8])
	Popolna krmna mešanica,	150
	razen:	
	— popolnih krmnih mešanic za prašiče,	100
	— popolnih krmnih mešanic za perutnino (razen piščancev) in ribe,	350

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
	— popolnih krmnih mešanic za piščance,	250
	— popolnih krmnih mešanic za govedo, ovce in koze	
	– – v laktaciji,	30
	– – drugo.	50
4. Svinec	Posamična krmila,	10
	razen:	
	— živinske krme ([3]),	30
	— fosfatov in apnenčastih morskih alg,	15
	— kalcijevega karbonata,	20
	— kvasa.	5
	Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino spojin elementov v sledovih,	100
	razen:	
	— cinkovega oksida,	400
	— manganovega oksida, železovega karbonata, bakrovega karbonata.	200
	Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino vezalcev in sredstev proti strjevanju,	30
	razen:	
	— klinoptilolita vulkanskega izvora.	60
	Premiksi ([6]).	200
	Dopolnilna krmna mešanica,	10
	razen:	
	— mineralnih krmnih mešanic.	15
	Popolne krmne mešanice.	5
5. Živo srebro ([4])	Posamična krmila,	0,1
	razen:	
	— rib, drugih vodnih živali ali proizvodov iz njih,	0,5
	— kalcijevega karbonata.	0,3
	Krmne mešanice,	0,1
	razen:	
	— mineralnih krmnih mešanic,	0,2
	— krmnih mešanic za ribe,	0,2
	— krmnih mešanic za pse, mačke in kožuharje.	0,3

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
6. Nitrit ([5])	Posamična krmila,	15
	razen:	
	— ribje moke,	30
	— silaže,	—
	— proizvodov in stranskih proizvodov iz sladkorne pese in sladkornega trsa ter iz proizvodnje škroba.	—
	Popolne krmne mešanice,	15
	razen:	
	— popolnih krmnih mešanic za pse in mačke z vsebnostjo vlage, ki presega 20 %.	—
7. Melamin ([9])	Krma,	2,5
	razen krmnih dodatkov:	
	— gvanidin ocetne kisline,	—
	— sečnine,	—
	— biureta.	—

([1]) Mejne vrednosti se nanašajo na skupni arzen.
([2]) Na zahtevo pristojnih organov mora odgovorni izvajalec izvesti analizo, s katero dokaže, da je vsebnost anorganskega arzena nižja od 2 ppm. Ta analiza je še zlasti pomembna pri vrsti morske alge *Hizikia fusiforme*.
([3]) Živinska krma vključuje proizvode, namenjene za živalsko krmo, kot so seno, silaža, sveža trava itn.
([4]) Mejne vrednosti se nanašajo na skupno živo srebro.
([5]) Mejne vrednosti so izražene kot natrijev nitrit.
([6]) Najvišja mejna vrednost, določena za premikse, upošteva dodatke z najvišjimi vrednostmi svinca in kadmija, ne pa dovzetnosti različnih živalskih vrst za svinec in kadmij. Kot določa člen 16 Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, str. 29), mora proizvajalec premiksov zaradi varstva zdravja živali in ljudi zagotoviti, da so, poleg skladnosti z najvišjimi mejnimi vrednostmi za premikse, navodila za uporabo premiksa v skladu z najvišjimi mejnimi vrednostmi za dopolnilno in popolno krmo.
([7]) Najvišje vsebnosti se nanašajo na analitično določitev fluora, pri čemer se ekstrakcija izvaja s klorovodikovo kislino 1 N 20 minut pri sobni temperaturi. Uporabijo se lahko enakovredni postopki ekstrakcije, če se lahko dokaže, da ima uporabljeni postopek ekstrakcije enakovredni učinek ekstrakcije.
([8]) Odstotek fosforja je relativen glede na krmo z 12-odstotno vsebnostjo vlage.
([9]) Mejne vrednosti se nanašajo samo na melamin. Vključitev strukturno povezanih spojin cianurinske kisline, amelina in amelida v mejne vrednosti bo obravnavana pozneje.

ODDELEK II: MIKOTOKSINI

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
1. Aflatoksin B_1	Posamična krmila.	0,02
	Dopolnilne in popolne krmne mešanice,	0,01
	razen:	
	— krmnih mešanic za molzno govedo in teleta, ovce molznice in jagnjeta, koze molznice in kozličke, pujske in mlado perutnino,	0,005

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
	— krmnih mešanic za govedo (razen za molzno govedo in teleta), ovce (razen ovc molznic in jagnjet), koze (razen koz molznic in kozličkov), prašiče (razen pujskov) in perutnino (razen mladih živali).	0,02
2. Rženi rožiček (*Claviceps purpurea*)	Posamična krmila in krmne mešanice, ki vsebujejo nezmleta žita.	1 000

ODDELEK III: VSEBOVANI RASTLINSKI TOKSINI

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
1. Prosti gosipol	Posamična krmila,	20
	razen:	
	— semen bombaževca,	5 000
	— pogač bombaževca in moke iz semen bombaževca.	1 200
	Popolne krme mešanice,	20
	razen:	
	— popolnih krmnih mešanic za govedo (razen telet),	500
	— popolnih krmnih mešanic za ovce (razen jagnjet) in koze (razen kozličkov),	300
	— popolnih krmnih mešanic za perutnino (razen kokoši nesnic) in teleta,	100
	— popolnih krmnih mešanic za kunce, jagnjeta, kozličke in prašiče (razen pujskov).	60
2. Cianovodikova kislina	Posamična krmila,	50
	razen:	
	— lanenega semena,	250
	— pogač iz lanenega semena,	350
	— proizvodov iz manioke in mandljevih pogač.	100
	Popolne krmne mešanice,	50
	razen:	
	— popolnih krmnih mešanic za mlade piščance (< 6 tednov).	10
3. Teobromin	Popolne krmne mešanice,	300
	razen:	
	— popolnih krmnih mešanic za prašiče,	200
	— popolnih krmnih mešanic za pse, kunce, konje in kožuharje.	50

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
4. Viniltiooksazolidon (5-viniloksazolidin-2-tion)	Popolne krmne mešanice za perutnino,	1 000
	razen:	
	— popolnih krmnih mešanic za kokoši nesnice.	500
5. Eterično gorčično olje ([1])	Posamična krmila,	100
	razen:	
	— tropin ogrščice.	4 000
	Popolne krmne mešanice,	150
	razen:	
	— popolnih krmnih mešanic za govedo (razen telet), ovce (razen jagnjet) in koze (razen kozličkov),	1 000
	— popolnih krmnih mešanic za prašiče (razen pujskov) in perutnino.	500

([1]) Mejne vrednosti so izražene kot alil izotiocianat.

ODDELEK IV: ORGANSKE KLOROVE SPOJINE (RAZEN DIOKSINOV IN PCB)

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
1. Aldrin ([1])	Posamična krmila in krmne mešanice,	0,01 ([2])
2. Dieldrin ([1])	razen:	
	— maščob in olj,	0,1 ([2])
	— krmnih mešanic za ribe.	0,02 ([2])
3. Kamfeklor (toksafen) – vsota indikatorjev, kemično sorodnih spojin CHB 26, 50 in 62 ([3])	Ribe, druge vodne živali in proizvodi iz njih,	0,02
	razen:	
	— ribjega olja.	0,2
	Popolna krma za ribe.	0,05
4. Klordan (vsota cis- in transizomerov ter oksiklordana, izražena kot klordan)	Posamična krmila in krmne mešanice,	0,02
	razen:	
	— maščob in olj.	0,05
5. DDT (vsota DDT-, DDD- (ali TDE-) in DDE-izomerov, izražena kot DDT)	Posamična krmila in krmne mešanice,	0,05
	razen:	
	— maščob in olj.	0,5

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
6. Endosulfan (vsota alfa in beta izomerov in endosulfansulfata, izražena kot endosulfan)	Posamična krmila in krmne mešanice,	0,1
	razen:	
	— koruze in koruznih proizvodov, ki nastanejo pri njihovi predelavi,	0,2
	— oljnic in proizvodov, ki nastanejo pri njihovi predelavi, razen surovega rastlinskega olja,	0,5
	— surovega rastlinskega olja,	1,0
	— popolnih krmnih mešanic za ribe.	0,005
7. Endrin (vsota endrina in delta-ketoiendrina, izražena kot endrin)	Posamična krmila in krmne mešanice,	0,01
	razen:	
	— maščob in olj.	0,05
8. Heptaklor (vsota heptaklora in heptaklorepoksida, izražena kot heptaklor)	Posamična krmila in krmne mešanice,	0,01
	razen:	
	— maščob in olj.	0,2
9. Heksaklorobenzen (HCB)	Posamična krmila in krmne mešanice,	0,01
	razen:	
	— maščob in olj.	0,2
10. Heksaklorociklo-heksan (HCH)		
— alfa-izomeri	Posamična krmila in krmne mešanice,	0,02
	razen:	
	— maščob in olj.	0,2
— beta-izomeri	Posamična krmila,	0,01
	razen:	
	— maščob in olj.	0,1
	Krmne mešanice,	0,01
	razen:	
	— krmnih mešanic za molzno govedo.	0,005
— gama-izomeri	Posamična krmila in krmne mešanice,	0,2
	razen:	
	— maščob in olj.	2,0

(1) Samostojen ali v kombinaciji, izražen kot dieldrin.
(2) Najvišja dovoljena količina za aldrin in dieldrin, samostojen ali v kombinaciji, izraženi kot dieldrin.
(3) Sistem številčenja Parlar s predpono CHB ali ‚Parlar':
CHB 26: 2-endo,3-ekso,5-endo, 6-ekso, 8,8,10,10-oktoklorobornan,
CHB 50: 2-endo,3-ekso,5-endo, 6-ekso, 8,8,9,10,10-nonaklorobornan,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaklorobornan.

ODDELEK V: DIOKSINI IN PCB

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v ng WHO-PCDD/F-TEKV/kg (ppt) [1], [2] pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
1. Dioksini (vsota polikloriranih dibenzo-*para*-dioksinov (PCDD) in polikloriranih dibenzofuranov (PCDF)), izraženi v toksičnih ekvivalentih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z uporabo WHO-TEF (dejavniki ekvivalence toksičnosti, 1997 [4])	Posamična krmila rastlinskega izvora,	0,75
	razen:	
	— rastlinskih olj in njihovih stranski proizvodov.	0,75
	Posamična krmila mineralnega izvora	1,0
	Posamična krmila živalskega izvora:	
	— živalska maščoba, vključno z mlečno maščobo in jajčno maščobo,	2,0
	— drugi proizvodi kopenskih živali, vključno z mlekom in mlečnimi proizvodi ter jajci in jajčnimi proizvodi,	0,75
	— ribje olje,	6,0
	— ribe, druge vodne živali in njihovi proizvodi, razen ribjega olja in ribjih beljakovinskih hidrolizatov, ki vsebujejo več kot 20 % maščobe [3],	1,25
	— ribji beljakovinski hidrolizati, ki vsebujejo več kot 20 % maščobe.	2,25
	Krmni dodatki kaolinitne gline, kalcijevega sulfata dihidrata, vermikulita, natrolit fonolita, sintetičnih kalcijevih aluminatov in klinoptilolita usedlinskega izvora iz funkcionalnih skupin vezalcev in sredstev proti strjevanju.	0,75
	Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino spojin elementov v sledovih.	1,0
	Premiksi.	1,0
	Krmne mešanice,	0,75
	razen:	
	— krmnih mešanic za hišne živali in ribe,	2,25
	— krmnih mešanic za kožuharje.	—
2. Vsota dioksinov in dioksinom podobnih PCB (vsota polikloriranih dibenzo-para-dioksinov (PCDD), polikloriranih dibenzofuranov (PCDF) in polikloriranih bifenilov (PCB)), izražena v toksičnih ekvivalentih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z uporabo WHO-TEF (dejavnik ekvivalence toksičnosti, 1997 [4])	Posamična krmila rastlinskega izvora,	1,25
	razen:	
	— rastlinskih olj in njihovih stranski proizvodov.	1,5
	Posamična krmila mineralnega izvora.	1,5
	Posamična krmila živalskega izvora:	
	— živalska maščoba, vključno z mlečno maščobo in jajčno maščobo,	3,0
	— drugi proizvodi kopenskih živali, vključno z mlekom in mlečnimi proizvodi ter jajci in jajčnimi proizvodi,	1,25
	— ribje olje,	24,0
	— ribe, druge vodne živali in njihovi proizvodi, razen ribjega olja in ribjih beljakovinskih hidrolizatov, ki vsebujejo več kot 20 % maščobe [3],	4,5
	— ribji beljakovinski hidrolizati, ki vsebujejo več kot 20 % maščobe.	11,0

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v ng WHO-PCDD/F-TEKV/kg (ppt) (1), (2) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
	Krmni dodatki kaolinitne gline, kalcijevega sulfata dihidrata, vermikulita, natrolit fonolita, sintetičnih kalcijevih aluminatov in klinoptilolita usedlinskega izvora iz funkcionalnih skupin vezalcev in sredstev proti strjevanju.	1,5
	Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino spojin elementov v sledovih.	1,5
	Premiksi	1,5
	Krmne mešanice,	1,5
	razen:	
	— krmnih mešanic za hišne živali in ribe,	7,0
	— krmnih mešanic za kožuharje.	—

(1) Zgornje koncentracije; zgornje koncentracije so izračunane ob predpostavki, da so vse vrednosti različnih pripadnikov iste vrste pod mejo določanja enake meji določanja.

(2) Ločene mejne vrednosti za dioksine (PCDD/F) se začasno še naprej uporabljajo. Proizvodi, namenjeni za živalsko krmo iz točke 1, morajo biti v navedenem začasnem obdobju v skladu z mejnimi vrednostmi za dioksine ter mejnimi vrednostmi za vsoto dioksinov in dioksinom podobnih PCB.

(3) Sveže ribe in druge vodne živali, neposredno dostavljene in porabljene brez vmesne predelave za proizvodnjo krme za kožuharje, so izvzete iz mejnih vrednosti, medtem ko se mejne vrednosti 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEKV/kg proizvoda in 0,8 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEKV/kg proizvoda uporabljajo za sveže ribe, 25,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEKV/kg proizvoda pa za ribja jetra, ki se uporabljajo za neposredno prehrano hišnih živali ter živali v živalskih vrtovih in cirkusih oziroma za posamično krmilo za proizvodnjo hrane za hišne živali. Proizvodi ali predelani živalski proteini, proizvedeni iz teh živali (kožuharji, hišne živali ter živali v živalskih vrtovih in cirkusih), ne morejo vstopati v prehransko verigo in jih je prepovedano krmiti rejnim živalim, ki se gojijo, vzrejajo ali razmnožujejo za proizvodnjo hrane.

(4) WHO-TEF za oceno nevarnosti za zdravje ljudi na podlagi sklepov zasedanja Svetovne zdravstvene organizacije v Stockholmu na Švedskem, 15.–18. junija 1997 (Van den Berg et al., (1998) *Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives*, 106(12), 775).

Pripadnik iste vrste	Vrednost dejavnika ekvivalence toksičnosti (TEF)	Pripadnik iste vrste	Vrednost dejavnika ekvivalence toksičnosti (TEF)
Dibenzo-p-dioksini (‚PCDD') in dibenzofurani (‚PCDF')		**‚Dioksinom podobni' ne-orto PCB + mono-orto PCB**	
2,3,7,8 - TCDD	1		
1,2,3,7,8-PeCDD	1	**Ne-orto PCB**	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 126	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 169	0,01
OCDD	0,0001	**Mono-orto PCB**	
2,3,7,8-TCDF	0,1	PCB 105	0,0001
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	PCB 114	0,0005
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5	PCB 118	0,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 123	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 157	0,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 167	0,00001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 189	0,0001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0001		

Uporabljene okrajšave: ‚T' = tetra; ‚Pe' = penta; ‚Hx' = heksa; ‚Hp' = hepta; ‚O' = okta; ‚CDD' = klorodibenzodioksin; ‚CDF' = klorodibenzofuran; ‚CB' = klorobifenil.

ODDELEK VI: ŠKODLJIVE BOTANIČNE NEČISTOČE

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
1. Semena plevela ter nezmleto in nezdrobljeno sadje, ki vsebuje alkaloide, glukozide ali druge strupene snovi, ločeno ali v kombinaciji, ki vsebuje:	Posamična krmila in krmne mešanice.	3 000
— *Datura* sp.		1 000
2. *Crotalaria* spp.	Posamična krmila in krmne mešanice.	100
3. Semena in lupine *Ricinus communis* L., *Croton tiglium* L. in *Abrus precatorius* L. ter proizvodi, ki izhajajo iz njihove predelave (1), ločeno ali v kombinaciji	Posamična krmila in krmne mešanice.	10 (2)
4. Neoluščen bukov žir – *Fagus silvatica* L. 5. Barbadoški orehi – *Jatropha curcas* L. 6. Indijska gorčica – *Brassica juncea* (L.) Czern. in Coss. ssp. *integrifolia* (West.) Thell. 7. Sareptska gorčica – *Brassica juncea* (L.) Czern. in Coss. ssp. *juncea* 8. Kitajska gorčica – *Brassica juncea* (L.) Czern. in Coss. ssp. *juncea* var. *lutea* Batalin 9. Črna ogrščica – *Brassica nigra* (L.) Koch 10. Etiopska gorčica – *Brassica carinata* A. Braun	Posamična krmila in krmne mešanice.	Semena in sadeži rastlinskih vrst, navedenih nasproti, ter proizvodi iz njihove predelave so lahko v krmi prisotni samo v sledovih, ki jih ni mogoče količinsko določiti.
11. Semena *Ambrosia spp*.	Posamična krmila,	50
	razen:	
	— prosa (zrnje *Panicum miliaceum* L.) in sorge (zrnje *Sorghum bicolor* (L) Moench s.l.), ki se ne dajejo neposredno živalim.	200
	Krmne mešanice, ki vsebujejo nezmleta žitna zrna in semena.	50

(1) Če je določljivo z analitično mikroskopijo.
(2) Vključuje tudi ostanke ovojev semen.

ODDELEK VII: DOVOLJENI KRMNI DODATKI V NECILJNI KRMI PO NEIZOGIBNEM PRENOSU

Kokcidiostatik	Proizvodi, namenjeni za prehrano živali (1)	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
1. Dekokvinat	Posamična krmila.	0,4
	Krmna mešanica za:	
	— nesnice in piščance za nesnice (> 16 tednov),	0,4
	— pitovne piščance v obdobju pred zakolom, ko je uporaba dekokvinata prepovedana (krma v karenci),	0,4

Kokcidiostatik	Proizvodi, namenjeni za prehrano živali [1]	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
	— druge živalske vrste.	1,2
	Premiksi, ki se uporabljajo v krmi, pri kateri uporaba dekokvinata ni dovoljena.	[2]
2. Diklazuril	Posamična krmila.	0,01
	Krmna mešanica za:	
	— nesnice, piščance za nesnice (> 16 tednov) in purane za pitanje (> 12 tednov),	0,01
	— pitovne in plemenske kunce v obdobju pred zakolom, ko je uporaba diklazurila prepovedana (krma v karenci),	0,01
	— druge živalske vrste, razen za piščance za nesnice (< 16 tednov), pitovne piščance, pitovne pegatke in purane (< 12 tednov).	0,03
	Premiksi, ki se uporabljajo v krmi, pri kateri uporaba diklazurila ni dovoljena.	[2]
3. Halofuginon hidrobromid	Posamična krmila.	0,03
	Krmna mešanica za:	
	— nesnice, piščance za nesnice in purane (> 12 tednov),	0,03
	— pitovne piščance in purane (< 12 tednov) v obdobju pred zakolom, ko je uporaba halofuginon hidrobromida prepovedana (krma v karenci),	0,03
	— druge živalske vrste.	0,09
	Premiksi, ki se uporabljajo v krmi, pri kateri uporaba halofuginon hidrobromida ni dovoljena.	[2]
4. Lasalocid natrij	Posamična krmila.	1,25
	Krmna mešanica za:	
	— pse, teleta, kunce, enoprste kopitarje, molznice, nesnice, purane (> 16 tednov) in piščance za nesnice (> 16 tednov),	1,25
	— pitovne piščance, piščance za nesnice (< 16 tednov) in purane (< 16 tednov) v obdobju pred zakolom, ko je uporaba lasalocid natrija prepovedana (krma v karenci),	1,25
	— druge živalske vrste.	3,75
	Premiksi, ki se uporabljajo v krmi, pri kateri uporaba lasalocid natrija ni dovoljena.	[2]
5. Alfa amonijev maduramicin	Posamična krmila.	0,05

Kokcidiostatik	Proizvodi, namenjeni za prehrano živali (1)	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
	Krmna mešanica za:	
	— enoprste kopitarje, kunce, purane (> 16 tednov), nesnice in piščance za nesnice (> 16 tednov),	0,05
	— pitovne piščance in purane (< 16 tednov) v obdobju pred zakolom, ko je uporaba alfa amonijevega maduramicina prepovedana (krma v karenci),	0,05
	— druge živalske vrste.	0,15
	Premiksi, ki se uporabljajo v krmi, pri kateri uporaba alfa amonijevega maduramicina ni dovoljena.	(2)
6. Natrijev monenzin	Posamična krmila.	1,25
	Krmna mešanica za:	
	— enoprste kopitarje, pse, drobnico (ovce in koze), race, govedo, krave molznice, nesnice, piščance za nesnice (> 16 tednov) in purane (> 16 tednov),	1,25
	— pitovne piščance, piščance za nesnice (< 16 tednov) in purane (< 16 tednov) v obdobju pred zakolom, ko je uporaba natrijevega monenzina prepovedana (krma v karenci),	1,25
	— druge živalske vrste.	3,75
	Premiksi, ki se uporabljajo v krmi, pri kateri uporaba natrijevega monenzina ni dovoljena.	(2)
7. Narazin	Posamična krmila.	0,7
	Krmna mešanica za:	
	— purane, kunce, enoprste kopitarje, nesnice in piščance za nesnice (> 16 tednov),	0,7
	— druge živalske vrste.	2,1
	Premiksi, ki se uporabljajo v krmi, pri kateri uporaba narazina ni dovoljena.	(2)
8. Nikarbazin	Posamična krmila.	1,25
	Krmna mešanica za:	
	— enoprste kopitarje, nesnice in piščance za nesnice (> 16 tednov),	1,25
	— druge živalske vrste.	3,75

Kokcidiostatik	Proizvodi, namenjeni za prehrano živali [1]	Najvišja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage
	Premiksi, ki se uporabljajo v krmi, pri kateri uporaba nikarbazina (samega ali v kombinaciji z narazinom) ni dovoljena.	[2]
9. Robenidin hidroklorid	Posamična krmila.	0,7
	Krmna mešanica za:	
	— nesnice in piščance za nesnice (> 16 tednov),	0,7
	— pitovne piščance, pitovne in plemenske kunce ter purane v obdobju pred zakolom, ko je uporaba robenidin hidroklorida prepovedana (krma v karenci),	0,7
	— druge živalske vrste.	2,1
	Premiksi, ki se uporabljajo v krmi, pri kateri uporaba robenidin hidroklorida ni dovoljena.	[2]
10. Natrijev salinomicin	Posamična krmila.	0,7
	Krmna mešanica za:	
	— enoprste kopitarje, purane, nesnice in piščance za nesnice (> 12 tednov),	0,7
	— pitovne piščance, piščance za nesnice (< 12 tednov) in kunce za pitanje v obdobju pred zakolom, ko je uporaba natrijevega salinomicina prepovedana (krma v karenci),	0,7
	— druge živalske vrste.	2,1
	Premiksi, ki se uporabljajo v krmi, pri kateri uporaba natrijevega salinomicina ni dovoljena.	[2]
11. Natrijev semduramicin	Posamična krmila.	0,25
	Krmna mešanica za:	
	— nesnice in piščance za nesnice (> 16 tednov),	0,25
	— pitovne piščance v obdobju pred zakolom, ko je uporaba natrijevega semduramicina prepovedana (krma v karenci),	0,25
	— druge živalske vrste.	0,75
	Premiksi, ki se uporabljajo v krmi, pri kateri uporaba natrijevega semduramicina ni dovoljena.	[2]

[1] Brez poseganja v dovoljene vrednosti v okviru Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 268, 18.10.2003, str. 29).

[2] Mejna vrednost snovi v premiksu je koncentracija, ki ne presega 50 % mejne vrednosti snovi v krmi, ki se ugotovi ob upoštevanju navodil za uporabo premiksa.

PRILOGA II

PRAGOVI UKREPANJA, KI SPROŽIJO PREISKAVE DRŽAV ČLANIC, KOT JE NAVEDENO V ČLENU 4(2)

ODDELEK: DIOKSINI IN PCB

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Prag ukrepanja v ng WHO-PCDD/F-TEKV/kg (ppt) [2], [3] pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage	Pripombe in dodatni podatki (npr. vrsta preiskav, ki jih je treba opraviti)
1. Dioksini (vsota polikloriranih dibenzo-*para*-dioksinov (PCDD) in polikloriranih dibenzofuranov (PCDF)), izraženi v ekvivalenci toksičnosti Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z uporabo WHO-TEF (dejavniki ekvivalence toksičnosti, 1997 [1])	Posamična krmila rastlinskega izvora,	0,5	[4]
	razen:		
	— rastlinskih olj in njihovih stranskih proizvodov.	0,5	[4]
	Posamična krmila mineralnega izvora.	0,5	[4]
	Posamična krmila živalskega izvora:		
	— živalska maščoba, vključno z mlečno maščobo in jajčno maščobo,	1,0	[4]
	— drugi proizvodi kopenskih živali, vključno z mlekom in mlečnimi proizvodi ter jajci in jajčnimi proizvodi,	0,5	[4]
	— ribje olje,	5,0	[5]
	— ribe, druge vodne živali in njihovi proizvodi in stranski proizvodi, razen ribjega olja in ribjih beljakovinskih hidrolizatov, ki vsebujejo več kot 20 % maščobe [3],	1,0	[5]
	— ribji beljakovinski hidrolizati, ki vsebujejo več kot 20 % maščobe.	1,75	[5]
	Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalne skupine vezalcev in sredstev proti strjevanju.	0,5	[5]
	Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino spojin elementov v sledovih.	0,5	[4]
	Premiksi.	0,5	[4]
	Krmne mešanice,	0,5	[4]
	razen:		

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Prag ukrepanja v ng WHO-PCDD/F-TEKV/kg (ppt) [2], [3] pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage	Pripombe in dodatni podatki (npr. vrsta preiskav, ki jih je treba opraviti)
	— krmnih mešanic za hišne živali in ribe,	1,75	[5]
	— krmnih mešanic za kožuharje.	—	
2. Dioksinom podobni PCB (vsota poliklo-riranih bifenilov (PCB)), izraženi v ekvivalenci toksičnosti Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z uporabo WHO-TEF (dejavniki ekvivalence toksičnosti, 1997 [1])	Posamična krmila rastlinskega izvora,	0,35	[4]
	razen:		
	— rastlinskih olj in njihovih stranskih proizvodov.	0,5	[4]
	Posamična krmila mineralnega izvora.	0,35	[4]
	Posamična krmila živalskega izvora:		
	— živalska maščoba, vključno z mlečno maščobo in jajčno maščobo,	0,75	[4]
	— drugi proizvodi kopenskih živali, vključno z mlekom in mlečnimi proizvodi ter jajci in jajčnimi proizvodi,	0,35	[4]
	— ribje olje,	14,0	[5]
	— ribe, druge vodne živali in proizvodi iz njih, razen ribjega olja in ribjih beljakovinskih hidrolizatov, ki vsebujejo več kot 20 % maščobe [3],	2,5	[5]
	— ribji beljakovinski hidrolizati, ki vsebujejo več kot 20 % maščobe.	7,0	[5]
	Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalne skupine vezalcev in sredstev proti strjevanju.	0,5	[4]
	Krmni dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino spojin elementov v sledovih.	0,35	[4]
	Premiksi.	0,35	[4]
	Krmne mešanice,	0,5	[4]
	razen:		
	— krmnih mešanic za hišne živali in ribe,	3,5	[5]

Nezaželene snovi	Proizvodi, namenjeni prehrani živali	Prag ukrepanja v ng WHO-PCDD/F-TEKV/kg (ppt) (2), (3) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage	Pripombe in dodatni podatki (npr. vrsta preiskav, ki jih je treba opraviti)
	— krmnih mešanic za kožuharje.	—	

(1) WHO-TEF za oceno nevarnosti za zdravje ljudi na podlagi sklepov zasedanja Svetovne zdravstvene organizacije v Stockholmu na Švedskem, 15.–18. junija 1997 (Van den Berg et al., (1998) *Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives*, 106(12), 775).

(2) Zgornje koncentracije; zgornje koncentracije so izračunane ob predpostavki, da so vse vrednosti različnih pripadnikov iste vrste pod mejo določanja enake meji določanja.

(3) Komisija bo proučila te pragove za ukrepanje hkrati s proučitvijo mejnih vrednosti za vsoto dioksinov in dioksinom podobnih PCB.

(4) Določitev vira kontaminacije. Potem ko je vir določen, se sprejmejo ustrezni ukrepi, kjer je to mogoče, za zmanjšanje ali odpravo vira kontaminacije.

(5) V veliko primerih morda ne bo treba opraviti preiskave vira kontaminacije, ker je raven prisotnosti na nekaterih območjih blizu praga za ukrepanje ali nad njim. Vseeno je treba, če je prag za ukrepanje presežen, zapisati vse informacije, kot so čas vzorčenja, geografsko poreklo, vrste rib itd., glede na prihodnje ukrepe za upravljanje prisotnosti dioksinov in dioksinom podobnih spojin v teh snoveh za prehrano živali.

Pripadnik iste vrste	Vrednost dejavnika ekvivalence toksičnosti (TEF)	Pripadnik iste vrste	Vrednost dejavnika ekvivalence toksičnosti (TEF)
Dibenzo-p-dioksini („PCDD“) in dibenzofurani („PCDF“)		**„Dioksinom podobni“ ne-orto PCB + mono-orto PCB**	
2,3,7,8-TCDD	1		
1,2,3,7,8-PeCDD	1	**Ne-orto PCB**	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 126	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 169	0,01
OCDD	0,0001	**Mono-orto PCB**	
2,3,7,8-TCDF	0,1	PCB 105	0,0001
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	PCB 114	0,0005
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5	PCB 118	0,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 123	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 157	0,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 167	0,00001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 189	0,0001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0001		

Uporabljene okrajšave: ‚T‘ = tetra; ‚Pe‘ = penta; ‚Hx‘ = heksa; ‚Hp‘ = hepta; ‚O‘ = okta; ‚CDD‘ = klorodibenzodioksin; ‚CDF‘ = klorodibenzofuran; ‚CB‘ = klorobifenil.‘ “