Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1811/2005,

4. november 2005,

mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise ajutist ja alalist lubamist ning juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 291, 5.11.2005, lk 12)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1018/2012, 5. november 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1109/2014, 20. oktoober 2014	L 301	19	21.10.2014
►M3	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1145, 8. juuni 2017	L 166	1	29.6.2017
►M4	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/147, 3. veebruar 2020	L 31	7	4.2.2020

Parandatud:

►C1 Parandus, ELT L 10, 14.1.2006, lk 72 (1811/2005)

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1811/2005,

4. november 2005,

mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise ajutist ja alalist lubamist ning juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Ensüümide rühma kuuluvaid I lisas nimetatud preparaate lubatakse tähtajatult kasutada loomasöötades söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Ensüümide rühma kuuluvaid II lisas nimetatud preparaate lubatakse tähtajaga neli aastat kasutada loomasöötades söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 3

Mikroorganismide rühma kuuluvaid käesoleva määruse III lisas nimetatud preparaate lubatakse kasutada loomasöötades tähtajatult söödalisanditena kõnealuses lisas ettenähtud tingimustel.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

I LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Maksimum sisaldus	Miinimum sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsusühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
E 1603	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.6	*Aspergillus aculeatus*'est (CBS 589.94) saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: kaetud kujul: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 50 FBG (1)/g vedelal kujul: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 120 FBG/ml	Põrsad (võõrutatud)	—	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 10 FBG	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik annus ühe kilogrammi täisjõusööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 10–25 FBG 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid) jõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 60 % taimseid koostisaineid (mais, lupiin, nisu, oder, soja, riis, õliraps või herned) 4. Kasutamiseks võõrutatud põrsaste (kaaluga kuni umbes 35 kg) puhul	Tähtajatu
▼M3 ———								

▼B

(1) Üks FBG on ensüümi hulk, mis vabastab ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 30 °C juures.

▼B

II LISA

EÜ nr või nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsusühikuid täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
11	Endo-1,4-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 74 252) toodetud endo-1,4-beeta-glükanaasi, endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: vedelal kujul ja graanulitena: Endo-1,4-beeta-glükanaas: 8 000 U ([1])/ml või g Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 18 000 U ([2])/ml või g Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 26 000 U ([3])/ml või g	Pardid	—	Endo-1,4-beeta-glükanaas: 400 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300 U	— — —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb ära märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik annus ühe kilogrammi täisjõusööda kohta: Endo-1,4-beeta-glükanaas: 400–1 600 U Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 900–3 600 U Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 300–5 200 U. 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beeta-glükaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 45 % nisu ja/või tritikalet	25.11.2009
▼M3 _____								

▼B

([1]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures vabastab karboksümetüültselluloosist 0,1 mikromooli glükoosi minutis.
([2]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures vabastab odra beeta-glükaanist 0,1 mikromooli glükoosi minutis.
([3]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 40 °C juures vabastab kaera/speltanisu ksülaanist 0,1 mikromooli glükoosi minutis.

▼B

III LISA

EÜ nr või nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					CFU/kg täissöödas			
Mikroorganismid								
▼M4 _____								
▼M2 _____								