KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/455,

15. märts 2017,

milles käsitletakse *Lactobacillus fermentum*'i (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum*'i (NCIMB 41638) ja *Lactobacillus rhamnosus*'e (NCIMB 41640) preparaadi lubamist koerte söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus *Lactobacillus fermentum*'i (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum*'i (NCIMB 41638) ja *Lactobacillus rhamnosus*'e (NCIMB 41640) preparaadile loa saamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3) Taotluses käsitletakse *Lactobacillus fermentum*'i (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum*'i (NCIMB 41638) ja *Lactobacillus rhamnosus*'e (NCIMB 41640) preparaadi lubamist koerte söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid".

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet") jõudis oma 1. detsembri 2015. aasta arvamuses ([2]) järeldusele, et *Lactobacillus fermentum*'i (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum*'i (NCIMB 41638) ja *Lactobacillus rhamnosus*'e (NCIMB 41640) preparaat ei avalda kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Samuti järeldas toiduohutusamet, et söödalisandi lisamine pastöriseeritud piimale või kaerapõhisele tootele põhjustab hapestumist, mis soodustab koertele ettenähtud sööda säilimist. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(5) *Lactobacillus fermentum*'i (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum*'i (NCIMB 41638) ja *Lactobacillus rhamnosus*'e (NCIMB 41640) preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(6) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid" ja funktsionaalrühma „säilitusained", lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
([2]) *EFSA Journal* 2016; 14(1): 4340.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. märts 2017

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Söödalisandi CFU/söödamaterjali kg			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: säilitusained									
1a001	—	*Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) ja *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640)	*Söödalisandi koostis* *Lactobacillus fermentum*'i (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum*'i (NCIMB 41638) ja *Lactobacillus rhamnosus*'e (NCIMB 41640) preparaat, mille *Lactobacilli*' sisaldus kokku on vähemalt $1,0 \times 10^8$ CFU/g söödalisandis (seejuures iga *Lactobacillus*'t vähemalt $1,0 \times 10^7$ CFU/g söödalisandis) *Toimeaine kirjeldus* *Lactobacillus fermentum*'i (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum*'i (NCIMB 41638) ja *Lactobacillus rhamnosus*'e (NCIMB 41640) elujõulised rakud *Analüüsimeetod* (1) Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787) Tuvastamine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE)	Koerad	—	—	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Seda söödalisandit tohib kasutada ainult kaerast saadud toodetes ja pastöriseeritud piimas. 3. Söödalisandi soovitatav kasutuskogus: — 6×10^8 CFU/kg kaerast saadud tootes (niiskusesisaldus 90 %); — $2,7 \times 10^{10}$ CFU/kg pastöriseeritud piimas. 4. Söödakäitlejad peavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kehtestama kasutamise korra ja võtma asjakohased korralduslikud meetmed, et maandada sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ja silma sattumisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte vastuvõetava tasemeni vähendada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel sobivaid isikukaitsevahendeid, sealhulgas nahakaitsevahendeid.	5. aprill 2027

(1) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.