Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/122

24.1.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2025/122

(2025. gada 22. janvāris),

ar ko apstiprina Itālijā izmantojamās cūku liemeņu klasificēšanas metodes un atceļ Īstenošanas lēmumu 2014/38/ES

(izziņots ar dokumenta numuru C(2025) 249)

(Autentisks ir tikai teksts itāļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 ([1]), un jo īpaši tās 20. panta pirmās daļas p) un t) punktu,

tā kā:

(1) Regulas (ES) Nr. 1308/2013 10. pantā ir noteikts, ka cūku liemeņu klasificēšanā piemēro minētās regulas IV pielikuma B daļā doto Savienības skalu. Minētās regulas IV pielikuma B daļas IV iedaļas 1. punktā ir noteikts, ka cūku liemeņu klasificēšanā muskuļaudu saturs jānovērtē pēc Komisijas apstiprinātām klasificēšanas metodēm, ka apstiprināt drīkst tikai statistiski pierādītas novērtēšanas metodes, kuru pamatā ir vienas vai vairāku cūkas liemeņa anatomisko daļu fiziska izmērīšana, un ka klasificēšanas metožu apstiprināšanas priekšnoteikums ir atbilstība maksimālajai pielaidei, kāda noteikta novērtējuma statistiskajai kļūdai. Minētā pielaide ir noteikta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/1182 ([2]) V pielikuma A daļas 1. punkta otrajā daļā.

(2) Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/38/ES ([3]) ir apstiprinātas sešas Itālijā izmantojamas cūku liemeņu klasificēšanas metodes.

(3) Itālija ir Komisiju lūgusi atsaukt metodes "Fat-O-Meater I (FOM I)" un "AutoFom III" apstiprinājumu.

(4) Vēl Itālija ir Komisiju lūgusi apstiprināt atjauninātu formulu metodēm "Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)", "Fat-O-Meater II (FOM II)", "CSB-Image-Meater" un "manuālā metode (ZP)", kas cūku liemeņu klasificēšanai šīs valsts teritorijā jau ir apstiprinātas ar Īstenošanas lēmumu 2014/38/ES.

(5) Deleģētās regulas (ES) 2017/1182 11. panta 3. punktā minētajā protokolā Itālija ir detalizēti aprakstījusi gaļas izciršanas izmēģinājumus, norādot principus, uz kuriem minētās jaunās metodes balstītas, gaļas izciršanas izmēģinājumu rezultātus un vienādojumus, kas izmantoti, lai novērtētu muskuļaudu procentuālo saturu.

(6) Izmantojot manuālo metodi ("ZP"), mērījumus var veikt arī ar rokā turamu skeneri, ko sauc par zoometru. Skeneris veic tādus pašus mērījumus kā manuālais bīdmērs. Tāpēc prognozes vienādojums ir tāds pats kā manuālās metodes ("ZP") vienādojums, un veiktā izmēģinājuma vienīgais mērķis bija verificēt elektroniskās ierīces precizitāti un precīzumspēju.

([1]) OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1182 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (OV L 171, 4.7.2017., 74. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/38/ES (2014. gada 24. janvāris), ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Itālijā (OV L 23, 28.1.2014., 35. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/38/oj).

(7) Minētos lūgumus izskatot, tika konstatēts, ka jauno klasificēšanas metožu apstiprināšanas un jau apstiprināto metožu vienādojumu atjaunināšanas nosacījumi un minimālās prasības, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2017/1182 V pielikuma A daļā, ir izpildītas. Tāpēc minētās klasificēšanas metodes un jaunās formulas būtu jāapstiprina izmantošanai Itālijā.

(8) Itālija ir Komisiju lūgusi atļaut tai noteikt cūku liemeņu noformējumu, kas ir citādāks nekā Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas III iedaļā noteiktais standarta noformējums.

(9) Klasificēšanas metožu vai šo metožu aparātu izmaiņas būtu atļaujamas tikai tad, ja tās ir skaidri apstiprinātas ar Komisijas īstenošanas lēmumu.

(10) Skaidrības un juridiskās noteiktības labad Īstenošanas lēmums 2014/38/ES būtu jāatceļ.

(11) Lai tirgus dalībniekiem dotu pietiekami daudz laika pielāgoties ar jaunu ierīču un jaunu vienādojumu ieviešanu saistītajām tehniskajām prasībām, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2025. gada 1. februāra.

(12) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Cūku liemeņu muskuļaudu satura novērtēšanai Itālijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas IV iedaļas 1. punktu apstiprina šādas klasificēšanas metodes:

a) aparāts "Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)" un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kas detalizēti aprakstītas pielikuma I daļā;

b) aparāts "Fat-O-Meater II (FOM II)" un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kas detalizēti aprakstītas pielikuma II daļā;

c) aparāts "CSB-Image-Meater" un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kas detalizēti aprakstītas pielikuma III daļā;

d) "manuālās metodes (ZP)" aparāts un ar to saistītās novērtēšanas metodes, kas detalizēti aprakstītas pielikuma IV daļā.

2. pants

Neatkarīgi no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas III iedaļā noteiktā standarta noformējuma cūku liemeņus Itālijā drīkst noformēt, pirms svēršanas un klasificēšanas neatdalot diafragmu un iekšu taukus. Šāda noformējuma gadījumā reģistrēto silta liemeņa svaru koriģē pēc šādas formulas:

$$Y = X - X \times a\ \%,$$

kur:

Y = liemeņa svars, kas noteikts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/1182 7. pantu,

X = silta liemeņa svars ar iekšu taukiem un diafragmu,

A = iekšu tauku un diafragmas īpatsvara summa (%);

— diafragmai atbilst 0,29 % (liemeņa svars no 110,1 līdz 180 kg) un 0,26 % (liemeņa svars no 70 līdz 110 kg);

— iekšu taukiem atbilst

  — 0,99 % (liemeņa svars no 70 līdz 80,0 kg),

  — 1,29 % (liemeņa svars no 80,1 līdz 90,0 kg),

  — 1,52 % (liemeņa svars no 90,1 līdz 100,0 kg),

  — 2,05 % (liemeņa svars no 100,1 līdz 110 kg),

  — 2,52 % (liemeņa svars no 110,1 līdz 130 kg),

  — 2,62 % (liemeņa svars no 130,1 līdz 140 kg),

  — 2,83 % (liemeņa svars no 140,1 līdz 150 kg),

  — 2,96 % (liemeņa svars no 150,1 līdz 180 kg).

3. pants

Iepriekš 1. pantā minēto apstiprināto klasificēšanas metožu vai šo metožu aparātu izmaiņas apstiprina ar Komisijas īstenošanas lēmumu.

4. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/38/ES atceļ.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts Itālijas Republikai.

To piemēro no 2025. gada 1. februāra.

Briselē, 2025. gada 22. janvārī

Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Christophe HANSEN

PIELIKUMS

CŪKU LIEMEŅU KLASIFICĒŠANAS METODES ITĀLIJĀ

I DAĻA

“Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)”

1. Šajā daļā izklāstītos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņus klasificē, izmantojot aparātu “Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)”.

2. Aparāts ir aprīkots ar zondi, kuras diametrs ir 5,95 mm (un 6,3 mm pie asmeņa zondes priekšgalā), kurā ir fotodiode (*Siemens LED* modelis LYU 260-EO un 58 MR tipa fotodetektors) un kuras darbības diapazons ir 0–120 mm. Mērījumu rezultātus aparāts “HGP 7” pats vai ar to savienots dators pārvērš muskuļaudu satura aplēsē.

3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādām formulām:

a) ja liemenis sver no 70 līdz 110 kg:

$$\hat{Y} = 69{,}8930 - 0{,}7338 \times X_1 + 0{,}0279 \times X_2,$$

kur:

$\hat{Y}$ = aplēstais liemeņa muskuļaudu saturs procentos,

X_1 = muguras tauku slāņa biezums (ar ādu) (mm), ko mēra 8 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto ribu no beigām,

X_2 = garā muguras muskuļa biezums (mm), ko mēra tajā pašā laikā un vietā kā X_1;

b) ja liemenis sver no 110,1 līdz 180 kg:

$$\hat{Y} = 80{,}136492 - 14{,}021984 \times \ln(X_1) + 3{,}581997 \times \ln(X_2),$$

kur:

$\hat{Y}$ = aplēstais muskuļaudu saturs procentos,

$\ln(X_1)$ = naturālais logaritms no muguras tauku slāņa biezuma (ar ādu) (mm), ko mēra 8 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto ribu no beigām,

$\ln(X_2)$ = naturālais logaritms no garā muguras muskuļa biezuma (mm), ko mēra tajā pašā laikā un vietā kā X_1.

II DAĻA

“Fat-O-Meater II (FOM II)”

1. Šajā daļā izklāstītos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņus klasificē, izmantojot aparātu “Fat-O-Meater II (FOM II)”.

2. Aparāts ir aprīkots ar 3,5 MHz ultraskaņas pārveidotāju bloku (*U-Systems*) un zondi, kuras diametrs ir 6 mm, kurā ir *Siemens* SFH 950/960 modeļa fotodiode un kuras darbības diapazons ir 3–125 mm. Aparātā integrēts dators mērījumu rezultātus pārvērš muskuļaudu satura aplēsē.

3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

a) ja liemenis sver no 70 līdz 110 kg:

$$\hat{Y} = 70{,}2193 - 0{,}7140 \times X_1 + 0{,}0174 \times X_2,$$

kur:

$\hat{Y}$ = aplēstais muskuļaudu saturs procentos,

X_1 = muguras tauku slāņa biezums (ar ādu) (mm), ko mēra 8 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto ribu no beigām,

X_2 = garā muguras muskuļa biezums (mm), ko mēra tajā pašā laikā un vietā kā X_1;

b) ja liemenis sver no 110,1 līdz 180 kg:

$$\hat{Y} = 59{,}354157 - 0{,}550737 \times X_1 + 0{,}092655 \times X_2,$$

kur:

$\hat{Y}$ = aplēstais muskuļaudu saturs procentos,

X_1 = muguras tauku slāņa biezums (ar ādu) (mm), ko mēra 8 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas starp trešo un ceturto ribu no beigām,

X_2 = garā muguras muskuļa biezums (mm), ko mēra tajā pašā laikā un vietā kā X_1.

III DAĻA

“CSB Image Meater”

1. Šajā daļā izklāstītos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņus klasificē, izmantojot aparātu “CSB Image Meater”.

2. Aparāts ir aprīkots ar tiešsaistes attēlu apstrādes sistēmu, kurā pusliemeņus automātiski filmē ar kameras sistēmu. Pēc tam attēlus apstrādā ar datoru, izmantojot specializētu lietojumprogrammu, kas spēj producēt 20 dažādu mērījumu kopumu. Trīs atlasītus mērījumus dators pārvērš muskuļaudu procentuālā satura aplēsē.

3. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

a) ja liemenis sver no 70 līdz 110 kg:

$$\hat{Y} = 67{,}4309 + 0{,}1182 \times X_1 - 0{,}0450 \times X_2 - 0{,}5762 \times X_3 - 0{,}1861 \times X_4,$$

kur:

$\hat{Y}$ = aplēstais liemeņa muskuļaudu saturs procentos,

X_1 = (MF) muskuļaudu vidējā masa, ko iegūst, mērot pa vidējo gūžas muskuli (mm),

X_2 = (ML) vidējā gūžas muskuļa garums (mm),

X_3 = (MS) tauku vidējā masa, ko iegūst, mērot virs vidējā gūžas muskuļa (mm),

X_4 = (WbS) tauku vidējā masa, ko iegūst, mērot virs otrā skriemeļa, skaitot no vidējā gūžas muskuļa priekšējā (kraniālā) gala (Vb);

b) ja liemenis sver no 110,1 līdz 180 kg:

$$\hat{Y} = 48{,}652593 - 0{,}465268 \times X_1 + 0{,}169248 \times X_2,$$

kur:

$\hat{Y}$ = aplēstais muskuļaudu saturs procentos,

X_1 = minimālais tauku slāņa biezums (ar ādu) (mm) virs vidējā gūžas muskuļa (ZPF),

X_2 = muskuļaudu slāņa biezums (mm) no vidējā gūžas muskuļa tālākā priekšējā punkta līdz muguras smadzeņu kanāla dorsālajai malai (ZPM).

IV DAĻA

Manuālā metode (ZP)

1. Šajā daļā izklāstītos noteikumus piemēro tad, kad cūku liemeņus klasificē, izmantojot manuālo metodi ("ZP").

2. "ZP" mērījumus var veikt manuāli ar lineālu vai ar zoometru pa nekustīga liemeņa viduslīniju.

3. Zoometrs ir ierīce, kas savienota ar viedtālruni, kurā ir *Android* lietojumprogramma ("ZMAPP"), kas nodrošina lietotāja saskarni, kura ar lāzera tālmēra palīdzību no attāluma var veikt lineārus, leņķiskus un virsmas mērījumus, ko kalibrē, izmantojot ar viedtālruņa kameru uzņemtus cūkas liemeņa attēlus.

4. Liemeņa muskuļaudu saturu aprēķina pēc šādas formulas:

a) ja liemenis sver no 70 līdz 110 kg:

$$\hat{Y} = 58{,}4789 - 0{,}5697 \times X_1 + 0{,}1230 \times X_2,$$

kur:

$\hat{Y}$ = aplēstais muskuļaudu saturs procentos,

X_1 = minimālais tauku slāņa biezums (ar ādu) (mm) virs vidējā gūžas muskuļa (ZPF),

X_2 = muskuļaudu slāņa biezums (mm) no vidējā gūžas muskuļa tālākā priekšējā punkta līdz muguras smadzeņu kanāla dorsālajai malai (ZPM);

b) ja liemenis sver no 110,1 līdz 180 kg:

$$\hat{Y} = 46{,}723946 - 0{,}472380 \times X_1 + 0{,}188621 \times X_2,$$

kur:

$\hat{Y}$ = aplēstais muskuļaudu saturs procentos,

X_1 = minimālais tauku slāņa biezums (ar ādu) (mm) virs vidējā gūžas muskuļa (ZPF),

X_2 = muskuļaudu slāņa biezums (mm) no vidējā gūžas muskuļa tālākā priekšējā punkta līdz muguras smadzeņu kanāla dorsālajai malai (ZPM).