Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/122

24.1.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2025/122

av den 22 januari 2025

om godkännande av klassificeringsmetoder för slaktkroppar av gris i Italien och om upphävande av genomförandebeslut 2014/38/EU

[delgivet med nr C(2025) 249]

(Endast den italienska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 ([1]), särskilt artikel 20 första stycket p och t, och

av följande skäl:

(1) I artikel 10 i förordning (EU) nr 1308/2013 föreskrivs att unionsskalor för klassificering av slaktkroppar av gris ska tillämpas i enlighet med punkt B i bilaga IV till den förordningen. I avsnitt B.IV.1 i bilaga IV till samma förordning föreskrivs, när det gäller klassificering av slaktkroppar av gris, att innehållet av magert kött ska bedömas med av kommissionen godkända klassificeringsmetoder, att endast statistiskt utprövade bedömningsmetoder grundade på fysisk mätning av en eller flera anatomiska delar av grisslaktkroppen får godkännas och att det statistiska felet vid bedömningen måste underskrida en angiven högsta toleransnivå för att en klassificeringsmetod ska kunna godkännas. Denna toleransnivå fastställs i del A.1 andra stycket i bilaga V till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1182 ([2]).

(2) Genom kommissionens genomförandebeslut 2014/38/EU ([3]) godkänns användningen av sex metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Italien.

(3) Italien har begärt att kommissionen ska återkalla godkännandet av metoderna Fat-O-Meater I (FOM I) och AutoFom III.

(4) Italien har också begärt att kommissionen ska godkänna en uppdaterad formel för metoderna Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7), Fat-O-Meater II (FOM II), CSB-Image-Meater och den manuella metoden (ZP), som redan godkänts genom genomförandebeslut 2014/38/EU, för klassificering av slaktkroppar av gris i Italien.

(5) Italien har lämnat in en detaljerad beskrivning av dissekeringsproven och de principer som dessa nya metoder bygger på samt resultaten av dissekeringsproven och de ekvationer som används för att bedöma andelen magert kött i det protokoll som avses i artikel 11.3 i delegerad förordning (EU) 2017/1182.

(6) Om den manuella metoden (ZP) används kan mätningar också utföras med hjälp av en handhållen skanner som kallas Zoometer. Skannern gör samma mätningar som den manuella kalibern. Prognosekvationen är således densamma som för den manuella metoden (ZP), och den prövning som utförts hade enbart till syfte att kontrollera hur pass noggrann och exakt den elektroniska enheten är.

([1]) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1182 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsskalorna för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och vad gäller rapportering av marknadspriser för vissa kategorier av slaktkroppar och levande djur (EUT L 171, 4.7.2017, s. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Kommissionens genomförandebeslut 2014/38/EU av den 24 januari 2014 om godkännande av klassificeringsmetoder för slaktkroppar av gris i Italien (EUT L 23, 28.1.2014, s. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/38/oj).

(7) Granskningen av begärandena har visat att villkoren och minimikraven för godkännande av de nya klassificeringsmetoderna och uppdateringen av ekvationerna för de godkända metoderna enligt del A i bilaga V till delegerad förordning (EU) 2017/1182 är uppfyllda. De nya klassificeringsmetoderna och de nya formlerna bör därför godkännas i Italien.

(8) Italien har också begärt kommissionens godkännande för att föreskriva en annan presentation av slaktkroppar av gris än den standardpresentation som fastställs i avsnitt B.III i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013.

(9) Ändringar av klassificeringsmetoder eller instrument bör bara tillåtas om de uttryckligen har godkänts genom ett genomförandebeslut av kommissionen.

(10) Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör genomförandebeslut 2014/38/EU upphävas.

(11) För att aktörerna ska få tillräckligt med tid för att anpassa sig till de tekniska kraven för övergången till nya instrument och nya ekvationer bör detta beslut tillämpas från och med den 1 februari 2025.

(12) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande klassificeringsmetoder får användas i Italien för att bedöma innehållet av magert kött hos slaktkroppar av gris i enlighet med avsnitt B.IV.1 i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013:

a) Instrumentet Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7) med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del I i bilagan.

b) Instrumentet Fat-O-Meater II (FOM II) med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del II i bilagan.

c) Instrumentet CSB-Image-Meater med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del III i bilagan.

d) Den manuella metoden (ZP) med tillhörande bedömningsmetoder, enligt vad som anges i del IV i bilagan.

Artikel 2

Utan hinder av den standardpresentation som avses i avsnitt B.III i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 får slaktkroppar av gris i Italien presenteras utan att mellangärde och ister avlägsnats innan de vägs och klassificeras. Vid sådan presentation ska den registrerade slaktkroppens vikt före kylning justeras enligt följande formel:

$$Y = X - X \times a\ \%$$

där

Y = slaktkroppsvikt enligt artikel 7 i delegerad förordning (EU) 2017/1182,

X = den varma slaktkroppens vikt med ister och mellangärde,

a = summan av ister och mellangärde (%).

— För mellangärde: 0,29 % (slaktkroppsvikt 110,1–180 kg) respektive 0,26 % (slaktkroppsvikt 70–110 kg).

— För ister:

  — 0,99 % (slaktkroppsvikt 70–80,0 kg)

  — 1,29 % (slaktkroppsvikt 80,1–90,0 kg)

  — 1,52 % (slaktkroppsvikt 90,1–100,0 kg)

  — 2,05 % (slaktkroppsvikt 100,1–110 kg)

  — 2,52 % (slaktkroppsvikt 110,1–130 kg)

  — 2,62 % (slaktkroppsvikt 130,1–140 kg)

  — 2,83 % (slaktkroppsvikt 140,1–150 kg)

  — 2,96 % (slaktkroppsvikt 150,1–180 kg)

Artikel 3

Ändringar av de godkända klassificeringsmetoder eller tillhörande instrument som avses i artikel 1 ska godkännas genom ett genomförandebeslut av kommissionen.

Artikel 4

Genomförandebeslut 2014/38/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Det ska tillämpas från och med den 1 februari 2025.

Utfärdat i Bryssel den 22 januari 2025.

På kommissionens vägnar
Christophe HANSEN
Ledamot av kommissionen

BILAGA

KLASSIFICERINGSMETODER FÖR SLAKTKROPPAR AV GRIS I ITALIEN

DEL I

Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)

1. Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av instrumentet Hennessy Grading Probe 7 (HGP7).

2. Instrumentet är försett med en sond på 5,95 mm i diameter (och 6,3 mm vid bladet upptill på sonden) som har en fotodiod (Siemens LED av typen LYU 260-EO och en fotodetektor av typen 58 MR) samt ett manöveravstånd på 0–120 millimeter. Resultaten av mätningarna ska räknas om till uppskattat innehåll av magert kött med hjälp av själva instrumentet (HGP 7) eller med hjälp av en dator som är ansluten till instrumentet.

3. Innehållet av magert kött i slaktkroppen ska beräknas enligt följande formler:

   a) Slaktkroppar på mellan 70 och 110 kg:

$$\hat{Y} = 69{,}8930 - 0{,}7338 \times X_1 + 0{,}0279 \times X_2$$

   där

   $\hat{Y}$ = den uppskattade andelen magert kött i slaktkroppen,

   X_1 = tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i mm, mätt 8 cm från slaktkroppens mittlinje mellan det tredje och fjärde sista revbenet,

   X_2 = tjockleken hos muskeln *longissimus dorsi* i mm, mätt samtidigt och på samma plats som X_1.

   b) Slaktkroppar på mellan 110,1 och 180 kg:

$$\hat{Y} = 80{,}136492 - 14{,}021984 \times \ln(X_1) + 3{,}581997 \times \ln(X_2)$$

   där

   $\hat{Y}$ = den uppskattade andelen magert kött,

   $\ln(X_1)$ = naturlig logaritm för tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i mm, mätt 8 cm från slaktkroppens mittlinje mellan det tredje och fjärde sista revbenet,

   $\ln(X_2$ = naturlig logaritm för tjockleken hos muskeln *longissimus dorsi* i mm, mätt samtidigt och på samma plats som X_1.

DEL II

Fat-O-Meater II (FOM II)

1. Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av instrumentet Fat-O-Meater II (FOM II).

2. Instrumentet är försett med en grupp ultraljudssensorer på 3,5 MHz (U-Systems) med en sond på 6 mm i diameter som har en fotodiod av typen Siemens SFH 950/960 och ett manöveravstånd på 3–125 mm. De uppmätta värdena ska räknas om till uppskattat innehåll av magert kött av en dator som är integrerad i instrumentet.

3. Innehållet av magert kött i slaktkroppen ska beräknas enligt följande formel:

a) Slaktkroppar på mellan 70 och 110 kg:

$$\hat{Y} = 70{,}2193 - 0{,}7140 \times X_1 + 0{,}0174 \times X_2$$

där

$\hat{Y}$ = den uppskattade andelen magert kött,

X_1 = tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i mm, mätt 8 cm från slaktkroppens mittlinje mellan det tredje och fjärde sista revbenet,

X_2 = tjockleken hos muskeln *longissimus dorsi* i mm, mätt samtidigt och på samma plats som X_1.

b) Slaktkroppar på mellan 110,1 och 180 kg:

$$\hat{Y} = 59{,}354157 - 0{,}550737 \times X_1 + 0{,}092655 \times X_2$$

där

$\hat{Y}$ = den uppskattade andelen magert kött,

X_1 = tjockleken på ryggfettet (inklusive svål) i mm, mätt 8 cm från slaktkroppens mittlinje mellan det tredje och fjärde sista revbenet,

X_2 = tjockleken hos muskeln *longissimus dorsi* i mm, mätt samtidigt och på samma plats som X_1.

DEL III

CSB Image-Meater

1. Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av instrumentet CSB Image-Meater.

2. Instrumentet är försett med ett onlinesystem för bildbearbetning där slaktkroppshalvorna automatiskt filmas av ett kamerasystem. Bilderna bearbetas sedan i en dator med hjälp av en särskild programvara som kan producera 20 olika mätningar. Tre utvalda värden räknas av en dator om till uppskattad andel magert kött.

3. Innehållet av magert kött i slaktkroppen ska beräknas enligt följande formel:

a) Slaktkroppar på mellan 70 och 110 kg:

$$\hat{Y} = 67{,}4309 + 0{,}1182 \times X_1 - 0{,}0450 \times X_2 - 0{,}5762 \times X_3 - 0{,}1861 \times X_4$$

där

$\hat{Y}$ = den uppskattade andelen magert kött i slaktkroppen,

X_1 = (MF) genomsnittlig mager massa, mätt i förhållande till muskeln *gluteus medius*, i mm,

X_2 = (ML) längd på muskeln *gluteus medius*, i mm,

X_3 = (MS) genomsnittlig fettmassa, mätt i förhållande till muskeln *gluteus medius*, i mm,

X_4 = (WbS) genomsnittlig fettmassa, mätt i förhållande till den andra ryggkotan, som börjar från den främre (kraniala) änden av muskeln *gluteus medius* (Vb).

b) Slaktkroppar på mellan 110,1 och 180 kg:

$$\hat{Y} = 48{,}652593 - 0{,}465268 \times X_1 + 0{,}169248 \times X_2$$

där

$\hat{Y}$ = den uppskattade andelen magert kött,

X_1 = minsta fettdjup (inklusive svål) i mm över muskeln *gluteus medius* (ZPF),

X_2 = muskeldjup i mm mellan muskeln *gluteus medius* främre slut och ryggdelen av ryggmärgskanalen (ZPM).

DEL IV

Den manuella metoden (ZP)

1. Bestämmelserna i denna del ska gälla vid klassificering av slaktkroppar av gris med hjälp av den manuella metoden (ZP).

2. ZP-mätningar kan utföras manuellt med hjälp av en mätstav eller av en Zoometer (ZM) i stycksnittet på slaktkroppar som inte rör sig.

3. Zoometern är en enhet som är ansluten till en smart telefon med en Android-applikation (ZMAPP) med ett användargränssnitt som genom en laseravståndsmätare kan göra avståndsmätningar för linjär mätning, vinkelmätning och ytmätning som kalibreras på bilder av griskroppar tagna med kameran i telefonen.

4. Innehållet av magert kött i slaktkroppen ska beräknas enligt följande formel:

a) Slaktkroppar på mellan 70 och 110 kg:

$$\hat{Y} = 58{,}4789 - 0{,}5697 \times X_1 + 0{,}1230 \times X_2$$

där

$\hat{Y}$ = den uppskattade andelen magert kött,

X_1 = minsta fettdjup (inklusive svål) i mm över muskeln *gluteus medius* (ZPF),

X_2 = muskeldjup i mm mellan muskeln *gluteus medius* främre slut och ryggdelen av ryggmärgskanalen (ZPM).

b) Slaktkroppar på mellan 110,1 och 180 kg:

$$\hat{Y} = 46{,}723946 - 0{,}472380 \times X_1 + 0{,}188621 \times X_2$$

där

$\hat{Y}$ = den uppskattade andelen magert kött,

X_1 = minsta fettdjup (inklusive svål) i mm över muskeln *gluteus medius* (ZPF),

X_2 = muskeldjup i mm mellan muskeln *gluteus medius* främre slut och ryggdelen av ryggmärgskanalen (ZPM).