Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1206/2005/EK RENDELETE

(2005. július 27.)

a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 197., 2005.7.28., 12. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 403/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 2.)	L 121	26	2013.5.3.
►M2	A Bizottság 290/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. március 21.)	L 87	84	2014.3.22.
►M3	A Bizottság (EU) 2017/211 végrehajtási rendelete (2017. február 7.)	L 33	23	2017.2.8.
►M4	A Bizottság (EU) 2017/1145 végrehajtási rendelete (2017. június 8.)	L 166	1	2017.6.29.

▼B

A BIZOTTSÁG 1206/2005/EK RENDELETE

(2005. július 27.)

a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

Az „enzimek” csoportjába tartozó, a mellékletben felsorolt készítmények takarmány-adalékanyagként való felhasználását határozatlan időre engedélyezik a mellékletben megállapított feltételek alapján.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

MELLÉKLET

EK-sorszám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Legnagyobb életkor	Legkisebb megengedett tartalom	Legnagyobb megengedett tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
					Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban			
Enzimek								
▼M1 ———								
▼B E 1604	►M2 ——— ◄	A *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz és endo-1,4-béta-xilanáz készítmény legkisebb aktivitása: Porított formában: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 2 000 U ([4])/g endo-1,4-béta-xilanáz: 1 400 U ([5])/g Folyékony formában: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 500 U/ml endo-1,4-béta-xilanáz: 350 U/ml	Hízósertés	—	endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 U endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U	— —	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást 2. Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában: endo-1,3(4)-béta-glükanáz:100 U endo-1,4-béta-xilanáz: 70 U 3. Nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként béta-glükánokban és arabinoxilánokban) gazdag összetett takarmányokban való alkalmazásra, pl. azokban, amelyek több mint 40 % árpát vagy 20 % búzát tartalmaznak	Határozatlan időre
▼M3 ———								

EK-sorszám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Legnagyobb életkor	Legkisebb megengedett tartalom	Legnagyobb megengedett tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
					Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban			
E 1633	►M4 ——— ◄	A *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz, a *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz és a *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) által termelt szubtilizin készítmény legkisebb aktivitása: Szilárd formában: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 100 ([7])/g endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U ([8])/g szubtilizin: 800 U ([9])/g	Brojlercsirke	—	endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 30 U endo-1,4-béta-xilanáz: 90 U szubtilizin: 240 U	— — —	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást 2. Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában: endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 30-100 U endo-1,4-béta-xilanáz: 90-300 U szubtilizin: 240-800 U 3. A több mint 60 % árpát tartalmazó összetett takarmányban való alkalmazásra	Határozatlan időre

►M1 ——— ◄

([4]) Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 5,55 mikromol redukáló cukrot (maltóz-ekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból 5,0 pH mellett és 50 °C-on.

([5]) Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 4,00 mikromol redukáló cukrot (maltóz-ekvivalenst) szabadít fel nyírfa-xilánból 5,5 pH mellett és 50 °C-on.

►M3 ——— ◄

([7]) Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukáló cukrot (glükóz-ekvivalenst) szabadít fel árpa béta-glükánból 5,0 pH mellett és 30 °C-on.

([8]) Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol redukáló cukrot (xilóz-ekvivalenst) szabadít fel pelyvás zab-xilánból 5,3 pH mellett és 50 °C-on.

([9]) Egy U az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikrogram fenolvegyületet (triozin-ekvivalenst) szabadít fel kazein alaprétegből 7,5 pH mellett és 40 °C-on.