Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1206/2005

2005 m. liepos 27 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 197, 2005 7 28, p. 12)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2013 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 403/2013	L 121	26	2013 5 3
►M2	2014 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 290/2014	L 87	84	2014 3 22
►M3	2017 m. vasario 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/211	L 33	23	2017 2 8
►M4	2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1145	L 166	1	2017 6 29

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1206/2005

2005 m. liepos 27 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede nurodomus preparatus, priklausančius fermentų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip gyvūnų mitybos priedus tame priede numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro			
Fermentai								
▼M1 ———								
▼B E 1604	►M2 ——— ◄	Endo-1,3(4)-beta-glucanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Penicillium funiculosum* (IMI SD101), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Miltelių pavidalo: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 2 000 U ([4])/g endo-1,4-beta-ksilanazė: 1 400 U ([5])/g Skysto pavidalo: endo-1,3(4)-beta-glukanazė: 500 U/ml endo-1,4-beta-ksilanazė: 350 U/ml	Mėsinės kiaulės	—	endo-1,3(4)-beta-gluka-nazė: 100 U endo-1,4-beta-ksila-nazė: 70 U	— —	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 100 U endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U 3. Naudoti kombinuotuose paaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % miežių arba 20 % kviečių	Neribotam laikui
▼M3 ———								

▼B

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro			
E 1633	►M4 ——— ◄	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) ir subtilizino, gauto iš *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Kieto pavidalo: endo-1,3(4)-beta-glukanazė: 100 U ([7])/g Endo-1,4-beta-ksilanazė: 300 U ([8])/g Subtilizinas: 800 U ([9])/g	Mėsiniai viščiukai	—	endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 30 U endo-1,4-beta-ksilanazė: 90 U subtilizinas: 240 U	— — —	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 30–100 U endo-1,4-beta-ksilanazė: 90–300 U subtilizinas: 240–800 U 3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 60 % miežių	Neribotam laikui

►M1 ——— ◄

([4]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 5,55 mikromolio redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 50 °C temperatūrai.
([5]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 4,00 mikromolius redukuojančių cukrų (maltozės ekvivalentai) per minutę iš beržų ksilano, esant 5,5 pH ir 50 °C temperatūrai.

►M3 ——— ◄

([7]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30 °C temperatūrai.
([8]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš avižų speltos ksilano, esant 5,3 pH ir 50 °C temperatūrai.
([9]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį fenolio junginio (tirozino ekvivalentai) per minutę iš avižų kazeino substrato, esant 7,5 pH ir 40 °C temperatūrai.