Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1206/2005 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2005 година

относно постоянни разрешения за някои добавки към храни за животни

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 197, 28.7.2005 г., стр. 12)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 403/2013 на Комисията от 2 май 2013 година	L 121	26	3.5.2013 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) № 290/2014 на Комисията от 21 март 2014 година	L 87	84	22.3.2014 г.
►**M3**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/211 на Комисията от 7 февруари 2017 година	L 33	23	8.2.2017 г.
►**M4**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1145 на Комисията от 8 юни 2017 година	L 166	1	29.6.2017 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1206/2005 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2005 година

относно постоянни разрешения за някои добавки към храни за животни

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Препаратите от групата на „ензимите“, както е определено в приложението са разрешени за използване без ограничение във времето като добавка при храненето на животните при условията, постановени в това приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕО номер	Добавка	Състав, химическа формула, описание	Вид или категория животно	Макс-имална възраст	Минимално съдържание	Макс-имално съдържан-ие	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					CFU/килограма храна за животни			
Енизими								
▼M1 ———								
▼B E 1604	►M2 ——— ◄	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глюконаза и ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведен от *Penicillium funiculosum* (IMI SD101) с минимално съдържание на: на прах: ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 2 000 единицина ([4]) грам (2 000 U/g) ендо-1,4-бета-ксиланаза: 1 400 единици ([5]) на грам (1 400 U/g) течна форма: ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 500 единици на милилитър (500 U/ml) ендо-1,4-бета-ксиланаза: 350 единици на милилитър (350 U/ml)	прасета за угояване	—	ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 100 единици (100 U) ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 единици (70 U)	— —	1. В указанието за използване на добавката да се посочи температурата на съхранение, времето на съхранение и стабилността на гранулиране. 2. Препоръчителна доза за килограм от храната за животни: ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 100 единици (100 U) ендо-1,4-бета-ксиланаза: 70 единици (70 U) 3. За използване в комбиниран фураж, богат на ненишестени полизахариди (основно beta glucans and arabinoxylans), т.е. съдържащи над 40 % ечемик или 20 % пшеница.	безсрочно
▼M3 ———								

▼B

ЕО номер	Добавка	Състав, химическа формула, описание	Вид или категория животно	Макс-имална възраст	Минимално съдържание	Макс-имално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					CFU/килограма храна за животни			
E 1633	►M4 ——— ◄	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глюконаза произведен от *Trichodermalongibrachiatum* (ATCC 2106),ендо-1,4-бета-ксиланаза, произведен от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) и субтилизин, поизведен от *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) с миинмално съдържание на: твърд ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 100 единици ([7]) на грам (100 U/g) ендо-1,4-бета-ксиланаза: 300 единици ([8]) на грам (300 U/g) субтилизин 800 единици ([9]) на грам (800 U/g)	пилета за угояване	—	ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 30 единици (30 U) ендо-1,4-бета-ксиланаза: 90 единици (90 U) субтилизин 240 единици (240 U)	— — —	1. В указанието за използване на добавката да се посочи температурата на съхранение, времето на съхранение и стабилността на гранулиране. 2. Препоръчителна доза за килограм от храната за животни: ендо-1,3(4)-бета-глюконаза: 30 – 100 единици (30 – 100 U) ендо-1,4-бета-ксиланаза: 90 – 300 единици (90 – 300 U) субтилизин: 240 – 800 единици (240 – 800 U) 3. За използване в комбиниран фураж, т.е. съдържащ 60 % ечемик.	безсрочно

►M1 ——— ◄

([4]) 1 U е количеството ензим, което отделя 5,55 микромола от редуцирани захари (еквивалент на малтоза) от бета глюкан от ечемик за минута при pH 5,0 и 50 °C.
([5]) 1 U е количеството ензим, което отделя 4,0 микромола от редуцирани захари (еквивалент на малтоза) от ксилан от брезово дърво за минута при pH 5,5 и 50 °C.

►M3 ——— ◄

([7]) 1 U е количеството ензим, което отделя 1 микромол от редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от бета глюкан от ечемик за минута при pH 5,0 и 30 °C.
([8]) 1 U е количеството ензим, което отделя 1 микромол от редуцирани захари (еквивалент на ксилоза) от oat spelt xylan за минута при pH 5,3 и 50 °C.
([9]) 1 U е количеството ензим, което отделя 1 микромол от съединения на фенола (тирозинов еквивалент) от казеинов субстрат за минута при pH 7,5 и 40 °C.