31981R2930

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2930/81
z dnia 12 października 1981 r.
przyjmujące dodatkowe przepisy w celu zastosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 805/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny [1], ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia Grecji,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wołowych [2], w szczególności jego art. 6 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitej klasyfikacji tusz wołowych na obszarze Wspólnoty konieczne jest przyjęcie bardziej sprecyzowanych definicji klas budowy i klas pokrycia tłuszczem;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dodatkowe przepisy określone w art. 6 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 1208/81 są zgodne z wykazem zawartym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 października 1981 r.

W imieniu Komisji

Poul DALSAGER

Członek Komisji

---

[1] Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 24.
[2] Dz.U. L 123 z 7.5.1981, str. 3.

ZAŁĄCZNIK

1. STRUKTURA

Rozwój profilu tuszy, w szczególności podstawowych części (udziec, grzbiet, łopatka)

Klasa budowy	Przepisy dodatkowe		
E	*Udziec:*	bardzo zaokrąglony	Zrazowa wewnętrzna wystaje wyraźnie nad spojenie łonowe (symphisis pelvis)
doskonała	*Grzbiet:*	bardzo szeroki i gruby aż do łopatki	Część tylnobiodrowa bardzo zaokrąglona
	Łopatka:	bardzo zaokrąglona	
U	*Udziec:*	zaokrąglony	Zrazowa wewnętrzna wystaje nad spojenie łonowe (symphisis pelvis)
bardzo dobra	*Grzbiet:*	szeroki i gruby aż do łopatki	Część tylnobiodrowa zaokrąglona
	Łopatka:	zaokrąglona	
R	*Udziec:*	dobrze wykształcony	Zrazowa wewnętrzna i część tylnobiodrowa lekko zaokrąglone
dobra	*Grzbiet:*	wciąż gruby, ale węższy przy łopatce	
	Łopatka:	dość dobrze wykształcona	
O	*Udziec:*	przeciętnie wykształcony do niedostatecznie wykształconego	
dość dobra	*Grzbiet:*	przeciętnie gruby do niedostatecznie grubego	Część tylnobiodrowa: profil prosty
	Łopatka:	przeciętnie wykształcona do niemal płaskiej	
P	*Udziec:*	niedostatecznie wykształcony	
słaba	*Grzbiet:*	wąski z widocznymi kośćmi	
	Łopatka:	płaska z widocznymi kośćmi	

2. STOPIEŃ WYKSZTAŁCENIA OKRYWY TŁUSZCZOWEJ

Ilość tłuszczu na tuszy oraz w jamie piersiowej

Klasa pokrycia tłuszczem	Przepisy dodatkowe
1 niska	Brak tłuszczu w jamie piersiowej
2 mała	W jamie piersiowej mięśnie między żebrami wyraźnie widoczne
3 średnia	W jamie piersiowej mięśnie między żebrami wciąż widoczne
4 wysoka	Wyraźne pasma tłuszczu na udźcu. W jamie piersiowej mięśnie między żebrami mogą być poprzerastane tłuszczem
5 bardzo wysoka	Udziec niemal całkowicie pokryty tłuszczem, tak że trudno wyróżnić pasma tłuszczu. W jamie piersiowej mięśnie między żebrami poprzerastane tłuszczem