# KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 841/92

## af 2. april 1992

## om ændring af forordning (EØF) nr. 1727/70, (EØF) nr. 1728/70, (EØF) nr. 2603/71, (EØF) nr. 410/76, (EØF) nr. 2501/87 og (EØF) nr. 2468/72 for så vidt angår visse tobakssorter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak [1], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1737/91 [2], særlig artikel 2, stk. 6, artikel 3, stk. 3, første afsnit, artikel 5, stk. 6, artikel 6, stk. 10, og artikel 7, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1467/70 af 20. juli 1970 om fastsættelse af visse almindelige regler for intervention inden for råtobaksektoren [3], særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

Ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 1738/91 [4] skal der blandt andet foretages en komplettering af betegnelsen for sort nr. 1, Badischer Geudertheimer, hvor hybriderne Pereg, Korso tilføjes, for sort nr. 2, Badischer Burley E, hvor der tilføjes »og hybrider deraf«, og for sort nr. 3, Virgin D, hvor der tilføjes »og hybrider deraf«, for at tage hensyn til Tysklands forening; der bør foretages ændringer af bilagene til de forordninger, som vedrører de enkelte tobakssorters betegnelser og kendetegn, dvs. følgende forordninger:

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 1727/70 af 25. august 1970 om gennemførelsesbestemmelserne for intervention inden for råtobak-sektoren [5], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 838/91 [6],

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 1728/70 af 25. august 1970 om fastsættelse af tabeller over tillæg og fradrag for råtobak [7], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 838/91,

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 2603/71 af 6. december 1971 om den nærmere udformning af kontrakter om en første bearbejdning og behandling af tobak, som interventionsorganerne ligger inde med [8], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 838/91,

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 410/76 af 23. februar 1976 om fastsættelse af det maksimumsvægttab, der er tilladt ved kontrollen efter den første bearbejdning og behandling af tobakken [9], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 838/91,

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 2501/87 af 24. juni 1987 om fastlæggelse af kendetegnene for de enkelte tobakssorter, der produceres i Fællesskabet [10], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 838/91;

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2468/72 [11], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3349/87 [12], indeholder i bilaget en liste over opsamlingscentre og bearbejdnings- og oplagringscentre; i betragtning af Tysklands forening bør nævnte bilag tilpasses den nye situation; nævnte forordning bør derfor ændres;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Råtobak —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

*Artikel 1*

I bilag I, II, IV og V til forordning (EØF) nr. 1727/70, i bilag I og II til forordning (EØF) nr. 1728/70 samt i bilaget til forordning (EØF) nr. 2603/71 og i bilaget til forordning (EØF) nr. 410/76 ændres betegnelserne på sorterne med numrene 1, 2 og 3 til henholdsvis:

»1. Badischer Geudertheimer, Pereg og Korso.
2. Badischer Burley E og hybrider deraf.
3. Virgin D og hybrider deraf.«

*Artikel 2*

Beskrivelserne af sorterne med numrene 1, 2 og 3 i bilaget til forordning (EØF) nr. 2501/87 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

*Artikel 3*

I bilaget til forordning (EØF) nr. 2468/72 indføjes i listerne over opsamlingscentre og bearbejdnings- og oplagringscentre i Tyskland følgende: »4371 Glauzig«.

*Artikel 4*

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

Den anvendes for første gang på tobak fra 1991-høsten.

(1) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.
(2) EFT nr. L 163 af 26. 6. 1991, s. 11.
(3) EFT nr. L 164 af 27. 7. 1970, s. 32.
(4) EFT nr. L 163 af 26. 6. 1991, s. 13.
(5) EFT nr. L 191 af 27. 8. 1970, s. 5.
(6) EFT nr. L 85 af 5. 4. 1991, s. 16.
(7) EFT nr. L 191 af 27. 8. 1970, s. 18.
(8) EFT nr. L 269 af 8. 12. 1971, s. 11.
(9) EFT nr. L 50 af 26. 2. 1976, s. 11.
(10) EFT nr. L 237 af 20. 8. 1987, s. 1.
(11) EFT nr. L 267 af 28. 11. 1972, s. 1.
(12) EFT nr. L 317 af 7. 11. 1987, s. 31.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 1992.

*På Kommissionens vegne*
Ray MAC SHARRY
*Medlem af Kommissionen*

*BILAG*

**Sort nr. 1 : Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso**

1. *Særlige karakteristika*

| | |
|---|---|
| 1.1. Genetiske : | a) Badischer Geudertheimer : Tysk sort, der er fremkommet efter en lang generationsrække af de såkaldte »Landrassen«, bevaringsforædling, certificerede frø fremavlet af certificerede frø. |
| | b) Pereg : Geudertheimer-type, resistent over for skimmel, krydsning med Bel, bevaringsforædling, certificerede frø eller frø fremavlet af certificerede frø |
| | c) Korso : Geudertheimer-type, resistent over for skimmel og Y-virus, krydsning med Bel, bevaringsforædling, certificerede frø eller frø fremavlet af certificerede frø |
| 1.2. Botaniske og morfologiske : | a) Badischer Geudertheimer : Under normale dyrkningsforhold en høj plante på ca. 1,70 m med gennemsnitlig 15 til 20 skråtstillede nytteblade med en gennemsnitlig afstand på 10 til 11 cm. Oprejst bladvækst med nedhængende bladspids. Store ovale eller elliptiske blade, grønne til mørkegrønne, let skinnende. Tidlig sort under normale dyrkningsforhold. |
| | b) Pereg : Høj plante på 1,60 til 1,80 m med gennemsnitlig 17 til 20 halvt oprejste nytteblade. Oprejst bladvækst med delvis nedhængende til nedhængende bladspids. Ovale til aflange blade, grønne, med fast glat overflade, halvtidlig sort |
| | c) Korso : Høj plante på ca. 1,70 m med gennemsnitlig 15 til 18 nytteblade. Bladene er lange til mellemlange, skråtstillede, bladfarven grønlig, overfladen afrundet, tidlig sort |
| 1.3. Jordbundsmæssige og klimatiske krav : | Løs, let og dybgrundet jord med tilstrækkelig vandtilførsel i områder af ringe højde med gennemsnitlig luftfugtighed. |

2. *Produktionsforhold*

| | |
|---|---|
| 2.1. Beplantningstæthed : | I gennemsnit 29 000 til 38 000 planter pr. ha. |
| 2.2. Aftopning : | Manuel eller mekanisk aftopning midt i blomstringstiden med beskæring af sideskud. |
| 2.3. Høstmetode : | Bladvis efter bladposition. |
| 2.4. Udbytte : | Under normale dyrkningsforhold 2 500 til 3 000 kg pr. ha i gennemsnit pr. område. |
| 2.5. Tørring : | I fri luft i tørrelader, der egner sig til »air curing«. |
| 2.6. Præsentation og sortering : | Tobak sorteret efter bladposition (lugs, nedre midterblade, øvre midterblade og topblade) og i indtil tre kvalitetsklasser, i bundter, i foreløbige baller eller pakket på anden måde, med eller uden omvikling. |

**Sort nr. 2 : Badischer Burley E og hybrider deraf**

1. *Særlige karakteristika*

| | |
|---|---|
| 1.1. Genetiske : | a) Badischer Burley : Vellykket Burley-type, krydsning af White-Burley og dobbelt Geudetheimer. Bevaringsforædling, certificerede frø eller frø fremavlet af certificerede frø. |
| | b) Bursanica, Zerlina og Dreta : Burley-typer, resistent over for skimmel, krydsning med Bel 61/10, bevaringsforædling, certificerede frø eller frø fremavlet af certificerede frø. |
| | c) BB16F : Krydsning af B21 × Bel og White Burley. |

| | |
|---|---|
| 1.2. Botaniske og morfologiske : | a) Badischer Burley : Under normale dyrkningsforhold en høj plante på ca. 1,80 m med gennemsnitlig 15 til 20 nytteblade. Lugs' og nedre midterblades bladvinkel vandret og øvre blade oprejst med en gennemsnitlig afstand på 10 cm. Store blade af bred oval form, lysegrønne til gulgrønne. Normalt tidlig blomstring og udstrakt tidlig modning i de øvrige bladpositioner under normale dyrkningsforhold. |
| | b) Bursanica, Zerlina og Dreta : Under normale dyrkningsforhold en meget høj plante på ca. 1,90 m med gennemsnitlig 17 til 22 nytteblade. Lugs' og nedre midterblades bladvinkel vandret og øvre blade oprejst. Store blade af oval eller bred oval form, lysegrønne til gulgrønne, rynket til stærkt rynket. Normal til sildig blomstring og modning. |
| | c) BB16F : Under normale dyrkningsforhold en plante af konisk form, ca. 1,60 m med 15 til 18 nytteblade. Halvelliptiske til elliptiske blade, lysegrønne til lysegule ved modning. Sekskantet blomsterstand med lyserøde blomster. |
| 1.3. Jordbundsmæssige og klimatiske rkav : | Sandet lermuldet jord med tilstrækkelig vandtilførsel og gennemsnitlig luftfugtighed. |
| 2. *Produktionsforhold* | |
| 2.1. Beplantningstæthed : | Badischer Burley E, Bursanica, Zerlina og Dreta : I gennemsnit 29 000 til 35 000 planter pr. ha. |
| | BF16F : I gennemsnit 28 000 til 32 000 planter pr. ha. |
| 2.2. Aftopning : | Manuel eller mekanisk midt i blomstringstiden, eventuelt med beskæring af sideskud. |
| 2.3. Høstmetode : | Bladvis efter bladposition eller stamhøst. |
| 2.4. Udbytte : | Under normale dyrkningsforhold gennemsnitlig 2 200 til 3 300 kg pr. ha. |
| 2.5. Tørring : | I fri luft i tørrelader, der egner sig til »air-curing«. |
| 2.6. Præsentation og sortering : | Tobak sorteret efter bladposition (lugs, nedre midterblade, øvre midterblade og topblade) og i indtil tre kvalitetsklasser, i bundter, i foreløbige baller eller pakket på anden måde, med eller uden omvikling. |

**Sort nr. 3 : Virgin D og hybrider heraf**

| | |
|---|---|
| 1. *Særlige karakteristika* | |
| 1.1. Genetiske : | Sort af virgin, der er blevet dyrket siden midten af 50'erne. Forædling på basis af amerikansk virgin, resistent over for Y-virus og rodbrand. Bevaringsforædling, certificerede frø eller frø fremavlet af certificerede frø. |
| 1.2. Botaniske og morfologiske : | Under normale dyrkningsforhold en høj plante på ca. 1,80 m med gennemsnitlig 14 til 20 nytteblade, oprejst bladvækst. Bladstørrelse middel til stor, lange til brede ovale lysegrønne til grønne blade med meget synlig nervation. Normal, tidlig modning og blomstring. |
| 1.3. Jordbundsmæssige og klimatiske krav : | Let, sandet til lermuldet jord, der hurtigt opvarmes, med tilstrækkelig vandtilførsel. |
| 2. *Produktionsforhold* | |
| 2.1. Beplantningstæthed : | a) I gennemsnit 29 000 til 35 000 planter pr. ha |
| | b) I gennemsnit 18 000 til 22 000 planter pr. ha, meget sandet og stærkt filtrerende jord. |
| 2.2. Aftopning : | Normalt ingen aftopning eller sen aftopning med beskæring af sideskud. |

| | |
|---|---|
| 2.3. Høstmetode : | Høst af de enkelte blade i takt med deres modning efter bladposition. |
| 2.4. Udbytte : | Under normale dyrkningsforhold 1 600 til 2 400 kg pr. ha pr. område. |
| 2.5. Tørring : | Varmluftstørring i særlige ovne (bulks), der egner sig til »flue-curing«. |
| 2.6. Præsentation og sortering : | Tobak sorteret efter bladposition (lugs, nedre midterblade, øvre midterblade og topblade) og i indtil tre kvalitetsklasser, i bundter, i foreløbige baller eller pakket på anden måde, med eller uden omvikling. |