31998R2785

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2785/98

1998 m. gruodžio 22 d.

dėl Tarybos direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 3 dalyje nurodytiems priedams nustatyto jų naudojimo laiko pakeitimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 98/19/EB ([2]), ir ypač į jos 9j ir 3 straipsnius,

kadangi Direktyvoje 70/524/EEB numatyta, kad atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą gali būti leidžiama naudoti naujus arba kitai paskirčiai vartojamus senuosius priedus;

kadangi leidimas naudoti naujus arba kitai paskirčiai vartojamus senuosius priedus gali būti suteiktas penkeriems metams, jei jie, atsižvelgiant į pašarams taikytinus leistinus lygius, neturi neigiamo poveikio žmonių arba gyvūnų sveikatai ar aplinkai, taip pat dėl pasikeitusių gyvulininkystės produktų savybių, jei jų buvimas pašaruose yra kontroliuojamas, nedaro žalos vartotojui ir, atsižvelgus į turimus rezultatus, galima pagrįstai manyti, kad, įdėjus juos į pašarus, jų poveikis pašarų savybėms arba gyvulininkystės produktams bus teigiamas;

kadangi įvairių Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 3 dalyje minimų pašarų priedų, kuriems iki 1998 m. lapkričio 30 d. gali būti suteiktas laikinas nacionalinis leidimas, tyrimai dar nebaigti; kadangi dėl to minėtų medžiagų leistinas naudojimo laikotarpis gali būti pratęstas atsižvelgiant į tai, kad laikinai leidžiamas minėtų priedų naudojimo laikas negali būti ilgesnis kaip penkeri metai;

kadangi Komisija su Gyvūnų mitybos moksliniu komitetu pasitarė dėl leidimo naudoti šio reglamento priede nurodytus mikroorganizmus; kadangi Komitetas pateikė savo nuomonę, visų pirma dėl šių priedų saugumo;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Direktyvos 70/524/EEB nuostatomis gali būti leidžiama naudoti šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis nurodytus pašarų priedus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 1998 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1998 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Franz FISCHLER

Komisijos narys

([1]) OL L 270, 1970 12 14, p. 1.
([2]) OL L 96, 1998 3 28, p. 39.

PRIEDAS

Rišikliai, lipnumą reguliuojančios medžiagos ir koaguliantai

Registracijos Nr.	Pašarų priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Maksimalus amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					mg/kg visaverčio pašaro			
2	Natrolito-fonolitas	–	–			25 000	Visi pašarai	1999 4 21 (1)

Mikroorganizmai

Registracijos Nr.	Pašarų priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Maksimalus amžius	CFU/kg visaverčių pašarų		Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Minimumas	Maksimumas		
1	*Bacillus cereus* var. *toyoi* (CNCM I-1012/NCIB 40112)	*Bacillus cereus* var. *toyoi* preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 10^{10} CFU/g priedo	Paršeliai	2 mėn.	10^9	10^9	–	1999 4 21 (1)
				4 mėn.	$0,5 \times 10^9$	10^9	–	1999 4 21 (1)
			Kiaulės	6 mėn.	$0,2 \times 10^9$	10^9	–	1999 4 21 (1)
			Paršavedės	–	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	–	1999 4 21 (1)
2	*Bacillus licheniformis* (DSM 5749)/*Bacillus subtilis* (DSM 5750) (santykiu 1/1)	*Bacillus licheniformis* ir *Bacillus subtilis*mišinys, kuriame yra ne mažiau kaip $3,2 \times 10^9$ CFU/g priedo (abiejų bakterijų po $1,6 \times 10^9$CFU/g)	Paršeliai	4 mėn.	$1,28 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	–	1999 7 17 (2)
3	*Saccharomyces cerevisiae* (NCYC Sc 47)	*Saccharomyces cerevisiae* preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 5×10^9 CFU/g priedo priedo	Penimi galvijai	–	4×010^9	8×10^9	Naudojimo instrukcijose nurodoma: „*Saccharomyces cerevisiae*dienos racione neturi būti daugiau kaip $2,5 \times 10^{10}$CFU 100 (šimtui) kg kūno svorio; $0,5 \times 10^{10}$ CFU kiekvienam papildomam 100 (šimtui) kg kūno svorio“	2001 2 20 (3)

Registracijos Nr.	Pašarų priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Maksimalus amžius	CFU/kg visaverčių pašarų		Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Minimumas	Maksimumas		
4	*Bacillus cereus*(ATCC 14893/CIP 5832)	*Bacillus cereus*preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 10^{10} CFU/g priedo	Mėsiniai triušiai	–	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	–	2001 2 20 (3)
			Veisliniai triušiai	–	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	–	2001 2 20 (3)

(1) Pirmasis leidimas – 1994 m. balandžio 22 d., Komisijos direktyva 94/17/EB (OL L 105, 1994 4 26, p. 19).
(2) Pirmasis leidimas – 1994 m. liepos 18 d., Komisijos direktyva 94/41/EB (OL L 209, 1994 8 12, p. 18).
(3) Pirmasis leidimas – 1996 m. vasario 21 d., Komisijos direktyva 96/7/EB (OL L 51, 1996 3 1, p. 45).

Radionukleidų surišikliai

1. Radioaktyvaus cezio rišikliai (^{137}Cs ir ^{134}Cs):

Registracijos Nr.	Pašarų priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Maksimalus amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					mg/kg visaverčio pašaro			
1.1	Geležies (III) amonio heksacianoferatas (II)	NH4Fe(III)[(Fe(II)(CN)6]	Atrajotojai (naminiai ir laukiniai)	–	50	500	Naudojimo instrukcijoje nurodoma: „Geležies (III) amonio heksacianoferato (II) kiekis dienos racione turi būti nuo 10 iki 150 mg 10 (dešimčiai) kg kūno svorio“	2001 10 13 (1)
			Veršiukai iki atrajojimo pradžios	–	50	500	Naudojimo instrukcijoje nurodoma: „Geležies (III) amonio heksacianoferato (II) kiekis dienos racione turi būti nuo 10 iki 150 mg 10 (dešimčiai) kg kūno svorio“	2001 10 13 (1)
			Ėriukai prieš atrajojimo pradžią	–	50	500	Naudojimo instrukcijoje nurodoma: „Geležies (III) amonio heksacianoferato (II) kiekis dienos racione turi būti nuo 10 iki 150 mg 10 (dešimčiai) kg kūno svorio“	2001 10 13 (1)

Registracijos Nr.	Pašarų priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Maksimalus amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					mg/kg visaverčio pašaro			
			Ožiukai prieš atrajojimo pradžią	–	50	500	Naudojimo instrukcijoje nurodoma: „Geležies (III) amonio heksacianoferato (II) kiekis dienos racione turi būti nuo 10 iki 150 mg 10 (dešimčiai) kg kūno svorio“	2001 10 13 [1]
			Kiaulės (naminės ir laukinės)	–	50	500	Naudojimo instrukcijoje nurodoma: „Geležies (III) amonio heksacianoferato (II) kiekis dienos racione turi būti nuo 10 iki 150 mg 10 (dešimčiai) kg kūno svorio“	2001 10 13 [1]

[1] Pirmasis leidimas – 1996 m. spalio 14 d., Komisijos direktyva 96/66/EB (OL L 272, 1996 10 25, p. 32).