II

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1187

od 7. kolovoza 2020.

o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Iodine based products – CID LINES NV"

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ([1]), a posebno njezin članak 44. stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

(1) Društvo CID LINES NV podnijelo je 13. kolovoza 2015., u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, zahtjev za izdavanje odobrenja za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Iodine based products - CID LINES NV", koji pripadaju vrsti proizvoda 3 i 4 iz Priloga V. toj uredbi, i dostavio pisanu potvrdu da je nadležno tijelo Nizozemske pristalo ocijeniti taj zahtjev. Zahtjev je evidentiran pod brojem predmeta BC-BY019142-30 u registru biocidnih proizvoda.

(2) Skupina biocidnih proizvoda pod nazivom „Iodine based products - CID LINES NV" sadržava jod, uključujući polivinilpirolidon jod, kao aktivnu tvar, koja je uvrštena na popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012. Uzimajući u obzir intrinzična svojstva aktivne tvari i znanstvene kriterije za određivanje svojstava endokrine disrupcije utvrđene u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ([2]), Komisija preispituje odobrenje joda, uključujući polivinilpirolidon jod, u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovisno o ishodu tog preispitivanja, Komisija će razmotriti je li odobrenja Unije za proizvode koji sadržavaju tu aktivnu tvar potrebno ukinuti ili izmijeniti u skladu s člankom 48. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(3) Nadležno ocjenjivačko tijelo podnijelo je 28. svibnja 2019., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, izvješće o ocjenjivanju i zaključke ocjenjivanja Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija").

(4) Agencija je 17. siječnja 2020. Komisiji dostavila mišljenje ([3]), uključujući nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Iodine based products - CID LINES NV" i konačno izvješće o ocjenjivanju te skupine biocidnih proizvoda u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.

([1]) SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

([2]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100 od 4. rujna 2017. o utvrđivanju znanstvenih kriterija za određivanje svojstava endokrine disrupcije u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 301, 17.11.2017., str. 1.).

([3]) Mišljenje ECHA-e od 11. prosinca 2019. o odobrenju Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Iodine based products - CID LINES NV" (ECHA/BPC/237/2019).

(5) U mišljenju se zaključuje da je skupina biocidnih proizvoda pod nazivom „Iodine based products - CID LINES NV" skupina biocidnih proizvoda u smislu članka 3. stavka 1. točke (s) Uredbe (EU) br. 528/2012, da je prihvatljiva za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe te da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, ispunjava uvjete utvrđene u članku 19. stavcima 1. i 6. te uredbe.

(6) Agencija je 4. veljače 2020. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(7) Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije i stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Iodine based products - CID LINES NV".

(8) Prema mišljenju Agencije, kad je riječ o neaktivnim tvarima natrijev jodid i natrijev jodat sadržanima u skupini biocidnih proizvoda pod nazivom „Iodine based products - CID LINES NV", u razdoblju za ocjenjivanje zahtjeva nije bilo moguće zaključiti ispunjavaju li te tvari znanstvene kriterije za određivanje svojstava endokrine disrupcije iz Delegirane uredbe (EU) 2017/2100. Stoga bi trebalo provesti daljnje ispitivanje natrijeva jodida i natrijeva jodata. Ako se zaključi da se natrijev jodid ili natrijev jodat ili obje tvari smatraju tvarima sa svojstvima endokrine disrupcije, Komisija će razmotriti treba li odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Iodine based products - CID LINES NV" ukinuti ili izmijeniti u skladu s člankom 48. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(9) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Društvu CID LINES NV izdaje se odobrenje Unije za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda pod nazivom „Iodine based products - CID LINES NV" s brojem odobrenja EU-0022265-0000 u skladu sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda navedenim u Prilogu.

Odobrenje Unije valjano je od 3. rujna 2020. do 31. kolovoza 2030.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. kolovoza 2020.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda

Iodine based products – CID LINES NV

Vrsta proizvoda 3 – Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinfekcijska sredstva)

Vrsta proizvoda 4 – Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinfekcijska sredstva)

Broj odobrenja: EU-0022265-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): EU-0022265-0000

I. DIO

PRVA RAZINA INFORMACIJA

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1 **Naziv skupine**

Naziv	Iodine based products – CID LINES NV

1.2 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi) Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

1.3 **Nositelj odobrenja**

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	CID LINES NV
	Adresa	Waterpoortstraat 2, 8900, Ieper, Belgium
Broj odobrenja	EU-0022265-0000	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0022265-0000	
Datum odobrenja	3. rujna 2020.	
Datum isteka odobrenja	31. kolovoza 2030.	

1.4 **Proizvođač(i) biocidnih proizvoda**

Naziv proizvođača	CID LINES NV
Adresa proizvođača	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgija

1.5 **Proizvođači aktivnih tvari**

Aktivna tvar	Jod
Naziv proizvođača	SQM S.A.
Adresa proizvođača	Los Militares, Piso 4, 4290 Santiago Čile
Lokacija proizvodnih pogona	Nueva Victoria plant, 00 Pedro de Valdivia Čile

Aktivna tvar	Jod
Naziv proizvođača	Cosayach Nitratos S.A.
Adresa proizvođača	Amunategui 178, 00 Santiago Čile
Lokacija proizvodnih pogona	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Čile

Aktivna tvar	Jod
Naziv proizvođača	ACF Minera S.A.
Adresa proizvođača	San Martin No 499, 00 Iquique Čile
Lokacija proizvodnih pogona	Lagunas mine, 00 Pozo Almonte Čile

Aktivna tvar	Jod
Naziv proizvođača	ISE Chemicals Corporation
Adresa proizvođača	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokio Japan
Lokacija proizvodnih pogona	3695 Kitaimaizumi, 299-3201 Oamishirasato city Japan

Aktivna tvar	Polivinilpirolidon jod
Naziv proizvođača	ISP Chemicals LLC, Afiliate of Ashland Inc
Adresa proizvođača	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Sjedinjene Američke Države
Lokacija proizvodnih pogona	455 N. main st (HWY 95), KY 42029 Calvert City Sjedinjene Američke Države

Aktivna tvar	Polivinilpirolidon jod
Naziv proizvođača	Pantheon FZE (DMCC branch)
Adresa proizvođača	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road, 00 Dubai Ujedinjeni Arapski Emirati
Lokacija proizvodnih pogona	Cala Cala, 00 Pozo Almonte Čile

2. **SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA**

2.1 **Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,0	3,0
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0	10,0

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	0,0	21,0
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0,0	30,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		0,0	12,5

2.2 **Vrsta(e) formulacija**

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat AL - svaka druga tekućina

II. DIO

DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1**

Identifikator	metaSPC 1: PT3 Concentrated teat disinfectants Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-1

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	1,5	1,5
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	12,05	12,05

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

Oznaka upozorenja	Uzrokuje teške ozljede oka. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Može uzrokovati oštećenje organa (štitnjače) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (oralno).
Oznake obavijesti	Nositi zaštitu za oči. Nositi zaštitno odijelo. Nositi zaštitne rukavice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati liječnika ili centar za kontrolu otrovanja. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 03– Koncentrirano sredstvo za dezinfekciju sisa, poslije mužnje, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija sisa životinja u laktaciji poslije mužnje
Načini primjene	Ručno ili automatizirano prskanje sisa
Količine kod primjene i učestalost	Razrijediti proizvod do konačne koncentracije od 0,3 % (w/w) raspoloživog joda. Nanositi 2 puta dnevno ručnom prskalicom te 3 puta dnevno robotom.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE (Polietilen visoke gustoće)

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [1] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

5.1 **Upute za uporabu**

Proizvod je potrebno razrijediti prije uporabe čistom pitkom vodom kako bi se omogućila konačna koncentracija joda od 0,3 % (200 ml proizvoda, dodati do 1 l vode).

Razrijeđeni proizvod mora se dovesti na temperaturu iznad 20 °C prije uporabe.

Preporučuje se 5 ml razrijeđenog proizvoda po kravi po obradi. Preporučuje se uporaba dozirne pumpe za punjenje proizvodom u opremu za nanošenje. Koristiti rukavice i opremu za zaštitu očiju tijekom faze razrjeđivanja. Razrijeđeni proizvod može se čuvati i koristiti 1 tjedan, no ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno.

Nanositi razrijeđeni proizvod na sise ručnom ili automatiziranom prskalicom.

Proizvod bi se trebao koristiti izravno nakon mužnje 2 puta dnevno ručnom prskalicom i 3 puta dnevno robotom (automatiziranom prskalicom).

Osigurati da je sisa potpuno pokrivena do tri četvrtine po duljini. Pustiti da se proizvod osuši na sisama. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

[1] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 1.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

— Za miješanje proizvoda i punjenje proizvodom: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu) i opremu za zaštitu očiju/lica.

— Za nanošenje ručnim prskanjem: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Ako je potrebna dezinfekcija koja se kombinira prije i poslije mužnje, za dezinfekciju prije mužnje potrebno je razmotriti uporabu drugog proizvoda koji ne sadržava jod.

— Čuvati izvan dohvata djece.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon dodira proizvoda s okom: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti hitnu liječničku pomoć ako bol, treptanje, suzenje ili crvenilo ne prestaju.

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti. NE izazvati povraćanje i odmah zatražiti savjet liječnika.

Imati pri ruci spremnik ili naljepnicu proizvoda.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Kenodin SD 400 IodoSD 400 Velvet Concentrate Wynnsan Iodine 3 - 1 conc Iodin Teat Spray 400	područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0001 1-1	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	1,5
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	12,05

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2**

Identifikator	metaSPC 2: PT3 - Ready to Use (RTU) Teat disinfectants Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-2

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Formulacija(e)	AL - svaka druga tekućina

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

Oznaka upozorenja	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 2. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 03– Sredstvo za dezinfekciju sisa spremno za uporabu, poslije mužnje, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija sisa životinja u laktaciji poslije mužnje
Načini primjene	Uranjanjem ili prskanjem sisa
Količine kod primjene i učestalost	Proizvod je spreman za uporabu. - Nanositi 2 puta dnevno za ručno prskanje i 3 puta dnevno za ručno uranjanje i prskanje robotom.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [2] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

5.1 **Upute za uporabu**

Proizvod se mora dovesti na temperaturu iznad 20 °C prije uporabe.

Nanositi proizvod uranjanjem ili prskanjem:

— *Uranjanjem:* Nanositi proizvod posudom za uranjanje. Oprati posudu za uranjanje vodom nakon uporabe.

— *Prskanjem:* Nanositi proizvod ručnom ili automatiziranom prskalicom.

Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno; preporučuje se 5 ml otopine po kravi po obradi. Preporučuje se uporaba dozirne pumpe za punjenje proizvodom u opremu za nanošenje.

Proizvod bi se trebao koristiti odmah nakon svake mužnje: 2 puta dnevno za ručno prskanje i 3 puta dnevno za ručno uranjanje i prskanje robotom. Osigurati da je sisa potpuno pokrivena do tri četvrtine po duljini. Pustiti da se proizvod osuši na sisama. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

— Za nanošenje ručnim uranjanjem: Ne preporučuje se nikakva posebna zaštitna oprema u normalnim uvjetima uporabe.

— Za nanošenje ručnim prskanjem: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Ako je potrebna dezinfekcija koja se kombinira prije i poslije mužnje, za dezinfekciju prije mužnje potrebno je razmotriti uporabu drugog biocidnog proizvoda koji ne sadržava jod.

— Čuvati izvan dohvata djece.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon dodira proizvoda s okom: Isprati odmah vodom.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

[2] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 2.

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	IodoDip 3000	područje prodaje: EU
	Bio Tec Jodip 3000	područje prodaje: EU
	Recoïode	područje prodaje: EU
	Stalosan Io Dip	područje prodaje: EU
	Stalosan Super Dip	područje prodaje: EU
	Velvet High Visco	područje prodaje: EU
	Bühning Joddip 3000	područje prodaje: EU
	Kenodin	područje prodaje: EU
	Wynnsan trikill RTU	područje prodaje: CZ
	Wynnsan Iodine RTU teat dip	područje prodaje: EU
	Wynnsan Iodine dip RTU	područje prodaje: EU
	Iocid	područje prodaje: EU
	Iodip+	područje prodaje: EU
	Wynngold Iodine Dip	područje prodaje: EU
	Pezerk iv plus	područje prodaje: EU
	Iod protect 3000 Film	područje prodaje: EU
	Seivit® Iode 3000	područje prodaje: EU
	Kenostart	područje prodaje: EU
	GAHERYOD	područje prodaje: EU
	Kenodin 3000	područje prodaje: EU
	Iodin Teat Dip 3000	područje prodaje: EU
	Iod 3000 dip	područje prodaje: EU
	Iodoschutz dip	područje prodaje: EU
	Ioschutz dip	područje prodaje: EU
	Iodocoop dip	područje prodaje: EU
	Iodotech dip	područje prodaje: EU
	Iodactiv' dip	područje prodaje: EU
	Iododip	područje prodaje: EU
	MIROX Dip Jod	područje prodaje: EU
	HCP Iodine Dip	područje prodaje: EU
	Agib Jodium Dip	područje prodaje: EU
	Jod 3000	područje prodaje: EU
	Iod dip	područje prodaje: EU
	Iode 3000	područje prodaje: EU
	Iodoschutz	područje prodaje: EU
	Coopjod	područje prodaje: EU
	Coopiode	područje prodaje: EU
	Coopiode épais	područje prodaje: EU
	Semex jod	područje prodaje: EU
	Iodotech	područje prodaje: EU

	Iododip green	područje prodaje: EU
	Iodip bio	područje prodaje: EU
	Iododip bio	područje prodaje: EU
	Iodactive épais	područje prodaje: EU
	Iodactiv	područje prodaje: EU
	Iodoactiv'	područje prodaje: EU
	Bayley's Premier Iodine Teat Dip	područje prodaje: EU
	Pearce Premier Iodine Teat Dip	područje prodaje: EU
	Diamond 1:3 Concentrate Iodine Post Dip Spray	područje prodaje: EU
	JODOCARE	područje prodaje: EU
	KENOSTART DYP	područje prodaje: EU
	STREPTOFIT	područje prodaje: EU
	Iodall Film	područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0002 1-2	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,17

7.2 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Kenodin Film	područje prodaje: EU
	IodoFilm	područje prodaje: EU
	Wynnsan Iofilm teat dip	područje prodaje: EU
	Kenodin Film Extra	područje prodaje: EU
	Wynngold Film	područje prodaje: EU
	Wynnsan trikill film teat dip	područje prodaje: EU
	Kenodin Film Soft	područje prodaje: EU
	Iocid Film	područje prodaje: EU
	TOP Film	područje prodaje: EU
	Seivit® Iode Gel	područje prodaje: EU
	IOD protect 3000 Film	područje prodaje: EU
	Iodin Film Teat Dip 3000	područje prodaje: EU
	Iodin Barrier Teat Dip 3000	područje prodaje: EU
	Iodin Film Teat Dip	područje prodaje: EU
	Iodin Barrier Teat Dip	područje prodaje: EU
	Iod 3000 film	područje prodaje: EU
	Iodoschutz film	područje prodaje: EU
	Ioschutz film	područje prodaje: EU

	Iodocoop film	područje prodaje: EU
	Iodotech film	područje prodaje: EU
	Iodactiv' film	područje prodaje: EU
	Iodofilm	područje prodaje: EU
	HCP Iodine Film	područje prodaje: EU
	Iod 3000 film	područje prodaje: EU
	Coopjod film	područje prodaje: EU
	Coopiode film	područje prodaje: EU
	Iodocoop film	područje prodaje: EU
	Semex jod film	područje prodaje: EU
	Iodofilm	područje prodaje: EU
	Iodofilm bio	područje prodaje: EU
	Iofilm bio	područje prodaje: EU
	Iodactive film	područje prodaje: EU
	Iodactiv film	područje prodaje: EU
	Iodactiv' film	područje prodaje: EU
	SCUDO 3000	područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0003 1-2	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,9

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3**

Identifikator	metaSPC 3: PT3-RTU Udder disinfectants Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-3

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,99
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,95
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Formulacija(e)	AL - svaka druga tekućina

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

Oznaka upozorenja	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 3. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 03- Sredstvo za dezinfekciju vimena spremno za uporabu, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija kože samo za uporabu na netaknutoj koži: — vime mliječnih krava i goveda prije telenja — vime krmača prije prasenja
Načini primjene	prskanje-
Količine kod primjene i učestalost	Proizvod je spreman za uporabu. - Nanositi na: — vime mliječnih krava i goveda: 1 prskanje na svaku sisu (jednako 4,8 ml po primjeni) — vime krmača: 15 do 20 ml po životinji
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [3] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

5.1 **Upute za uporabu**

Za dezinfekciju kože:

Proizvod se mora dovesti na temperaturu iznad 20 °C prije uporabe.

Preporučuje se uporaba dozirne pumpe za punjenje proizvodom u opremu za nanošenje.

Nanositi prskanjem na netaknutu kožu životinja za topikalnu dezinfekciju:

— na vime mliječnih krava i goveda prije telenja: 1 prskanje na svaku sisu (jednako 4,8 ml po primjeni). Dezinfekcija se provodi jedanput, jedan dan prije telenja i jedanput, jedan dan nakon telenja. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

[3] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 3.

— na vime krmača prije prasenja: Preporučuje se 15 do 20 ml po životinji, jedanput dnevno prije prasenja i jedanput svaki dan tijekom 4 dana nakon prasenja. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

Samo za uporabu na netaknutoj koži.

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

Za nanošenje ručnim prskanjem na krave i krmače: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

Ako je potrebna kombinacija dezinfekcije krava poslije mužnje i dezinfekcije kože krava, proizvod na bazi joda ne smije koristiti ista osoba za obje dezinfekcije.

Čuvati izvan dohvata djece.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon dodira proizvoda s okom: Isprati odmah vodom.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Animal Skin Disinfectant Dermades 3000 Iodin Skin Disinfectant	područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0004 1-3	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,17

7.2 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Dermades Animal skin disinfectant 1 % Dermades Strong Iodin Skin Disinfectant Strong	područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0005 1-3	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,99
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,95

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 4**

Identifikator	metaSPC 4: PT3 - RTU Udder and Teat disinfectants Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-4

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,3
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,17	2,17

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4**

Formulacija(e)	AL - svaka druga tekućina

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

Oznaka upozorenja	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 4. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 03– Sredstvo za dezinfekciju sisa spremno za uporabu, poslije mužnje, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Sredstvo za dezinfekciju sisa spremno za uporabu koje se koristi poslije mužnje na životinjama u laktaciji.
Načini primjene	Uranjanje ili prskanje-

Količine kod primjene i učestalost	Proizvod je spreman za uporabu. - - Nanositi 2 puta dnevno za ručno prskanje i 3 puta dnevno za ručno uranjanje i prskanje robotom.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Za dezinfekciju sisa:

Proizvod se mora dovesti na temperaturu iznad 20 °C prije uporabe.

— Uranjanjem: Nanositi proizvod na sise posudom za uranjanje. Oprati posudu za uranjanje vodom nakon uporabe.

— Prskanjem: Nanositi proizvod na sise ručnom ili automatiziranom prskalicom.

Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno. Preporučuje se 5 ml otopine po kravi po obradi. Preporučuje se uporaba dozirne pumpe za punjenje proizvodom u opremu za nanošenje.

Proizvod bi se trebao koristiti izravno nakon mužnje posudom za uranjanje ili ručnom ili automatiziranom prskalicom. Osigurati da je sisa potpuno pokrivena do tri četvrtine po duljini.

Proizvod se nanosi poslije mužnje: 2 puta dnevno za ručno prskanje i 3 puta dnevno za ručno uranjanje i prskanje robotom.

Pustiti da se proizvod osuši na sisama.Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

— Za nanošenje ručnim prskanjem: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Za nanošenje ručnim uranjanjem: osobna zaštitna oprema (OZO) nije potrebna za sigurnu uporabu.

— Ako je potrebna dezinfekcija koja se kombinira prije i poslije mužnje, za dezinfekciju prije mužnje potrebno je razmotriti uporabu drugog proizvoda koji ne sadržava jod.

— Čuvati izvan dohvata djece.

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2 **Opis uporabe**

Tablica 5. Uporaba br. 2 – Vrsta proizvoda 03- Sredstvo za dezinfekciju vimena spremno za uporabu, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Sredstvo za dezinfekciju spremno za uporabu, samo za uporabu na netaknutoj koži: — vime mliječnih krava i goveda prije telenja — vime krmača prije prasenja
Načini primjene	Nanošenje na kožu životinje: prskanjem-
Količine kod primjene i učestalost	Proizvod je spreman za uporabu. - Nanositi na: — vime mliječnih krava i goveda: 1 prskanje na svaku sisu (jednako 4,8 ml po primjeni) — vime krmača: 15 do 20 ml po životinji
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Za dezinfekciju kože:

Proizvod mora biti na temperaturi iznad 20 °C prije uporabe.

Preporučuje se uporaba dozirne pumpe za punjenje proizvodom u opremu za nanošenje.

Nanositi prskanjem na netaknutu kožu životinja za topikalnu dezinfekciju:

— na vime mliječnih krava i goveda prije telenja: 1 prskanje na svaku sisu (jednako 4,8 ml po primjeni). Dezinfekcija se provodi jedanput, jedan dan prije telenja i jedanput, jedan dan nakon telenja. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

— na vime krmača prije prasenja: Preporučuje se 15 do 20 ml po životinji, jedanput dnevno prije prasenja i jedanput svaki dan tijekom 4 dana nakon prasenja. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

Pustiti da se proizvod osuši na koži.

Samo za uporabu na netaknutoj koži.

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

4.2.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

— Za nanošenje ručnim prskanjem na krave i krmače: Za sigurnu uporabu nije potreban OZO (osobna zaštitna oprema).

— Čuvati izvan dohvata djece.

4.2.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [4] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

5.1 **Upute za uporabu**

Vidjeti upute specifične za uporabu.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

Vidjeti mjere za smanjenje specifičnih rizika pri uporabi

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon dodira proizvoda s okom: Isprati odmah vodom.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Kenodin SD	područje prodaje: EU
	IodoSD 3000	područje prodaje: EU
	Bio Tec Jodspray 3000	područje prodaje: EU
	Q Farm Iodine Des	područje prodaje: EU
	ANRO - Euterpflege Dip	područje prodaje: EU
	Stalosan Io Spray	područje prodaje: EU
	Stalosan Super Spray	područje prodaje: EU

[4] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 4.

	IDip+	područje prodaje: EU
	Bühning Jodspray 3000	područje prodaje: EU
	Velvet RTU	područje prodaje: EU
	Wynnsan trikill spray	područje prodaje: EU
	Wynnsan Iodine spray RTU	područje prodaje: EU
	Wynngold Iodine Dip and spray	područje prodaje: EU
	Pezerk IL	područje prodaje: EU
	Iod protect 3000 Sprüh	područje prodaje: EU
	Seivit® Iode Spray	područje prodaje: EU
	IOD protect 3000 Sprüh	područje prodaje: EU
	Kenodin SprayFilm	područje prodaje: EU
	Iodo SP	područje prodaje: EU
	Kenostart SD	područje prodaje: EU
	GAHERYOD SPRAY	područje prodaje: EU
	Iodin Teat & Skin 3000	područje prodaje: EU
	Iod 3000 sprüh	područje prodaje: EU
	Iodoschutz sprüh	područje prodaje: EU
	Ioschutz sprüh	područje prodaje: EU
	Iodocoop sprüh	područje prodaje: EU
	Iodotech sprüh	područje prodaje: EU
	Iodactiv' sprüh	područje prodaje: EU
	Iodosprüh	područje prodaje: EU
	MIROX Spray Jod	područje prodaje: EU
	HCP Iodine SD	područje prodaje: EU
	Agib Jodium Spray	područje prodaje: EU
	Jod 3000 spray	područje prodaje: EU
	Iod sprüh	područje prodaje: EU
	Coopjod	područje prodaje: EU
	Coopiode spray	područje prodaje: EU
	Iodocoop spray	područje prodaje: EU
	Semex jod spray	područje prodaje: EU
	Iododip spray	područje prodaje: EU
	Iododip spray green	područje prodaje: EU
	Iodospray Bio	područje prodaje: EU
	Iospray bio	područje prodaje: EU
	Iodactive spray	područje prodaje: EU
	Iodactiv spray	područje prodaje: EU
	Iodactiv' spray	područje prodaje: EU
	Ark Iodine S+D	područje prodaje: EU
	Agrihealth Iodine SD	područje prodaje: EU
	AGRO LOGIC JODOCARE SPRAY	područje prodaje: EU
	IODACTIVE	područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0006 1-4	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,17

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5**

Identifikator	metaSPC 5: PT3 - RTU Teat disinfectants PVP-Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-5

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 5**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		3,0	3,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	1,5	2,9
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 5**

Formulacija(e)	AL - svaka druga tekućina

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

Oznaka upozorenja	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 6. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 03– Sredstvo za dezinfekciju sisa spremno za uporabu, poslije mužnje, polivinilpirolidon (PVP) jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija sisa poslije mužnje životinja u laktaciji
Načini primjene	Uranjanje ili prskanje-
Količine kod primjene i učestalost	Proizvod je spreman za uporabu. - Nanositi 2 puta dnevno za ručno prskanje i 3 puta dnevno za ručno uranjanje i prskanje robotom.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [5] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

5.1 **Upute za uporabu**

Proizvod se mora dovesti na temperaturu iznad 20 °C prije uporabe.

Preporučuje se uporaba dozirne pumpe za punjenje proizvodom u opremu za nanošenje.

Nanositi proizvod uranjanjem ili prskanjem:

— *Uranjanjem:* Nanositi proizvod posudom za uranjanje. Oprati posudu za uranjanje vodom nakon uporabe.

— *Prskanjem:* Nanositi proizvod ručnom ili automatiziranom prskalicom.

Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno. Preporučuje se 5 ml otopine po kravi po obradi.

Proizvod bi se trebao koristiti odmah nakon svake mužnje, dva puta dnevno za ručno prskanje i 3 puta dnevno za ručno uranjanje i prskanje robotom. Osigurati da je sisa potpuno pokrivena do tri četvrtine po duljini. Pustiti da se proizvod osuši na sisama. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

— Za nanošenje ručnim prskanjem: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Za nanošenje ručnim uranjanjem: Za sigurnu uporabu nije potreban OZO (osobna zaštitna oprema).

— Ako je potrebna dezinfekcija koja se kombinira prije i poslije mužnje, za dezinfekciju prije mužnje potrebno je razmotriti uporabu drugog biocidnog proizvoda koji ne sadržava jod.

— Čuvati izvan dohvata djece.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon dodira proizvoda s okom: Isprati odmah vodom.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

[5] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 5.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 18 mjeseci.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Iodo PVP Iodin Teat Dip 3000 PVP	područje prodaje: EU područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0007 1-5	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		3,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,5

7.2 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Iodo SD PVP Iodin Teat Spray & Dip 3000 PVP	područje prodaje: EU područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0008 1-5	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		3,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,5

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6**

Identifikator	metaSPC 6: PT3- RTU Udder disinfectants PVP-Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-6

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 6**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,0	0,0
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		10,0	10,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,0	2,0
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 6**

Formulacija(e)	AL - svaka druga tekućina

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

Oznaka upozorenja	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Može uzrokovati oštećenje organa (štitnjače) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (oralno).
Oznake obavijesti	Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Ne udisati aerosol.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 7. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 03- Sredstvo za dezinfekciju vimena spremno za uporabu, polivinilpirolidon (PVP) jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru — Sredstvo za dezinfekciju spremno za uporabu, samo za uporabu na netaknutoj koži: - vime mliječnih krava i goveda: prije telenja - vime krmača: prije prasenja
Načini primjene	prskanje-
Količine kod primjene i učestalost	Proizvod je spreman za uporabu. - Nanositi na: — Vime mliječnih krava i goveda: 1 prskanje na svaku sisu (jednako 4,8 ml po primjeni) — Vime krmača: 15 do 20 ml po životinji
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Proizvod mora biti na temperaturi iznad 20 °C prije uporabe.

Preporučuje se uporaba dozirne pumpe za punjenje proizvodom u opremu za nanošenje.

— Mliječne krave i goveda: Nanositi proizvod prskanjem na vime prije telenja (1 prskanje/po sisi jednako 4,8 ml po primjeni). Dezinfekcija se provodi jedanput, jedan dan prije telenja i jedanput, jedan dan nakon telenja. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

— Kod krmača, na vime prije prasenja: Preporučuje se 15 do 20 ml po životinji. Dezinfekcija se provodi jedanput, jedan dan prije prasenja i jedanput svaki dan tijekom 4 dana nakon prasenja. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

Samo za uporabu na netaknutoj koži.

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

— Za nanošenje ručnim prskanjem na krave i krmače: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Ako je potrebna kombinacija dezinfekcije krava poslije mužnje i dezinfekcije kože krava, proizvod na bazi joda ne smije koristiti ista osoba za obje dezinfekcije.

— Čuvati izvan dohvata djece.

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [6] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

5.1 **Upute za uporabu**

Vidjeti upute specifične za uporabu.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

Vidjeti mjere za smanjenje specifičnih rizika pri uporabi.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon dodira proizvoda s okom: Isprati odmah vodom.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti. NE izazvati povraćanje i odmah zatražiti savjet liječnika.

Imati pri ruci spremnik ili naljepnicu proizvoda.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Dermades PVP Wynngold 10 % Iodine Solution Iodin Skin Disinfectant PVP	područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0009 1-6	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,0
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		10,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,0

[6] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 6.

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7**

Identifikator	metaSPC 7: PT3 and PT4 - Concentrated Surface disinfectants Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-7

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi) Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 7**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	1,8	2,49
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		2,5	12,5

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 7**

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

Oznaka upozorenja	Uzrokuje teške ozljede oka. Može uzrokovati oštećenje organa (štitnjače) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (oralno). Može nagrizati metale. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitno odijelo. Nositi zaštitu za oči. Nositi zaštitu za lice.

	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati liječnika ili centar za kontrolu otrovanja. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Sakupiti proliveno/rasuto. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 8. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 04 – Koncentrirano površinsko sredstvo za dezinfekciju u kuhinjama i u prehrambenoj industriji, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Neporozna površinska dezinfekcija u profesionalnim kuhinjama i u prehrambenoj industriji
Načini primjene	Prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom-
Količine kod primjene i učestalost	Preporučuje se 0,04 l otopine za svaki kvadratni metar koji je potrebno dezinficirati. - Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca: 0,015 % joda Učestalost je jedanput dnevno.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Uporaba u profesionalnim kuhinjama (vrsta proizvoda 4) i u prehrambenoj industriji (vrsta proizvoda 4):

Proizvod je potrebno razrijediti vodom prije uporabe (prema tablici u nastavku).

Temeljito očistiti površine deterdžentom prije dezinfekcije. Isprati čistom vodom i ukloniti višak vode.

Proizvod se koristi u profesionalnim kuhinjama (površinska dezinfekcija): Učestalost je jedanput dnevno.

Proizvod se koristi u prehrambenoj industriji (površinska dezinfekcija): Učestalost je jedanput dnevno.

Koristiti na sobnoj temperaturi.

Nanositi proizvod prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom. Osigurati da je površina potpuno mokra. Pustiti da djeluje najmanje 15 minuta te nakon toga isprati površine čistom vodom.

Primjer proizvoda koji sadrži 1 % joda (*)	Razrjeđivanje proizvoda	Kontaktno vrijeme
Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca	1,5 % *(15 ml proizvoda, dodati do 1 l vode)*	15 min

(*) Na svakoj naljepnici proizvoda potrebno je navesti informacije o načinu razrjeđivanja. Budući da se koncentrirani jod u proizvodima u ovom meta SPC-u može kretati od 1,8 do 2,49 %, ovdje nije moguće navesti sva razrjeđivanja proizvoda.

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

— Tijekom lijevanja i pumpanja koncentriranog proizvoda: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu) i opremu za zaštitu očiju/lica.

— Tijekom prskanja proizvodom: Nositi rukavice otporne na kemikalije i zaštitno odijelo (barem tip X, EN XXXXX) (materijal rukavica i zaštitnog odijela treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Čuvati izvan dohvata djece.

— Javnost i životinje potrebno je držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2 **Opis uporabe**

Tablica 9. Uporaba br. 2 – Vrsta proizvoda 03 - Koncentrirano površinsko sredstvo za dezinfekciju za veterinarsku uporabu, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene	u zatvorenom prostoru Neporozna površinska dezinfekcija u veterinarskom području
Načini primjene	Prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom
Količine kod primjene i učestalost	Preporučuje se 0,04 l otopine za svaki kvadratni metar koji je potrebno dezinficirati. - Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca: 0,025 % joda u uporabi Virucidna djelotvornost: 0,035 % joda u uporabi Vidjeti mjere za smanjenje specifičnih rizika pri uporabi
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Koristiti u veterinarskom području (vrsta proizvoda 3), površinska dezinfekcija:

Proizvod je potrebno razrijediti vodom prije uporabe (prema tablici u nastavku).

Temeljito očistiti površine deterdžentom prije dezinfekcije. Isprati čistom vodom i ukloniti višak vode.

Proizvod se koristi za dezinfekciju nastambi za svinje, krave i perad.

Nanositi proizvod prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom. Osigurati da je površina potpuno mokra. Pustiti da djeluje najmanje 30 minuta.

Nastamba za životinje mora biti prazna tijekom primjene i životinje ponovno mogu ući u nastambu 24 sata nakon završetka primjene.

Primjer proizvoda koji sadrži 2,49 % joda (*)	Razrjeđivanje proizvoda	Kontaktno vrijeme
Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca	*1 % *(10 ml proizvoda, dodati do 1 l vode)*	30 min.
Virucidna djelotvornost	1,4 % *(14 ml proizvoda, dodati do 1 l vode)*	30 min.

(*) Na svakoj naljepnici proizvoda potrebno je navesti informacije o načinu razrjeđivanja. Budući da se koncentrirani jod u proizvodima u ovom meta SPC-u može kretati od 1,8 do 2,49 %, ovdje nije moguće navesti sva razrjeđivanja proizvoda.

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno.

4.2.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

— Tijekom lijevanja i pumpanja koncentriranog proizvoda: Nositi rukavice otporne na kemikalije, zaštitno odijelo (materijal treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu) i opremu za zaštitu očiju/lica.

— Tijekom prskanja proizvodom: Nositi rukavice otporne na kemikalije i zaštitno odijelo (barem tip X, EN XXXXX) koji su nepropusni za biocidni proizvod (materijal rukavica i zaštitnog odijela treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Koristiti dnevno samo jednu vrstu proizvoda koji sadrži jod.

— Zbog mogućeg problema za ljudsko zdravlje, isti profesionalni korisnik ne smije provoditi dezinfekciju nastambi za životinje više od 3 puta mjesečno i ne smije koristiti proizvode na bazi joda u druge svrhe tijekom tog razdoblja.

— Zbog mogućeg problema za zdravlje životinja, dezinfekcija staja ne bi se trebala provoditi više od jedanput godišnje ili jedanput u životnom vijeku za telad i svinje. Hraništa moraju biti pokrivena tijekom primjene.

— Čuvati izvan dohvata djece.

— Javnost i životinje potrebno je držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

4.2.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [7] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

5.1 **Upute za uporabu**

Vidjeti upute specifične za uporabu.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

Vidjeti mjere za smanjenje specifičnih rizika pri uporabi.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon dodira proizvoda s okom: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti hitnu liječničku pomoć ako bol, treptanje, suzenje ili crvenilo ne prestaju.

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti. NE izazvati povraćanje i odmah zatražiti savjet liječnika.

Imati pri ruci spremnik ili naljepnicu proizvoda.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Dodin 20 Iodo 20 Bio Tec Joddesinfektion Dufa dine 1,8 % Alfasan super disinfectant Iodes Streptoclean Iodin Surface Disinfectant 1,8 % IODINE	područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0010 1-7	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	1,8

[7] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 7.

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	5,29
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		5,0

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8**

Identifikator	metaSPC 8: PT3 and PT4 - Concentrated Surface disinfectants Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-8

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi) Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 8**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	2,5	3,0
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	3,15	9,45
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	5,0	12,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		2,5	12,5

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 8**

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8**

Oznaka upozorenja	Može nagrizati metale. Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka.

	Može uzrokovati oštećenje organa (štitnjače) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (oralno). Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitno odijelo. Nositi zaštitu za oči. Nositi zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu vodom. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. Pri otežanom disanju:Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sakupiti proliveno/rasuto. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 10. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 04 – Koncentrirano površinsko sredstvo za dezinfekciju u kuhinjama i u prehrambenoj industriji, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Neporozna površinska dezinfekcija u profesionalnim kuhinjama i u prehrambenoj industriji
Načini primjene	Prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom
Količine kod primjene i učestalost	Preporučuje se 0,04 l otopine za svaki kvadratni metar koji je potrebno dezinficirati. - Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca: 0,015 % joda Dnevna uporaba

Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

— Uporaba u profesionalnim kuhinjama (vrsta proizvoda 4) i u prehrambenoj industriji (vrsta proizvoda 4):

— Proizvod je potrebno razrijediti vodom prije uporabe (prema tablici u nastavku).

— Temeljito očistiti površine deterdžentom prije dezinfekcije. Isprati čistom vodom i ukloniti višak vode.

— Proizvod se koristi u profesionalnim kuhinjama (površinska dezinfekcija): Učestalost je jedanput dnevno.

— Proizvod se koristi u prehrambenoj industriji (površinska dezinfekcija): Učestalost je jedanput dnevno.

— Koristiti na sobnoj temperaturi.

— Proizvod se nanosi prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom. Osigurati da je površina potpuno mokra. Pustiti da djeluje najmanje 15 minuta te nakon toga isprati površine čistom vodom.

Primjer proizvoda koji sadrži 3 % joda (*)	Razrjeđivanje proizvoda	Kontaktno vrijeme
Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca	0,5 % *(5 ml proizvoda, dodati do 1 l vode)*	15 min.

(*) Na svakoj naljepnici proizvoda potrebno je navesti informacije o načinu razrjeđivanja. Budući da se koncentrirani jod u proizvodima u ovom meta SPC-u može kretati od 2,5 do 3 %, ovdje nije moguće navesti sva razrjeđivanja proizvoda.

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

— Tijekom lijevanja i pumpanja koncentriranog proizvoda: Nositi rukavice otporne na kemikalije, zaštitno odijelo (materijal treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu) i opremu za zaštitu očiju/lica.

— Tijekom prskanja proizvodom: Nositi rukavice otporne na kemikalije i zaštitno odijelo (barem tip X, EN XXXXX) (materijal rukavica i zaštitnog odijela treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Čuvati izvan dohvata djece.

— Javnost i životinje potrebno je držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2 **Opis uporabe**

Tablica 11. Uporaba br. 2 – Vrsta proizvoda 03 – Koncentrirano površinsko sredstvo za dezinfekciju za veterinarsku uporabu, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Neporozna površinska dezinfekcija u veterinarskom području
Načini primjene	Prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom
Količine kod primjene i učestalost	Preporučuje se 0,04 l otopine za svaki kvadratni metar koji je potrebno dezinficirati. - Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca: 0,025 % joda u uporabi Virucidna djelotvornost: 0,035 % joda u uporabi Vidjeti mjere za smanjenje specifičnih rizika pri uporabi.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Koristiti u veterinarskom području (vrsta proizvoda 3), površinska dezinfekcija:

Proizvod je potrebno razrijediti vodom prije uporabe (prema tablici u nastavku).

Temeljito očistiti površine deterdžentom prije dezinfekcije. Isprati čistom vodom i ukloniti višak vode.

Proizvod se koristi za dezinfekciju nastambi za svinje, krave i perad.

Nanositi proizvod prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom. Osigurati da je površina potpuno mokra. Pustiti da djeluje najmanje 30 minuta. Nastamba za životinje mora biti prazna tijekom primjene i životinje ponovno mogu ući u nastambu 24 sata nakon završetka primjene.

Primjer proizvoda koji sadrži 2,5 % joda (*)	**Razrjeđivanje proizvoda**	Kontaktno vrijeme
Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca	**1 % (10 ml proizvoda, dodati do 1 l vode)**	30 min.
Virucidna djelotvornost	**1,4 % (14 ml proizvoda, dodati do 1 l vode)**	30 min

(*) Na svakoj naljepnici proizvoda potrebno je navesti informacije o načinu razrjeđivanja. Budući da se koncentrirani jod u proizvodima u ovom meta SPC-u može kretati od 2,5 do 3 %, ovdje nije moguće navesti sva razrjeđivanja proizvoda.

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno.

4.2.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

— Tijekom lijevanja i pumpanja koncentriranog proizvoda: Nositi rukavice otporne na kemikalije, zaštitno odijelo (materijal treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu) i opremu za zaštitu očiju/lica.

— Tijekom prskanja proizvodom: Nositi rukavice otporne na kemikalije i zaštitno odijelo (barem tip X, EN XXXXX) koji su nepropusni za biocidni proizvod (materijal rukavica i zaštitnog odijela treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Koristiti dnevno samo jednu vrstu proizvoda koji sadrži jod.

— Zbog mogućeg problema za ljudsko zdravlje, isti profesionalni korisnik ne smije provoditi dezinfekciju nastambi za životinje više od 3 puta mjesečno i ne smije koristiti proizvode na bazi joda u druge svrhe tijekom tog razdoblja.

— Zbog mogućeg problema za zdravlje životinja, dezinfekcija staja ne bi se trebala provoditi više od jedanput godišnje ili jedanput u životnom vijeku za telad i svinje. Hranilišta moraju biti pokrivena tijekom primjene.

— Čuvati izvan dohvata djece.

— Javnost i životinje potrebno je držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

4.2.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU ([8]) METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8**

5.1 **Upute za uporabu**

Vidjeti upute specifične za uporabu.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

Vidjeti mjere za smanjenje specifičnih rizika pri uporabi.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon dodira proizvoda s okom: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti hitnu liječničku pomoć ako bol, treptanje, suzenje ili crvenilo ne prestaju.

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Nakon dodira s kožom (ili kosom): Skinuti zagađenu odjeću i obuću. Temeljito oprati zahvaćeno područje velikom količinom sapuna i vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti. NE izazvati povraćanje i odmah zatražiti savjet liječnika.

Imati pri ruci spremnik ili naljepnicu proizvoda.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 8**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Iocid 30	područje prodaje: EU
	Iodo 30	područje prodaje: EU
	Dufa dine	područje prodaje: EU
	Iodin Surface Disinfectant 2,8 %	područje prodaje: EU

([8]) Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 8.

Broj odobrenja	EU-0022265-0011 1-8				
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	7,93
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	11,25
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		12,5

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 9

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 9**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9**

Identifikator	metaSPC 9: PT4 - Concentrated CIP disinfectants Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-9

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 9**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 9**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,5	0,99
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	0,0	0,0
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	25,0	30,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 9**

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 9**

Oznaka upozorenja	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Može nagrizati metale.
Oznake obavijesti	Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitno odijelo. Nositi zaštitu za oči. Nositi zaštitu za lice. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu vodom. Pri otežanom disanju:Nazvati liječnika. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odmah nazvati liječnika.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 9**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 12. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 04 – Koncentrirano sredstvo za dezinfekciju za čišćenje na mjestu, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacteria Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Yeasts Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija čišćenjem na mjestu (CIP) za opremu za mužnju i za instalacije za čišćenje na mjestu u prehrambenoj industriji
Načini primjene	Dezinfekcija čišćenjem na mjestu (CIP)/

Količine kod primjene i učestalost	Nanositi proizvod u automatiziranom sustavu s krajnjom koncentracijom raspoloživog joda od 0,00125 % - Proizvod se koristi jedanput dnevno u prehrambenoj industriji i do 2 puta dnevno u prostorijama za mužnju.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [9] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 9**

5.1 **Upute za uporabu**

— Dezinfekcija strojeva za mužnju ili instalacija za čišćenje na mjestu u prehrambenoj industriji

— Najprije očistiti instalaciju za čišćenje na mjestu.

— Nanositi proizvod u automatiziranom sustavu uz razrjeđivanje proizvoda (prema tablici u nastavku) vodom.

— Koristiti na sobnoj temperaturi.

— Poštovati kontaktno vrijeme prema tablici u nastavku.

— Isprati instalaciju vodom.

Primjer proizvoda koji sadrži 0,5 % joda (*)	Razrjeđivanje proizvoda	Kontaktno vrijeme
Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca	0,25 % *(2,5 ml proizvoda, dodati do 1 l vode)*	15 min. za bakterije i kvasac

(*) Na svakoj naljepnici proizvoda potrebno je navesti informacije o načinu razrjeđivanja. Budući da se koncentrirani jod u proizvodima u ovom meta SPC-u može kretati od 0,5 do 0,99 %, ovdje nije moguće navesti sva razrjeđivanja proizvoda. Daje se primjer za proizvode s 0,5 % joda.

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

Tijekom lijevanja i pumpanja koncentriranog proizvoda: Nositi rukavice otporne na kemikalije, zaštitno odijelo (barem tip X, EN XXXXX) (materijal rukavica i zaštitnog odijela treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu) i opremu za zaštitu očiju/lica.

Čuvati izvan dohvata djece.

[9] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 9.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon udisanja: Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako poteškoća s disanjem ne prestaje.

Nakon dodira s kožom (ili kosom): Skinuti zagađenu odjeću i obuću. Temeljito oprati zahvaćeno područje velikom količinom sapuna i vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Nakon dodira proizvoda s okom: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti hitnu liječničku pomoć ako bol, treptanje, suzenje ili crvenilo ne prestaju.

Ako se proguta: Isprati usta. NE izazvati povraćanje i odmah zatražiti savjet liječnika.

Imati pri ruci spremnik ili naljepnicu proizvoda.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 9**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Iodo CIP Iocip Bio Tec Jodreiniger JODOPHOS SUPER 4001 Bühning Jodreiniger Wynnsan Ice bank Tank Cleaner Bulk Tank Sanitizer Iodin CIP Disinfectant	područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0012 1-9	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	26,3

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 10

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 10**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 10**

Identifikator	metaSPC 10: PT3 - Concentrated teat disinfectants Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-10

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 10**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 10**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	2,8	2,8
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	21,0	21,0
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 10**

Formulacija(e)	SL -topivi koncentrat

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 10**

Oznaka upozorenja	Uzrokuje teške ozljede oka. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Može uzrokovati oštećenje organa (štitnjače) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (oralno).
Oznake obavijesti	Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitno odijelo. Nositi zaštitu za oči. Nositi zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati liječnika ili centar za kontrolu otrovanja. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Sakupiti proliveno/rasuto.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 10**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 13. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 03 – Koncentrirano sredstvo za dezinfekciju sisa, poslije mužnje, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija sisa životinja u laktaciji poslije mužnje
Načini primjene	Prskanjem sisa ručnom ili automatiziranom prskalicom./
Količine kod primjene i učestalost	Proizvod mora biti razrijeđen prije uporabe kako bi se omogućila krajnja koncentracija joda od 0,3 %. - Nanositi 2 puta dnevno ručnom prskalicom i 3 puta dnevno robotom (ili automatiziranom prskalicom).
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [10] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 10**

5.1 **Upute za uporabu**

Proizvod mora biti razrijeđen prije uporabe kako bi se omogućila krajnja koncentracija joda od 0,3 %. Proizvod trebalo razrijediti do 11 % (110 ml proizvoda, dodati do 1 l vode).

Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno. Preporučuje se 5 ml otopine po kravi po obradi. Preporučuje se uporaba dozirne pumpe za punjenje proizvodom u opremu za nanošenje.

Koristiti rukavice i opremu za zaštitu očiju tijekom faze razrjeđivanja. Razrijeđeni proizvod može se čuvati i koristiti 1 tjedan.

Proizvod se mora dovesti na temperaturu iznad 20 °C prije uporabe.

Nanositi razrijeđeni proizvod na sise ručnom ili automatiziranom prskalicom.

Proizvod bi se trebao koristiti izravno nakon mužnje 2 puta dnevno ručnom prskalicom i 3 puta dnevno robotom (automatiziranom prskalicom). Osigurati da je sisa potpuno pokrivena do tri četvrtine po duljini. Pustiti da se proizvod osuši na sisama. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

— Za miješanje proizvoda i punjenje proizvodom: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu) i opremu za zaštitu očiju/lica.

— Za nanošenje ručnim prskanjem: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu) i opremu za zaštitu očiju/lica.

— Ako je potrebna dezinfekcija koja se kombinira prije i poslije mužnje, za dezinfekciju prije mužnje potrebno je razmotriti uporabu drugog proizvoda koji ne sadržava jod.

— Čuvati izvan dohvata djece.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon dodira proizvoda s okom: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti hitnu liječničku pomoć ako bol, treptanje, suzenje ili crvenilo ne prestaju.

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti. NE izazvati povraćanje i odmah zatražiti savjet liječnika.

Imati pri ruci spremnik ili naljepnicu proizvoda.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

Razrjeđivanja proizvoda stabilna su 1 tjedan.

[10] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 10.

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 10**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Kenodin SD 900	područje prodaje: EU
	IodoSD 900	područje prodaje: EU
	IDip+ concentrate	područje prodaje: EU
	Jodkonzentrat 1:9	područje prodaje: EU
	Bühning Jodkonzentrat 1:9	područje prodaje: EU
	Wynnsan Iodine Conc dip 9-1	područje prodaje: EU
	Kenodin 900	područje prodaje: EU
	Dufa Dip	područje prodaje: EU
	Kenostart 900	područje prodaje: EU
	Iodin Teat Spray 900	područje prodaje: EU
	HCP Iodine Concentrate	područje prodaje: EU
	Maxi Subliem CP	područje prodaje: EU
	Subliem Koncentrat Plus	područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0013 1-10	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	21,0

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 11

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 11**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11**

Identifikator	metaSPC 11: PT3 - RTU Teat disinfectants Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-11

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 11**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 11**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,25	0,25

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,1
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 11**

Formulacija(e)	AL - svaka druga tekućina

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 11**

Oznaka upozorenja	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 11**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 14. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 03 – Sredstvo za dezinfekciju sisa spremno za uporabu, poslije mužnje, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija sisa životinja u laktaciji poslije mužnje
Načini primjene	Uranjanjem ili prskanjem sisa/
Količine kod primjene i učestalost	Proizvod je spreman za uporabu. - Nanositi 2 puta dnevno ručnom prskalicom i 3 puta dnevno posudom za uranjanje ili robotom (automatiziranom prskalicom).

Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [11] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 11**

5.1 **Upute za uporabu**

Nanositi proizvod uranjanjem ili prskanjem:

— Uranjanjem: Nanositi proizvod posudom za uranjanje. Oprati posudu za uranjanje vodom nakon uporabe.

— Prskanjem: Nanositi proizvod ručnom ili automatiziranom prskalicom.

Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno; preporučuje se 5 ml otopine po kravi po obradi. Proizvod mora biti na temperaturi iznad 20 °C prije uporabe. Preporučuje se uporaba dozirne pumpe za punjenje proizvodom u opremu za nanošenje.

Proizvod bi se trebao koristiti odmah nakon svake mužnje, dva puta dnevno ručnom prskalicom ili tri puta dnevno posudom za uranjanje ili robotom (automatiziranom prskalicom). Osigurati da je sisa potpuno pokrivena do tri četvrtine po duljini. Pustiti da se proizvod osuši na sisama. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

— Za nanošenje ručnim prskanjem: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Za nanošenje ručnim uranjanjem: Za sigurnu uporabu nije potreban OZO (osobna zaštitna oprema).

— Ako je potrebna dezinfekcija koja se kombinira prije i poslije mužnje, za dezinfekciju prije mužnje potrebno je razmotriti uporabu drugog proizvoda koji ne sadržava jod.

— Čuvati izvan dohvata djece.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon dodira proizvoda s okom: Isprati odmah vodom.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

[11] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 11.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 11**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Kenodin 2500 Iodin Teat Dip 2500 Jod 2500	područje prodaje: EU područje prodaje: EU područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0014 1-11	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,25
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,1

METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 12

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 12**

1.1 **Identifikacijska oznaka iz metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 12**

Identifikator	meta SPC 12: PT3 – RTU Teat disinfectants Iodine

1.2 **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-12

1.3 **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

2. **SASTAV U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 12**

2.1 **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 12**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,5
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0	0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,1	2,9

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)	
					Min.	Maks.
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina	Neaktivna tvar	7664-38-2	231-633-2	0,0	0,0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO	Neaktivna tvar	68439-46-3		0,0	0,0

2.2 **Vrste formulacija u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 12**

Formulacija(e)	AL - svaka druga tekućina

3. **OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 12**

Oznaka upozorenja	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom. Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 12**

4.1 **Opis uporabe**

Tablica 15. Uporaba br. 1 – Vrsta proizvoda 03– Sredstvo za dezinfekciju sisa spremno za uporabu, poslije mužnje, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Dezinfekcija sisa životinja u laktaciji poslije mužnje
Načini primjene	Uranjanjem ili prskanjem sisa/
Količine kod primjene i učestalost	Proizvod je spreman za uporabu. - Nanositi 2 puta dnevno za ručno prskanje i 3 puta dnevno za ručno uranjanje i prskanje robotom.
Kategorije korisnika	profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.2 *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.3 *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. **OPĆE SMJERNICE ZA UPORABU** [12] **METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 12**

5.1 **Upute za uporabu**

Proizvod se mora dovesti na temperaturu iznad 20°C prije uporabe.

Nanositi proizvod uranjanjem ili prskanjem:

— Uranjanjem: Nanositi proizvod posudom za uranjanje. Oprati posudu za uranjanje vodom nakon uporabe

— Prskanjem: Nanositi proizvod ručnom ili automatiziranom prskalicom.

Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno; preporučuje se 5 ml otopine po kravi po obradi.

Proizvod bi se trebao koristiti odmah nakon svake mužnje: 2 puta dnevno za ručno prskanje i 3 puta dnevno za ručno uranjanje i prskanje robotom. Osigurati da je sisa potpuno pokrivena do tri četvrtine po duljini. Pustiti da se proizvod osuši na sisama. Osigurati dostatno kontaktno vrijeme i potrebno je voditi brigu da se proizvod ne ukloni nakon nanošenja (npr. životinja treba stajati najmanje 5 minuta).

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

5.2 **Mjere za smanjenje rizika**

— Za nanošenje ručnim prskanjem: Nositi rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).

— Za nanošenje ručnim uranjanjem: Za sigurnu uporabu nije potreban OZO (osobna zaštitna oprema).

— Ako je potrebna dezinfekcija koja se kombinira prije i poslije mužnje, za dezinfekciju prije mužnje potrebno je razmotriti uporabu drugog proizvoda koji ne sadržava jod.

— Čuvati izvan dohvata djece.

5.3 **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Nakon dodira proizvoda s okom: Isprati odmah vodom.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti.

5.4 **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

[12] Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu u sklopu metasažetka svojstava biocidnog proizvoda 12.

5.5 **Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja**

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi.

Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 12**

7.1 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Kenodin 5000	područje prodaje: EU
	IodoDip 5000	područje prodaje: EU
	JOD 5000	područje prodaje: EU
	Bio Tec Jodip 5000	područje prodaje: EU
	Bühning Jodfilmdip-Super	područje prodaje: EU
	Iocid 5000	područje prodaje: EU
	Iod protect 5000 Film	područje prodaje: EU
	IOD protect 5000 Film	područje prodaje: EU
	Iocid	područje prodaje: EU
	Iodip+	područje prodaje: EU
	Protetos cua	područje prodaje: EU
	Iodin Teat Dip 5000	područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0015 1-12	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,9

7.2 **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv	Kenodin SD 5000	područje prodaje: EU
	IodoSD 5000	područje prodaje: EU
	IODOSPRAY 5000	područje prodaje: EU
	Bio Tec Jodspray 5000	područje prodaje: EU
	IDip+ 5000	područje prodaje: EU
	Bühning Jodspray 5000	područje prodaje: EU
	Iod protect 5000 Sprüh	područje prodaje: EU
	Kenodin Film Spray	područje prodaje: EU
	IOD protect 5000 Sprüh	područje prodaje: EU
	Iodin Spray & Dip 5000	područje prodaje: EU
Broj odobrenja	EU-0022265-0016 1-12	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	0,5
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0,0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Neaktivna tvar	68131-39-5	500-195-7	2,9